

KINDERKRANKHEITEN

A. VOGEL


YALE
MEDICAL LIBRARY



HISTORICAL LIBRARY

The Gift of

GEORGE C. GRAHAM



Dr. F. Reichmann.

Dr. J. B. Schumann

LEHRBUCH

DER

KINDERKRANKHEITEN.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LEHRBUCH
DER
KINDERKRANKHEITEN

VON

DR. ALFRED VOGEL,
PROFESSOR DER MEDICINISCHEN KLINIK IN DORPAT.

MIT SECHS LITHOGRAPHIRTEN TAFELN.

SIEBENTE AUFLAGE.

STUTT GART.
VERLAG VON FERDINAND ENKE.
1876.

RJ 44
875V.

Vorwort zur ersten Auflage.

Der Hauptzweck dieses Buches ist, meinen Zuhörern einen Leitfaden in die Hand zu geben, welchen sie ihren häuslichen Studien zu Grunde legen können.

In einem von zahlreichen Kranken frequentirten Ambulatorium ist es nicht immer möglich, über alle Fälle die gehörige, erschöpfende Belehrung zu geben. Man muss sich meist damit begnügen, nach einem bündigen Krankensexamen die Diagnose zu stellen, das Sichtbare sehen, das Hörbare hören und das Greifbare fühlen zu lassen. Die ausführlichere Schilderung und Deutung der Symptome kann bei gehörigem Fleisse auch aus Büchern erlernt werden.

Obgleich nun die Zahl der schon bestehenden Lehrbücher keine geringe ist und jedes derselben viel Gutes und Wahres enthält, so wird man mir es doch nicht vorargen, wenn ich mit keinem derselben vollkommen einverstanden bin. Es soll dieses keineswegs als Tadel, sondern nur als Beweis angesehen werden, dass Manches in der Pädiatrik noch Hypothese ist und namentlich die Therapie von verschiedenen Aerzten verschieden gehandhabt wird.

Die hier angegebene Behandlung mag sceptisch oder selbst einzig genannt werden. Sie mag es stellenweise auch sein. Jeder Arzt kann sich irren, keiner aber sollte sich herbeilassen, Mittel zu rühmen, die ihm selbst schon oft im Stiche gelassen haben. Hätte man von jeher streng an diesem Grundsatz festgehalten, so stünde es gewiss besser um unsere Therapie und um den ganzen Stand der Aerzte überhaupt.

Die ziemlich allgemein gewordene Sitte, jedem Abschnitte eine möglichst grosse Anzahl von Quellen aus Handbüchern, Monographien und Journalartikeln voranzuschicken, ist unterlassen, weil sich diese Citate schon in den meisten andern Lehrbüchern finden, z. B. bei Rilliet und Barthez, bei Canstatt, in Virchow's Pathologie, und weil dieselben nur dann einen Sinn haben, wenn auch ihr Inhalt in der folgenden Schilderung resumirt und kritisch beleuchtet wird. Eine derartige Bearbeitung ist jedoch für das Anfangsstadium nicht zweckmässig, indem hierbei die nöthige Kürze und Klarheit verloren geht.

München, im Juli 1860

Alfred Vogel.

Vorwort zur siebenten Auflage.

Die Anerkennung, welche mein Lehrbuch bei Fachgenossen und Studierenden findet, die Uebersetzung desselben in alle Hauptsprachen der civilisirten Welt und das schnelle Vergriffensein der letzten Auflage verschaffen mir die beruhigende Gewissheit, dass dasselbe nicht ohne allen Nutzen geblieben ist.

Einige Zusätze und theilweise Umarbeitung haben die Capitel von der künstlichen Ernährung des Säuglings, von der Ruhr, der Tuberculosis und der vasculären Lähmung erfahren. Bei der Behandlung wurde mehrfach der antiseptischen Methode gedacht. An verschiedenen Abschnitten mussten Zusätze und Verbesserungen vorgenommen werden und schließlich wurde durch Aufügung eines Sachregisters einem mehrfach geäußerten Wunsche entsprochen.

Im Uebrigen möchte ich an die Worte des Satyristen erinnern:

*Sed haec, sed quibus medicum, sed sedis plene
Quis legat hic, aliter non H. sedis liber*

Dorpat, im Juni 1876.

Alfred Vogel.

Inhalt.

	Seite		Seite
Vorwort	III	Milchanalyse	29
I. Allgemeiner Theil.		Ernährung	37
1. Capitel.		Künstliche Ernährung	38
Physiologisch-anatomische Bemerkungen über den kindlichen Organismus	I	Beizug, Kleidung, Wohnung	44
A. Respiration und Circulation.		II. Specießer Theil.	
Ductus venosus Arantii	1	1. Capitel.	
Ductus arteriosus Botalli	2	Krankheiten direct in Folge der Geburt entstehend	46
Fornix ovale	2	A. Asphyxia neonatorum	46
Arteriae umbilicales	2	B. Atelectasis pulmonum	49
Thymusdrüse	3	C. Cephaloematom	50
II. Secretionen.		D. Krankheiten des Nabels	53
Neonatorum	4	1) Entzündung der Nabelgefäße	54
Harnstrenge	5	2) Ulceration der Nabelhöhle	54
Hautsecretion, Gese	6	3) Brand des Nabels	55
C. Wachsthum.		4) Der überzählige Nabelstrang	55
Allgemeines Wachsthum	6	5) Nabelhernie	56
Falten	7	6) Nabelbruch	57
Zahndurchbruch	10	E. Triumvir neonatorum	58
2. Capitel.		F. Zellgewebverhärtung	61
Allgemeine Regeln für die Untersuchung der Kinder	12	G. Mastitis neonatorum	63
Fuß	15	H. Melasma neonatorum	65
Brusthöhle	16	I. Icterus neonatorum	66
Bauchhöhle	21	K. Congestio neonatorum	67
Gestalt und Maßen	23	2. Capitel.	
3. Capitel.		Krankheiten des Digestionsapparates.	
Ernährung und Pflege der Kinder	26	A. Mundhöhle.	
Ammenwahl	27	1) Harnschale	73
		2) Stomatitis	74
		3) Defectus linguae	74

	Seite
4) Protopharyngitis	76
5) Adenitis linguae	77
6) Paratonsillitis	78
7) Stomatitis catarrhalis	79
8) Diphtheritis	81
9) Stomatitis	85
10) Stomatitis aphthosa	87
11) Noma	89
12) Scar	91

Anhang.

a) Bedeutung des Zungenbeines	96
b) Dentitonschmerzen	96

B. Parotis.

1) Parotitis	102
2) Hypertrophie der Parotis	106

C. Pharynx und Oesophagus.

1) Angina tonsillaris	109
2) Hypertrophie tonsillarum	109
3) Retropharyngealabszesse	110
4) Oesophagitis	111
5) Fimbria veli convergentia	113
6) Schwellung des Stimmritzes	118

D. Magen und Duodenum.

1) Die wichtigsten Symptome der Magen- und Duodenalaffektionen	114
a) Dyspepsie	114
b) Ebelus	116
c) Erbrechen	117
d) Flatulen und Kolik	120
e) Diarrhoe	123
f) Verstopfung	126
2) Calambus ventriculi	128
3) Toxische Entzündung d. Magens	129
4) Ulcus pepticum	131
5) Hämorrhagische Erosionen	132
Magenerweiterung	132
6) Catarrhus intestinalis	137
7) Enteritis biliosa	142
8) Dysenteria	145
9) Intussusception	149
10) Hernia inguinalis	153
11) Fissura ani	154
12) Polypen des Mastdarms	154
13) Proctopus ani	155
14) Bildungsfehler des Anus	157

15) Infektionskrankheiten mit vorwiegender Localisation auf dem Darmkanal	160
a) Typhus abdominalis	160
b) Cholera asiatica	177
16) Entomen	183

E. Leber.

1) Syphilitische Lebermetastase	191
2) Fettheder	192
3) Angeborene Anomalien	195

F. Milz.

Wechselleber	196
------------------------	-----

G. Bauchfell.

1) Peritonitis	199
2) Ascites	202
3) Krankheiten d. Mesenterialdrüsen	204

3. Capitel.

Krankheiten der Respirationsorgane.

A. Nasenhöhle.

1) Epistaxis	205
2) Coryza	206
3) Nasenbluten in der Nase	208
4) Fremde Körper in der Nase	209

B. Larynx und Trachea.

1) Keuch	210
2) Pseudokrup	223
3) Stenosen	227
a) Spasmus glottidis	227
b) Paralyse glottidis	234

C. Schlundhöhle.

Struma	235
------------------	-----

D. Thyroidea.

E. Lungen.

1) Catarrhus bronchialis	238
2) Pneumonia	244
3) Erweichende Abscessen	250
4) Emphysema	256
5) Oedema pulmonum	257
6) Haemoptoe	259
7) Haemoptoischer Infarkt	260
8) Gangraena pulmonum	261
9) Tuberculosis pulmonum	263
10) Carcinoma pulmonum et metastasi alicui	269
11) Tumor coracalis	270
12) Periodischer Narkitismus	281

	Seite		Seite
F. Pleura.		H. Gehörsin.	
1) Pleuritis	282	1) Bildungsfehler am Gehörgange	355
2) Hydrothorax	288	a) Mangel der Ohrmuschel	355
		b) Verschiebung d. Gehörgangs	360
4. Capitel.		2) Otitis externa	357
Krankheiten der Circulationsorgane:		3) Abscessbildung im Gehörgang	359
A. Herz und Gefäßstämme.		4) Otitis interna	361
1) Angeborene Anomalien	290	5) Fremde Körper im Otre	364
2) Herzentzündung u. Rheumatis- mus mitans	296		
3) Hyperaerikardium	304	6. Capitel.	
B. Arterien und Venen.		Krankheiten der Harn- und Ge- schlechtsorgane.	
1) Nervus varicosus	305	A. Nieren.	
2) Thrombosen des Naves & Dues infer	307	1) Bildungsfehler der Nieren	396
		2) Harnsteinfarkt	398
6. Capitel.		3) Nephros Brightii	399
Krankheiten des Nervensystems.		4) Nierensteine, Nierenabscess, Nierenzysten	404
A. Gehirn.		B. Harnblase.	
1) Hydrocephalus acutus	306	1) Bildungsfehler	405
2) Meningitis und Encephalitis	325	2) Cystitis	407
3) Sonnenstich	328	3) Incontinencia urinae	409
4) Hydrocephalus und Infantile cerebri	329	4) Ischuria	412
5) Hydrocephalus chronicus	333	5) Haematuria	412
6) Angeborener Gehirnschmerz	336		
7) Sclerosis des Gehirns	337	C. Männliche Genitalien.	
8) Neoplasmen des Gehirns.		I. Penis.	
a) Tuberkel	338	1) Bildungsfehler	415
b) Krebs	339	2) Balanitis	417
c) Ektasie	340	3) Errebenes Paraphimosis	418
9) Bildungsfehler	340	4) Onanie	419
B. Rückenmark.		II. Hoden.	
1) Entzündung des Rückenmarkes und seiner Hüllen	341	1) Cryptorchidie	421
2) Spina bifida	345	2) Hydrocele	422
C. Störungen der Nervenleitung.		D. Weibliche Genitalien.	
1) Eclampsia infantum	349	1) Bildungsfehler	424
2) Paralyse	355	2) Leukorrhoea	426
3) Chorea minor	359	3) Diphtherie und Brand	429
4) Chorea major	367	4) Vaginallähmung	432
5) Epilepsia	370		
Anhang.		7. Capitel.	
Gehirnkrankheiten	380	Hautkrankheiten.	
D. Höhere Sinnesorgane.		1) Schätzsch	430
I. Gesichtssinn.		2) Masern	430
1) Epithelium	382	3) Syphilis	430
2) Cyclopa	383	4) Sklerum	431
3) Bildungsfehler d. inneren Auges	383	Varicella	434
		5) Malformirte Sklerum	436
		6) Erythema nodosum	437
		7) Erysipelas	438

	Seite		Seite
8) Infortigo	464	2) Tuberculosis und Scrophulosis . .	485
9) Furunculosis	465	A. Tuberculosis.	
10) Paraplegia benigna	466	B. Scrophulosis.	
11) Krätze	467	a) Haut	493
12) Skleroderm	469	b) Schleimhäute u. Excretionsorgane .	497
13) Verbrennung	471	c) Lymphdrüsen und Zellgewebe .	502
14) Erfrierung	472	d) Knochen	504
8. Capitel.		e) Gelenke	510
Dyskrasie.		3) Hereditäre Syphilis	532
1) Blaskrätze	475		

I. Allgemeiner Theil.

1. Capitel.

Physiologisch-anatomische Bemerkungen über den kindlichen Organismus.

A. Respiration und Circulation. Der erste Akt des Neugeborenen ist eine Inspiration. Unmittelbar nach der Geburt contrahiren sich die Inspirationsmuskeln, und es dringt zum ersten Male atmosphärische Luft in die Lungenbläschen. Die hierauf erfolgende Volumenzunahme der Lungen bedingt einerseits nach aussen Vergrösserung des Brustkorbes, andererseits aber auch nach innen eine Compression der neben den Lungen in der Brusthöhle befindlichen Organe — Herz, grosse Gefässe und Thymusdrüse, — und ferner ein Herabdrängen des Zwerchfells, wodurch ein beträchtlicher Druck auf die Baucheingeweide entbunden muss. Diese plötzliche Volumenveränderung sämtlicher Brust- und Baucheingeweide trägt neben andern physiologischen Vorgängen jedenfalls dazu bei, die Circulationsverhältnisse der einzelnen Organe zu ändern und es schliessen sich in der That folgende fötale Blutbahnen unmittelbar oder bald nach der Geburt:

1) Der Ductus venosus Arantii, Tafel I. 4. Aus der Placenta entspringt die Nabelvene, Tafel I. 8, läuft nach ihrem Eintritt durch den Nabelring zwischen dem Bauchfell und den Mase. transversa zur Leber und gelangt durch die Fossa longitudinalis anterior sinistra rückwärts zum linken Ende der Fossa transversa. Sie theilt sich hier in 2 Aeste, von welchen der grössere in den linken Ast der Pfortader geht, der kleinere Ast als Ductus venosus Arantii aber in die untere Hohlvene, Tafel I. 4. einmündet. Der Ductus venosus Arantii verbindet also die Nabelvene mit der V. cava inferior, und diese Verbindung sowie jene mit der Pfortader wird aufgehoben, sobald die Placenta vom Uterus abgestossen, das Blut in der Nabelvene stagnirt, und die erste Inspiration geschehen ist.

2) Der Ductus arteriosus Botalli, Tafel I. 2, am Fetus ein Verbindungskanal zwischen der arteria pulmonalis und der Aorta. Er entspringt da, wo die Arteria pulmonalis sich in die beiden Aeste spaltet, doch mehr nach dem linken Aeste hin, läuft dann schräg aufwärts nach dem unteren Rande des Aortabogens, und verbindet sich unter einem stumpfen Winkel mit demselben an der Stelle, wo nach oben die linke Arteria subclavia hervorkommt. Er dient dazu, das Blut von den Lungen abzulassen und es sogleich wieder aus dem rechten Herzen in den grossen Kreislauf zu bringen. Je näher die Geburt heranrückt, desto dünner wird der Ductus arteriosus B., desto stärker die beiden Aeste der Pulmonalarterie. Je weiter der Ductus arterios. B., desto enger ist der Theil der Aorta, welcher aus dem Herzen bis zur Einmündungsstelle dieses Ductus geht. Die durch die Inspirationsmuskeln ausgebluteten Lungen saugen nicht nur Luft, sondern auch Blut aus den Gefässen an, nicht bloss das luftführende, auch das blutführende Röhrensystem erweitert sich. Es entsteht ein stärkerer Blutstrom von der Lungenarterie zu den Lungen und die letztere gibt weniger Blut an ihren fistulösen Zweig, den duct. Botalli ab. Die Ausdehnung der Lungen bewirkt aber auch eine Lageveränderung, selbst Knickung des duct. Botalli, in welchem gleichzeitig eine Gewebewucherung der longitudinalen Schichten der tunica media und intima eintritt und die Innenfläche des Gefässes füllig und buckelig macht. An diesen Unebenheiten schlagen sich feine Fibringerinnsel nieder, welche ebenfalls zur Verstopfung des Lumens beitragen und ein constantes Vorkommen von Haematoiden in dem später sich daraus bildenden ligam. arteriosum bedingen. Der fistulöse ductus Botalli obliterirt hiernach so schnell, dass man bei einem Kinde, das 2—3 Tage gelebt hat, kaum mehr eine feine Sonde durch denselben führen kann.

3) Das Foramen ovale. Das Septum der Vorhöfe hat im Fetus eine Oeffnung, For. ovale, da wo beim Erwachsenen die Fossa ovalis liegt. An dieser Oeffnung findet sich eine häutige, halbmondförmige Klappe, Valsula foraminis ovalis, die nach oben einen ausgeschweiften freien Rand hat. Im Fetus verschliesst diese Klappe das For. ovale nur sehr unvollständig, so dass ein Theil des Blutes aus dem rechten Vorhof direkt in den linken Vorhof und von da Umgehung der Lungen sogleich wieder in den grossen Kreislauf gelangt. Je näher die Geburt heranrückt, um so kleiner wird das For. ovale und um so grösser und entwickelter seine Klappe. Nach der Geburt wandeln sich die Lungen plötzlich zu einem Sangwerke um, es wird eine grössere Blutzufuhr zu denselben nothwendig, der rechte Ventrikel erweitert sich und hienit wird die Blutbahn vom For. ovale abgehekt. Der freie Rand der halbmondförmigen Klappe besteht zwar gewöhnlich noch einige Monate fort, die Klappe ist aber so entwickelt, dass sie allseitig, sufficient schliesst. Bei Kindern über 8—10 Monate findet man in der Regel den Klappenrand total mit dem entsprechenden Rande des For. ovale verwachsen.

4) Die Nabelarterien, Art. umbilicales, Tafel I. 3. Nachdem schon bei Verschluss des Ductus venosus Arnati der Nabelvene gedacht worden, erübrigt noch die Beschreibung des Verschlusses der Nabelarterien. Die beiden Nabelarterien entspringen aus der entsprechenden Arteria hypogastrica, übertreffen an Dicke alle übrigen

Arter der Hypogastrica und steigen neben der Harnblase aufwärts. Beide fassen den Uterus zwischen sich und geben mit ihm zwischen den Bauchmuskeln und dem Bauchfell in die Höhe bis zum Nabel. Sie laufen nun gewunden durch den Nabelstrang und erreichen die Placenta, in der sie sich verästeln. Sobald die Verbindung zwischen Uterus und Placenta aufgehört hat, entsteht in diesen Umbilicalarterien ein Thrombus, der sich fast bis zu ihrem Ursprunge aus der arteria hypogastrica erstreckt. Nur eine kurze Strecke von diesen Ursprungsstellen bleiben sie wegsam, und geben einige Arter. vesicales, beim weiblichen Geschlecht ausserdem die Arter. uterina ab. Der übrige Theil von da bis zum Nabelring obliterirt und bildet einen feinen weissen Strang.

Neben diesen grossen mechanischen Veränderungen gehen durch den Eintritt der atmosphärischen Luft in die Lungen noch bedeutendere chemische Processus vor. Durch Wechselwirkung von Luft und Blut, und durch den Austausch von Gasen, welche die Wand der den Lungen-Alveolen anliegenden Capillaren und die Alveolenwandung selbst in zwei entgegengesetzten Richtungen zu durchdringen haben, wird Luft und Blut so verändert, dass erstere irrespirabel, letzteres arteriell und somit nahrungsfähig gemacht wird. Der Neugeborene bekommt hellrothes und dunkelrothes Blut.

Eines dem künftlichen Organismus allein zukommenden Organes muss hier noch Erwähnung geschehen, der Thymusdrüse. Die Thymus zeichnet sich durch grosse Verschiedenheit in Bezug auf Grösse, Gewicht, Consistenz und Gestalt aus.

In das Mediastinum anticum eingebettet, beschränkt sie sich bald auf den obern Theil des Herzbeutels und auf die Ursprünge der grossen Gefässstämme, in der Breite kaum $\frac{1}{2}$ Zoll messend, bald wieder reicht sie von der Schilddrüse bis zum Zwerchfell herab und übersteigt $2\frac{1}{2}$ Zoll in der Breite. Nach Jendrassik sind ihre Hauptabflüsse unmittelbare Zweige der grossen Gefässstämme, welchen sie aufliegt. Nach demselben Autor, dem wir noch die meiste Aufklärung über dieses räthselhafte Organ verdanken, besteht die Thymus aus zwei oft sehr ungleichen Hälften, welche durch eine aus mehreren zarten Blättern zusammengesetzte Metabran mit einander verbunden sind, in der die Hauptabflüsse verlaufen. Die häufiger vorkommende Gestalt einer solchen Thymushälfte ist eine längliche, das obere Drittel beiläufig schmählich, abgerundet, während der übrige Theil mehr abgedacht und breiter ist; oft krümmt sich noch vom unteren Ende der Drüse ein mehr oder weniger grosser Abschnitt hornartig am äusseren Rande nach aufwärts. Abweichend von dieser Form ist die Thymushälfte nur in Gestalt eines durchgehends dünnen und schmalen strangartigen Streifens vorhanden, oder sie zerfällt bei bedeutendem Volumen in mehrere abgerundete Lappen, die durch dünne Parenchymtheile verbunden neben oder über einander gelagert sind.

In allen Fällen ist die vordere dem Sternum zugewendete Fläche convex, die hintere dem Herzbeutel aufliegende schwach concav. Der äussere und untere Rand ist dünn, oft saumartig, der innere stumpfer, mit tiefen Furchen versehen, in welche wie in einen Hohl die Blutgefässe sich einenken.

Am Anfange solid und festkörnig verknüpft sich die Thymus

mit der Zeit in eine viele Höhlen bergende, weichere Masse, deren Saft immer sauer reagirt. Die Erweichung schreitet von der Centralaxe, wo in einem ausgebreiteten Bindegewebslager die Hauptvenen verlaufen, nach der Peripherie vor. Nach und nach wird die Drüse immer flacher, die Hohlräume treten dichter an einander, so dass von einem Drüsenparenchym eigentlich nichts mehr zu bemerken ist, und zur Zeit der beginnenden Pubertät ist sie in der Regel vollkommen verschwunden. Ausnahmsweise jedoch findet sie sich auch noch bei älteren Individuen, zuweilen sogar von beträchtlichem Umfang und Gewicht. Bei tuberculösen Kindern findet man sie von Tuberkeln durchsetzt. Der Krebs des *Mediastinum anticum*, der bei Kindern verhältnissmässig öfter vorkommt als bei Erwachsenen, nimmt wahrscheinlich von ihr seinen Ausgang. Die vielfach nachgezählte Angabe, dass bei syphilitischen Kindern sich Abscesses in der Thymus finden, beruht nach Jendrassik auf einem Irrthum; denn die vermeintlichen Abscesses sind meistens nichts anderes, als die in der Rückbildung regelmässig entstehenden Hohlräume, welche sich bei vielen nicht im mindesten syphilitischen Kindern auch finden.

B. Secretionen. Sämmtliche Schleimhäute, die im Fetalzustande nur sehr wenig functioniren, fangen nach der Geburt an, das ihnen eigenthümliche Secret zu secretiren. Die Mund- und Nasenhöhle werden schlüpfrig, letztere oft nur sehr mangelhaft, so dass häufig Kunsthilfe nöthig wird, um die angetrockneten Schleimkrusten zu entfernen. Die Speicheldrüsen secretiren zwar auch eine Flüssigkeit, dieselbe hat aber noch nicht ganz die chemischen Eigenschaften des Speichels der Erwachsenen, indem sie Stärkmehl nur sehr langsam in Zucker umzuwandeln im Stande ist. Der Magen beginnt einen Saft zu secretiren, der den in der Muttermilch enthaltenen Klebstoff löst. Die den grössten Theil der Bauchhöhle ausfüllende Leber secretirt hellbraune Galle, die den Faeces, nach Entleerung des dunkelbraunen Meconiums (Kindspeches), eine orangegelbe Farbe verleiht.

Die weit verbreitete Ansicht, das Meconium sei ein Gemisch von Galle, Darmoschleim und Darmepithel, hat sich durch Förster's Untersuchungen als irrig erwiesen. Es besteht vielmehr aus platten Schüppchen, die alle Charaktere verhornter Plattenepithelien an sich tragen, daher aus dem *Tractus intestinalis* nicht herkommen können, vielmehr vollkommen genau mit den Hornschüppchen des *Vernix caseosus* übereinstimmen. Daneben finden sich constant Härchen in derselben Menge wie im *Vernix caseosus* und ausserdem Fettkugeln von verschiedener Grösse — offenbar Hauttalg, dem *Vernix caseosus* angehörig — Cholesterinkrystalle, die theils aus der Galle stammen, theils Rückbildungsproducte des *Vernix caseosus* sein mögen, und unregelmässige gelbe und bräunliche Klumpen und Schollen, welche die dunkle Färbung des Meconium verursachen und ohne Zweifel Gallenfarbstoffe sind. Es besteht demnach das Meconium ausser den allerdings von der Galle herrührenden letztgenannten Substanzen hauptsächlich aus *Vernix caseosus*; und es geht daraus hervor, dass der Fetus von Zeit zu Zeit — und zwar, aus der gewöhnlichen Quantität Meconium zu schliessen, nach und nach eine ziemlich grosse Menge — Amnionwasser mit dem in ihm schwimmenden *Vernix caseosus* verschluckt, wovon das Wasser im Magen rasch aufgesogen wird, da man es nie in demselben findet.

die Haare und Hornschüppchen aber als unverdaut durch den ganzen Tractus intestinalis wandern.

Der Darm secernirt nach der Geburt eine gewisse Quantität Schleim, dessen verwechselte oder vermischte Secretion, als Diarrhöe oder Verstopfung, die häufigsten und ersten Erkrankungen des Säuglings bedingt.

Den Nieren wird gleich nach der Geburt eine etwas zu grosse Aufgabe zugemuthet. Die Kinder trinken in den ersten Tagen noch zu wenig, das Blut kann desshalb nur wenig Wasser abgeben, und so kommt es, dass in den geraden Harnkanälchen die harnsauren Salze, welche in Folge der grossen Umwälzungen des Stoffwechsels sich schnell ansammeln, nicht gelöst bleiben, sondern aus der zu concentrirten Lösung herausfallen und dem sog. Harnsäureinfarkt der Neugeborenen bilden. Der Harnsäureinfarkt ist eine gelbrothe oder hochrothe Streifung der Pyramiden, nahe an den Papillen. Er erscheint gewöhnlich erst am zweiten Tage nach der Geburt, wurde aber in einzelnen Fällen von mir noch bei Kindern gefunden, welche schon länger als vier Wochen gelebt hatten. Da er, freilich nur sehr ausnahmsweise, bei todtegeborenen Kindern gefunden worden sein soll, und eine beträchtliche Menge von Kindern, die zwischen dem 2.—14. Lebenstage sterben, denselben nicht aufweist, so lässt er sich gerichtlich medicinsch nicht verwerten. Man findet ihn häufig als carminrothes Pulver in den Windeln der Neugeborenen, was auch einzelnen aufmerksamen Hebammen schon bekannt ist. Die microscopische Untersuchung ergibt cylindrische, aus amorphen, harnsauren Ammoniak und Epitheliumzellen bestehende Säulchen, denen auch einzelne rhomboidrische Harnsäurekrystalle beigemengt sind. An den Tagen, wo dieses Pulver sich in den Windeln findet, sind die Kinder meist unruhig, schreien beim Uriniren und haben eine geröthete Harnröhrenmündung. Wenn gleich seine Entstehung und Ausscheidung als ein physiologischer Vorgang zu betrachten ist, so lässt sich doch nicht läugnen, dass der so häufige Nierengries kleiner Kinder ebenso wie das Auftreten der Blasensteine im Kindesalter mit ihm in Verbindung zu bringen ist. —

Die Haut, welche während des Fötuslebens anhaltend die Temperatur des mütterlichen Blutes genoss, tritt mit dem Momente der Geburt in ein kälteres Medium, sie ist von nun an der Einwirkung der Luft, des Lichtes und des Temperaturwechsels ausgesetzt und übernimmt die Functionen der Ausscheidung. Sie hat zuerst eine gleichmässige, rothe Färbung, welche am 2.—6. Tage einer gelblichen Platz macht, um dann in die gewöhnliche rosenrothe überzugehen. Diese gelbliche Färbung wird oft irrtümlich für Gelbsucht gehalten. Die neugeborenen Kinder sind fast am ganzen Körper mit Ausnahme der Handteller und Fusssohlen mit weichen oft ziemlich langen Haaren, Lanugo, besetzt, welche in den ersten Lebenswochen ausfallen. Auch die starken Kopfhaare, welche viele Kinder mit auf die Welt bringen, fallen in den ersten Lebenswochen wieder aus und werden nur sehr langsam durch feinen, meist heller gefärbten Nachwuchs ersetzt. Schwächliche Kinder von langsamer Entwicklung ohne diese Fettpolster behalten diese ersten Haare viel länger, als die schnell und gehörig zunehmenden. Die Schweissdrüsen funktionieren in den ersten Lebenswochen nur sehr wenig, es gelingt fast nie, ein Kind unter vier Wochen

in eine solche Transpiration zu bringen, dass der Schweiß sich in Tropfen sammelt.

Hingegen kommt an den Talgdrüsen der behaarten Kopfhaut fast bei allen Kindern eine vermehrte Secretion vor, der Gneis, *Schorrhoea capillitii*, die vom Beginn des zweiten Lebensmonats an bis zu Ende des ersten Jahres zu den physiologischen Vorgängen zu rechnen ist. Der Gneis entwickelt sich sehr allmählig; am Anfange steht die Haut aus, als wenn sie mit Talg oder Cerat eingeschmiert worden wäre; auf dieser schmierigen Haut bleibt nun aller Staub und Schmutz kleben und vertrocknet mit dem Hauttalg zu weissgrauen oder gelblichen, später braunen und selbst schwarzen Schuppen, die zwischen den Fingern sich leicht zerreiben und, abgelöst, die Kopfhaut unversehrt, nicht einmal eingestrichelt durchblicken lassen. Er wird von keinem Jucken, keiner Nase und keiner Hautinfiltration begleitet. Durch häufiges Einölen des Kopfes mit Olivenöl und Abwaschungen mit Seifenwasser kann man diese Schuppenbildung unbeschadet der Gesundheit leicht verhüten. An vielen Orten, z. B. in München, haben die Hebammen dem Gneis ein solches tangere vindicirt. Es gelingt mir schon eine Mutter zu der eben beschriebenen Behandlungswiese zu überreden. Die Mütter lassen meistens die braunen Schuppen unberührt, bis am Ende des ersten Lebensjahres die Schorrhoë von selbst nachlässt, die Schuppen von den fortwachsenden Haaren weiter und weiter von der Kopfhaut abgeloben werden und endlich ganz vertrocknen und zerbröckeln. Nach Ablauf jener Zeit kommt keine einfache *Schorrhoea capillitii* bei den Kindern mehr vor.

C. Das Wachsthum der Kinder im Allgemeinen, und das Wachsthum einzelner Körpertheile. Am schnellsten wächst das Kind in den ersten Lebenswochen, im ersten Lebensjahre 6—7 Zoll, im zweiten 3½ Zoll, im dritten kaum 3, im vierten 2½ Zoll. Vom vierten oder fünften Lebensjahre bis zum sechzehnten wird das Wachsthum ziemlich regelmässig und beträgt jährlich etwas über oder unter 2 Zoll. Vom 16.—17. Lebensjahre nimmt der Körper nur mehr 1½, in den folgenden zwei Jahren nur um 1 Zoll zu. Die meisten Menschen wachsen nur bis zum 20. Jahre, bei einzeihen wird das völlige Wachsthum erst mit 25 Jahren beendet. Mangelhafte Ernährung, zu heisses und zu kaltes Klima beschränken das Wachsthum. Acute febrile Krankheiten unterbrechen dasselbe in keiner Weise, befördern es vielmehr sehr bedeutend, was besonders für acute Exantheme gilt. Die Kinder wachsen in einer acuten febrilen Krankheit von wenigen Wochen oft ½—1 Zoll, während sie im physiologischen Zustand hierzu ½—1 Jahr Zeit brauchen. (Sie erscheinen übrigens noch dadurch viel grösser, dass die Fettpolster bei allen diesen Krankheiten beträchtlich abnehmen). Knochenkrankheiten, Rheumatis, Knochenverwundungen verzögern das Wachsthum. Wachsen die Kinder zu schnell, so magern sie ab, werden kräftlos, träge, blass. Nach 1½—2 Monaten fängt das Kind an, den Kopf aufrecht zu halten und willkürlich, besonders nach dem Lichte, zu drehen. Erst im siebenten bis achten Lebensmonate lernt das Kind sitzen und noch später im neunten bis zehnten entwickeln sich die Bewegungen der untern Extremitäten, es beginnt zu stehen und einige Wochen darauf zu gehen.

Das Wachsthum geht nicht immer an allen Körpertheilen gleich-

mässig von Statuen, oft wächst der Kopf mehr als die übrigen Theile, oft die Extremitäten mehr als Rumpf und Kopf, am häufigsten bleibt bei unserer mangelhaften physischen Erziehung der Thorax in seiner Entwicklung nach der Breite zurück.

Zuweilen ist es von Interesse, das Maass der Schädelknochen genauer zu bestimmen, und man hat sich deshalb über folgende Messpunkte verständigt: 1) die grösste Peripherie des Kopfes. Hier wird das Maass am Hinterhaupthöcker und an der grössten Wölbung der Stirne angelegt. Bei bedeutenderen chronischen Wasserköpfen steht das Hinterhauptbein mehr horizontal, und es fällt daher die grösste Peripherie oberhalb des Hinterhaupthöckers. 2) Das Maass von einem Ohr zum andern. Es geht von der obersten Partie des Ohrmuschelansatzes über die grosse Fontanelle zur entgegengesetzten Seite. 3) Das Maass vom Hinterhaupt zur Nasenwurzel geht vom Hinterhaupthöcker über den Scheitel bis zur Glabella. Diese drei Maasse können mit jedem Papierstreifen oder noch besser mit einem in Centimeter getheilten Lederstreifen genommen werden. Die Durchmesser müssen mit einem Messzirkel gesucht werden. Der Querdurchmesser hat seine Endpunkte an den beiden Seitenwandhöckern, der Längendurchmesser an der kleinen Fontanelle und an der grössten Wölbung in der Mitte der Stirne.

Von Wichtigkeit für den Kinderarzt ist eine genaue Kenntnis der grossen Fontanelle und ihres physiologischen Verschlosses. Die Fontanelle ist durch die Entwicklung des Schädels bedingt. Indem der Verknöcherungsprocess des embryonischen Schädels von mehreren Ossificationspunkten ausgeht, welche durch Knochenanschlüsse an ihre Peripherie nach allen Seiten gleichmässig wachsen, so müssen die Ecken des Schädelknochens das Letztgebildete sein. Da also die Schädelknochen Anfangs eine rundliche Contour haben, so wird, wenn mehrere solche Knochen scheiben zusammenstossen, zwischen diesen ein Raum übrig bleiben müssen, der so viele Ecken hat, als Knochen scheiben ihn begrenzen. Dieser nur durch häutige Bedeckung verschlossene Raum heisst Fontanelle. Weil nun das Seitenwandbein im entwickelten Zustand vier Winkel hat, so wird an jedem derselben im embryonalen Zustand eine Fontanelle vorkommen müssen, weil aber die obern Winkel beider Seitenwandbeine aneinanderstossen, somit ihre Fontanelle zusammenfliessen, so können nur sechs Fontanelle vorkommen, von denen die Stirn- und Hinterhauptfontanelle unpaarig, die vordere und hintere Seitenfontanelle dagegen paarig angebracht ist.

Am ausgetragenen Kinde existirt nur mehr die grosse viereckige Stirnfontanelle, deren Viereck einen Rhombus mit einwärts gebogenen, ungleich langen Rändern bildet. Sie entsteht durch Zusammenstoss der beiden Stirn- und Seitenwandbeine, der Winkel, unter welchem die Stirnbeine zusammenstossen, ist spitzer, als der der zusammenstossenden Seitenwandbeine. Ein vollkommener Verschluss der grossen Fontanelle tritt schon vor beendigten zweiten Jahre ein. Merkwürdig ist die Vergrösserung dieser Fontanelle bis nach zurückgelegtem neunten Lebensmonat, eine Erscheinung, auf die Elsässer zuerst aufmerksam gemacht hat. Zur Bestimmung ihrer Grösse wählte Elsässer eine Methode, die nebst möglichst annähernder und wenigstens relativ sicherer Bestimmung ihres Quadratinhalts zugleich einen kurzen Ausdruck lieferte. Er mass die Entfernung zweier einander parallel

gegenüberliegenden Seiten von der Mitte ihrer Länge aus, dasselbe wurde mit den zwei anderen parallelen Seiten vorgenommen, die zwei hieraus resultierenden Zahlen wurden dann addirt und die Hälfte als Durchmesser der Fontanelle angenommen. Es liefert diese Methode exaktere Resultate, als wenn man von einer Ecke zur andern gegenüberliegenden messen wollte. Das Resultat ist in diesem letzteren Falle ganz unsicher, weil die Ecken sich oft noch ziemlich weit in die Nähte hinein als schmale Streifen erstrecken, wobei die Grenze, von der aus gemessen werden will, der Willkür unterliegen muss.

Die Grössenverhältnisse der vorderen Fontanelle waren nach Trimestern folgende:

Trimester.	Zahl der Kinder.	Durchschnittlicher Durchmesser der Fontanelle in Pariser Linien.
1.—3. Monat.	10	9,60
4.—6. „	15	11,93
7.—9. „	7	13,50
10.—12. „	13	11,88
1.—12. Monat	45	11,60

In diesem Zeitraume ist die Fontanelle immer offen.

13.—15. Monat 9 7,77

Unter diesen 9 Kindern ist die F. bei 3 geschlossen, bei einem δ , bei den übrigen 10—15 Linien weit.

16.—18. Monat: 8 Kinder. Bei 4 ist die F. geschlossen, bei den übrigen 2, 3, 9 und 10 Linien weit.

19.—21. Monat: 5 Kinder. Bei 2 geschlossen, bei den übrigen δ , 12 und 12 Linien weit.

22.—24. Monat: 7 Kinder. Bei 5 geschlossen, bei den übrigen 9 und 15 Linien weit.

Es geht aus dieser Tabelle hervor,

1) dass die vordere Fontanelle während des ersten Lebensjahres am kleinsten ist beim Neugeborenen und im Verlaufe des ersten Trimesters,

2) dass sie dann bis ins dritte Trimester an Grösse zunimmt und

3) erst im vierten wieder sich verkleinert.

Die hier sogleich sich aufhängende Frage: „Wie ist diese Zunahme der grossen Fontanelle an Umfang zu erklären?“ lässt sich nach Ellisser auf folgende mechanische Weise beantworten. Die grosse Fontanelle bildet ein Viereck, dessen Spitzen nach vorn und hinten, rechts und links gestellt sind. Durch die Ecken laufen zwei Knochenspalten des Schädels, eine Querspalte (Kronennaht) und eine Längspalte (Stirn- und Pfeilnaht). Stellen wir uns nun vor, das Flächenwachsthum der Schädelknochen geschehe so, dass sich an ihren Rändern immer neue Streifen ansetzen, so werden durch die an den zwei Rändern jeder Spalte neu entstandenen Ansätze die betreffenden Knochen auseinander getrieben. Betrifft es nun die in die Fontanelle einmündenden Spalten, so muss dieselbe, wenn ihre Ränder nicht gleichzeitig auch wachsen, nach allen Seiten grösser werden. Die Fontanelleiränder wachsen nun allerdings, allein sie wachsen nur in demselben Verhältnisse wie die Spaltränder, und dies genügt schon, die mechanische Vergrösserung der Fontanelle zu erklären.

Denken wir uns nämlich weiter, dass nur eine der oben genannten Hauptspalten, z. B. die Querspalte, neue Flächenmasse ansetze, die andere aber, nämlich die Längenspalte, unverändert bleibe, denken wir uns ferner, dass an jedem Rande der Querspalte in einem gewissen Zeitraum ein 1 Pariser Linie breites Stück anwachse, so wird die Fontanelle am Schluss dieses Zeitraumes in diesem Falle wieder ihren alten Durchmesser haben, wenn auch ihre Ränder innerhalb desselben je um eine Linie gewachsen sind. So würde also, ein gleichmässiges Wachsen aller Knochenränder vorausgesetzt, die Fontanelle in dem Falle ihren Durchmesser gar nicht verändern, wenn nur Eine Spalte durch sie hindurchginge, oder in der andern gar kein Stoffansatz stattfände. Nun findet aber dieser in der Längenspalte in demselben Verhältnis statt, wie in der Querspalte. Wie nun beim Wachsen der Querspaltentränder um eine Linie die Fontanelletränder gleichfalls um eine Linie wachsen müssten, sollten andere ihre Durchmesser dieselben bleiben, so tritt dieselbe Consequenz bei der Längenspalte ein, wenn diese gleichzeitig mit der Querspalte eine Linie in die Breite wächst. Mit andern Worten, die Fontanelletränder müssen, sollen ihre Durchmesser dieselben bleiben, innerhalb eines Zeitraumes, in welchem die Quer- und Längenspaltenränder je eine Linie ansetzen, um das doppelte, nämlich um zwei Linien sich vergrößern. Letzteres thun sie aber nicht, sondern wachsen ungefähr in demselben Verhältnisse wie die Spaltentränder (also in dem angenommenen Zeitraum auch nur um eine, nicht um zwei Linien) und deshalb muss die Fontanelle stetig an Umfang zunehmen. Dies ist nun auch wirklich annäherungsweise der Fall. Wenn vorstehende Erklärung nicht deutlich genug sein sollte, der gehe sich die kleine Mühe, die zwei Contouren Tafel II, Fig. 1 und 2 je viermal aus Papier auszuschneiden und mit den stumpfen Winkeln so zusammensetzen, dass die kleinen Linien a und a' je einer Figur ein Viereck bilden.

Fig. II, stellt die schematische Zeichnung eines bei der Bildung der grossen Fontanelle theilgenommenen Schädelknochen dar, der in einem gewissen Zeitraum allseitig um eine Linie aus Fig. I, seiner ursprünglichen Grösse herangewachsen ist.

So lange nun die Spaltentränder in demselben raschen Verhältnisse wie die Fontanelletränder fortwachsen, dauert natürlich die Vergrößerung der Fontanelle fort. Es kommt aber ein Zeitpunkt, wo die Ränder der Spalten knöchern verwachsen, Nähte im engeren Sinne bilden, und gleichzeitig der Gesamtkopf in einem langsameren Verhältnisse sich ausdehnt. Die Folge hiervon ist, dass die Knochenränder sich nicht mehr auseinander schieben können, und dass das unveränderte Fortwachsen der noch freien Fontanelletränder nun die allmähliche Verkleinerung der Fontanelle zum Resultate hat. Dieser Zeitpunkt der gleichzeitigen Nähtbildung und beginnenden Verkleinerung der Fontanelle tritt bei gesunden Kindern um den neunten Monat ein: Die Fontanelle schliesst sich aber vollkommen erst nach dem fünfzehnten Lebensmonat.

Die Vergrößerung der grossen Fontanelle in den ersten drei Trimestern ist also kein pathologischer, kein rachitischer, sondern ein physiologischer Vorgang.

Der Nutzen der grossen Fontanelle wird gewöhnlich zu einseitig

nur von seiner negativen Seite, der mangelnden festen knöchernen Hülle betraffet, während ihre Form, Lage, Grössenzunahme, seit der ganzen Entwicklung des Kindes zusammengehalten, einen wirklichen positiven Zweck erkennen lässt.

Schädel und Wirbelsäule bilden zusammen eine feste umschliessende Kapsel um Gehirn und Rückenmark, so dass die Gesamtmasse der Schädelhöhle und des Rückenmarkskanals an Raum weder ab- noch zunimmt. In dem ersten Lebensjahre nun, wo das Gehirn rasch wächst und an Congestionen mehr als später geneigt ist, hätte eine absolute Starrheit des Schädels diesen physiologischen Eigenschaften nicht entsprechen, zu welchem Zwecke eine nach innen und aussen nachgiebige Stelle, die grosse Fontanelle, gleichsam als eine Art Sicherheitsventil besteht.

Während sie bei Gehirncongestionem und Hydrocephalus sich nach aussen wölbt und so den Druck auf das Gehirn durch die streitenden Gefässe oder den hydrocephalischen Erguss mindert, wölbt sie anderer Seits sich bei Gehirn-Atrophie und Atrophie nach innen und bildet auf dem Schädeldach eine Grube. —

Das Gehirn wächst in den ersten Lebensmonaten am schnellsten, bei der Geburt wiegt es noch kein Pfund, im zweiten Jahre schon 1½ Pfund. Beim Neugeborenen ist die Gehirnhaut weich, fast knorpelartig, nicht scharf in graue und weisse, in Rinden- und Marksubstanz geschieden. Im ersten Lebensjahre ist die Dura mater regelmässig, im zweiten noch häufig mit dem Schädeldach fest verwachsen, so dass bei Eröffnung der Schädelhöhle die Dura mater und das Schädeldach zugleich abgenommen werden müssen. Es erscheint demnach überflüssig, bei jeder Section eines Kindes unter einem Jahre diese Erscheinung eigens zu beschreiben, wie es in den meisten Sectionsberichten mit einem besondren Nachdruck geschieht.

Der Durchbruch der Zähne.

Nach Hyrtl fängt schon im ersten Drittel des Embryolebens die Bildung der Zähne an. In der sechsten Schwangerschaftswoche entstehen nach Gossair an der Stelle der zukünftigen Kinnladen enge Furchen zwischen den kaum angedeuteten Lippen und den rudimentären Kieferbögen. Die Ränder der Furchen erheben sich zu Wällen, wodurch die Furchen zu einem tiefen Graben wird. Die Wälle biegen sich mehrmals ein, wodurch der Graben buchtig wird. Auf dem Grunde der Buchten wachsen Warzen empor, zwischen welchen die gebogenen Wälle sich berühren, und Zellen für die Warzen bilden. Jede Zelle hängt mit der Mundhöhle durch eine Oeffnung zusammen, welche sich durch Convergiren der Ränder später schliesst. So entsteht das Zahnsäckchen, auf dessen Grund die Zahnpapille aufsitzt. Die Zahnpapille dient als Modell für die Ablagerung des Zahnbeins, das Email wird durch das den Kopf der Papille überziehende und einhüllende Schleimorgan gebildet, in welches die Zahnpapille hineinwächst. Auf diese Weise entwickeln sich die Zahnsäckchen der zwanzig Milchzähne, deren Verknöcherung im fünften Schwangerschaftsmonat erfolgt. Die Säckchen für die bleibenden Zähne sprossen an der hintern Wand der Milchzahnsäckchen hervor, wahrscheinlich mit Höhlencommunication. Sie

schränken sich beim zunehmenden Wachsthum von diesen ab, hängen aber mit ihnen durch einen Faden zusammen (Gubernaculum dentis). Beim Neugeborenen sind schon sämtliche Bläschen der Milchzähne und der bleibenden Zähne im Kiefer vorhanden. Die Milchzähne rücken allmählig gegen den durch einen Knorpel geschlossenen Zahnhöhlenrand des Kiefers empor. Die Ursache dieses Verrückens ist die successive Anbildung der Zahnwurzel. Zugleich schwindet der Zahnfleischknorpel und die obere Wand des Zahnsäckchens. Die Seitenwände des Zahnsäckchens werden zum Pericor der Zahnwurzel. Zuweilen schwindet der Knorpel früher, als die Krone des Zahns, die Oberfläche erreicht hat, der durchbrochende Zahn liegt dann in einer seichten Grube des Zahnfleischknorpels frei zu Tage, kann aber häufig nicht gesehen, sondern nur gefühlt oder durch Anschlagen mit einem Löffelstiel entdeckt werden. Ein Experiment, womit man den auf den ersten Zahn ungeduldig wartenden Eltern grosse Freude bereiten kann.

Unter vermehrter Secretion und Rötung der Mundschleimhaut und verschiedenen andern, im spec. Theile abzuhandelnden Symptomen beginnt der Durchbruch der ersten Milchzähne. Die zwanzig Milchzähne erscheinen bei den meisten gesunden Kindern in folgenden fünf Gruppen:

I. Gruppe.

Zwischen dem 4. u. 7. Monate erscheinen ziemlich gleichzeitig die zwei mittleren unteren Schneidezähne, worauf eine Pause von 3–9 Wochen eintritt.

II. Gruppe.

Zwischen dem 8. u. 10. Monate erscheinen die vier oberen Schneidezähne in kurzer Aufeinanderfolge von wenigen Wochen. Zuerst die beiden mittleren, dann die seitlichen. Die zweite Pause beträgt 6–12 Wochen.

III. Gruppe.

Zwischen dem 12. u. 15. Monate erscheinen sechs Zähne auf einmal, nämlich die vier ersten Backenzähne und die zwei unteren seitlichen Schneidezähne; gewöhnlich zuerst die Backenzähne im Oberkiefer, dann die unteren Schneidezähne und zuletzt die Backenzähne des Unterkiefers. Pause bis zum 18. Monat.

IV. Gruppe.

Zwischen dem 18. und 24. Monate brechen die Eckzähne (die oberen auch Augenzähne genannt) durch. Pause zwei bis drei Monate.

V. Gruppe.

Zwischen dem 20. und 30. Monate endlich kommen die vier zweiten Backenzähne zum Vorschein.

Hienüt ist die erste Dentition geschlossen. Das Kind hat nun 20 Milchzähne. Im fünften oder sechsten Lebensjahre bricht der dritte Backenzahn durch und hienüt beginnt die zweite Dentition. Die Arterien der Milchzähne obliteriren und ihre Nerven schwinden; so werden

diese ihrer Lebensbedingungen beruhte und fallen, durch die Vergrößerung der Alveolen gelockert, endlich aus, ohne vorher caries geworden zu sein. Da der kindliche Kiefer nicht gross genug ist, auch die bleibenden Zähne in geschlossener Reihe sich entwickeln zu lassen, so kommt der bleibende Eckzahn vor den äusseren Schneidezahn und ersten Backenzahn zu liegen, und auf dieser Sonderstellung der Eckzähne beruhen auch ihre häufigen unrichtigen Stellungen nach dem Durchbruche. Die Scheidewand, welche die Alveoli der bleibenden Zähne von jenen der Milchzähne trennte, wird nach und nach resorbirt. Damit erstere in die Fussstapfen der letzteren treten können und damit sie ihren Weg nicht verfehlen können, veranlaßt sich der abgeschnittene Strang zwischen jedem Milchzahn und dem correspondirenden bleibenden Zahn wieder in einen offenen Gang. Die Milchzähne fallen ungefähr in derselben Ordnung wieder aus, wie sie erschienen sind. Im zwölften Jahre erscheint der vierte Backenzahn und endlich im 16. bis 24. Jahre der fünfte Backenzahn, der sog. Weisheitszahn, dessen Krone erst im zehnten Lebensjahre so verknöchern beginnt.

Wenn auch nicht behauptet werden kann, dass alle gesunden Kinder in der oben beschriebenen Ordnung und Zeit zahnem, so steht doch wenigstens so viel fest, dass die Kinder, die diese Ordnung einhalten, die wenigsten Beschwerden und Folgekrankheiten vom Durchbruch ihrer Zähne zu erleiden haben. Unter den Varietäten der physiologischen Dentition sind besonders folgende zu bemerken: 1) In der Zeitfolge. Es kommen zuweilen Kinder mit Zähnen auf die Welt, wie Ludwig XIV. und Mirabeau, ohne dass später eine allgemeine raschere Entwicklung an ihnen bemerkt wurde. 2) In der Reihenfolge. Zuweilen erscheinen die oberen Schneidezähne früher als die unteren, und in diesem Falle die seitlichen meist vor den mittleren; nur sehr selten erscheinen die Eckzähne vor den Backenzähnen.

2. Capitel.

Allgemeine Regeln für die Untersuchung der Kinder.

Ganz kleine, erst einige Wochen alte Kinder verhalten sich meist sehr indifferent gegen eine ärztliche Untersuchung, sie schlafen viel und fühlen sich, wenn man sie auf einige Minuten ihrer festen Wickeln und Kissens entledigt, so bekümmert, dass sie nur selten unruhig sind. Fangen die Kinder aber einmal an, ihre Umgebung zu kennen und zu unterscheiden, was oft schon deutlich im dritten Lebensmonate bemerkt wird, so erschreckt sie jedes fremde Gesicht, also auch das des herbeigekommenen Arztes. Diese Schüchternheit dauert bei einigen Kindern bloss bis zum 18. bis 24. Lebensmonat, nimmt zuweilen ab, dann wieder zu, bei andern aber besteht sie bis zum vierten bis sechsten Jahre fort. Viel kommt hierbei auf die Verhältnisse an, unter welchen das Kind heranwächst; je weniger Menschen es zu sehen bekommt, um so schüch-

terner wird es; Kinder, die in Städten aufwachsen, leiden deshalb weniger daran als die auf dem Lande.

Drei Umstände sind es hauptsächlich, die dem Kinderarzt hindernd in den Weg treten: das Fehlen der Sprache, die bedeutende Agitation, welche die Untersuchung hervorruft, und endlich das Geschrei, das diese Agitation begleitet. Das erste Hinderniss lässt sich natürlich nicht beseitigen, kann aber durch ein geduldetes, eingehendes Examen der Angehörigen einigermaßen ersetzt werden, die beiden letzten hingegen müssen hinweggeräumt werden.

Wenn ein Kind gewaschen ist und dann getrunken oder gegessen hat, so schläft es ein; da aber diese Prozeduren in einer ordentlichen Familie täglich um dieselbe Zeit vorgenommen werden, so ist es gar nicht schwierig, das Kind schlafend zu beobachten, wobei man nicht vergessen darf, es vor dem Einschlafen mit solchen Kleidern einhüllen zu lassen, die dann, ohne das Kind im mindesten zu belästigen, leicht aufgehoben werden können. Der Schlaf muss zu jenen Untersuchungen benutzt werden, welche nur bei vollkommener Ruhe richtig gewürdigt werden können, die Untersuchungen, welche man angesichts der Agitation und des Geschreies vorzunehmen im Stande ist, können bis zum Erwachen des Kindes verschoben werden. Hieraus ergibt sich, dass die Untersuchung kranker Kinder in zwei verschiedenen Zeitabschnitten vorgenommen werden muss, nämlich während der Ruhe und während der Agitation. Nur während der Ruhe können beobachtet werden: die Gesichtszüge, die Stellungen und unwillkürlichen Bewegungen des Rumpfes und der Extremitäten, der Puls, die Art und Zahl der Respirationen und die Ergebnisse der Percussion. Während der Agitation kann man untersuchen: die Haut, deren Farbe, Temperatur und krankhafte Veränderungen, die Mundhöhle, das Abathmen, die Genitalien, den Anus, die Extremitäten, die Art zu saugen und vor allem das Geschrei. —

Der Ausdruck des Gesichtes verräth die Empfindungen auch der kleinsten Kinder ziemlich deutlich und kann für den geübten Beobachter ungemein viel zur Erkennung der Krankheit und Stellung der Prognose beitragen. Eine de Salle bemerkt ganz richtig, dass gesunde Säuglinge vollkommen ausdruckslose Physiognomien haben, worin ihm Jedermann, eine verblendete Mutter vielleicht ausgenommen, beistimmen muss. Um so wichtiger ist die Thatsache, dass kranke Kinder einen bestimmten Ausdruck bekommen, der größtentheils vom Schwund des Fettes im Unterhautzellgewebe, zum Theil aber auch von eigenthümlichen Contractionen sonst relaxirter Gesichtsmuskeln abhängt.

Bei jeder profusen Diarrhöe, am schnellsten bei der asiatischen Cholera, verändern sich die Gesichtszüge eines vorher vollen runden Kindes so rasch, dass es in 24 Stunden oft kaum mehr wieder zu erkennen ist. Die Augäpfel sinken zurück in die Orbits, so dass die Lider kaum mehr dem Bulbus allseitig folgen können und eine Falte (dem untern Bande der Orbits entsprechend) am untern Augenlide sich bildet, die Nase wird spitz und die vorher wulstigen Lappen werden scharfrandig.

Bei chronischer Atrophie schwinden auch die letzten Spuren von Fett aus dem Gesicht, die Haut wird überall zu weit und rauh, und

ausserdem kommen noch in Folge von Gehirnerreiz mannigfache Contractionen, besonders der Stirnmuskeln, dann des Corrugator supercilii und des Levator alae nasi et labii superioris vor, wodurch das Gesicht ein greisenhaftes Aussehen bekommt, weshalb die französischen Pathetriker es sehr ungallanter Weise ein *Voltaire'sches Gesicht* nennen.

Jadelot hat drei Gesichtszüge aufgestellt, welche innere Krankheiten anzeigen sollten. Der erste Zug fängt am innern Augenwinkel an und verliert sich am Jochbein. Er nannte ihn *le trait oculo-zygomatique*, Augenwangenzug. Der zweite nimmt seinen Anfang am oberen Theile des Nasenflügels und umfasst in einem Halbkreise die äussere Linie des Orbicularis oris. Dieser zerfällt in zwei Theile, in den Nasen- (*le trait nasal*) und in den Backenzug (*le trait génal*). Der dritte Zug fängt am Mundwinkel an und verliert sich gegen das Kinn zu. Der erste soll Affektionen des Gehirns, der zweite des Unterleibes und der dritte der Brusthöhle anzeigen. Wir brauchen einem denkenden Leser wohl kaum hinzuzufügen, dass dies leere Hirngespinnste sind. So leicht wird es dem Arzte leider nicht gemacht, dass er gleich aus dem Gesichte eine jede Krankheit zu entdecken im Stande wäre. Ein einziges charakteristisches Zeichen für eine bestimmte Krankheit findet sich im Gesichte, nämlich das Heben der Nasenflügel während einer jeden Inspiration, wodurch wir mit grösster Bestimmtheit eine entzündliche Affection der Lunge diagnosticiren können.

Was die Stellungen und Bewegungen des Kindes betrifft, so pflegt das neugeborene Kind diejenige Körperhaltung wieder anzunehmen, die es in der Gebärmutter hatte. Der Rücken ist nach aussen gekrümmt, der Kopf senkt sich auf die Brust und die Glieder sind an den Rumpf gezogen. Liegt das Kind ruhig, hat es anhaltenden und festen Schlaf, bewegt es sich im wachen Zustand mit gehöriger Kraft und Lust, so kann man auf ein entschiedenes Wohlbefinden schliessen. Hiervon unterscheidet sich wesentlich der Zustand von Kraftlosigkeit und Betäubung. In jenem hört die Beweglichkeit des Kindes auf, es liegt apathisch da, in letzterem hingegen sind die Augen starr, verfolgen nicht mehr die Augen der Mutter oder der Amme, was schon ganz kleine, kaum vier Wochen alte, gesunde Säuglinge zu thun pflegen, die Augenlider bedecken die halbe Hornhaut, schliessen sich aber auch im Schlafe nicht vollständig.

Werfen sich die Kinder unaufhörlich umher und finden in gar keiner Lage Ruhe, so haben sie bestimmt erhöhte Hauttemperatur und beschleunigten Puls; werden sie hierauf ruhig, ohne dass das Fieber abnimmt, so ist dieser Nachlass die Folge zunehmender Schwäche und kann als ungünstiges Zeichen betrachtet werden. Bei exsudativen Prozessen im Gehirn beugen die Kinder häufig den Kopf nach rückwärts, bei Gehirnatrophie in Folge von allgemeiner Atrophie reiben sie mit dem Hinterhaupt fortwährend am Kopfkissen oder bohren in dasselbe hinein und reiben sich mit den Händchen an den Haaren und den Ohren. Gesunde Kinder schlafen, wenn sie müde sind, in jeder Position ein und ruhig fort, bei Pneumonien aber wählen die Kinder meist die Rückenlage oder die Lage auf der erkrankten Seite und legen sich, wenn man sie auf die gesunde Seite lagert, gleich wieder auf die andere hinüber. Auf dem Gesichte liegen die Kinder mit scrophulösen Augenentzündungen und zuweilen mit cephalischen Schmerzen,

Wenn man Säuglinge während des Saugens oder kurze Zeit nachher auf die linke Seite legt, so pflegen sie unruhig zu werden und zu erbrechen, was auf der bedeutenden Schwere und Grösse der Leber, die in dieser Lage auf den Magen drückt, zu beruhen scheint. Daher kommt es auch, dass die Säuglinge am leichtesten an der linken Brust trinken, dass sie deshalb mehr an diese angelegt werden und dass sich deshalb in dieser gewöhnlich mehr Milch findet. An Wahrscheinlichkeit gewinnt diese Argumentation noch dadurch, dass Säuglinge, die sich hartnäckig sträuben, an der rechten Brust zu saugen, diese nicht selten ohne Wegerung nehmen, sobald man ihre Beine unter den rechten Arm der Mutter bringt und sie auf der rechten Seite liegend trinken lässt.

Mit den Händen zeigen die Kinder häufig direct den Sitz des Schmerzes an. Während des Zahmens greifen sie sich in den Mund, bei Hydrocephalus und Gehirnerreiz saufen sie an den Haaren (zuweilen aber auch an den Genitalien), beim Krup drücken und reiben sie sich am Halse, grössere Kinder drücken bei Colik sich auf den Unterleib, bei Blasonschmerzen, häufig durch Vesicantien veranlasst, auf die Blase. Bei Würmern beissen sie sich in der Nase und in dem Anus. Atrophische Kinder haben die Daumen eingeschlagen und machen eine feste Faust. Das stossweise Anziehen und Strecken der Fusse mit Geschrei verbunden ist das gewöhnliche Zeichen von Blähungen und hört sogleich auf, wenn einige Blähungen abgegangen sind.

Die Untersuchung des Pulses kann mit Erfolg nur bei einem schlafenden Kinde angestellt werden. Bei einem Kinde, das plötzlich erwacht oder durch vieles Betasten bereits unruhig geworden ist, hat man natürlich mit übersteiglichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das Kind sucht sich auf jede Weise los zu winden, und je fester man den Arm fixirt, um so stärker spannt das Kind die Muskeln und macht das Pulsfühlen ganz unmöglich.

Man hat verschiedene Mittel angegeben, durch welche es auch beim wachenden Kinde gelingen sollte, den Puls zu befühlen, — bei einem an der Brust, an einem Sauglappen oder am Finger saugenden Kinde. Die Saugbewegungen hebeln immer die Respiration- und die Herzbewegungen, weshalb durch diese Untersuchungsmethode keineswegs brauchbare Resultate erzielt werden können. Man nähert sich also am besten einem schlafenden Kinde, berührt mit der Spitze des Zeigefingers leise die Art. radialis und folgt, wenn das Kind den Arm rührt, allen diesen Bewegungen ohne den geringsten Widerstand, es wird dann gewöhnlich bald wieder ruhig und schläft fort. Dauert die Unruhe des Armes aber fort, so muss man sogleich den tastenden Finger zurückziehen, weil es sonst unfehlbar nach wird und für ein ärztliches Examen kein Kind ungünstigere Verhältnisse bietet, als ein eben aufgewecktes. In der Vernachlässigung dieser Vorsichtsmaassregeln mag wohl der Grund liegen, dass die meisten Autoren den Puls der Säuglinge etwas zu hoch, 130—140 Schläge in der Minute, angeben. Valleix, Arzt am Pariser Findelhaus, hat bei dreizehn ganz gesunden, schlafenden Säuglingen von 3—21 Tagen die Mittelzahl 87 (Minimum 76, Maximum 104) gefunden. Ich fand bei vierundzwanzig gesunden, schlafenden Säuglingen als Minimum 92, als Maximum 136, als Mittelzahl 109 Pulschläge. Noch schwieriger ist bei der Kleinheit

der Arterie die Bestimmung des harten und weichen Pulses. Das Hauptaugenmerk muss bei Säuglingen entschieden auf den Rhythmus der Pulsschläge gerichtet werden, myxömatöser, aussetzender Puls kommt bei Herzfehlern und bei Gehirnerkrankungen vor. Grosse Frequenz der Pulsschläge hat eine viel geringere Bedeutung, als bei Erwachsenen, denn sie wird schon durch die geringste Aufregung und unbedeutende Schmerzen erzeugt. Verlangsamung des Pulses findet man bei Sklerem der Nervenbahnen und bei Gehirndruck. In vielen Fällen ist der Puls einen oder selbst mehrere Tage vor dem Tode gar nicht mehr zu fühlen.

Die Temperaturmessungen, welche in neuerer Zeit mit Recht so sehr geübt werden und schon so schöne Resultate geliefert haben, können in der Kinderpraxis nicht immer so bequem, wie dies beim Erwachsenen der Fall ist, ausgeführt werden. Bei Säuglingen macht das Einlegen des Thermometers, während sie an der Mutterbrust saugen, selten Schwierigkeiten, ebensowenig bei schwachkranken Kindern jeden Alters. Bei leichteren Kranken aber von 1—3 Jahren stösst man sehr häufig auf Widerstand, wenn man den Arm des Kindes nur 5 Minuten lang an die Brust andrücken will. Einzelne wenige Messungen sind für die Diagnose, Prognose etc. von geringem Werthe, und längere Zeit hindurch mehrmals täglich bei einem schreienden, sich sträubenden Kinde diese Prozedur vorzunehmen, wird man, wenigstens in der Privatpraxis, von den Angehörigen verhindert. Abgesehen davon, dass auch die oft wiederholten Aufregungen und der Widerwille des Kindes eine rationelle Contraindication abgeben müssen. Dasselbe gilt auch von der vielfach empfohlenen Einbringung des Thermometers in den After, welche nur von Kindern unter einem Jahre ohne Widerstand geduldet wird, bei älteren vielfach ein Zetergeschrei verursacht und also nicht häufig geübt werden kann. Immerhin bleibt die Thermometrie auch in der Pädiatrik ein sehr werthvolles diagnostisches Hilfsmittel. Gleichzeitig muss man sich aber auch gewöhnen, durch Auflegen der wohl-erwärmten, trocknen Flachhand auf den Bauch eines jeden Kindes eine approximative Schätzung der Hauttemperatur zu erlernen. Was die gefundenen Thermometergrade betrifft, so sei hier vorläufig nur bemerkt, dass die Fiebertemperaturen bei kräftigen Kindern ausserordentlich hoch, bis zu 41.5° Cels., steigen können und deshalb doch die Prognose nicht lethal gestellt zu werden braucht.

Die Untersuchung der Respirationsorgane bietet bei kleinen Kindern sehr bedeutende Schwierigkeiten, die ebenso durch die Kleinheit der betreffenden Organe als durch die Unruhe und Widerspenstigkeit des zu untersuchenden Kindes bedingt sind. Die physikalische Untersuchung zerfällt in die Inspection, Percussion, Auscultation und Palpation, von denen die ersten zwei Methoden bei vollkommenster Ruhe die letzteren auch bei einem schreienden Kinde in Anwendung kommen können.

Inspection. Was vorerst die Art und Zahl der Respirationen bei kleinen Kindern, die das erste Lebensjahr noch nicht erreicht haben, betrifft, so leuchtet schon aus den sich widersprechenden Angaben der gewissenhaftesten Autoren ein, dass sich hierüber keine bestimmten Normalzahlen finden lassen. Es schwanken diese Angaben der Respirationsbewegungen zwischen 18 und 35 in der Minute. Vor allem ist

zu berücksichtigen, dass auch bei gesunden Kindern die Respirationsbewegungen nicht gleich sind im Schlafe und wachen Zustande. Nur im Schlafe geht die Respiration vollkommen rhythmisch von Statten. 60 Zählungen, die ich an 22 schlafenden Kindern in einem Alter von 3—4 Wochen vornahm, gaben mir als Mittel 26,4 Inspirationen in der Minute. Sobald die Kinder erwacht und nur einigermaßen munter geworden sind, so wird durch jede Berührung, durch jeden ungewohnten Ton, durch jede Veränderung der Zimmerbeleuchtung die Respiration ungleich; sie setzt länger als gewöhnlich aus, dann folgen wieder einige sehr rasche oberflächliche oder tiefe und langsame Athembzüge nach. Heben die Kinder nun gar an zu schreien, so hört aller Rhythmus auf, im Allgemeinen aber nimmt während des Schreies die Frequenz der Athembzüge zu. Wegen dieser grossen physiologischen Schwankungen lassen sich auf kleine Abweichungen von der Mittelzahl nicht wohl diagnostische Schlüsse bannen.

Bei Kindern, die das erste Lebensjahr überschritten haben, sind die Respirationsbewegungen im wachen Zustand schon viel gleichmässiger. Durch die so ausserordentlich häufigen Lungenkrankungen, besonders die lobuläre Pneumonie und die rheumatische Carnification, werden sie um das zwei- bis vierfache, also bis 50—80 in der Minute beschleunigt, ohne dass die mechanischen Hindernisse, Verstopfung grösserer Lungenparthieen mit Exsudat, physikalisch nachweisbar sind. In späteren Jahren, bis nach vollendeter zweiter Dentition, heben nur noch gewisse Krankheiten den Rhythmus der Respiration auf, nämlich alle jene Gehirnerkrankungen, welche einen erheblichen Druck auf die Gehirnhalsstanz ausüben vermögen, also vor allen Hydrocephalus acutus, ferner grössere Gehirntuberkel, Gehirnkrebs und zuweilen auch Meningitis und Meningealblutungen, wenn die Eien- oder Blutschichte über den Meningen eine gewisse Dicke erlangt hat. In diesen Fällen sind die Athembewegungen auffallend ungleich, abwechselnd langsam und wieder beschleunigt, tief, still oder mit einem Souffler verbunden.

Was die Form der Athembewegungen betrifft, so haben wir beim gesunden Kinde unter einem Jahre vorherrschend die abdominale Respiration, d. h. das Zwerchfell contrahirt sich stärker und kräftiger als die Brustmuskeln, der Brustkorb wird noch oben fast gar nicht, nach abwärts aber um so bedeutender ausgedehnt, so dass vielmehr eine Formveränderung am Unterleibe als am Thorax zum Vorschein kommt. Die Art zu respiriren ist bei verschiedenen Brustkrankheiten eine sehr verschiedene; die einzelnen Abweichungen werden bei den betreffenden Krankheiten im speciellen Theile eigens besprochen werden. Eine aufmerksame Inspection des Thorax ist sehr wichtig und verschafft schon manche Aufschlüsse, bevor noch die eigentliche physikalische Untersuchung, welche ja beim unruhigen Kinde gar nicht ausführbar ist, begonnen hat.

Die Percussion des kindlichen Alters geschieht am besten ohne Pleosimeter und ohne Hammer, Finger auf Finger. Der chirurgische Grundsatz, alle Instrumente, die durch die Hand ersetzt werden können, zu vermeiden, findet hier um so mehr seine Anwendung, als die Kinder, besonders die im zweiten und dritten Lebensjahre stehenden, eine unüberwindliche Scheu gegen die Hammer- und Pleosimeterpercussion haben, während sie sich bei einer ausserdem ruhigen und sanften Be-

handlung gern die Fingerpercussion gefallen lassen. Kinder, die schon aufrecht getragen werden, percutirt man am besten auf dem Arme der Mutter. Es bietet sich so die Rückenfläche, auf welche immer das meiste Augenmerk zu richten ist, am bequemsten dar, und die Kleinen lassen sich in unmittelbarer Berührung ihrer Mutter noch am liebsten untersuchen. Wickelkinder percutirt man in der Seitenlage, wobei man selten Widerstand zu befürchten hat. Dass die Hände, bevor man sie auf den blossen Leib des Kindes legt, gehörig gewärmt sein müssen, versteht sich von selbst. Aerzte, die an perpetuellen kalten und feuchten Händen leiden, werden in der Kinderpraxis nicht besonders reüssiren.

Die Percussionsanschläge vollführe man durchaus schwach, sanft und langsam, und setze sie so lange an einer Stelle fort, bis man im Moment der tiefsten Inspiration und vollkommensten Expiration zu percutiren Gelegenheit gehabt hat, wozu oft zehn und noch mehr Schläge nothwendig sind.

Eine kräftige Percussion, wie sie am Rücken eines athletischen Mannes gefordert wird, ist bei der Elasticität des Thorax und der Kleinheit der zu untersuchenden Organe niemals am Platze. Man percutirt hiernach nicht deutlich, sondern macht entferntere Theile, den Darm, conquirend, und ausserdem wird das Kind durch stärkeres Klopfen sogebück und sicher unruhig.

Langsam muss percutirt werden, weil der Untersuchende immer eine gewisse Zeit braucht, den erzeugten Schall zu empfinden und über das Empfundene sich ein Urtheil zu bilden. Mit der gewöhnlichen, raschen trommelnden Bewegung ist es dem geübtesten Ohre nicht möglich, feinere Nuancen des Schalles zu unterscheiden.

An ein und derselben Stelle muss so lange fortpercutirt werden, bis der tiefste Expirations- und Inspirationsmoment erhascht worden ist, weil nur durch Vergleichung und gehörige Würdigung der beiden hiernach entstehenden immer verschiedenen Percussionschalls eine wirkliche Erforschung der percutirten Parthie ermöglicht wird.

Auf eine Erscheinung muss ich speziell aufmerksam machen, die trotz ihres täglichen Vorkommens noch nirgends gehörig gewürdigt und noch weniger gedeutet wurde. Percutirt man nämlich bei gesunden Kindern von der Geburt bis zum zweiten und selbst dritten Lebensjahre die beiden Lungen vergleichsweise auf dem Rücken, so findet man, so lange die Kinder ganz ruhig athmen und gar keinen Ton von sich geben, beiderseits einen sanften, schwächer oder stärker tympanitischen Percussionschall; sobald sie aber unruhig werden, sich gegen die Untersuchung sträuben und ihren Unwillen durch ein pressendes Geschrei kundgeben, so wird der ganze Befund plötzlich ein anderer. Statt des beiderseits gleichen, sonst tympanitischen Schalles tritt über der linken Lunge ein mässig gedämpfter Percussionschall ein, die Rückenfläche der rechten Lunge aber ist hienauf bis an die Spina scapulae vollkommen leer, gedämpft. Percutirt man nun an derselben Seite einige Secunden oder selbst Minuten ruhig fort, bis es sich trifft, dass ein Percussionsschlag gerade mit dem Moment zusammenfällt, wo das Kind wieder tief inspirirt und zu diesem Zwecke die Bauchpresse bis nach vollendetem Athemzug aufgehoben muss, so hört

man plötzlich wieder den ursprünglich normalen Percussionsschall, der jedoch nur einen Augenblick währt und sogleich wieder durch vollkommen leere, gedämpfte Schläge ersetzt wird.

Die Kinder, einmal durch Percutiren unwillig gemacht, hören nämlich nicht mehr auf, mit kräftiger Bauchpresse zu schreien, und so lange dieses pressende Geschrei währt, kann man mit Bestimmtheit bei jedem Kinde im ersten Lebensjahre diese Erscheinung studiren.

Der nächst liegende Grund dieses verminderten sonoren Schalles auf der ganzen Rückenfäche findet sich in der Wirkung der Bauchpresse, wodurch der Inhalt der Bauchhöhle nach oben comprimirt wird. Der Unterschied zwischen rechts und links, nämlich der vollkommen leere, gedämpfte Percussionsschall rechts, erklärt sich vielleicht aus dem stärkeren Aufwärtshängen der Leber, deren Grösse noch in einem bedeutenden Missverhältnisse zu den übrigen Unterleibsorganen steht.

Auf der Vorderfläche des Thorax und an beiden Seiten sind die durch Anwendung der Bauchpresse entstehenden Veränderungen des Percussionsschalles wohl auch zu bemerken, erscheinen aber hier viel weniger frappant.

Die oben beschriebene merkwürdige Erscheinung zeitweiser vollkommener Dämpfung rechts hinten macht mein Vertrauen auf die Krankengeschichten von Pneumonien kleiner Kinder, wie sie in den Handbüchern und Journalartikeln sich so häufig finden, etwas schwankend, um so mehr, als in denselben gerade wieder rechts hinten die Dämpfung am häufigsten beobachtet wird. Nur solche physikalische Untersuchungen können Geltung behalten, bei welchen ausdrücklich erwähnt ist, dass das Kind während derselben vollkommen ruhig respirirte, die Bauchpresse nicht benutzte, und dass die dann aufgefundenen Dämpfung auch bei der Inspiration und mehrere Tage hindurch noch deutlich zu unterscheiden war. Ich bin überzeugt, dass eine grosse Anzahl einfacher Bronchitiden, die in den ersten Tagen ihres Bestehens gewöhnlich von Fieber und etwas Dyspnoe begleitet sind, aus Unkenntniss dieser physiologisch normal eintretenden Dämpfung rechts hinten für Pneumonien gehalten werden, wozin denn auch die meistens glückliche Behandlung und schnell eintretende Genesung ihren Grund haben mag.

Bei der Percussion des Thorax eines schreienden Kindes ist noch eine andere Erscheinung zu bemerken, nämlich das sogenannte Münzenklirren. Dieses Geräusch kann man jeden Augenblick an sich selbst studiren, wenn man sich mit voller Faust an das Sternum klopft und zu gleicher Zeit lange Noten singt. Es wird hierdurch der Ton momentan von einem Geräusche unterbrochen, das metallisch klirrend ist und dieselbe Höhe hat als der geungene Ton, welcher sogleich nach geschicktem Schläge in der ursprünglichen Reinheit wieder fort klingt. Es kann dieses Geräusch mit dem bei Erwachsenen vorkommenden cavernösen Münzenklirren und dem *Bruit de pôt Sé* nicht verwechselt werden, indem es nur während des Schreiens oder Sprechens hervorgerufen werden kann, während das bei Excavationen zuweilen beobachtete, auch ohne dass der Kranke einen Ton von sich gibt, gehört wird. Bei ruhig athmenden, nicht schreienden Kindern kommt niemals Münzenklirren vor, indem bekanntlich bei Kindern unter zwei Jahren Cavernen ausserordentlich selten sind, und selbst bei deren

Bestehen das Geräusch nur ausnahmsweise percutirt wird. Diagnostische Bedeutung kann ihm demnach nicht zugeschrieben werden.

Durch Percussion lässt sich in manchen Fällen die Grösse der Thymusdrüse ermitteln. Wenn man das Manubrium sterni möglichst rasch, aufmerksam und leise percutirt, so findet man eine Dämpfung, deren Umfang von Monat zu Monat abnimmt. Man kann sich durch diese Untersuchung häufig genug überzeugen, dass viele Kinder eine grosse Thymusdrüse haben und doch niemals an Spasmus glottidis leiden, und umgekehrt, dass viele Kinder, die von heftigem Spasmus glottidis (das sog. Asthma thymicum) befallen werden, keine percutirbare Thymus erkennen lassen.

Die Auscultation, bei Erwachsenen der wesentlichste Theil der physikalischen Untersuchung, bietet bei Kindern viel geringere Vortheile, wozu theils die fortwährende Unruhe und die ungleichen Athembewegungen desselben, theils die Kleinheit des Raumes und die durch die elastischen Thoraxwände begünstigte Schallleitung, theils endlich der Umstand, dass die Kinderstimme auf den Wunsch des Untersuchers weder erhöht noch verhöhet werden kann, die Schuld tragen.

Wenn bei abgemagerten Kindern die Intercostalräume einmal bedeutende Vertiefungen darstellen, so ist eine vollständige Aufsetzung des Stethoscops geradezu unmöglich, mit dem blossen Ohre die Seitenflächen oder die vorderen Partien des Thorax zu auscultiren, duldet fast kein Kind, es bleibt uns also vornehmlich der Rücken für diese Untersuchung übrig. Während wir aber bei Erwachsenen den Raum des Trachealathmens genau begrenzt wissen, ist dies bei den Kindern nicht der Fall. Wir hören bei gesunden Kindern über den ganzen Rücken, oft sogar über den ganzen Thorax eine laute Expiration und eine tühare Inspiration, so dass wir nach diesem Befunde, wenn er bei Erwachsenen vorkommt, eine ausgebreitete, unzweifelhafte Verdichtung des Lungengewebes diagnosticiren würden. Nicht so bei Kindern. Wir haben hier bei der Auscultation nicht die streng geschiedenen Geräusche des normalen Vesicularathmens einerseits und des Bronchialathmens andererseits, sondern an den meisten Stellen des Thorax ein dem Bronchialathmen sehr nahest, nur durch lange Uebung von diesem zu unterscheidendes Geräusch. So fällt der Hauptschluss, den wir aus dem Bronchialathmen bei Erwachsenen ziehen können, nämlich die Verdichtung des Lungengewebes, weg; es handelt sich bei Kindern meistens nur um eine Vergleichung der beiden Thoraxhälften, auf welcher von beiden das Bronchialathmen deutlicher vernommen wird. Gute Anhaltspunkte liefert die Auscultation der Stimme. Die Stimme resonirt zwar überall am ganzen kindlichen Thorax, wo aber verdichtetes Lungengewebe besteht, da ist ihre Consistenz so heftig, dass der Untersuchende glaubt, er habe sein Ohr am Munde des Kindes, und dieses schreit ihm direkt hinein. Es ist dieses Zeichen um so werthvoller, als es auch bei unruhigen Kindern, und zwar nur bei diesen wahrgenommen werden kann, und man sich also dem Kinde mehr mit besonderer Vorsicht und grösserem Zeitaufwand zu nähern braucht.

Die Palpation ist die bequemste und einfachste Untersuchungsmethode des kindlichen Thorax. Legt man die Hand auf die Brust eines Kindes, so fühlt man zunächst den Temperatur- und Feuchtig-

keitsgrad der Haut. Da, wie schon oben bemerkt worden, bei der Umriss der Kinder exacte Thermometermessungen nicht immer anwendbar sind, so muss man sich gewöhnen, mit der Hand allein die Hauttemperatur möglichst genau zu erforschen, indem die erhaltene Temperatur das wesentlichste Glied des Symptomencomplexes, den wir Fieber nennen, abgibt und hiernach unser therapeutisches Verfahren sich zum grössten Theile richtet.

Ausser diesen allgemeinere Wahrnehmungen fühlt die auf die Brust gelegte Hand noch den *Fremitus* der Stimme, d. h. die der Hand sich mittheilenden Vibrationen des Thorax, welche mit der Stimme entstehen und wieder verschwinden. Am stärksten werden die Vibrationen am Orte ihrer Entstehung, dem Larynx und der Trachea gefühlt, sehr deutlich längs der Wirbelsäule, in dem Räume zwischen den beiden Schulterblättern, deutlich in den Seitengegenden, dann über und unter den Schlüsselbeinen und dem Sternum. Da, wo das Herz und die Leber unmittelbar den Brustkorb berühren, ist der *Fremitus* vollkommen aufgehoben, Fettpolster schwächen die Vibrationen.

Diese bei jedem gesunden Kinde auftretenden Verhältnisse ändern sich nun, sobald ein Theil des Lungengewebes durch compacte tuberculöse oder scirröse Infiltrationen, lobäre Hepatisation oder Carnification verdichtet ist. Es wird nämlich, wenn die hierbei in verdichteten Stellen einmündenden grösseren Bronchien permeabel bleiben, die Stimme verstärkt gefühlt. Verstopfung eines Bronchus hebt allen *Fremitus* über der entsprechenden Lungenpartie auf. Flüssige Ergüsse in den Pleuracysten verhindern aus ebendalls da, wo die Flüssigkeit die Lungen von den Rippen trennt, die Stimme zu fühlen, hingegen ist bei der nothwendig dadurch erfolgenden Compression der Lungen, da wo sie am Thorax anliegen, der *Fremitus* verstärkt.

Durch die Palpation lassen sich ausser der Stimme noch die *Rhonchi* ermitteln. Bringt die in den Bronchien und der Trachea auf- und abströmende Luft zähe Schleimmassen, die membran- oder balkenartig deren Lumen ausfüllen, in Schwingungen, so theilen sich die so entstehenden Geräusche der Brustwand mit und pflanzen sich deutlicher und weiter als alle anderen Geräusche fort. Auf diesem letzteren Umstande beruht auch die irrthümliche Ansicht, dass diese Geräusche da entstünden, wo sie am deutlichsten gefühlt werden. Je höher oben gegen die Trachea zu die vibrierende Schleimlamelle aufsteht, um so verbreiteter fühlt man das hierdurch entstehende Geräusch über den ganzen Thorax, je kleiner der Durchmesser des schleimhaltigen Bronchus, also je näher der Peripherie, um so umschriebener wird es an der Brustwand fühlbar.

Die Palpation der Stimme und der *Rhonchi* darf nie unterlassen werden, und muss bei unruhigen Kindern sogar Percussion und Auscultation ersetzen.

Dies sind die Hauptpunkte, auf welche der Arzt bei einem schlafenden oder wenigstens ruhigen Kinde zuerst zu achten hat. Die Percussion muss immer zuletzt vorgenommen werden, weil man durch dieselbe am gewissten den Schlaf stört.

Fast noch wichtiger als die Untersuchung der Brusthöhle ist die der Bauchhöhle, da die Krankheiten des Darumkanals bei weitem häufiger sind als die der Lungen. Wenn schon beim Erwachsenen die

Percussion des Abdomens wegen der schwankenden Gasmenge in den Gefäßen keine sehr exakten Resultate liefert, so tritt dieser Uebelstand beim Kinde noch viel schärfer hervor. Bei allen Arten von Darm-entzündungen wird der Darm meteoristisch aufgetrieben und Leber und Milz nehmen bei der dann vorgenommenen Percussion scheinbar an Volumen ab.

VaQuex liess, wenn er den Bauch eines Kindes untersuchen wollte, dasselbe plötzlich an ein helles Fenster oder in die Nähe eines Lichtes bringen, wodurch die Unruhe in der Regel sogleich aufhört, das Kind sieht unverwandt gegen das Licht. Einen solchen Augenblick muss man benutzen, um einen langsam zunehmenden Druck auf das Abdomen auszuüben, was das Kind ruhig verträgt, wenn der Druck keinen wirklichen Schmerz erzeugt. Man kann auf diese Weise den Bauch bei einem kleinen Kinde oft so stark drücken, dass man die Wirbelsäule berührt. Ist der Druck wirklich schmerzhaft, so stösst das Kind jedesmal einen schmerzhaften lauten Schrei mit Verzerrung der Gesichtszüge aus, der zuweilen gleich wieder aufhört, sobald der Druck nachlässt.

Seröse Ergüsse im Peritonealsack, die hauptsächlich häufig nach Scharlach und bei Tuberculosis des Peritoneums vorkommen, findet man schwer in liegender Stellung. Das Serum senkt sich nach hinten und an der vorderen Fläche des Abdomens findet sich überall Darm, so dass man nirgends Fluctuation entdecken kann. Lässt man die Kinder aufsitzen oder auf den Bauch legen, so senkt sich das Serum nach unten und vorne, und ist dann leicht durch Fluctuationsgefühl und Percussion zu constatiren.

Der Anus ist bei jedem Kinde genau zu beisehtigen. Bei vielen Diarrhöen rülhet er sich und gibt gewissermassen einen Maassstab für die Heftigkeit und Dauer, an ihm erscheinen auch gewöhnlich die ersten Symptome der angeborenen Syphilis. Die innere Untersuchung hat gar keine Schwierigkeit; unter langsam rotirenden Bewegungen kann der kleine Finger wohl geölt auch eingeführt werden, es verursacht aber diese Procedur immer Schmerzen, und darf nur bei wirklichen Indicationen vorgenommen werden.

Die Genitalien verdienen auch in allen Fällen eine genaue Berücksichtigung. Sie sind bei Diarrhöen ebenfalls geröthet und das Scrotum vornehmlich excorirt sehr schnell, die weiblichen Genitalien secretiren dann sehr Schleim. Die Harnröhre wird am einfachsten mit einer silbernen Sonde, beim Knaben catheterartig gebogen, untersucht, welche Procedur in vielen Fällen von Strangurie zugleich als Heilmittel die besten Dienste leistet.

Die Innenfläche der Schenkel ist der beste Anhaltspunkt für die Beurtheilung der Ab- oder Zunahme eines kranken Kindes, wie ja bekanntlich auch die Mäzung unseres Schlachtreiches von den Fleischern immer an dieser Stelle geprüft wird. Ein Unwohlsein und besonders eine Diarrhöe von wenigen Stunden macht die vorher feste, gespannte Haut sehr weich und etwas locker, nach 24 Stunden entstehen kleine Fältchen auf ihr, und bei fortwährender Krankheit schwinden die mächtigen Fettpolster so vollkommen, dass statt ihrer grossfaltige, schlatternde Säcke sich bilden, die sich aber bei wieder aufgenommenener Ernährung erstaunlich rasch füllen und der inneren Schenkelfläche ihre frühere Gestalt und Festigkeit wiedergeben.

Die Untersuchung der Mundhöhle darf nie unterlassen werden. Man drückt den Kindern sanft auf das Kinn, worauf sie gewöhnlich den Mund weit aufmachen, oder man schiebt ihnen den Finger längs der Wangenschleimhaut bis an den hinteren Abschnitt des Unterkiefers, gelangt hier leicht zwischen Ober- und Unterkiefer hinein und kann nun die Mundhöhle beliebig weit öffnen. Bei einiger Geschicklichkeit und Übung gelingt es sehr leicht, mit dem Zeigefinger die hintere Pharynxwand, den hinteren Ausgang der Nasenhöhle, den Kehldeckel und selbst die Stimmritze zu betasten, was in einzelnen Fällen von Diphtheritis, Retropharyngealabscessen, Larynkrup etc. wichtige Aufschlüsse verschaffen kann.

Die Zunge ist bei Kindern noch viel weniger „der Spiegel des Magens“ als bei Erwachsenen. Kinder mit heftigen Darmerkrankungen haben häufig eine ganz normale rothe Zunge, und umgekehrt gesunde Kinder mit gutem Appetit und regelmäßiger Verdauung zeigen häufig eine ganz weisse oder wenigstens mit weissen Inseln bedeckte Zunge. Viele Eltern richten ihre Kinder schon in der frühesten Jugend darnach ab, auf Befehl sogleich die Zunge herauszustrecken, und thun sich auf diese ihre unsichtige Erziehung etwas zu Gute. Die Kleinen treiben aber dann ihre gute Erziehung so weit, dass sie auch auf der Strasse dem behandelnden Arzt, den sie häufig schon von weitem erkennen, zur allgemeinen Belustigung der Vorübergehenden die Zunge fortwährend herausstrecken. Zahnende Kinder mit rothem Zahnfleisch lassen ihre Mundhöhle nur sehr ungern untersuchen, man muss sich deshalb gewöhnen, mit einem einzigen Fingergriff so rasch als möglich beide Zahnreihen zu überstreichen, damit sie nicht gar zu unruhig werden.

Zweierlei Geräusche sind es endlich, die wir bei der Untersuchung beobachten müssen: Das Geschrei und der Husten.

Die Kinder schreien nur während des Expirationsaktes. Während der Inspiration kommen zwar auch einzelne Schreie vor, z. B. beim Stimmritzkampf. Diese lauten, gezogenen Inspirationen sind jedoch immer nur vereinzelte und lassen sich unter die Bezeichnung „Geschrei“ eigentlich nicht bringen, da wir hierbei eine Reihe schnell sich folgender Töne im Sinne haben. Das gewöhnliche Geschrei findet also nur während der Expiration statt, es ist laut klingend, langgedehnt und bei Kindern von gleichem Alter auch von ziemlich gleicher Höhe, doch hat der Ton des Geschreies fast bei jedem Kinde noch etwas Eigenenthümliches, das sich ebenso wenig wie die Verschiedenheit der menschlichen Stimme genauer definiren lässt. Da während des Schreies die Luft in den Lungen durch die Bauchpresse comprimirt wird, durch die gespannte Stimmritze aber nur langsam und nicht dem Grade ihrer Compression entsprechend entweichen kann, so muss eine momentane Circulationsstörung eintreten. Nach einer tiefen Inspiration hebt das Kind sein Geschrei damit an, dass es den Mund weit öffnet, wobei die Zunge zuweilen in leichten convulsivischen Bewegungen auf dem Zahnfleischrande sichtbar wird, die Nasenlöcher sich erweitern, die Augen sich pressend schliessen und auf den Wangen und der Stirne sich zahlreiche Falten bilden. Es schreit nun unter zunehmender Röthe und strotzenden Hals- und Kopfvenen so lange fort, als es ohne ernste Inspiration bestehen kann, tritt dieser Zeitpunkt ein, so nimmt es rasch

einen tiefen Athem, wobei die Verzerrung der Gesichtszüge einen Augenblick nachlässt. So lange die Unruhe des Kindes währt, bestehen auch diese Verzerrungen fort, sobald es sich aber beruhigt, tritt wieder ein Ebnenmäss im Aus- und Einathmen ein, die Falten des Gesichtes schwinden, es folgen noch einzelne leichtere Schreie, der Mund schliesst sich allmählig und es tritt dann bald eine kleine Erschöpfung ein, die sehr gewöhnlich in Schlaf überzugehen pflegt. Zuweilen hört man in einer Expiration drei bis fünf Schreie schnell aufeinander, worauf ein langgestreckter anhaltender Schrei folgt, der in zitternden Absätzen endet. Es hat dieses Geschrei mit dem Zieggengestecker gross Ähnlichkeit. Zu bemerken ist noch, dass kleine Kinder unter $\frac{1}{2}$ Jahr, und nur für diese gilt die bisherige Beschreibung des Geschreies, niemals Thränen vergossen.

Die wesentlichsten Schlüsse, die wir von der Art des Geschreies auf die Art der Erkrankung selbst ziehen können, sind nun folgende: Kinder, die an Pneumonie, an Pleuritis oder an Anelectase der Lungen leiden, schreien niemals laut, noch viel weniger anhaltend, sie sind bloss im Stande, ein leises klägliches Stöhnen hervorzubringen. Kinder, die an catarrhalischer, diphtheritischer oder krupöser Laryngitis erkrankt sind, können gar nicht schreien, sind apnoeisch, die leichtesten Grade von catarrhalischer Kehlkopfentzündung hemmen das Geschrei nicht vollständig, machen es aber heiser. Hydrocephalische Kinder endlich bringen nur einzelne schrillende Töne hervor und verfallen nach jedem einzelnen Aufschreien wieder in ihren Sopor. Ein fieberkrankes Kind schreit nie anhaltend und laut, selbst wenn es heftige Schmerzen hat. Am längsten schreien die Kinder bei Otitis, bei Abscessen in der Tiefe und nach Verwundungen.

Die Art des Hustens gibt uns für die Beurtheilung der Respirationsorgane sehr wesentliche Anhaltspunkte: Husten die Kinder laut, locker und ohne Schmerz, so hat man sicher nur einen einfachen Catarrh der Bronchien vor sich; verzerrn sie aber bei jedem Hustenreiz das Gesicht, husten sie trocken, leise und stoßen sie den Husten möglichst zu unterdrücken, so hat man es eben so sicher mit einer entzündlichen Affection der Lungen zu thun. Der Krampf beginnt mit einem trocknen, bellenden Husten, der nur zu bald einem aphonen Krächzen Platz macht. Der Keuchhusten besteht in einem langen, krampfhaften, stossweisen Ausathmen, das durch eine gezogene, lauschlürfende Inspiration unterbrochen wird. Die tuberculösen Kinder husten meist trocken, aber in kurzen Intervallen Tag und Nacht fort. Der Husten der Typhösen endlich ist im Verhältnisse zu den grossen Veränderungen, die wir an den Lungen physikalisch nachweisen und häufig in den Leichen finden, sehr unbedeutend und ohne Beschwerde.

Diese sind die Haupteigenenthümlichkeiten, auf die der Arzt bei Untersuchung eines kranken Kindes vornehmlich Rücksicht zu nehmen hat. Was nun das Berechnen des Arztes betrifft, so gehört zum Umgange mit kranken Kindern grosse Geduld und Sanftmuth. Am schwierigsten sind immer die Kinder von 1—3 Jahren zu behandeln. Säuglinge und Kinder unter einem Jahre sind selten sehr schmerzhaft und lassen sich durch etwas Geklapper oder leichtes Klopfen auf ihre Kissen schnell beruhigen. Die Kinder von dem eben angeführten Alter haben oft gegen jedes fremde Gesicht eine unüberwindliche Scheu. Man muss

zu solchen Kindern nicht direkt an's Bett gehen, sondern ihnen Anfangs den Rücken wenden, sie ganz ignoriren, entfernt vom Bettchen mit den Eltern oder Kindermädchen ruhige Gespräche mit sanfter Stimme führen, und sich endlich langsam und ruhig mit etwas Glänzendem oder einem Stückchen Zucker dem Kinde nähern. Sitzt man am Bett, so darf man das Kind nicht gleich abdecken, am Unterleib herumkneten und die physikalische Untersuchung beginnen. Man stellt erst einzelne dem Alter entsprechende Fragen an dasselbe und sucht ihm einige Ja oder Nein abzugewinnen, oder man bewundert sein Spielzeug, das am Bette steht, oder man erzählt ihm von einem andern Spielzeug, das es noch nicht besitzt und das man ihm zu zeigen verspricht etc. etc., kurz man muss mit dem Kinde befreundet sein, bevor man es untersuchen darf, zu eine ordentliche, gründliche Untersuchung zu denken. Auf diese Weise gelingt es aber fast immer und zwar sehr schnell, sich die Freundschaft der Kleinen zu erwerben. Lässt man nach so geschlossener Freundschaft auch etwas Ernst und Energie durchblicken, so gewinnt man plötzlich viel mehr Autorität über die Kinder, als dies die nächste Umgebung nur je zu ahnen gewagt hat. Die Kinder lassen sich dann ruhig untersuchen, legen sich auf jede Seite, die man wünscht, nehmen ohne Widerrede selbst die bittersten Medikamente ein und unterstützen die ärztliche Untersuchung auf alle mögliche Weise. Nur wenn die Umgebung die unglaubliche Borntheit begangen hat, dem Kinde den zu erwartenden Arzt als Popanz vorzustellen, dauert es etwas länger, bis ihm diese einfältige Vorstellung wieder verwischt wird. Niemals und unter keiner Bedingung versuche man durch barsches Anfahren, Festhalten oder gar durch einen leichten Schlag widerspenstige Kinder zur Fügsamkeit zu bringen. Abgesehen davon, dass man hiedurch nur grössere Furcht und ein noch heftigeres Zetergeschrei bewirkt, zieht man sich hiedurch die Abneigung und selbst den Hass der meistens bornierten Eltern — denn fast nur bei diesen findet man solche unbillige Kobelde — zu. Behält man hingegen in solchen Fällen seinen Gleichmuth und ruhige Stimme, so überkommt die Eltern wegen der ganz vernachlässigten und verfallenen Erziehung des Kindes ein tiefes Schamgefühl. Sie stoßten es hierauf oft so gewaltig, dass man vom ärztlichen Standpunkt aus dazwischen treten muss, worauf man dann gewöhnlich gewonnenes Spiel und einen ergebenen Patienten hat. Im Allgemeinen kann der Grundsatz aufgestellt werden, je kränker das Kind, um so leichter lässt es sich untersuchen.

Dem angehenden, in der Pädiatrik unerfahrenen Arzte mögen diese Bemerkungen kleinlich und unbedeutend erscheinen, wenn er sich aber einmal mehr auf diesem Gebiete bewegt hat, wird er wohl einsehen, dass ohne diese Cautelen trotz aller Kenntnisse und Untersuchungsmethoden eine glückliche Behandlung rein unmöglich ist.

3. Capitel.

Ernährung und Pflege der Kinder.

Das beste Nahrungsmittel für ein neugeborenes Kind ist bekanntlich die Milch seiner eigenen Mutter, wenn diese nicht stillen kann, die Milch einer Amme, und wenn auch diese nicht bezuschaffen ist, die Milch eines Hausviehes.

Bezüglich des Stillens durch die eigene Mutter entstehen zwei Fragen: 1) In welchen Fällen kann die Mutter nicht stillen? und 2) in welchen darf sie nicht stillen?

Sie kann nicht stillen, wenn sie keine oder zu wenig Milch hat, wenn die Warzen fehlen oder fehlerhaft gebildet sind, oder endlich wenn örtliche Krankheiten der Brust, Geschwüre oder Krebsknoten vorhanden sind. Ob eine Mutter Milch bekommen und das Kind selbst zu saugen vermögen werde, ist, besonders bei Erstgebärenden, schwer vorherzusagen. Die Größe und Härte einer Brust gibt hierfür keine sicheren Anhaltspunkte. Oft fehlt gesunden, jungen Frauen mit gutgeformten üppigen Brüsten die Milch, während sie bei schwächeren, mit vorher sehr flachem Busen, oft wider Erwarten reichlich eintritt. Am wahrscheinlichsten sind die Schwangeren zum Selbststillen ihres zu erwartenden Kindes geeignet, denen schon während der Schwangerschaft viel Colostrum aus den Brüsten fließt. Bezüglich dieser Secretion theilt Danaë die Frauen in drei Klassen: In die erste gehören jene, die so wenig Colostrum secretiren, dass man am Ende der Schwangerschaft kaum einige Tropfen aus der Brust zu drücken im Stande ist. Dieses Colostrum enthält mikroskopisch nur wenig Milchkügelchen und nur eine geringe Zahl Colostrumkörperchen. Man darf dann nur auf eine sparsame Milchsecretion nach der Entbindung rechnen.

Die zweite Klasse umfasst jene Frauen, die zwar viel Colostrum secretiren, das aber ganz die Eigenschaften des vorigen hat. Es ist eben so arm an Milchkügelchen und Colostrumkörperchen, und man kann dann mit Wahrscheinlichkeit eine zwar reichlich secretirte aber dünne, wenig nützende Milch nach der Geburt erwarten.

Ist aber drittens die Secretion des Colostrums am Ende der Schwangerschaft reichlich, milchweis und mit gelben Streifen und Klümpchen vermischt, und finden sich viel Milchkügelchen und Colostrumkörperchen vor, so kann man ziemlich bestimmt voraussagen, dass sich die Schwangere zum Selbststillen eignet und eine nährhafte Milch in genügender Menge secretiren wird.

Vollkommener Mangel der Warzen findet sich selten, häufig aber kommen die eingedrückten Warzen vor, woran gewöhnlich ein zu hoch hinaufgehendes Corsette, dessen Brustausbuchtung zu klein ist, die Schuld trägt. Nach der Geburt ist es zu spät, diese eingedrückten Warzen zu verbessern; bis es gelingt, sie brauchbar zu machen, müht sich das Kind vergebens ab, die Milch herauszusuchen und hört endlich ganz auf zu saugen; während der letzten Schwangerschaftsmonate aber kann hierfür viel geschehen. Die Frauen müssen ganz weit gekleidet

sich und müssen täglich einmal den Kopf einer irdenen sogenannten echnischen Pfeife auf die Warze setzen und am andern Ende der Pfeife mit dem Mund saugen, oder man setzt auch noch besser täglich einmal eine Gutschuimilchpumpe auf. Dem Vorschlag von Bouchout, wenn die Frauen diese Manipulation nicht ertragen, „den Mann hin und wieder den Säugling machen zu lassen,“ habe ich noch keinen Ehemann gemacht, glaube auch nicht, dass sich bei uns in Deutschland viele so galante Gatten finden würden.

Mit dem Brustkrebs endlich darf man jene harten gutartigen Knoten nicht verwechseln, welche bei jungen Frauen und Mädchen sehr häufig vorkommen, aber unschmerzhaft sind. Sie sind ganz unschädlich und verlieren sich gänzlich nach dem ersten Wochenbette, wenn das Stillen einmal in Gang gekommen.

Die zweite Frage: In welchen Fällen darf eine Mutter nicht selbst stillen? ist schwieriger zu entscheiden. Schwächliche und art organisirte Frauen ertragen zuweilen das Selbststillen gut, wenn sie sonst günstige äußere Verhältnisse und das zum Stillen sehr notwendige Pflöggen haben. In andern Fällen hingegen wirkt das Stillen selbst auf kräftige robuste Frauen, wenn Armuth, Aerger, Gram, unglückliche eheliche Verhältnisse dazu kommen, höchst ungünstig, sie magern ab und altern ausserordentlich schnell. Absolut zu verbieten ist das Selbststillen allen Müttern, welche an Syphilis, chronischen Hautausschlägen, Tuberculosis, oder auch zur hereditären Anlage zu derselben, an Arthritis und Epilepsie leiden. Bei hysterischen Frauen hat das Selbststillen vermöge der Stillentziehung einen nachtheiligen Einfluss sowohl auf die Gesundheit der Mutter, als vermittelt der Herrschaft des Nervensystems auf die Milchabsonderung auch auf das Kind. Bei höherem Alter der Mutter, besonders wenn diese Erstgebärende ist, verbietet sich das Stillen wegen Mangel an Milch meistens von selbst, ist aber wegen jedenfalls dünner, magerer Milch in allen Fällen abzurathen. Acute Krankheiten, Exantheme, Typhus, Puerperalfieber etc. machen gewöhnlich die Milch versiegen, so lange sie aber wegnimmt wird, soll man die Kinder nicht abnehmen. Die Milch wirkt nicht direkt schädlich auf das Kind, ihre Entfernung aber in allen Fällen sehr wohlthätig auf die Mutter.

Liegt keiner dieser Uebelstände vor, so ist es einer jeden Mutter zur heiligen Pflicht zu machen, dass sie ihr Kind selbst stille. Zärtheit und Kleinheit kann diese Pflicht nicht aufheben, sonst wären die meisten Frauen in unseren Städten davon dispensirt. Unter ausserdem günstigen Verhältnissen bekommt die Milch der eigenen Mutter den Kindern immer am besten, denn es ist eine oft gemachte Erfahrung, dass das Kind einer schwächlichen Mutter an deren Brust vortrefflich gedeiht und zunimmt, während ein fremdes Kind, dem man, verführt durch das gute Aussehen des ersteren, diese schwächliche Mutter als Amme gibt, durchaus nicht zunehmen will.

Kann oder will eine Mutter nicht selbst stillen, so ist das beste Surrogat eine Amme.

Es ist schwer über die Wahl einer Amme allgemeine Regeln aufzustellen, weil eine Menge localer Verhältnisse hier in Betracht kommt, die natürlich für verschiedene Städte und Länder verschiedene sein müssen.

Hat man die Wahl zwischen mehreren zum Ammendienste sich antragenden Personen, so erhält immer die den Vorzug, die schon einmal geboren und durch ihre Brust allein ein kräftiges Kind schon aufgezogen hat. Lässt sich dies durch eigene Anschauung oder glaubwürdige Zeugen beweisen, so hat man die grösste Garantie, dass nach den folgenden Geburten das Stillen in gleicher Regelmässigkeit vor sich gehen werde. Es ist immer gut, wenn die Amme 3—4 Wochen früher entbunden hat, als die Frau, deren Kind sie übernehmen soll, denn in den ersten drei Wochen hat fast eine jede Wöchnerin eine ziemliche Quantität Milch aufzuweisen, nach dieser Zeit aber nimmt bei vielen die Milchsecretion von Tag zu Tag ab, so dass, wenn man genöthigt war, eine Amme zu engagiren, die erst vor wenigen Tagen entbunden hat, man nach einigen Wochen diesen kostbaren Individuen wegen Mangel an Milch den Abschied geben muss. Ausserdem sind bei Ammen, die schon einige Wochen gestillt haben, Nachkrankheiten des Wochenbettes und namentlich das lästige Wundwerden der Warzen nicht mehr zu befürchten. Diese hier aufgeführten Vortheile überwiegen jedenfalls den kleinen Nachtheil, dass die Milch einer solchen Amme eigentlich für ein mehrere Wochen älteres Kind gehört. Die chemische Zusammensetzung der Milch ist überhaupt bei ein und derselben Amme und noch mehr bei verschiedenen Individuen so wenig constant, dass es immer nur ein glücklicher Zufall ist, wenn einem Kinde die Milch einer fremden Person so gut wie die seiner eigenen Mutter bekommt und anschlägt.

Das beste Alter für eine Amme ist zwischen 20 und 30 Jahren, doch können häufig Ausnahmen hiervon gemacht werden: Mädchen unter 20 Jahren sind meist Erstgebärende, und haben also ihre Eigenschaften als Amme noch nicht declarirt. Bei Personen, die älter als 30 Jahre sind, findet schon nicht mehr der rege Stoffwechsel statt, der zur Production einer qualitativ und quantitativ genügenden Milch gefordert wird. Die Franzosen behaupten, die Brunneten hätten eine nahrhaftere Milch als die Blondinen, wozu ich noch bei uns in Deutschland noch nicht habe überzeugen können. Was die Brunneten selbst betrifft, so seien sie mässig gross, von gesunder Haut bedeckt, die Warzen müssen wenigstens 2—3 Linien prominiren, und bei Druck auf die Mamma muss die Milch aus mehreren Milchgängen in feinen Strahlen hervorspritzen. Man pflegt bei den Ammen auch auf gute Zähne zu sehen, was übrigens bei der ungeheuren Verwahrheitung, die jetzt die Zahncurie gewonnen hat, immer mehr vernachlässigt wird. Viel wichtiger scheint mir ein gesundes, rothes, festes Zahnfleisch zu sein. Blasses, bläuliches, leicht blutendes oder riechendes Zahnfleisch lässt immer Blutmuth oder mangelhafte Verdauung vermuthen, zwei Zustände, die sich keinesfalls mit dem Säugen vertragen. Bei unserer Bevölkerung sind mir die phlegmatischen und nachgiebigen Ammen immer die erwünschtesten, eine herrschsüchtige Person kann in einem Hause, wo mehrere Dienstheden sind, niemals Amme werden; denn sie wird, kaum angenommen, sogleich ihre Unentbehrlichkeit demselben fühlen lassen und sie nach wenigen Tagen aus dem Hause zu treiben suchen. Der Schluss der ganzen Scene ist dann immer, dass die Friedensstörerin wieder entfernt wird, und der für Alles Rath wissende Hausarzt eine neue Amme herbeischaffen muss. Gewöhnlich zieht man die Land-

mädchen den Städterinnen vor. Wenn es wahr wäre, dass die Moralität auf dem Lande grösser ist als in der Stadt, so wäre dies allerdings ein gewichtiger Grund, meine Erfahrungen jedoch können diese Behauptung nicht bestätigen. Bei Landmädchen stellt sich aber meist noch der Uebelstand ein, dass sie starkes Heimweh bekommen, die städtische Kost und Lebensweise nicht vertragen und sich schwer acclimatilisiren, so dass sie trotz ihres stärkeren Knochenbaues und ihrer entwickelteren Brüste weniger gute Dienste leisten, als ein Fabrikmädchen oder eine städtische Dienstragd.

Bevor man eine Amme annimmt, hat sie sich und ihr Kind am ganzen Körper untersuchen zu lassen; das Kind muss gut gekniet sein, für sein Alter gehörige Fettpolster haben und darf an keinem Körperteile nur irgend verdächtige wunde Stellen zeigen. Die Amme muss die oben beschriebenen Eigenschaften der Mamma und des Zahnfleisches haben, die physikalische Untersuchung der Brusthülle darf keine Anomalie ergeben, sie darf keinerlei Geschwüre haben, besonders sind Arme, Genitalien und Mundhülle genau auf Syphilis zu untersuchen.

Diese Vorschriften finden aber nur ihre Anwendung, wenn man die Wahl zwischen mehreren Ammen hat. Wenn man aber, wie es so häufig in kleineren Städten der Fall ist, froh sein muss, überhaupt im ganzen Orte und seiner Umgegend eine Person, die sich zur Amme hergibt, aufzutreiben, so kann man eine jede nehmen, die an keiner fieberhaften Krankheit, keiner Syphilis und keiner nachweisbaren Tuberculosis leidet und eine hinlängliche Menge Milch aus gesunden Warzen secretirt.

Wir kommen nun zur Hauptsache, zur Milch und ihren chemischen und mikroskopischen Eigenschaften.

Das spezifische Gewicht der Frauenmilch ist durchschnittlich 1,032. Lässt man sie einige Zeit ruhig stehen, so scheidet sich auf ihrer Oberfläche eine dicke, fettreiche, gelblich weisse Schichte, der sog. Rahm, ab, während die darunter befindliche Flüssigkeit, ärmer an Fett und deshalb spezifisch schwerer, von bläulich weisser Farbe wird. Die frische Frauenmilch ist bläulich weiss oder rein weiss, von schwach säullichem Geschmacke und alkalischer Reaktion, lässt man sie aber bei nicht zu niedriger Temperatur stehen, so fängt sie allmählig an neutral und endlich sauer zu reagiren und kleine Klümpehen auszuscheiden.

Der wesentliche Unterschied zwischen Frauenmilch und Kuhmilch besteht nicht in der Verschiedenheit der Milchzucker- und Butterquantität, sondern darin, dass das Casein der Kuhmilch beim Sauerwerden in grossen Klumpen und selbst zu einer zusammenhängenden Gallerte gerinnt, während das Casein der Frauenmilch sich nie anders als in kleinen Klümpehen und losen Flecken ausscheidet.

Bei der mikroskopischen Untersuchung stellt sich die frische Frauenmilch als klare Flüssigkeit dar, in welcher gleichwie in einer Emulsion Fettkügelchen, die sog. Milchkügelchen suspendirt sind. Die Grösse der Milchkügelchen ist verschieden, die meisten messen im Durchmesser 0,0012—0,0020", schüttelt man aber die Milch, lässt sie dann einige Stunden stehen und untersucht von der oberflächlichen

Schüssel, so findet man neben den gewöhnlichen Milchkügelchen viele grosse Fettkugeln, deren Durchmesser bis zu 0,05—0,04" zunimmt. Siehe Tafel II. Fig. 3.

Durch das Mikroskop allein, ohne Beihülfe chemischer Reagentien, kann man sich nicht überzeugen, dass die Milchkügelchen eigene Membranen haben. Die Existenz einer Hüllmembran kann aber sehr leicht und zwar auf zweierlei Weise bewiesen werden. Die eine Methode, von Heule, besteht in der Anwendung verdünnter Essigsäure und gleichzeitiger Beobachtung der angesäuerten Milch unter dem Mikroskope. Die Milchkügelchen erleiden hiedurch eine solche Veränderung, die sie, wären sie blosse Fetttropfen, niemals zeigen könnten. Sie werden vielfach gezerrt, einige wie geschwamm, andere lösenförmig, an den meisten tritt aber ein kleines Tröpfchen hervor, welches fast wie ein Kern des Milchkügelchens erscheint, diesem Tröpfchen folgen an andern Stellen neue nach, so dass zuweilen um das nun verkleinerte Milchkügelchen ein ganzer Kranz von Tröpfchen entsteht. Bei Anwendung concentrirter Essigsäure fliessen die Milchkügelchen zu grossen Fetttropfen zusammen. Die zweite Methode ist von E. Mitscherlich und besteht darin, dass man frische Milch mit Aether schüttelt, wobei dieselbe fast unverändert bleibt und der Aether nur wenig Fett aufnimmt. Wäre die Milch eine einfache Emulsion, so müsste sie alles Fett an den Aether abgeben und sich hiedurch in eine durchsichtige, oder wenigstens durchscheinende Flüssigkeit verwandeln; setzt man nun eine Substanz zu, welche jene Hüllen auflösen vermag, z. B. ständes oder kohlensaures Kali, dann nimmt in der That der Aether alles Fett auf, und es bleibt eine fast durchsichtige Molke zurück.

Ausser den Milchkügelchen kommen in der Milch noch andere Formelemente vor, nämlich die Colostralkörperchen oder Corps granuleux der Franzosen. Physiologisch finden sie sich nur in der ersten Woche nach der Entbindung, nehmen dann rasch ab und zeigen sich immer wieder, sobald dem Wochenbette sich irgend eine Krankheit zugesellt oder eine Stillende von irgend einer acuten, fieberhaften Affection befallen wird. Sie bestehen aus unregelmässigen Conglomeraten sehr kleiner Fettbläschen, welche durch eine amorphe etwas granulöse Substanz zusammengehalten werden, und sind nach Heule von 0,006 bis 0,028" Durchmesser. Durch Aether werden die Fettkörnchen derselben weit leichter als die der Milchkügelchen aufgelöst, durch Essigsäure und Kali wird die granulöse Zwischensubstanz aufgelöst und die Fettbläschen zerstreut; durch Jedwasser werden die Colostralkörperchen intensiv gelb gefärbt. Es kann also kein Zweifel sein, dass diese Körperchen nichts weiter sind, als sehr kleine, in eine albuminöse Substanz eingebettete Fettbläschen, ein Kern und eine Hüllmembran sind nicht nachzuweisen. Siehe Tafel II. Fig. 4.

Neben diesen beiden Hauptformelementen der Milch finden sich noch darin sehr vereinzelt Epithelialzellen und Schleimkörperchen, sie treten in grösserer Quantität nur bei localen krankhaften Affectionen der Brustdrüsen auf.

Faerstoffgerinnung kommt nur bei Blagehalt der Milch vor.

Blutkörperchen werden selbst in der Milch gefunden und mehren sich derselben gewöhnlich nur bei Erosionen der Warzen bei Pilz und Infusorien finden sich in der frischen Frauenmilch niemals.

Was die chemische Zusammensetzung betrifft, so haben wir hier:

1) den Milddzucker ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$), der in der Frauenmilch zu 3,2 bis 6,2 Procent enthalten ist. Im Colostrum ist am meisten Milddzucker ($7\frac{1}{2}\%$), seine Quantität vermindert sich nach Simon's Beobachtungen von Monat zu Monat, geht aber selten unter 4% herunter.

2) Die Fette, die Butter. Die Butter bildet den Inhalt der Milchkügelchen und kann durch Zerstörung der Hüllenmembranen dieser Kügelchen (Bakterien) ziemlich gut isolirt werden. Die einzelnen Fette der Frauenmilch sind noch keiner genaueren Untersuchung unterworfen worden, nur so viel ist bekannt, dass sie sehr schnell ranzig werden und flüchtige Fettsäuren bilden. Der Gehalt der Frauenmilch an Fett ist nicht constant. Simon fand 2,53 bis 3,88% Butter; Clemen und Scherer am vierten Tage nach der Geburt 4,3%, am zehnten Tage 3,5%, und am zwölften Tage 3,3%; Chevallier und Henry 3,5%. Im Colostrum fand Simon 5,0% Butter. Eine auffallende Erfahrung ist, dass die beim Melken oder künstlichen Sagen zuletzt auslaufende Milch bei äteigens gleicher Zusammensetzung immer viel fettreicher gefunden wird, als die zuerst auslaufende. Da diese Beobachtung zuerst an Kühen gemacht wurde, so glaubte man, dass schon in dem Uter die Milch anfange sich abzumahlen, so dass die wässrigen Bestandtheile sich in den Zitzen vermehrt, höher oben vermindert fänden, allein da Reiset dieselbe Erfahrung auch an der Frauenmilch, die in einzelnen Absätzen aus der Brust einer Frau gezogen wurde, machte, so muss, da hier diese einfache Senkung vermöge der Stellung der Brüste nicht angenommen werden kann, der Grund wohl in etwas anderem als in dem gewöhnlichsten mechanischen Verhältnisse zu suchen sein.

Nach meinen neuesten Untersuchungen schwankt der Fettgehalt der Frauenmilch wasserordentlich. Es ist mir gelungen, eine höchst einfache optische Milchprobe herzustellen, mit welcher man in 2—3 Minuten eine genaue Rahmbestimmung und zwar von einer ganz kleinen Quantität Milch machen kann. Die ausführliche Beschreibung des Instrumentes und seiner bisherigen Anwendung findet sich in einer eigenen Brochüre: Eine neue Milchprobe. F. Enke 1862. Man kann auf diese Weise den Fettgehalt einer Frauenmilch augenblicklich, sicher und, was das wichtigste ist, mit ein paar Cubikcentimeter Milch anstellen. Die bisherige Methode, den Fettgehalt der Frauenmilch zu prüfen, bestand darin, dass man die ausgepumpte Milch in des Galaktometer goss. Der Galaktometer ist ein Probirglaschen, das eine Skala von 100 Theilstrichen trägt. Man füllt dasselbe bis zum 0 Striche mit Milch, lässt es 24 Stunden ruhig stehen und liest dann die Dicke der Rahmschichte ab. Gute Frauenmilch darf nicht weniger als drei Theilstriche Rahm geben. Dieser Galaktometer hat den Nachtheil, dass die Untersuchung erst nach 24 Stunden beendet werden kann, und dass es oft schwierig und schmerzhaft ist, eine so grosse Menge Milch aus der Brust einer Amme zu pumpen. Durch meine optische Milchprobe werden diese beiden Nachtheile vermieden.

Der Milddzucker und die Butter enthalten keinen Stickstoff und sind die w.g. Respirationsmittel der Frauenmilch.

3) Der Kaseinstoff, das Casein findet sich in der Frauenmilch gelöst, so lange sie nicht sauer reagirt, und fällt in leichten Flecken

hervor, wenn sich überschüssige Milchsäure durch Zersetzung des Milchnockens gebildet hat. Die Milch einer guten Amme muss 3—3,5% Casein enthalten, das Colostrum aber enthält etwas mehr, meist 4%. Die chemische quantitative Bestimmung des Caseins ist sehr schwierig und zeitraubend und kann deshalb bei der Wahl einer Amme füglich unterlassen werden. Das Casein ist der einzige stickstoffhaltige Körper der Milch.

4) Die löslichen Salze der Frauenmilch bestehen aus Chlornatrium und Chlorkalium, phosphorsauren Alkalien und ausser diesen aus dem Kali und Natrium, welche an das Casein gebunden sind.

Die unlöslichen Salze sind phosphorsaure Kalk- und Talgerde, welche hauptsächlich dem Casein angehören, Spuren von Eisenoxyd und Fluor. In der Frauenmilch kommen im Durchschnitt 0,16 bis 0,25% Salze, darunter 0,04 bis 0,09% lösliche vor. Der Salzgehalt des Colostrums ist grösser als der der Frauenmilch in einem späteren Stadium des Säugens.

Vernois und Becquerel untersuchten die Milch von 89 Ammen und stellten folgende Durchschnittszahlen auf.

Dichtigkeit	1032
In 1000 Theilen Milch findet sich:	
Wassermenge	883,68
Zucker	43,64
Käsestoff	39,24
Butter	26,66
Salze	1,78

Es gibt einzelne Verhältnisse, welche auf die Zusammensetzung der physiologischen Milch von Einfluss sind, nämlich 1) die Innervation, 2) die Zeit, welche seit der Entbindung verlossen, 3) die Nahrungsweise der Stillenden und 4) ihre Geschlechtsfunctionen.

1) Die Innervation. Der schädliche Einfluss, den Zorn, Schrecken, Schmerz, Nervenanfälle etc. auf die Milch ausüben, ist längst bekannt. Weniger genau sind die wirklichen, hierdurch entstehenden chemischen Veränderungen untersucht. Die Milchdrüse hat in dieser Beziehung Ähnlichkeit mit der Thränendrüse, die sich ja bei fast allen grösseren Gemüthsbewegungen heftig regt. Factisch ist, dass die Kinder, welche an einer gemüthlich afficirten Amme getrunken haben, bald darauf heftig schreien, Coliken, Diarrhöen und zuweilen Convulsionen bekommen. Ob die Milch hierdurch so giftig werden kann, dass die Kinder sogleich nach dem Genuss sterben, muss bezweifelt werden. Bedenkt man, dass einerseits eine unverhältnissmässig grosse Zahl von kleinen Kindern überhaupt plötzlich stirbt und andererseits, dass es Ammen gibt, die sich fast täglich erzürnen, so möchte man eher an ein zufälliges Zusammentreffen als an eine wirklich giftige Milch glauben. Ich behandelte eine hysterische Frau, die ihr Kind selbst stillte, und war nicht wenig erstaunt, als ich einmal nach einem hysterischen Anfall ihr einige Kaffeelöffel Milch aus den Brüsten pumpete, diese Milch fast ganz durchsichtig wie Molke und ohne allen Zucker- geschmack zu finden. Sie liess darauf an diesem Tage das Kind nicht mehr trinken und nach 24 Stunden war wieder die frühere, sehr dicke gelbliche, fettreiche Milch vorhanden, womit das Kind vortreflich gedieh. Es ist auch bekannt, dass die Kühe weniger Milch geben als

gewöhnlich, wenn sie von einer fremden Person gemolken werden, so sollen sogar in einzelnen Fällen gar keine Milch geben, wenn sie gequält oder durch fremde Zuschauer während des Melkens beunruhigt werden. Es muss dies auf einer pöthlichen Verminderung der Secretion und theilweisen Resorption der secretirten Milch beruhen, denn die Milch kann nicht willkürlich zurückgehalten werden, da durchaus kein entsprechender Musculapparat existirt. Aus diesen Angaben geht jedenfalls zur Genüge hervor, dass der physischen Stimmung einer Stillenden grosse Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, und dass es vollkommen gesunde, gut entwickelte Frauen gibt, die nichtsdestoweniger zum Säugegeschäft durchaus unbrauchbar sind.

2) Die Zeit, welche seit der Entbindung verfloßen ist, hat einen grossen Einfluss auf die chemische Zusammensetzung der Milch. Das Colostrum, die erste Milch, enthält ausser den bisher angeführten chemischen Körpern noch Albumin, Schleim und die grossen granulirten Colostrumkörperchen. Die Grösse der Milchkügelchen ist noch viel ungleicher als dies später der Fall ist. Butter und Salz finden sich in grösserer Menge als in der späteren Zeit, und hiervon hängt die etwas abführende Wirkung des Colostrums ab. Die Quantität des Milchezuckers nimmt von Monat zu Monat ab und bleibt endlich auf 4% als Minimum stehen.

3) Die Nahrungsmittel der Stillenden vermindern, wenn sie unzureichend sind, die Milchquantität überhaupt, und die soliden Bestandtheile insbesondere, so dass eine hungernde Amme nur wenig und wässrige Milch von geringem specifischem Gewicht liefert. Am meisten nimmt die Butter und der Käsestoff ab.

Vernois und Boesjérol haben in dieser Richtung zahlreiche Versuche gemacht und folgende Zahlenunterschiede gefunden.

	Bei guter Nahrung.	Bei mangelhafter Nahrung.
Spec. Gewicht	1034,68	1031,91
Wasser	888,86	891,80
Feste Bestandtheile	111,14	108,20
Zucker	42,97	43,88
Butter	26,88	25,92
Casein	39,96	36,88
Salz	1,33	1,52

Ob einzelne Nahrungsmittel mehr Milch machen als andere, ist schwer zu entscheiden, und komestfalls lassen sich hierüber allgemeine Gesetze aufstellen, weil die Assimilation verschiedener Nahrungsmittel bei einzelnen Individuen eine sehr verschiedene ist. So viel aber ist gewiss, dass die Milchqualität und Quantität nicht im geraden Verhältnisse zum Stickstoffgehalt der Nahrungsmittel steht. Eine Amme vom Land z. B. gibt mit einfachen Mehl- und Milchspeisen viel mehr und bessere Milch, als wenn man ihr täglich die grössten Stücke gebratenen Fleisches aufröhrt. Genuss von Alkohol oder alkoholfreien Getränken verleiht der Milch eine besäuernde Eigenschaft. Die Säuglinge schlafen viel, bekommen aber bald eine Gehirnreizung, werden schläpft und mageren ab. In Ländern, wo Bier das Nationalgetränk ist, halten es die Frauen für unmöglich, ohne 2—4 Schell Bier für den Tag zu stillen. Diejenigen, die schon früher im nichtschwangeren

Zustande an grössere Mengen Bier gewöhnt waren, mögen den Genuss desselben nur fortsetzen, sie werden dadurch sich und dem Kinde keinen Schaden zufügen. Wenn aber Aennen erst während des Stillens Bier trinken lernen, und sich nun alle Mühe geben, auf einmal grosse Quantitäten hiervon in sich aufzunehmen, so treten hiedurch deutliche Congestionen nach dem Gehirn und Verdauungsstörungen auf, die jedenfalls nachtheilige Folgen für den Säugling haben. —

Von den Arzneimitteln hat man schon verschiedene in der Milch deutlich nachweisen können. Die meisten in Wasser löslichen Salze finden sich, wenn sie keine profuse Diarrhöe verursacht haben, in der Milch wieder, am leichtesten und schärfsten ist das Jodkalium nachzuweisen. Man schüttelt die Milch mit etwas Stärkemehl und gibt nun zu diesem Gemisch einige Tropfen Salpetersäure, worauf sogleich sich die ganze Stärke in den bekannten dunkelblauen Jodkleister verwandelt. Verschiedene Farbstoffe gehen in die Milch über, z. B. der Krapp. Bei Kühen, die mit Esparsette gefüttert werden, bildet sich in der Milch ein brauner Farbstoff, der dem Indigo analoge Eigenschaften haben soll.

Abscristium, Wermuth macht die Milch bitter, die ätherischen Oele des Knechtlauchs und des Thymians verleihen ihr den Geruch nach diesen Pflanzen. Gibt man einer Aenne ein Draclicum irgend welcher Art, so geht dessen purgirende Wirkung in den meisten Fällen auf die Milch und damit auf den Säugling über. Die Behandlung des Säuglings durch Medicamente, die man der Mutter eingibt, ist übrigens eine unnütze Quälerei der letzteren; wenn dergleichen Medicamente wirklich indocirt sein sollten, so verträgt sie der Säugling ebensogut, wenn man sie ihm in gehörig kleiner Quantität direct aus dem Medicin glas eingibt, als wenn sie erst in den Kreislauf der Mutter aufgenommen und dann in sehr kleinen und jedenfalls nicht genau bestimmbar Quantitäten aus der Brustdrüse secretirt werden.

4) Die Geschlechtsfunctionen haben einen unverkennbaren Einfluss auf die Milchsecretion. Menstruirt eine Aenne wieder, so wird ihre Milch im Allgemeinen sparsamer secretirt, aber die festen Bestandtheile derselben nehmen nicht ab, sondern vermehren sich im Gegentheil. Butter und Casein nehmen bedeutend, Milchsucker und Salze nachweisbar zu. Das Kind wird deshalb in der Regel etwas unruhig und lässt die Zeichen gestörter Verdauung erkennen. Nach beendeter Menstruation tritt aber häufig die frühere Beschaffenheit und Quantität der Milch wieder ein, weshalb es nicht geeignet erscheint, eine menstruirende Aenne sogleich zu entlassen, wie dies so häufig geschieht; es ist vielmehr rathlich, die Wiederkehr der Menstruation mehrmals abzuwarten, und die Aenne erst dann zu entlassen, wenn das Kind längere Zeit nach der Periode ruhig bleibt und nicht mehr in dem Maasse wie früher zunimmt.

Tritt neue Schwangerschaft ein, so verliert sich das Fortstillen in den meisten Fällen von selbst, weil die Milchsecretion sogleich bedeutend geringer wird und die Milch wieder die Eigenschaften des Colostrums annimmt. Tritt es Ausnahmefällen diese Veränderung nicht ein, so muss der Säugling abgenommen werden, weil sonst das Wachsthum des Fetus im hohen Grade beeinträchtigt wird. Ob ein Cairus, auf den keine Schwangerschaft eintritt, an und für sich schädlich ist, ist mir nicht bekannt, aber doch nicht wahrscheinlich.

Rasch sich wiederholende Schwangerschaften üben einen ungünstigen Einfluss auf die Milchsecretion aus. Bei der dadurch entstehenden Blutmuth und allgemeinen Hyperästhesie der Weiber wird nur sparsam und wenig nahrhafte Milch erzeugt.

Durch Krankheiten erleidet die Milch wesentliche Veränderungen. Gewöhnlich finden sich in der Milch febriler oder Anmen grössere Mengen von Colostrunkörperchen. Ihre Quantität nimmt hierbei sehr ab oder sie versiegt gänzlich. Die festen Bestandtheile schwinden aber nicht mit gleicher Schnelligkeit wie das Wasser, so dass im Anfange einer fieberhaften Erkrankung eine an allen festen Bestandtheilen sehr reiche Milch erzeugt wird, weshalb leicht Verdauungsstörungen des Säuglings entstehen. Im Allgemeinen ist als Regel aufzustellen, dass man den Säugling an der Brust der erkrankten Stillenden lässt, solange dieselbe Milch hat, und der Säugling sich wohl befindet, wobei natürlich vorausgesetzt wird, dass die Krankheit keine ansteckende, kein acutes Exanthem, kein Petechialtyphus, und keine syphilitische ist. —

Für den praktischen Arzt genügt es vollkommen, folgende Eigenschaften der Milch zu prüfen: 1) Er füllt seinen in 10⁶ Theile getheilten Galaktometer *vid. pag. 30* bis zum obersten Theilstrich und lässt ihn 24 Stunden wohl zugedeckt und ruhig stehen; nach dieser Zeit muss die Rahmschichte mindestens 3 Theilstriche einnehmen. 2) Er untersucht die frische Milch mit blassem Lakmus- und gelbem Curcumpapier. Das Lakmuspapier darf sich in keinem Falle röthen, das Curcumpapier muss sich schwach bräunen. 3) Er bringt einige Tropfen der frischen Milch auf die Zunge. Die Milch muss fade und schwach säuerlich schmecken. 4) Er bringt einen Tropfen Milch unter das Mikroskop. Wenn die Amme vor mehr als acht Tagen geboren hat, dürfen hier die Colostrunkörperchen und Epithelialzellen gar nicht oder nur sehr vereinzelt zum Vorschein kommen. Die Milchkügelchen sollen nicht gar zu ungleich von Grösse und in dichter Menge vorhanden sein.

Im Allgemeinen ist zu bemerken, dass der Gesundheitszustand der Amme, ihre Verdauung, ihr Schlaf, ihre Respiration, ihre Haut und ihre Genitalien eine viel grössere Aufmerksamkeit verdienen, als die chemische und morphologische Zusammensetzung ihrer Milch, und dass es viel wichtiger ist, sich von einer genügenden Quantität der Milch genau zu überzeugen, als ihre qualitativen Verhältnisse zu prüfen. Die Quantität einer Milchsecretion lässt sich dadurch bestimmen, dass man das Kind vor und nach dem Trinken wiegt, wobei es im Durchschnitt um 3—6 Unzen zugenommen haben muss. Da diese Wägungen aber umständlich und in der Privatpraxis nicht beliebt sind, so genügt es auch, den Säugling während des Trinkens zu beobachten. Strengt er sich dabei nicht bedeutend an, läuft ihm die Milch zu den Mundwinkeln heraus, und lässt er nach $\frac{1}{2}$ Stunde die Brust zufrieden und ruhig los, so darf man überzeugt sein, dass er eine hinreichende Quantität Milch zu sich genommen hat. —

Hat man nun das seltene Glück, eine in jeder Beziehung entsprechende Amme gefunden zu haben, so sind folgende Vorsichtsmaassregeln zur Wahrung ihrer ferneren Gesundheit zu beobachten. Warme Bäder sind für Personen aus den unteren Ständen etwas so seltenes und ungewohntes, dass es nicht rathsam erscheint, einer nicht sehr

reinlich ausschenden Amme ein ganzes Bad nehmen zu lassen. Man thut besser, ihr mehrmals die Woche eine kleine Waune mit warmem Wasser und ein Stück Seife zu verabreichen, wodurch bei gutem Willen eine genügende Reinlichkeit erzielt werden kann. Ist die Amme warme Bäder von früher gewohnt, so schaden sie ihr auch während des Stillens nicht. Das gleiche gilt auch von den kalten Fasse- und Seebädern. Als erste Regel muss immer aufgestellt werden: man ändere nichts an den Gewohnheiten und der früheren Lebensweise der Amme, wenn andere sie nur einigermaßen mit einem vernünftigen Regime sich vereinigen lassen. Die Ammen können mit Ausnahme sehr gewürzreicher, salz- oder alkoholhaltiger Speisen Alles essen, was ihnen schmeckt, und es ist immer am besten, wenn ihre Lebensweise, ein paar Zwischenmahlzeiten abgerechnet, von der Lebensordnung der Familie, in der sie aufgenommen, gar nicht abweicht. Alle Speisen, die sie bekommt, müssen gut gekocht und nach ihrem Geschmack sein, im übrigen ist es wirklich überflüssig, sich auf detaillierte Küchensettel einzulassen.

Ihr Schlafzimmer muss gut ventilirt werden, und sie selbst muss täglich ohne Rücksicht auf das Wetter sich Bewegung in frischer Luft machen, wobei nur zu bemerken ist, dass sie, wenn man sie nicht schon lange und ganz genau kennt, nie allein ausgehen darf.

Ein grosses Vorurtheil herrscht im Publikum gegen menstruirende Ammen, und einige Blutspuren in ihrem Hemde genügen gewöhnlich schon, die Eltern des Säuglings in die grösste Bestürzung zu versetzen. Die Gefahr ist aber bei weitem nicht so gross, als sie aussieht, da meisten Ammen menstruiren nur schwach und unregelmässig, haben während der Menstruation etwas weniger Milch, die Kinder bekommen wohl auch darauf Unbehagen, in 1—3 Tagen ist aber die ganze Veränderung vorüber, und Amme und Säugling befinden sich wieder im besten Wohlbefinden.

Zwei Grundsätze müssen fest gehalten und täglich eingeschärft werden:

1) Die Brust ist kein Beruhigungsmittel für das schreiende Kind, sondern muss regelmässig entweder alle zwei oder drei Stunden gereicht werden. Während dieser Intervalle eintretende Unruhe ist kein Zeichen von Hunger, sondern hat irgend einen andern Grund, der häufig in engen Kleidehen oder durchnässten Windeln zu suchen ist. Zur Nachtzeit genügt eine vierstündige Pause, z. B. von Abends 9 Uhr bis 1 Uhr der Amme zum ersten Schlaf vollständig. Den Rath einiger Pädiatriker, vom Abend bis zum andern Morgen den Säugling nicht anzulegen, lahe ich mich nie befolgen können.

2) Die Amme darf niemals das Kind bei sich im Bette haben. Ich bin überzeugt, dass viele von den räthselhaften, schnellen Todesfällen der Säuglinge durch Erstickung im Bette der Mutter oder Amme zu erklären sind. Die Ammen schlafen während des Stillens ein und ersticken dann durch ihren Körper oder durch das im Schlaf hinaufgezogene Federbett den Säugling. Eine aufmerksame Mutter darf sich deshalb die Mühe nicht reuen lassen, die Amme mehrmals in der Nacht zu controliren, und ihr die Uebertretung dieses Gebotes mit der grössten Strenge zu verweisen.

Viele Ammen leiden an hartnäckiger Obstipation und ziehen sich durch Verschweigung dieses Uebels endlich wirkliche Verdauungs-

strenge zu. Man hat sie deshalb zu belehren, dass sie dieselbe nicht verschweige, sondern gleich davon die Eltern in Kenntniss setze, man kann durch ein paar Löffelchen Latwerge oder gekochte Zwetschgen die ganze Krankheit beseitigen.

Man konnte eine Anne mit Theilnahme und freundlicher Ansprache entgegnen, trotz ihres hohen Lohnes sind die jungen Geschöpfe herzlich zu bedauern, die, theilich durch eigene Schuld, so weit gekommen sind, dass sie ihr eigenes Kind weggelien und ein fremdes dafür an die Brust nehmen; ein solcher Dienst ist, beim Lichte betrachtet, mit Geld überhaupt gar nicht zu bezahlen.

Es rückt nun schliesslich auch die Frage: Wann und wie soll man ein Kind entwöhnen?

Nur selten hängt die Beantwortung dieser Frage vom Gutachten des Arztes allein ab, geschichtlich influenziren eine Menge anderer oder nur der Gesundheitsverhältnisse der Anne und des Kindes auf die Bestimmung des Termins zum Abgewöhnen. Auch hier, wie höher in so vielen Dingen der ärztlichen Praxis, ist die Sache nicht mit ein paar Zahlen abgemessen, sondern es müssen viele Verhältnisse einander gegenüber gestellt und erwogen werden. Das natürlichste ist offenbar, das Kind so lange fort trinken zu lassen, als es die Brust gerne nimmt, dabei gedeiht, und die Stillende dadurch keinerlei Nachtheil an ihrer Gesundheit, Schwäche, Blässe, Abmagerung, allgemeine Hyperästhesie etc., verspürt. Dieses Verhältnis dauert bei einer gesunden Anne und einem kräftigen Kinde in unseren Climates durchschnittlich 4—8 Monate fort. Hierauf verspürt die Anne, dass ihre Milchsecretion dem steigenden Appetit des Kindes entsprechend nicht weiter zunimmt, und dass der Säugling also nicht mehr genug bekommt. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo man dem Kinde etwas der Brust noch andere Nahrungsmittel zukommen lassen muss. Auch hier kann man nicht sagen, diese oder jene Speise ist die zuträglichste, und die andere sind schädlich; denn die Kinder haben nicht alle denselben Magen und denselben Geschmack, die einen z. B. nehmen, so lange sie nur noch einmal im Tage die Brust bekommen, keine Kuhmilch und nichts damit bereitetes an, während sie verschiedenes eingekochte Fleischsuppen ohne Sträuben gemessen, die andern nehmen kein Mehlsau, sondern bloss Zwieback oder Semmelsau, andere wieder nehmen gar keine eingekochten Fleischsuppen, sondern bloss Milchsuppen an u. s. w. Ich lasse deshalb mit dünnem Semmelsau den Anfang machen, geht es in acht Tagen hinmit nicht, so versuche ich Mehlsau, und wird auch dieses nicht angenommen, so kommt dünne Fleischbrühe mit Semmel gekocht an die Reihe. Eines dieser drei Nahrungsmittel nimmt ein jedes Kind, wenn ihm die Brust der Anne nicht hinlänglich Sättigung bietet. Vier Wochen lang gibt man ein Mus, weitere vier Wochen zwei Mus und endlich drei Mus. Indessen lernt das Kind auch Weinstreubchen kauen und Wasser trinken, nimmt die Brust nur noch einmal in der Nacht und vermisst sie nicht sehr lebhaft, wenn es schliesslich in der Nacht lauwarme Kuhmilch statt der Brust bekommt.

Diese ist die sicherste Methode ein Kind ohne allen Schaden abzugewöhnen. Oft genug muss es auf einmal oder in sehr kurzer Zeit die Anne verlieren. Da ist es dann besonders wichtig, auf die Zahelperioden zu achten. Hat das Kind gerade eine Zahperioade glücklich

überstapeln, so dass sich mit Bestimmtheit voraussetzen lässt, dass es in den nächsten Wochen mit neuen Zahnbeschwerden nichts zu thun haben werde, so verträgt es in den meisten Fällen auch das plötzliche Abgewöhnen ohne Gefahr, im entgegengesetzten Falle aber tritt meistens eine sehr profuse Diarrhöe ein, die oft nicht sehr zu stillen ist oder zu deren Folgen wenigstens die Kinder Monate lang laboriren. Wenn einem Kinde die oberen und unteren Schneidezähne durchgebrochen sind, so ist ihm von der Natur gewiss schon andere compactere Nahrung als die blosser Muttermilch anzuweisen. Jedenfalls aber ist es unnütz und für die Mutter meistens schädlich, die Kinder bis über das erste Jahr hinaus zu stillen. Sie nehmen sich dazu meistens selbst ab, weil ihnen beim Saugen zu wenig auf einmal in den Mund kommt. Ich behandelte eine amerikanische Dame, die ihren zwei und ein halbes Jahr alten Sohn immer noch stillte, bis ihr eines Morgens das geistig sehr entwickelte Kind, als es zum Trinken kommen sollte, ganz freundlich sagte: Ich danke, liebe Mama, das Saugen ist mir zu langweilig. —

Kann die Mutter nicht selbst stillen und hat sie nicht die Mittel, sich eine Amme zu mieten, so bleibt nichts übrig, als die künstliche Ernährung zu versuchen.

Zur künstlichen Ernährung sind folgende Bedingungen erforderlich. Sorgsame Auswahl und Zubereitung der Nahrungsmittel, grosse Geduld und Ausdauer, strenge Genauigkeit, manuelle Fertigkeit und der höchste Grad von Reinlichkeit.

Der beste Ersatz für die Frauenmilch ist die Kuhmilch, nicht weil sie in der Zusammensetzung ihr am ähnlichsten, sondern weil sie zu billigen Preisen am leichtesten und regelmässigsten zu haben ist. Nur wer selbst längere Zeit sich mit quantitativen Milchuntersuchungen abgegeben hat, wird mir beistimmen können, dass die paar Procente mehr Casein und Butter, und die paar Procente weniger Milchzucker die grosse Differenz allein nicht veranlassen können, die zwischen der Ernährung mit Frauenmilch und Kuhmilch allerdings besteht. Das Secret der Milchdrüsen hat eben auch, ähnlich dem der Nieren, ziemlich weite physiologische Grenzen, aus denen man recht schöne Mittelzahlen construiren kann. Aus diesen Mittelzahlen aber geht noch lange nicht hervor, dass die Milch die beste ist, welche dem physiologischen Mittel am nächsten steht.

Der wesentlichste Unterschied zwischen Frauen- und Kuhmilch ist, wie schon oben bemerkt, darin zu suchen, dass das Casein der Frauenmilch im Magen zu kleinen leichten Flocken in einer ganz losen Gallerte, das der Kuhmilch aber zu grossen compacten Klumpen gerinnt, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man ein künstlich aufgezogenes und ein Brustkind $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{2}$ Stunde nach der Mahlzeit durch rasche Bewegungen, Reiben an der Magenenge etc. zum Brechen bringt. Die lockeren Flocken der Frauenmilch werden leicht verflüssigt und assimiliert, die festen Klumpen des Kuhmilccaseins vornag der jugendliche Magensaft aber nicht zu lösen, sie werden wieder zerbrochen oder wandern als grosse, saure, unvedante Massen durch den ganzen Darmkanal, der dadurch allenthalben gereizt wird. Es kommt also darauf an, dem Casein der Kuhmilch diese Eigenschaft zu benehmen, was einigermaßen erzielt werden kann, wenn man sie etwas stärker alkalisch macht. Ich bediene mich seit langer Zeit hierzu einer

Lösung von kohlensaurem Natron 4 Grm. auf 200 Grm. Wasser, von der zur Milch jeder Mahlzeit ein Kaffeelöffel voll zugeschnitten wird. Wird die Milch zu Mus verkocht, so lasse ich die Lösung neben zur kalten Milchzusetzen, und im Sommer wird gleich die ganze für 12 Stunden berechnete Milchmenge bei ihrer Ankunft im Hause in der Weise alkalisch gemacht, dass immer auf 5 Unzen Milch ein Esslöffel Natronlösung kommt. Bei kleinen Kindern lasse ich noch $\frac{1}{2}$ Wasser und auf jede Mahlzeit eine Messerspitze Milchzucker zusetzen, Kinder über drei Monate trinken die Kuhmilch, wie sie ist, aber immer mit dem Natronzusatz. Mit so präparierter Milch habe ich schon viele Dutzende von Kindern gross ziehen lassen, und bei der Mehrzahl durchaus keine Verdauungsstörungen bemerkt. Sind die Eltern vernünftig, so gibt man in den ersten drei Lebensmonaten nur diese Milch und keinerlei Mus und fängt zu Beginn des vierten Lebensmonates erst mit einem Mus an. Man kocht die Milch gewöhnlich gleich beim Empfange einmal aufkochen, weil dadurch auch die Gerinnung verzögert wird. Das beste Mus wird so bereitet, dass man $\frac{1}{4}$ altgebackenen Semmel $\frac{1}{2}$ Stunde lang in kaltem Wasser einweicht, darauf das Wasser gewöhnlich schwach sauer reagiert und dann die nicht weiter ausgepresste Semmel mit 200 C.C. alkalischer, nicht abgerahmter Milch und einer Messerspitze Milchzucker zu einem gleichmässigen Brei verkocht. Bei weitem beliebter als der Semmelmus ist, besonders in den unteren Volksklassen, der Mehlmus: auch bei diesem gedeihen unendlich viele Kinder vortreflich und es ist noch sehr die Frage, ob er nicht ebenso unschädlich ist, als der Semmelmus. Wenn $\frac{1}{2}$ der künstlich aufgezogenen Kinder Mehlmus bekommen und nur $\frac{1}{4}$ Semmelmus, so werden bei angenommener gleicher Verdaulichkeit beider Nahrungsmittel vier Mehlmus Kinder an Verdauungsstörungen leiden müssen, bis endlich einmal ein Semmelmuskind erkrankt.

Wer nun nicht weiss, dass wirklich 4 Mal mehr Kinder Mehlmus essen, der muss natürlich die Ansicht sich bilden, dass das Mehlmus bei weitem schlechter vertragen wird als das Semmelmus. Bevor aber nicht ausführliche, Jahre lang geführte statistische Zusammenstellungen diese Verhältnisse in klaren Zahlen darthun, kann Niemand behaupten, dass dünnes, noch tropfbares Mehlmus schädlicher sei als das Semmelmus. Statt des gewöhnlichen Weizenmehls nimmt man auch Reismehl oder das Mehl der Pfeilwurzel, Arrowroot, zwei sehr klebrarme Mehlsorten. Die Gebrauchsart für das Arrowroot ist folgende: Man schüttet einen Theelöffel voll in ein porcellanes Gefäss und setzt so viel kaltes Wasser hinzu, dass dasselbe einen feinen Teig gibt, hierauf giesst man eine Tasse kochender Milch (oder auch Wasser, Fleischbrühe) zu, rührt es gut um und lässt es am Feuer einige Minuten aufkochen, bis es die Consistenz einer leichten Gallerte bekommt. Weitmas das rationellste unter allen Surrogaten der Muttermilch ist jedenfalls die sogenannte Liebig'sche Suppe, durch welche sich der grosse Chemiker ein höchendes Verdienst um die Pädiatrik erworben hat. Bekannt sind enthalten:

	enthaltende Stoffe	nichtenthaltende Stoffe
in Frauenmilch	1	3,8
„ Kuhmilch, frisch	1	3,0
„ Kuhmilch, abgerahmt	1	2,6
„ Weizenmehl	1	5

Es ließe sich also leicht eine Mischung von Kuhmilch und Weizenmehl herstellen, die dasselbe Verhältnis des blut- und wärmelbildenden Bestandtheils habe wie die Frauenmilch; indess reagirt das Weizenmehl sauer und enthält viel weniger Alkali als die Frauenmilch, weniger als zur normalen Blutbildung erforderlich ist, und endlich wird dem kindlichen Organismus durch Ueberführung des Stärkemehls in Zucker eine ganz unnützlige Arbeit aufgebürdet. Es ist also wünschenswert, zuvor das Stärkemehl in die lösliche Form des Zuckers und des Dextrins überzuführen; dies geschieht leicht durch Zusatz von Malzmehl zu dem Weizenmehl. Wenn man Milch mit Weizenmehl zu einem dicken Brei kocht und diesem noch heißen Brei dann Malzmehl zusetzt, so wird die Mischung nach einigen Minuten flüssig und nimmt einen süßsen Geschmack an; darauf und auf einen Zusatz von Alkali, um die saure Reaction des Weizenmehls zu neutralisiren, beruht die Herstellung der Liebigschen Suppe.

Die Vorschrift, die Liebig selbst gegeben hat, ist folgende: Man wiegt 15,0 Weizenmehl, 15,0 Malzmehl und 0,45 doppeltkohlensaures Kali ab, mischt sie erst für sich, sodann unter Zusatz von 30,0 Wasser und zuletzt von 150 CC Milch, und erhitzt unter beständigem Umrühren bei sehr gelindem Feuer, bis die Mischung anfängt dicklich zu werden; bei diesem Zeitpunkte entfernt man das Kochgefäß vom Feuer und rührt 5 Minuten lang um, erhitzt auf's Neue und setzt wieder ab, wenn eine neue Verflüchtung eintritt, und bringt zuletzt das Ganze zum Kochen. Nach der Absonderung der Kleie von der Milch durch ein feines Sieb (feines Florzeug) ist die Suppe zum Genuße fertig. Zu beachten ist, daß man gewöhnliches, frisches Weizenmehl, nicht das feinste, weil reicher an Stärkemehl, nimmt. Gerstenmehl ist bei jedem Bierbrauer zu haben. Nachdem die Unkrautsaamen ausgelesen, wird es leicht auf einer gewöhnlichen Kaffeemühle zu einem groben Mehl zermahlen. Von dem Kali bicarbon. crystall. lost man zwei Theile in elf Theilen Wasser auf und erhält so eine vollkommen klare, klare Flüssigkeit. Das lästige Abwiegen der Stoffe kann man vermeiden, denn ein gehäufte Eßlöffel Weizenmehl wiegt ziemlich genau 15,0, ein eben solcher Eßlöffel Malzmehl zur Hälfte glatt abgestrichen wiegt ebenfalls 15,0 und ein gewöhnlicher Fingerhut, mit der Kalilösung gefüllt, fast nahe 0,45 des Salzes. Läßt man sich auch in einem Becherglase vom Apotheker 30 CC und 150 CC Wasser abwiegen und notirt die Höhe der Flüssigkeiten durch einen aufgeklebten Papierstreifen, so ist Alles für eine verständige Mutter hinlänglich bequem eingerichtet. Das doppeltkohlensaure Kali kann nicht durch das gleiche Natriumsalz ersetzt werden, da in allen unsere Speisen, in der Milch, der Fleischflüssigkeit und den Blutkörperchen wesentlich Kalisalz enthalten sind. Die so bereitete Suppe schmeckt ziemlich süß und wird bei gehöriger Verdünnung mit Wasser auch von Neugeborenen vertragen. Nach meinen eigenen Erfahrungen und denen vieler deutscher Aerzte ist diese Suppe das beste Surrogat für Muttermilch und hat schon manchen, ganz atrophischen Kindern schließlich das Leben gerettet.

Das schwierigste in großen Städten ist immer, sich frische, unverfälschte Milch zu verschaffen. Die Milch der öffentlichen Milchmischerlagen läßt immer viel zu wünschen übrig, und es ist unbedingt nöthwendig, wenigstens zu Anfang, bis man sich hinlänglich von dem

reellen Träumen des Milchlieferanten überzeugt hat, das Melken und Füttern im Kuhstalle selbst zu überwachen. Die Milch muss immer von einer Kuh gemolken werden, die täglich mehrere Stunden sich ausserhalb des Stalles im Freien befindet und fast ausschliesslich grünes Futter bekommt. Unsere weit verzweigten Eisenbahnverbindungen machen es übrigens jetzt fast jeder Familie möglich, sich von irgend einem bediensteten Gutsbesitzer oder Oekonomie, dessen Zuverlässigkeit man schon in andern Dingen mehrfach erprobt hat, den täglichen Milchbedarf kommen zu lassen. Wenn die Milch durch den Transport auch zwei- oder dreimal theurer als an Ort und Stelle wird, so ist diese Ernährung doch noch viel billiger als eine Amme. In neuester Zeit ist es endlich gelungen, Milch mit Zusatz von Rohrzucker im Vacuum bei so niedriger Temperatur einzudampfen, dass sich keine Haut bildet und ein dicker, weisser Syrup entsteht. Es ist diese condensirte Milch aus der Fabrik der Anglo-Swiss condensed Milk Co. in Cham, Ct. Zug, nach deren Muster sich auch schon in Deutschland mehrere Fabriken etablirt haben. Die condensirte Milch löst sich im Wasser leicht auf und stellt, in der zehnfachen Menge Wasser gelöst, eine sehr wohlschmeckende verästete Milch dar, an welcher sogar noch das Aroma der frischen Milch wahrgenommen wird. Löst man grössere Mengen auf einmal, so bleibt eine Spur von Bodensatz zurück, welcher aus Crystallkörnchen von milchsaurer Kalke besteht. Da der letztere sich im Magensaft jedenfalls wieder löst, so ist diese Erscheinung für den Ernährungswerth von keiner Bedeutung. Betrachtet man die condensirte Milch ohne Wasserzusatz unter dem Mikroskope, so findet man schon bei achtzigfacher Vergrösserung das ganze Sichtfeld mit schönen charakteristischen Crystallen von Milchrucker bedeckt und dazwischen einzelne Büschel von milchsaurer Kalk. Setzt man nun einen Tropfen Wasser zu, so entstehen wie mit einem Schlage unzählige Kugeln von verschiedener Grösse, die sich in keiner Weise von den frischen Milchkügelchen unterscheiden, während die Milchruckerkrystalle noch verschwinden. Dieses Wiedererscheinen der ursprünglichen Milchkügelchen auf Wasserzusatz unterscheidet die condensirte Milch von allen früheren Milchpulvern und Conserven, ja man kann aus diesem Präparate sogar noch frische Butter darstellen, wenn man es mit der siebenfachen Menge Wasser löst und bei 17° R. auf die gewöhnliche Art buttert.

Die condensirte Milch hat sich in der Kinderstube vollkommen bewährt. Ich verdünne bei Neugeborenen 1 Theil mit 12 Theilen Wasser und steige bis zum Schluss des ersten Lebensjahres bis auf 1:6 Theile. Mit diesem Präparate allein, ohne Zusatz von Anglicosen habe ich schon Kinder vortreflich gedeihen sehen. Für die Bewohner grosser Städte und namentlich auf Reisen ist die condensirte Milch von grösstem, unersetzlichem Werthe.

In neuester Zeit hat das Kindermehl des Chemikers Nestlé sich viele Freunde erworben. Dasselbe ist ein gepulvertes Backwerk, bestehend aus Weizenmehl, Eigelb und condensirter Milch, und enthält 40% Zucker und Milchrucker, 5% Fett, 15% Proteinstoffe und 30% Dextrin. Die Stärke wird hier, nicht wie bei der Liebig'schen Suppe durch Malt, sondern durch überhitzten Wasserdampf bei hohem Atmosphärendrucke in Dextrin eingewandelt. Es hat diese Präparat vor

der Liebig'schen Suppe den Vorzug grosser Bequemlichkeit, indem man ein Esslöffel Mehl mit sechs Esslöffel Wasser einfach aufgeköcht wird. Nimmt man mehr Wasser, so bekommt man eine angenehm schmeckende Flüssigkeit, die aus der Flasche gereicht wird. Kinder von zwei bis drei Monaten vertragen diese Nahrung ganz gut und gedeihen dabei, bei Neugeborenen ist dieses nicht immer der Fall. Vorzügliche Dienste leistet das Nestlé'sche Kindermehl bei stillenden Müttern, deren Muttermilch nicht vollständig zur Sättigung des Kindes genügt.

Ist man nun durch die Ungunst der Verhältnisse nicht im Stande, dem Kinde eine gute Kuhmilch zu verschaffen, so muss man zu Surrogaten greifen, deren Brauchbarkeit auf die Länge aber sehr problematisch ist. Hierher gehört Kalbsbrühe mit Eigelb, Schleimsuppen, Salepahnkochen, Carottenbrei. Der letztere machte vor einiger Zeit grosses Aufsehen und wird folgendermassen bereitet: 300 gereinigtes gelbe Rüben werden mit 200 OC Wasser gemischt und 12 Stunden stehen gelassen, worauf man diese Gemisch durch ein Tuch presst. Der so gewonnene Saft wird mit geriebenen Semmel (1 Theil Semmel auf 4 Theile Saft) an gelindem Feuer einige Male aufgeköcht und zuletzt mit etwas Zucker versüsst. — Es gibt Kinder, welche durchaus keine Kuhmilch vertragen. Diese können mit Carottenbrei oder Schleimsuppe oder Fleischbrühe mit Eigelb mehrere Monate lang bestehen, sie wachsen aber nur langsam und setzen bei dieser Kost nie gehörige Pottpolster an, von vier zu vier Wochen muss man deshalb immer wieder einen Versuch mit recht frischer, süsser Milch oder Liebig'scher Suppe machen, oft gelingt die Reception der Milch später, obwohl sie vorher durchaus nicht vertragen wurde.

Die Art, wie man kleinen Kindern die Nahrung beibringt, ist nicht gleichgültig. Man kann ihnen schon von den ersten Lebenstagen an dieselbe mit einem Löffelchen oder einer Schnabelschale reichen, worin sie sich bald gewöhnen, besser aber gibt man ihnen ein Saugglas, weil hierbei die Gesichtsmuskeln auf ähnliche Weise geübt werden wie bei Kindern an der Mutterbrust.

Die einfachste Art von Sauggläsern ist wohl ein gewöhnliches vier bis fünf Unzen haltendes Fläschchen mit ziemlich engem Halse, auf welchem man mehrere Stüpsel aus gereinigtem feinem Badeschwamm schneidet und den eingepassten Schwamm dann durch ein darüber gebundenes Stückchen Flor oder Battist am Flaschenhalse befestigt. Diese Schwämmchen müssen täglich mehrmals gewechselt werden und lassen sich am besten in frischem Wasser aufbewahren. Ueberragen sie den Hals des Fläschchens um $1\frac{1}{2}$ Cmt. und ist das Stückchen Battist gehörig gespannt, so imitiren sie täuschend die Form und Consistenz einer Brustwarze.

Wenn diese Schwämmchen nicht gut und elegant genug sind, der kann die Gläser mit goldenen, silbernen, zinnernen, beizernen oder calcinirten Mundstücken versehen lassen. Sehr gerne trinken die Kinder auch aus den in neuester Zeit Mode gewordenen durchlöchernten Gauschoukkäppchen, welche sich besonders durch Reinlichkeit empfehlen.

Eine grosse Verbreitung hat der sog. Schmelzer, Zulp oder Sauglappen. Derselbe wird bereitet, indem man stark gerückerten, gestoßenen Zwieback mit Milch oder Wasser zu einem dicken Teig formt,

in einen leinenen Lappen schlägt und dann anbindet, wodurch ein Knopf von der Größe eines kleinen Apfels entsteht. Dieser weiche, süssige Knopf wird den Kindern um, wenn sie nicht zu beruhigen sind, in den Mund gesteckt, sie fangen sogleich an zu saugen und halten sich Stunden lang hierbei ruhig. Im Allgemeinen lässt sich gegen reinliche, oft erneuerte Schnuller nichts sagen, als dass die Wangen der Kinder durch das tagelange Saugen übermässig ausgedehnt werden und hässliche Wülste bilden, wenn sie endlich einmal den Mund ohne Schnuller schliessen. Gewöhnlich aber fängt der Inhalt des Schnullers, in Berührung mit der warmen Mundhöhle, rasch an in saure Gährung überzugehen. Der Mundhöhlenschleim wird sauer, und es entsteht dann sogleich gestörte Verdauung und eine Pilzhefung auf der Schleimhaut, die nur zu oft ein trauriges Ende nimmt. Es ist deshalb Pflicht eines jeden Arztes, die Schnuller möglichst zu beseitigen, was allerdings leichter gesagt als gethan wird. Man denke sich nur in die Lage einer armen Frau, die sich den ganzen Tag mit ihren Kindern geplagt hat, und nun in der Nacht, wenn sie und ihre ganze Familie der Ruhe dringend bedürfen, das schreiende Kind nicht vom Anne bringt. Sie wird sagen, der Arzt hat gut rathen, keinen Schnuller zu geben, er trägt das schreiende Kind in der Nacht doch nicht herum, und wird ihn dem Kinde unter hundert Fällen nicht einmal vorzuenthalten. In den untern Volksklassen wird es kaum je gelingen, diesen gährenden Knopf zu beseitigen, und in den bessern Klassen haben die Kinder eine Amme oder wenigstens eine reichliche Belohnung, die ihn oft genug erneuert, wodurch er dann gewöhnlich auch unschädlich gemacht wird. — Social von der Ernährung im ersten Lebensjahre.

Im zweiten Lebensjahre kann man schon anfangen, den Kindern etwas weiches, feingehacktes Fleisch zu geben. Wenn sie nicht Diarrhöe haben, auch nicht dazu geneigt sind, vertragen sie reifes Obst schon vortreflich, hingegen machen ihnen gekochte grüne und Wurzelgewürse und Hülsenfrüchte sehr gewöhnlich Indigestion. Einem zweijährigen Kinde z. B. verordne ich folgende Lebensweise: Morgens, zwischen 6 und 7 Uhr im Sommer, zwischen 7 und 8 Uhr im Winter, Milchsuppe, zwischen 9 und 10 Uhr trockenes Weissbrod, höchstens etwas Butter darauf gestrichen, um 12 Uhr eingekochte Fleischsuppe, Fleisch mit etwas Sauce oder Kartoffelpüree, oder statt des Fleisches eine Mehlspeise wohl mit Eiern, aber nur mit wenig Fett bereitet, nur selten und wenig grünes oder anderes Wurzelgewürse. Nachmittags zwischen 3—4 Uhr Milch mit Weissbrod, im Sommer Obst mit Brod, Abends um 7 Uhr Fleischsuppe oder Milchsuppe. Zucker bekümmert den Kindern im Allgemeinen schlecht, und es ist für ihre ganze Verdauung höchst wichtig, sie so wenig wie möglich daran zu gewöhnen. Nach zurückgelegtem dritten Lebensjahre vertragen die Kinder auch alle Gemüse, und sie können, wenn sie ausserdem gut erzogen sind, recht wohl mit den Eltern am Tische essen; man hat ihnen blos noch die gegöhrten, stark gesalzenen, gewürzten und sehr sauren Nahrungsmittel zu versagen, alle anderes können sie mit Maass geniessen. Wein sollen die Kinder bis zum vierzehnten Jahre nicht zu kosten bekommen, auch Bier ist durchaus unnöthig. Ebenso Thee und Kaffee. Das Weissbrod wird vom dritten Jahre an sehr passend durch ausgebackenes, nicht zu frisches Roggenbrod, Haubrod, ersetzt. Man thut

gut, den Kindern die ganze Mittagskost von einem Teller essen zu lassen. Sie müssen zuerst die Suppe vollkommen anessen, bevor sie Fleisch und Gemüse auf dem leeren Suppenteller bekommen, und auch dieses muss erst vollständig verzehrt sein, bevor eine Mehlspeise oder Compot oder Braten etc. ihnen auf den wieder wieder abgelesenen Teller gegeben wird. Abgesehen davon, dass der kleinere Verlebensuch von Tellern eine Vereinfachung des Hauswesens bedingt, wird hiedurch noch die gute Eigenschaft erreicht, dass die Kinder alles essen lernen und nicht genäselig werden. —

Gehen wir nun von der Ernährung über zur Pflege der Kinder, so treffen wir zuerst auf die Cultur der Haut. Der Vernix caseosa, die Hautschnur des Fötus, kann nicht durch Wasser abgewaschen werden, sondern muss zuerst mit einem Fett, frischer Butter oder einem geruchlosen, fetten Öl vermischt werden, worauf er sich mit jedem Tuche leicht abputzen lässt. Kleine Kinder müssen täglich zehn Minuten lang in einem Wasser von 27° R. gebadet werden, örtliche Leiden genügen nicht, dass Gebot zu umgehen, wohl aber muss das Baden unterbleiben bei einer allgemeinen fieberhaften Erkrankung. Der Aufenthalt im Wasser und die Temperaturschwankungen, die beim Ausziehen und Abtrocknen der Kinder nicht umgangen werden können, vermehren in der Regel die Hitze der Haut und führen einen höheren Grad von Schwäche herbei.

Wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind, kann man gradatim bis auf eine Temperatur von 24° R. heruntersinken. Kühlere Bäder im ersten Lebensjahre zu geben ist nicht rathsam. Im zweiten Lebensjahre, wo die Anforderungen des Kindes steigen werden und sie schon anfangen, sich an Reinlichkeit zu gewöhnen, ist es nicht mehr notwendig, sie täglich zu baden, man gibt dann 3—4 Bäder die Woche von 23—24° R. Vom dritten Lebensjahre an genügen wöchentlich 2—3 Bäder, im Sommer täglich Fluss- oder Seebäder vollständig, die Haut gehörig offen zu erhalten.

Die Erlernung der Schwimmkunst ist für beide Geschlechter sehr nützlich und Gesundheit fördernd.

Zur Cultur der Haut gehört nicht nur deren Reinigung, sondern auch die Abhaltung zu grossen Temperaturschwankungen von derselben, was durch Kleidung und Heizung bewerkstelligt wird.

Bei der ersten Bekleidung der Neugeborenen ist darauf zu achten 1) dass die Nabelschnur in keiner Weise gereizt werde; 2) dass Brust und Bauch mit Kleidungsstücken umgeben sind, die in keiner Richtung die vor so kurzer Zeit erst eingeleiteten Respirationsbewegungen hemmen können und 3) dass den obern und untern Extremitäten ihre natürliche Stellung, die Beugung gestattet ist. Das Fatseln oder Wickeln der Kinder kann sehr schädlich werden, wenn, wie es gewöhnlich geschieht, die Wickerschnur zur bessern Befestigung fest angezogen wird. Der aufmerksame Arzt hat bei jedem Wickelkind, bevor er es sich aufwickeln lässt, die Anlage der Wickerschnur zu prüfen und das zu feste Anlegen strenge zu rügen. Die Hände sollen niemals mitgewickelt werden, sondern müssen, im Falle sie zum Kühlwerden gereizt sind, durch ein eigenes für sich bestehendes Tuch bedeckt werden. Aufrecht darf ein Kind erst getragen werden, wenn es den Kopf allein heben und in aufrechter Stellung wenigstens einiger-

manus dirigiren kann. Mit der frühzeitigen Abhärtung durch leichte kühle Kleidung muss der Arzt sehr vorsichtig sein. Es lässt sich allerdings nicht läugnen, dass in der ersten Jugend abgehärtete Kinder sich schneller und kräftiger entwickeln, seltener erkranken, und einmal acquirirte Krankheiten leichter überstehen, andererseits muss man aber auch zugestehen, dass viele Darm- und Lungenkrankungen der Kinder von einem raschen Temperaturwechsel, oder einer überhaupt zu geringen Wärme der Brust- oder Bauchhaut hergeleitet werden müssen. Hat man nun ängstliche Eltern endlich zur Abhärtungsmethode gebracht, und es erkrankt darauf das Kind, so werden dem Arzte die bötesten Vorwürfe, und nicht mit Unrecht gemacht. Ich gebrauchte deshalb immer den Ausweg, leichte Kleidung, wo ich sie vorfand, nie zu tadeln, allein auch nie bestimmt darauf zu dringen. Unvernünftige Excesse in zu kühler oder warmer Kleidung kommen aber natürlich nicht geduldet worden. Lernen die Kinder laufen, so müssen sie Schuhe bekommen, die aber eine gehörig breite Sohle haben und so lang sein sollen, dass von dem Nagel der grossen Zehe bis zur Spitze der Schuhe wenigstens noch ein Zwischenraum von $\frac{1}{2}$ Zoll besteht. Kühle Mütter fangen schon sehr frühzeitig an, auf die schlaffe Taille der kleinen Mädchen ihr Augenmerk zu richten, was man natürlich nicht leiden darf, in vielen Fällen aber nicht verliiten kann; denn die mütterliche Eitelkeit ist ein arger Feind des rationalen Arztes.

Was endlich die Kinderstube betrifft, so muss das Kind in den ersten acht Tagen seines Lebens in einem halb dunklen Zimmer gehalten werden, das man nach und nach heller werden lässt, bis die jungen Augen nach vierzehn Tagen endlich an das Licht vollkommen gewöhnt sind und ohne Schaden ihm ausgesetzt werden können. Von dieser Zeit an sei die Kinderstube freundlich, wenigstens von zwei Fenstern erhellt, der Boden sei mit Oelfarbe angestrichen oder mit Wachstuch bedeckt, das kein Wasser eindringen kann, und der Ofen werde von innen geheizt und nicht zum Kochen der Speisen benutzt. Zur gründlichen Ventilation müssen die Fenster täglich einmal $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde lang geöffnet sein, während welcher Zeit die Kinder sich natürlich in einem andern Zimmer aufhalten haben. Frische Luft ist unbedingt ein dringendes Bedürfniss einer kräftigen Entwicklung. Neugeborene, die im Sommer das Licht der Welt erblicken, sollen schon von der zweiten oder dritten Woche an täglich in's Freie getragen werden, im Winter aber muss man mindestens 8–10 Wochen warten, bis man es wagen darf, sie an einem sonnigen Mittag etwas an die Luft zu bringen. Grössere Kinder können gar nie genug im Freien sein, je früher man sie hinausleckt und je länger man bis vor Einbruch der Nacht sie ausser lässt, um so besser entwickeln sie sich. In den Städten hat deshalb der Arzt mit aller Energie darauf zu dringen, dass die Familien sich Gärten oder schattige Grasplätze mithen, wo die Kinder ungehört den ganzen Tag bleiben können. Die bei den Kindernägden so sehr beliebten Spaziergänge auf öffentlichen Promenaden können dem Kinde den ungehört Aufenthalt in einem Privatgarten keineswegs ersetzen.

II. Specieller Theil.

I. Capitel.

Krankheiten direkt in Folge der Geburt entstehend.

Wenn es allerdings zweckmässig erscheint, bei einer Besprechung der Kinderkrankheiten, ebenso wie in den neueren speciellen Pathologien, die Krankheiten eines Körpertheils nach dem andern einfach aufzuzählen und die Einteilung nicht auf das Wesen der pathologischen Veränderungen zu gründen, so treffen wir doch in der Pädiatrik eine Klasse von Krankheiten, welche einen bestimmten, physiologischen Zusammenhang haben und deshalb auch gemeinsam vor allen andern abgehandelt werden müssen. Es sind das die Krankheiten, die dem Geburtsakt und dem Ortwechsel des Kindes aus dem Uterus in die atmosphärische Luft allein ihren Ursprung verdanken. Hierher gehören: A) der Scheintod der Neugeborenen, B) die Atelctase der Lungen, C) die Kopfb Blutgeschwulst der Neugeborenen, D) die pathologischen Zustände des Nabels, E) der Trismus neonatorum, F) die Zellgewebeverhärtung, G) die Mastitis neonatorum, H) die Melæcia, I) der Icterus der Neugeborenen und K) die Ophthalmidenzoorrhöe der Neugeborenen.

A. Asphyxia neonatorum.

Der Scheintod der Neugeborenen oder die Asphyxia (a privativum und δ apnoë der Puls) ist ein Zustand, bei welchem nach der Geburt die Inspirationsmuskeln sich nicht oder nur ungenügend contrahiren, und das Athmen also nicht beginnt. Die Herzbewegungen gehen hierbei ziemlich rhythmisch, wenn auch schwach und nicht immer fühlbar, sondern bloss auscultirbar fort, weshalb der Name Asphyxie gerade nicht sehr glücklich gewählt erscheint. Man unterscheidet zwei verschiedene Formen von scheinodten Neugeborenen: bei der einen Form sind die Kinder cyanotisch, gewöhnlich sehr gross und entwickelt, die Haut ist infiltrirt, die Zunge dick und blau, aus der Mundhöhle ragend,

die Bulbi hervorgetrieben, der Herzschlag schwach und unrythmisch. Man nennt diese Form auch *Asphyxia apoplectica*, weil sie wahrscheinlich auf einer Congestion des Gehirnes in Folge mangelhafter Herzaction beruht. Bei der andern Form sind die Kinder todtensblass, die Gliedmassen hängen schlaff herunter, der Unterkiefer nähert sich dem Sternum, der Herzschlag und die Pulsation der Nabelschnur sind unregelmässig und schwach zu fühlen, die Respiration fehlt entweder ganz, oder es erhebt sich der Thorax in grossen Intervallen kurz und krampfhaft, das Meconium fliesset unwillkürlich ab. Die Respirationen werden immer seltener, der Herzschlag immer schwächer, und gewöhnlich tritt nach einigen Stunden der Tod ein. Zwischen diesen beiden Hauptformen giebt es einzelne Uebergänge, die keines der oben geschilderten Bilder vollständig wiedergeben, im Allgemeinen aber sind diese Uebergänge selten.

Ätiologie.

Die Asphyxie hat verschiedene Ursachen. Sie kann durch Compression der Nabelschnur gegen die Beckenwände entstehen, oder die Nabelschnur kann um den Hals geschlungen sein, oder die Placenta kann sich vorzeitig gelöst haben. Es kann der Schädel durch ein zu enges Becken oder die geburtshilfliche Zange gelitten haben, oder es sind die Luftwege mechanisch durch Schleim und Blut verstopft. Endlich sind Frühgeburten, schwächliche Eltern, besonders schwächende Krankheiten der schwangeren Mutter als Ursache der Asphyxie bekannt. Eine Compression der grösseren Blutgefässe des Halses kann nur die apoplectische Form bedingen, weil kaum ein Druck entstehen dürfte, der die Halarterien unempfindlich machte, während die oberflächlicheren und dünnwandigen Halsvenen bald darunter leiden werden. Die Zufuhr des Blutes zum Kopfe wird somit nicht beeinträchtigt, sondern nur dessen Abfluss.

Eine Compression des Nabels hingegen übte früher einen Einfluss aus auf die Nabelvene als auf die Nabelarterien, es floss deshalb vom Fötus mehr Blut ab als zu, und es kam hierbei nur Anämie und Blässe und endlich die sogenannte *Asphyxia nervosa* sich anbahnen.

Die pathologische Anatomie liefert hierbei keine constanten Resultate. Man findet in der Leiche nichts als einen noch ziemlich vollständigen fotalen Kreislauf und bei besonders heftigen geburtshilflichen Eingriffen oder sehr ungünstigen Beckenräumlichkeiten Blutextravasate zwischen den Meningen oder im Gehirn selbst.

Der Verlauf dieses Zustandes muss selbstverständlich ein sehr rascher sein; wenn sich nach einigen Stunden keine regelmässigen Respirationsbewegungen und deutlichere Herzschläge einstellen, so hört das Leben auf, welcher Ausgang sich häufiger bei der sogenannten nervösen als bei der apoplectischen Form ereignet. Sehr häufig stellen sich nach einiger Zeit bei gehöriger Hülfeleistung die Athembewegungen ein, der Herzschlag wird kräftiger und rhythmisch, und es verliert sich sowohl die Cyanose bei der einen als die anämische Blässe der andern Form.

Therapie.

Die Behandlung richtet sich hauptsächlich nach den Ursachen. Vor allem ist die Mundhöhle gründlich zu reinigen, was am besten

mit dem Finger geschickt. Es entsteht durch Berührung des Gaumensegels und der Epiglottis heftige Würg- und Hustenbewegungen, wodurch allein schon die Respiration eingeleitet werden kann. Hat man durch Reinigung der Mundhöhle nichts effektuirt, so läßt man bei den cranzischen Kindern sogleich aus der durchgeschnittenen Nabelschnur zwei Esslöfel Blut heraus. Blutet die Nabelschnur nicht mehr, so verzichte man auf fernere Blutentziehung. Blasse Kinder vortragen natürlich keines Blutverlusts, sind vielmehr durch genaue Unterbindung der Nabelschnur davor zu schützen. Ein sehr einfaches und immer bereites Mittel sind einige Schläge mit der flachen Hand auf den Steiß, Theils durch die Erschütterung, theils durch den Schmerz entstehen sehr nützliche Reflexbewegungen der Inspirationsmuskeln. Nutzt auch dieses Verfahren nicht, so bringe man das Kind in ein warmes Bad, nehme es aus diesem nach einer Minute wieder heraus, schwenke es einige Male auf und nieder und setze es hierauf gleich wieder in das Bad. Durch diese abwechselnde Erwärmung und Abkühlung entsteht ein wohlthätiges Hästresis. Man kann auch reizende Flüssigkeiten auf die Brust träufeln, wozunter Weinessig, Branntwein, Aether, kölnisches Wasser die gefährlichsten Mittel sind. Ein sehr beliebtes, oft gepriesenes, dann wieder verurtheiltes Verfahren ist das direkte Luftblasen. Man reinigt hierbei zuerst Mund und Nase, setzt dann die eigenen Lippen an den geöffneten Mund des Kindes und bläst hinein, worauf natürlich die Luft zu den Nasenlöchern des Kindes wieder herauskommt. Nachdem man sich so von der Durchgängigkeit derselben überzeugt hat, hält man auch diese mit zwei Fingern an, und bläst nun von Neuem Luft in den Mund. Man irrt sehr, wenn man glaubt, es komme auf diese Weise Luft in die Lungen, in den meisten Fällen wird durch das Aufblasen der Mundhöhle die Epiglottis nur noch fester auf den Kehlkopf aufgedrückt, so dass gar keine Communication der Mundhöhle mit den Lungen mehr stattfindet. Der durch die Spannung der Mundhöhle entstehende Reiz aber kann möglicher Weise günstig auf die Inspirationsbewegung wirken, und mag einen ähnlichen Effekt wie der die Epiglottis berührende, kitzelnde Finger hervorruft.

Soll wirklich die Luft in die Bronchien geblasen werden, so muss man das von Chaussier hiezu eigens angegebene Instrument oder einen dünnen nadelförmigen Catheter in die Trachea bringen, nachdem man mit der Spitze des Zeigefingers die Epiglottis in die Höhe gehoben hat. Viele und bewährte Geburtshelfer verworfen aber das Luftblasen gänzlich, auch sprechen Versuche an neugeborenen Thieren, die man durch Untertauchen in warmes Wasser künstlich scheinbar gerettet hat, gegen dasselbe. Rationell ist es, die Kinder auf die rechte Seite und etwas hoch zu legen, weil hierdurch der rechte Vorhof nach unten, der linke nach oben zu liegen kommt und hiermit das in den rechten Vorhof eingetretene Blut gerade nach aufwärts steigen muss, wenn es durch das noch offene Foramen ovale gleich in den linken Vorhof statt in den rechten Ventrikel gelangen will. Es mag durch diese Lagerung der Schläse der Klappe dieses fötalen Weges erleichtert werden. Das sicherste Mittel, die Inspirationsmuskeln zur Contraction zu bringen, wird immer die Electricität sein. Die Inspirationsmuskeln können den Thorax nur auf Kosten des Lungen erweitern, und es

weisen also die Alveolen Luft aufzunehmen; sind sie einmal ordentlich mit Luft gefüllt, so kann dieselbe so rasch nicht mehr ganz austreten und wird fort und fort als Reiz für fernere Inspirationsbewegungen dienen; das schlimmste hierbei bleibt, dass hier *Periculum in mora* ist, und dass die Herstellung eines elektrischen Stromes immer eine gewisse Zeit und Sachkenntniss erfordert, die man von einer Hebamme kaum erwarten darf.

Alle diese Belebnungsversuche sind so lange fortzusetzen, als man noch durch Auscultation den Herzschlag ermitteln kann. Erst wenn dieser mehrere Minuten lang gar nicht mehr zu hören, kann man von weiteren Bestrebungen ablassen und das Kind für todt erklären. Wenn es überhaupt gelingt, Asphyxie zu heben, so geschieht dies gewöhnlich in einer oder höchstens 2–3 Stunden.

B. Atelectasis pulmonum.

Wenn nach der Geburt die Inspirationsmuskeln sich nicht hinreichend und gleichmässig contrahiren, so dehnen sich auch nicht alle Partitheen der Lungen gleichmässig aus, an einzelnen Stellen verharrten die Alveolen in ihrem fötalen Zustande, sind luftleer und bleiben collapsirt. Dieser pathologisch anatomische Befund heisst Atelectasie (*α priv.*, *τέλος*, das Ende. *έκτενσις*, die Ausdehnung).

Selten ist eine ganze Lunge oder ein ganzer Lappen, meist sind nur einzelne zerstreute Lappchen, besonders nach hinten und unten atelectatisch, dieselben sind in den beiden Lungen scharf abgegrenzt, vertieft neben den lufthaltigen Theilen, sie sind blauroth und derb, crispiren nicht auf Druck und sinken im Wasser unter, die Schnittfläche ist gleichmässig, nicht körnig. Mit einem Tubulus lassen sich die atelectatischen Lungentheile vollkommen aufblasen, die aufgeblasenen Stellen bleiben aber immer noch etwas dunkler rosa als ihre Umgebung. Durch diese Möglichkeit sich aufblasen zu lassen, unterscheidet sich die Atelectase hinlänglich von der crispösen Pneumonie. Ausserdem findet man bei diesen Kindern meist noch die fötalen Circulationswege offen, in den Lungen aber nirgends Spuren eines eitrigen oder exsudativen Processes.

Symptome.

Die Kinder kommen sehr gewöhnlich asphyctisch zur Welt oder athmen wenigstens von Geburt an oberflächlich und heben den Thorax nur unmerklich. Charakteristisch ist die Stille der Kinder. Sie können nicht zusammenhängend und laut schreien, sondern geben nur einzelne schwache, wimmernde Töne von sich, auch können sie nicht anhaltend und kräftig saugen und lassen die Brust bald wieder los, wodurch den Stillenden bedeutende Beschwerden bereitet werden. Zuweilen sind sie vorübergehend cyanotisch, sie schlafen viel und haben eine blass, kühle Haut. Die Pupillen reagiren träge, sind etwas erweitert, der Puls ist schwach und verlangsamt. Die Percussion des Thorax ist, wenn die Atelectase nicht sehr ausgedehnt ist, kaum verändert, im Allgemeinen etwas weniger sonor als bei gesunden Neugeborenen. Das Athmungsgeräusch ist bei der geringen Thoraxbewegung natürlich nur sehr schwach, Bronchialathmen bekommt man

auch über den atelectatischen Stellen fast nie zu hören, zweifeln aber knisternde Rhonchi. Hat dieser Zustand einige Tage bestanden, so stellen sich Krämpfe im Gesicht und am ganzen Körper ein, die Respirations- und Circulationsbewegungen werden immer schwächer und langsamer, die Haut immer kühler, und die Kinder verbleichen entweder nach und nach, oder der Tod tritt unter heftigen tonischen oder clonischen Convulsionen plötzlich ein.

Ursachen.

1) Asphyxie und alle dort angeführten Bedingungen. Die ganze Atelectase lässt sich auch als ein leichter und länger fortgesetzter Grad der Asphyxie betrachten. 2) Unreife und schwächliche Kinder. 3) Die Autoren geben auch das Einathmen einer zu kalten Luft als Ursache an, viel wahrscheinlicher stellt sich aber auf kalte Luft lobuläre Pneumonie ein und 4) sollen zu schnelle und leichte Geburten Atelectase bedingen. Von der später erscheinenden Atelectase soll weiter unten bei den Lungenkrankheiten gesprochen werden.

Behandlung.

Sie fällt ganz mit der des Scheintodes zusammen. Prophylaktisch ist es wichtig, jedes Kind in den ersten Minuten seines Lebens zu lüften, lautes Schreien zu bringen, wozu die beim Scheintod angegebenen Mittel die geeignetsten sind: Lufteinblasen hat bei Atelectase keinen Erfolg, hingegen ist die Galvanisirung der Brustmuskeln mit Vorsicht angewandt hier vollständig an ihrem Platze. Was die allgemeinen Regeln betrifft, so müssen diese Kinder in einer gleichmäßigen Zimmertemperatur von mindestens 15° R. und durch Wärflaschen und warme Tücher möglichst warm gehalten werden; man wechselt häufig ihre Lage und trage sie umher. Man lässt den Kindern Nichts mit dem Löffel ein, sondern lässt sie mit einiger Anstrengung saugen, weil auch dadurch tiefe Inspirationen entstehen. Das von Jörg empfohlene Emetikum aus Pulv. r. Ipecac. 0,120 habe ich einmal, aber mit unglücklichem Erfolge angewandt, und beschränke mich seitdem darauf, die Kinder täglich 2–3 Mal mit dem Finger am weichen Gaumen und der Epiglottis zu kitzeln, wodurch heftige Würgebewegungen und diesen entsprechende tiefe Inspirationen hervorgerufen werden.

Man hat auch versucht, durch Druck von aussen die Respirationsbewegungen nachzuahmen, indem man den sehr beweglichen Thorax der Neugeborenen kräftig und im langsamsten Tempo mit den Fingern comprimirt, wobei der Rücken auf einer festen Unterlage sich befinden muss. Auch von diesem Verfahren habe ich noch keine günstigen Resultate gesehen, was sich übrigens leicht voraussehen liess; denn dieses rückwärts Comprimiren des Thorax ist wirklich nicht mehr Ähnlichkeit mit den Inspirationsbewegungen, als das Zuspätschieben einer Flasche mit deren Oeffnen.

C. Cephaloemato. Die Kopfblutgeschwulst.

Symptome.

Die Kopfblutgeschwulst, Cephaloemato (ἡ κεφαλή κεφαλ. τὸ οἷον Bätt), auch Thrombus venosorum genannt, ist eine tumoröse, nicht

weiche, elastische, deutlich flutuierende Geschwulst am behaarten Theile des Kopfes und rührt von einem Bluterguss zwischen Pericranium und Knochen her, weshalb man es auch zur genaueren Bezeichnung Cephalematoma sub pericranium genannt hat. Die Blutung ereignet sich höchst wahrscheinlich während der Geburt; denn man bemerkt schon am ersten Lebenstage, wenn die gewöhnliche Kopfgeschwulst sich zu senken anfängt, eine ziemlich bedeutende Erhabenheit, dieselbe dauert bis zum vierten, längstens sechsten Tage fort, wo dann ein reichlich apfelformiger Tumor auf einem Parietalknochen sich findet. Gewöhnlich wird sie auf der rechten Seite beobachtet, ausnahmsweise kommt auf beiden Scheitelbeinen solche Geschwülste vor. Sie überschreiten niemals eine Naht.

Nachdem diese Geschwulst einige Tage bestanden hat, bemerkt man, wenn man mit dem Finger von der normalen Kopfhaut aus fest gegen die Geschwulst drückt, einen festen knöchernen Ring, der die ganze Basis der Geschwulst umgibt. Es ist dies eine Knochenwucherung, die sich zwischen Knochen und dem vom Blute abgehobenen Periost entwickelt, Taf. II, Fig. 5, Nr. 6, und den Anfang der Resorption bezeichnet. Nach und nach verliert die Geschwulst ihre Weichheit und theilt dem anstreichenden Finger ein eigenthümliches Gefühl oder Geräusch mit, das davon herrührt, dass nun auch auf der der Blutung zugekehrten Fläche des Pericraniums Knochenbildung begonnen hat. Allmählig verliert die Geschwulst an Höhe, wird immer härter und flacher, und nach $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{2}$ Jahre bemerkt man nur mehr bei genauem Zufühlen eine Unebenheit und ungleiche Erhabenheit des Knochens, über der die behaarte Kopfhaut sich aber gut verschieben lässt. Das Cephalematoma ist eine ziemlich seltene Krankheit und kommt unter 1000 Neugeborenen höchstens 1—2 Mal vor.

Aetiologie.

Die Ursache derselben scheint nach Valleix folgende zu sein: Man findet bei den meisten Leichen Neugeborener eine Ecchymose des Pericraniums von 3 Zoll Länge und 2 Zoll Breite, die sich zu beiden Seiten der Pfeilnaht erstreckt, auf dem rechten Scheitelbeine aber ausgeholter vorkommt als auf dem linken. Sie rührt höchst wahrscheinlich von dem zirkelförmigen Druck des geöffneten Muttermundes her. Die Stellen, an denen man diese Ecchymose am häufigsten findet, sind nun gerade die, wo auch das Cephalematoma am häufigsten vorkommt, so dass letzteres nur als der höchste Grad jener gewöhnlich auftretenden kleinen Blutung erscheint.

Bei der Häufigkeit schwerer Geburten und der Schärfe der Cephalematome wird es jedenfalls notwendig sein, ausser diesen mechanischen Verhältnissen eine besondere Dünne oder Bruchigkeit der Knochengefässe anzunehmen, und die von Nägels, Hunter und Meisner beobachteten Cephalematome nach Stoisgeburten beweisen zur Genüge, dass die Sache nicht so einfach ist, wie Valleix sie sich gedacht hat, sondern dass noch andere Factoren hier im Spiele sein müssen.

Ausser dieser eigenthümlichen Kopfknochenblutung kommen ebenfalls sehr selten nach schweren Geburten besonders in Folge der Zange noch Blutungen über und unter der Galea aponeurotica vor, sie sind

nach diffus, bekommen sie einen Knochenring und resorbiren sich viel schneller als die seltenen Cephaloematomen, mit grüner und brauner Färbung der lebhafte Kopfhaut. Tafel II, Fig. 6 ein schematischer Durchschnitt eines solchen Cephaloematomas subaponeuroticum sive spurium. —

Erfolich findet man auch neben dem wahren Cephaloematom, aber auch ohne dasselbe, eine Blutung an der Innenfläche des Schädelknochens zwischen Knochen und Dura mater. Taf. II, Fig. 7. In Folge des Gegendruckes treten Convulsionen oder Lähmungen ein. Es läßt sich diese Meningealapoplexie nicht sicher diagnostizieren, wenn aber bei Cephaloematomas sich pericranium dergleichen Symptome vorkommen, so kann man mit ziemlicher Bestimmtheit die Complication eines Cephaloematomas meningium annehmen. Der Tod ist der gewöhnliche Ausgang dieses Processes.

Das wahre Cephaloematom kann außer mit dem C. subaponeuroticum noch verwechselt werden:

1) mit dem Caput succedaneum, der gewöhnlichen Kopfgeschwulst, dem sogenannten Vorkopfe. Derselbe ist ein Oedem der Kopfschwarte, fluctuirt nicht und hinterläßt auf Fingerdruck eine Grube. Er verschwindet schon in den ersten 12—24 Stunden, während das Cephaloematom, bei der Geburt kaum bemerkbar, von Tag zu Tag wächst, bis es nach acht Tagen seine grösste Ausdehnung erreicht hat und sich mit einem Knochenringe umgibt. Häufig wird in den ersten 24 Stunden des Cephaloematom vom Vorkopfe maskirt.

2) mit dem angeborenen Hirnbruche. Hernia cerebri congenita. Der Hirnbruch findet sich nie auf dem Scheitelbeine, sondern immer nur zwischen zwei Kopfknochen, also in den Nähten und Fontanelle. Er tritt beim Schreien und Husten der Kinder mehr hervor, löst sich zum Theil reponiren, und verursacht hierbei leicht Convulsionen. Die ihn bedeckende Haut ist meistens verdünnt und lankig.

3) mit vasculösen Geschwulsten. Dieselben sind bei Neugeborenen ziemlich selten, und wenn sie vorkommen, sehr selten an lebhafte Theile des Kopfes: sie fluctuiren nicht, fühlen sich teigig an, haben keinen Knochenring, und die sie bedeckende Haut ist durch stark entwickelte Venengeflechte bläulich gefärbt.

Behandlung.

Aus unserer Schilderung des Verlaufes läßt sich die Behandlung leicht ableiten. Wenn man das Cephaloematom ruhig sich selbst überläßt, nicht quetscht, die deckende Haut nicht reizt und keine chirurgischen Eingriffe unternimmt, so resorbirt es sich, wie oben erwähnt, im Laufe von 3—6 Monaten vollständig, die Kinder entwickeln sich dabei ungehindert fort, haben keinen Schmerz, wenn man auf den umhüllenden Knochen drückt, und überhaupt gar keinen Nachtheil von dem ganzen Process und seinen Folgen.

Trotz dieser unumstößlichen Thatsache gibt es eine Menge von Behandlungsmethoden, die theils von operationsgeringen Chirurgen, theils von alltageschäftigen Aerzten erfunden worden sind. Man hat die Geschwulst mit allen möglichen aromatischen Wässern, mit Salniak, grauer Salbe, Joëhrstark, Beamtwein und Salz etc. etc. gewaschen und

gesalbt. Man hat durch Bestreichung mit Collodium oder durch Stanniolplatten, mit denen die Kinderhüftchen gefüttert wurden, einen gelinden Druck ausgeübt, man hat Aetzmittel aufgelegt, Setaceen durchgezogen, und man hat endlich die Geschwulst angestochen, aufgeschlitzt, oder gar durch einen Kreuzechnitt das Blut entleert.

Das Comprimiren, Aetzen, Stechen und Schneiden bringt nur Nachtheil und Gefahr durch Reizung der Kopfschwarte und durch die Berührung des vom Periost entblößten Knochens mit der atmosphärischen Luft. Bei der sogenannten zertheilenden Behandlung sind die unschädlichsten Mittel die besten; ich bediene mich lediglich eines indifferenten Fettes, das *Salamina causa* täglich einmal auf die Geschwulst geschmiert wird. Zu meiner Genugthuung ersehe ich, dass nach einem Bericht Fürths im Wiener Findelhaus seit mehreren Jahren 69 Fälle rein expectativ und zwar mit dem besten Erfolge behandelt wurden.

D. Die Krankheiten des Nabels.

Nach Durchschneidung der Nabelschnur beginnt das am Unterleibe des Kindes adhärerende Stück einzutrocknen und fällt zwischen dem dritten und zehnten Tage ab. Die Zeit des Abfalls richtet sich nach der Beschaffenheit der Nabelschnur; ist diese dünn und schlank, so fällt sie schnell ab, ist sie dick oder, wie die Hebammen sagen, fett, so dauert es natürlich länger, bis alles Wasser der Wharton'schen Substanz verdunstet ist. In Folge des üblichen Einschlagens in einen Leinwandlappen und des Einbindens in die Nabelbinde nimmt die zu Horn vertrocknete Nabelschnur die Gestalt eines fachen Bandes an, auf dem die Nabelarterien und die Vene sich als drei dunklere Streifen markiren. An der Stelle, wo die Wharton'sche Substanz mit der Bauchwand sich vereinigt, faltet sich bei Schrumpfung der Nabelschnur die Cutis sterntförmig, und bei endlichem Abfall der Schnur findet man eine ziemlich feste trockene Narbe. In einzelnen Fällen wächst im Fötus die Cutis eine kleine Strecke an dem Nabelstrang hinauf, wodurch nach Abfall desselben unverhältnissmässig grosse Wulste und ein tiefer Trichter entstehen, was man mit dem Namen „Fleischnabel“ bezeichnet, wie Tafel II, Fig. 9 a u. b schematisch darthun.

Bei fetten Nabelsträngen ist jener Vernarbungsprocess weniger vorgeschritten, statt der Narbe erscheint eine geröthete, entzündete, missende oder wirklich eiternde Fläche, die zu verschiedenen pathologischen Processen Veranlassung gibt. Nur im Zusammenhang mit einem lebenden Kinde geht der Nabelstrang diese Vertrocknung ein, stirbt das neugeborene Kind bald nach der Geburt, so vertrocknet er nicht an der Leiche, sondern beginnt zu faulen, was bei gerichtlichen Sectionen einen Anhaltspunkt für den Eintritt des Todes abgeben kann.

Behandlung des normalen Nabels.

Um ein regelmässiges Eintrocknen und Abfallen des Nabelstranges zu erzielen, ist es nöthwendig, ihn vor jeder Zerrung und Misshandlung zu schützen. Er werde etwas zusammengerollt oder gebogen, in ein feines Leinwandlappen geschlagen und seitlich, ohne Zerrung, mit

der Nabelbinde befestigt. Beim An- und Ankleiden der Kinder sowie im Bade muss jede Berührung des immer steifer werdenden Nabelschmurses vermieden werden, und niemals darf man versuchen, durch Anziehen oder rüttelnde, zupfende Bewegungen ein vorzeitiges Abfallen zu bewerkstelligen.

Folgende pathologische Prozesse kommen während oder nach dem Abfall vor.

1) Die Entzündung der Nabelgefäße. Phlebitis und Arteriitis umbilicalis.

Es kommt zuweilen, zum Glück jedoch selten vor, dass die Geleisen, welche unter den Bauchmuskeln die Nabelgefäße ausfüllen, eiterig zerfallen und eine eiterig jauchige Sekretion des Nabels verursachen. Durch Druck auf die Umgebung desselben kann man einzelne Tropfen Jauche auf einmal entleeren. In Folge der Rötung und des Schmerzes sind die Kinder sehr unruhig, bewegen die Bauchmuskeln so wenig als möglich und fiebern regelmässig. Bald treten pyämische Entzündungen der weissen Haut oder Erysipel der Bauchwand hinzu, und die Kinder sterben bis längstens Ende der dritten Woche. Tritt ausnahmsweise keine Jaucheresorption ein, so wird die Eiterung geringer, und der Nabel vernarbt nach einigen Wochen zu einer harten Narbe. Da aber diese Venenentzündung besonders in Gebärhäusern, in welchen Puerperalfieber herrscht, beobachtet wird, so erfolgt gewöhnlich Pyämie und der Tod.

Behandlung.

Die Behandlung ist sehr einfach; man duldet keine Krusten auf der jauchigen Fläche, indem man sie fortwährend mit warmen feuchten Compressen bedeckt und 2–3 stündlich mit warmem Wasser ausspült. Die Hauptsache bleibt immer schleimige Entferrung aus dem inficirten Gebärhause und eine kräftige gesunde Nahrung, welche natürlich nur bei den wenigsten Frauen, die in Gebärhäusern entbinden, zu beschaffen ist. Ist man gezwungen, die Kinder künstlich zu ernähren, so genügt während dieses Processes Milch und Wasser oder Milch und Thee zur Fröstung des Lebens. Diarrhöen müssen so schnell als möglich durch Mucil. gi. arab. 30,0 mit TR. Opü eror. gr. j., wovon man ein oder selbst zwei Kaffeelöffel reicht, gestillt werden.

2) Bleunorrhoe und Ulceration der Nabelnarbe.

Bei fettem Nabel oder in Folge von Unreinlichkeit und Misshandlung der jungen Narbe fängt diese wieder an, nach Art der Schleimhäute zu secretiren, was man durch Bleiwassercompressen oder Bestreichung mit Höllenstein wieder sistiren kann. Besteht aber dieser Zustand länger, so bilden sich kleine Excoriationen auf der Bauchwand, die ganze Umgebung wird lebhaft geröthet, schmerzhaft bei Berührung und es entwickelt sich ein rundes Geschwür bis zur Grösse eines Groschens. In den schlimmsten Fällen kann Perforation dieses Geschwüres, Peritonitis und Tod eintreten.

Behandlung.

Durch die Behandlung mit feuchter Wärme und später mit einigen Höllensteinstrichen gelingt es meist eine Vernarbung herbeizuführen, wenn ausser die Kinder gut genährt und keine Verdauungsstörungen vorhanden sind, im entgegengesetzten Falle tragen die Schmerzen und die Eiterung des geschwürigen Nabels natürlich zur Beschleunigung der Atrophie das ihre bei.

3) Brand des Nabels.

Bei schwächlichen Kindern oder in Gebärhäusern, wo Puerperalfieber herrscht, kann eine Nabelphlegitis oder das eben besprochene Nabelgeschwür auch gangränös werden, indem sich aus demselben eine graubraune, sphacelöse Masse entwickelt, der Brand greift rasch auf die Bauchwand über, die Epidermis wird lose, lässt sich abziehen und die darunter befindliche Cris hat eine grüne, bläuliche Farbe. Zuweilen stöckert zwischen den sphacelösen Massen noch jauchegemischtes Blut in ziemlicher Menge hervor. In den meisten Fällen tritt nach Peritonitis, nach Ablösung eines Darmstückes auch Darmperforation und Entleerung von Faeces aus dem sphacelösen Geschwür ein. Sehr selten nur genesen diese Kranken, indem der Schorf sich begrenzt, abstösst und eine granulirende Fläche zurücklässt, der gewöhnliche Ausgang ist der Tod nach 8–14 Tagen.

Bei der Behandlung ist Reinlichkeit und eine Anstrengung das Wichtigste; zur Vertilgung des brandigen Geruches ist ein Charpieverband mit Chamäleonlösung zu empfehlen. Zur Aufrechterhaltung der sehr gesunkenen Kräfte bediene ich mich immer eines reinen Kaffees mit Milch und Zucker, oder einigen Kaffeelöffel rothen Weines.

4) Der exulcerirende Nabelstumpf, der Nabelschwamm, Fungus umbilicalis.

Wenn nach Abfall der Nabelschnur noch keine Vernarbung eingetreten ist, so wuchert zuweilen aus der wunden Fläche eine gestielte Excreescenz, die die Grösse einer Erbse und darüber erreichen kann, hervor und verhindert natürlich die Bildung einer Narbe. Die anliegende Bauchhaut wulstet, röthet und exsudirt sich, und bei Vernachlässigung dieser Symptome liegt die Gefahr des Brandes sehr nahe. Sind einmal Excreescenzen vorhanden, so muss man sie erst genau reinigen und die Nabelfalte auseinanderziehen, bis man sich von der Ursache, dem exulcerirenden Stumpfe, überzeugen kann, indem derselbe häufig von der gerötheten Falte überdeckt wird, wie der schematische Durchschnitt, Taf. II, Fig. 8, zeigt. Ist der Stumpf und die Nabelfalte exulcerirt, so glaubt man eine wunde Fläche vor sich zu haben und kann sich nur durch Auseinanderziehen der Falte von dieser irrthümlichen Anschauung befreien. Die Behandlung besteht in Abschneidung oder Abbindung des Stumpfes. Die Abschneidung kann man ohne Assistenz vornehmen, indem man mit der linken Hand die Nabelfalte auseinanderhält, dann mit einer Cooper'schen Schere den Stiel abschneidet und die blutende Wundfläche mit Höllenstein reibt. Zur Abbindung braucht man beide Hände, weshalb ein Assistent mit

einer Hand die Nabelschnur spannt und mit einer Saule in der andern die gemachte lose Fadenschlinge möglichst tief an den Grund des Stüdes schiebt. Zieht man die Schlinge fest an, so durchschneidet sie sogleich den Stumpf, und auch hier tritt eine kleine Blutung ein, die durch Hollenstein gestillt wird. Aus dem Gesagten geht hervor, dass das Abschneiden weit leichter, einfacher und ebenso gefahrlos ist als das Abbinden. Ich vermute, dass dieser gestielte Stumpf, wenn man ihn sich ganz selbst überlässt, nach und nach verjaucht und absterbt, so dass schließlich eine spontane Heilung eintritt.

b) Die Nabelblutung.

Nach Abfall der Nabelschnur, bevor vollkommene Vernarbung eingetreten, entsteht zuweilen eine gefährliche Blutung, der man nur höchst selten Meister zu werden im Stande ist. Plötzlich ohne alle Veranlassung findet man die Nabelbinde blutig und lost man sie nun, so sieht man Tropfen auf Tropfen langsam aus der Nabelgrube herausströmen. Fängt man das Blut in einem Uhrglase auf, so dauert es Tage lang, bis sich ein Fibrincoagulum bildet, und dieses Coagulum bleibt lose und flockig. Die Kinder bluten nun so fort und fort und gehen nach einigen Tagen anämisch zu Grunde, nachdem sich zuletzt noch Petechien und Echylosen der Haut, die man bei der Section auch auf Pleura und Pericardium trifft, eingestellt haben. Die Krankheit, überhaupt ausserordentlich selten, indem sie bei 10,000 Neugeborenen nur einmal vorkommt, wurde von mir erst einmal beobachtet, bei der Section fand man Nabelvene und Nabelarterien mit vollständigen Thromben angefüllt. Der Vater dieses am elften Tage verstorbenen Kindes will der Sohn eines Bluter's sein, indem er mir mitaufgeföhrt versicherte, dass sein Vater aus jeder Schnittwunde am Finger mehrere Tage lang blutete und einmal nach einer Zahnoperation so viel Blut verloren hatte, dass er mehrere Monate lang blaß und schwach blieb. Die Nabelblutung ist also mit Wahrscheinlichkeit als die erste Aeusserung der Bluterdyskrasie anzusehen und ist dann wohl auch mit Ursache, dass die Bluter so selten vorkommen.

Therapie.

Die gewöhnlichen blutstillenden örtlichen Mittel, auch der so sehr gerühmte Liqueur ferri sesquichlorati, bleiben erfolglos, auch die von Dubois und Sauréon empfohlene Ligature en masse, welche darin besteht, dass man zwei Insektennadeln über's Kreuz tief durch den Nabel zieht und mit Achterseuren umwickelt, leistete in meinem Falle nichts, indem aus den Nabelstichen selbst das Blut wieder herausströmte. Thomas Hill hat einen Fall geheilt, indem er auf den eben abgetupften Nabel einen Gypsbrod goss und die später entstehenden Risse immer wieder mit Gyps ausfüllte, ein Verfahren, das, jedenfalls gefahrlos und leicht auszuführen, eine fernere versuchsweise Anwendung verdient. Die von einzelnen Chirurgen vorgeschlagene Aufsuchung und Unterbindung der Nabelarterien und der Nabelvene geht von der unrichtigen Prämisse aus, dass die Blutung aus diesen Gefässen herrührt, was sich in meinem Falle nicht bestätigt hat. Hält man an der Theorie der Bluterkrankheit, welche bisher die meiste Wahrscheinlichkeit für sich hat, fest, so sind natürlich alle operativen Eingriffe zu verwerfen.

6) Der Nabelbruch, *Hernia umbilicalis*.

Unter Nabelbruch kurzweg versteht man zweierlei Zustände, die fast gar keine Ähnlichkeit mit einander haben, nämlich den angeborenen und den erworbenen Nabelbruch (*Exomphalus*, *Omphalocele congenita*, Nabelschambruch — *Hernia umbilicalis*, *Omphalocele acquisita*, Nabelringbruch).

Der angeborene oder Nabelschambruch beruht auf einer Hemmungsbildung der Bauchdecken, in deren Spalte der Bruch zu Tage kommt. Die Bauchplatten des Embryo, die links und rechts von den Primärstreifen auswachsen, sind die ersten Rudimente der Bauchwand, sie wachsen in die Keimblase hinein, nähern sich mit ihren Rändern und umgrenzen dadurch eine Höhle — die zukünftige Bauchhöhle, in welcher ein Theil der Keimblase abgeschnürt wird. Dieser abgeschnürte Theil der Keimblase wird zum Darumkanal, welcher mit dem innerhalb des Bauches liegenden Theile der Blase (Nabelblase) durch einen Gang communicirt. Dieser Gang ist der Darmnabel; die ihn umgebenden Ränder der noch nicht vollständig verwachsenen Bauchplatten bilden den Hautnabel. Findet nun diese Abschnürung, welche in die sechste bis achte Woche des Fötuslebens fällt, nicht gehörig statt, so entwickelt sich der Darm in der offenen Blase, erhält sie dadurch Meibend offen und die Leber hat grosse Neigung in die weite Blase zu treten, wohn sie durch die Nabelvene direct geleitet wird.

Wenn der Theil des Darmes, welcher normal in der Basis der Nabelschnur enthalten ist, nicht zur rechten Zeit in den Unterleib zurücktritt, sondern sich in der Nabelblase fortentwickelt, so erreicht er am Ende einen Umfang, der ihm auch nach der Geburt den Rücktritt in die Bauchhöhle verhindert, gleich Früchten, die frühzeitig als Blüten in den Hals einer Flasche hineingebracht, im reifen Zustand desselben nicht mehr passieren können.

Wenn sich aber neben dem Darms auch ein Theil der Leber bei der Nabelöffnung betheiligt, so hält die Leber gemäss ihrer Dichtigkeit den Ring weit offen und der in der Blase enthaltene Darm kehrt bei seiner zunehmenden Grösse in die Bauchhöhle zurück. Die angeborenen Nabelbrüche, wo kein Theil der Leber vorliegt, lassen sich niemals reponiren, die vorliegenden Darmschlingen werden bald nach der Geburt nach Abtossung der Nabelschnur brandig, es tritt Peritonitis und der Tod ein. Die angeborenen Nabelbrüche, welche ein Stück Leber enthalten, sind möglicher Weise einer spontanen Heilung fähig. Es bedeckt sich der Peritonealüberzug der Leber mit Granulationen, die grosse Oeffnung contrahirt sich nach und nach und es entsteht eine derbe Narbe. Deibout hat auf diese Weise Heilung zu Stande kommen sehen. Die Behandlung ist hierbei sehr einfach, man bedeckt die granulirende Fläche mit einem Ceratlappen und nährt die Kinder möglichst gut.

Der erworbene Nabelbruch, der Nabelringbruch entsteht erst einige Wochen oder Monate nach der Geburt, nachdem die Nabelnarbe sich zur rechten Zeit und in normaler Weise gebildet hat, und wird hauptsächlich bei etwas mageren Kindern, die viel an Flatulenz leiden und anhaltend schreien, beobachtet. Der Nabelring gibt nach, durch die Bauchpresse wird ein Stückchen Dünndarm in den Ring

gepresst und schiebt das Peritonäum und die sich ausdehnende Nabelnarbe vor sich her, so dass statt der Vertiefung eine Hervorragung von der Grösse einer Kirsche bis zu der eines halben Apfels zum Vorschein kommt. In der Mitte des Nabels findet sich eine weisse, glänzende Stelle, welche dem Punkte entspricht, wo die drei Nabelgefässe nach dem Abfallen des Nabelstranges mit einander verwachsen. Diese Stelle heisst der Gefässnabel. Sie düht sich weniger aus, als der Hautnabel und findet sich desshalb auch gewöhnlich nicht auf dem Gipfel des Nabelbruchs, sondern nach unten oder seitwärts. Der Inhalt des Bruches ist meist eine kleine Dünndarmschlinge, die nur sehr selten das Netz vor sich her schiebt. Die Reposition gelingt in allen Fällen ohne Mühe, nach derselben kann man mit der Fingerspitze leicht die Grösse des Ringes untersuchen. Bei gehörigem Verband verkleinert sich der Nabelring nicht einfach, sondern wird, wie ich oft beobachtet habe, zuerst eine Querspalte, deren Ränder sich dann mehr und mehr nähern. Incarcerationen sind mir noch niemals vorgekommen.

Die Behandlung dieses meist auch spontan heilenden Bruches besteht darin, dass man sich aus Leinwand oder Charpie oder Korkholz einen Pfropf macht, der etwas grösser als der Nabelring ist, ihn mit einem 6—8 Quadratzeil grossen Stück Heftpflaster auf den repairten Bruch aufklebt, und mit einer breiten Nabelbinde diesen Verband unterstützt. Wenn die Angehörigen des Kindes dieses einfache Verfahren einmal gelernt haben, so kann das Kind auch täglich wieder gebadet werden, woraufdann der Verband jedesmal erneuert werden muss. Der Ansicht vieler Autoren, es müsse der Nabelbruch durch lange, um den ganzen Leib gehende, vorne gekreuzte Heftpflasterstreifen zurückgehalten werden, kann ich nicht beistimmen; denn die abdominale Respiration wird dadurch sehr beeinträchtigt, ferner gibt es kein Heftpflaster, das nicht mit der Zeit zerfällt, und die Erneuerung dieses Verbandes ist den Angehörigen schwieriger zu lehren, als das einfache Ankleben eines viereckigen Pflasters, weshalb gewöhnlich zum grossen Schaden der Kinder das Baden lange unterbleibt. In 3—6 Monaten kann man, wenn obiges Verfahren consequent fortgesetzt wird und das Kind ausserdem gebadet, einen jeden noch so erweiterten Nabelring zum Verschluss bringen.

E. Trismus und Tetanus der Neugeborenen.

Symptome.

(ὁ σπασμός, das Krampfen; ὁ τένος, Starrkrampf) 1—5 Tage nach Abfall der Nabelschnur, niemals früher noch später, kommt bei Kindern Trismus vor. Gewöhnlich gehen Vorboten voraus, als Unruhe, Weinen, ein eigenthümliches Zittern des Unterkiefers, Auffahren im Schlaf und Regierde nach der Brust, die das Kind schnell wieder los lässt. Nachdem diese Vorboten einige Stunden, höchstens Tage gedauert, können die Kinder plötzlich den Mund nicht mehr öffnen. Die Kaumuskeln füllen sich hart an, die Haut darüber aber ist zum Unterschiede von der Zellgewebsverhärtung leicht verschiebbar. Die Gesichtszüge verlieren die den Neugeborenen eigene Ausdrucklosigkeit, der Mund spitzt sich an, die aufeinander gepressten Lippen sind von strahlenförmigen

Falten gefurcht, es bilden sich Falten auf der Stirne und den Wangen, die von bläulichen Ringen umgebenen Augen sind fest geschlossen, der Kopf ist stark nach hinten gezogen, der Nacken steif, die Haut ist ungerschwind, geröthet. Die Kinder vermögen nicht mehr zu schlucken; wenn man ihnen auch mit menslicher Gewalt die Kiefer geöffnet und etwas Getränk eingeflösst hat, so kommt es doch regelmäßig nach kurzer Zeit wieder zum Munde heraus. Anfangs hat dieser Zustand noch Intervalle, die Krämpfe lassen Stunden lang nach, so dass man an eine Genesung glauben könnte. Sie kehren aber regelmäßig wieder, werden immer anhaltender und dauern meist bis zum Tode, nur zuweilen tritt vor der Agonie wieder eine Relaxation der contrahirten Muskeln ein. Im höchsten Grade der Krankheit werden alle Muskeln so vollkommen steif, dass man die Kinder wie ein Stück Holz emporheben kann. Nach 1—8 Tagen tritt der Tod ein und zwar durch Erstickung oder durch Erschöpfung. Die Kinder ersticken entweder in Folge von Verschluss der Stimmritze während eines convulsivischen Paroxysmus, oder in Folge der durch die allgemeine Starre gänzlich aufgehobenen Thätigkeit der Inspirationsmuskeln. Im zweiten Falle, dem Tode durch Erschöpfung, ist so die häufige Wiederkehr der Convulsionen, welche ein rasches Sinken der Kräfte bedingt. Bei längerer Dauer bringt der Mangel an Schlaf und Nahrung die Auflösung zu Stande.

Aetiologie.

Bei wenig internen Krankheiten kann man die Ursache mit solcher Bestimmtheit angeben als beim Trismus neonatorum. Eine Krankheit, die nur 1—5 Tage nach dem Abfallen der Nabelschnur auftritt, hat doch ganz gewiss einen Zusammenhang mit dem Verwundungsproccesse des Nabels. Es ist auch sehr natürlich, dass bei einer so raschen Contraction von Geweben, wie sie hier stattfindet, hier und da in der Narbe ein Nerv gezerrt oder gepunctirt werde, und so alle Reflexcontractionen veranlassen kann, wie wir sie beim traumatischen Tetanus durch einen fremden Körper erzeugt finden. Diese wird um so eher geschehen, wenn die Nabelschnur dick war, roh behandelt wurde und in Folge dessen eine Ulceration sich entwickelte. Man findet bei vielen Sectionen an Trismus verstorbener Kinder bedeutende Veränderungen der Nabelarterien und der Vene, Erweiterung, Röhung, Erweichung, Verschwärung der Gefäßwand, Eiter und Jauche im Innern und in der Umgebung dieser Gefässe.

Bei uns in Deutschland kommt die Krankheit nur sehr sporadisch vor; dass sie zu gewissen Zeiten und bei gewissen Witterungsverhältnissen häufiger sein soll, war mir nicht möglich zu entdecken. Ich sah sie schon zu allen Jahreszeiten und Barometerständen, bei kühlem und heissem, feuchtem und trockenem Wetter. Im Dubliner Geburtshause und in Mailand wurde der Trismus epidemisch beobachtet, endemisch ist er in Triest, Spanien, auf Minscka, in Westindien, Jamaica, auf Cayenne. In einzelnen Colonien Guyana's soll die Hälfte der dort geborenen Kinder davon weggerafft werden. Nicht bloss im Süden, auch im hohen Norden tritt er endemisch auf, z. B. in Island, wo ihn die Eingeborenen mit dem Namen „Chinlose, Kimbackenschiss“ bezeichnen, und auf den Westmann-Inseln an der Südküste von Island

soll nach Mackenzie diese Krankheit so häufig unter den Neugeborenen herrschen, dass sich die kleine Bevölkerung nur durch die Einwanderung erhält.

Die pathologische Anatomie liefert außer den schon besprochenen Veränderungen der Nabelgefäße keine charakteristischen Merkmale. Die Bluthäufung des Rückenmarks und die zuweilen blutigen Ergüsse im Rückenmarkskanal sind jedenfalls secundäre Processe. Die Leichen behalten ihre holzartige Steifheit und fühlen sich auch in warmer Jahreszeit wie gefroren an.

Die Prognose ist ausserordentlich ungünstig. Gölls und Hejms haben in ihrer langen Praxis keinen einzigen Fall gesehen leben. Hufeland stellt das Verhältniss der Sterblichkeit = 50 : 1. Alle meine Kranke, es waren deren wenigstens zehn bis zwölf, sind nur unter den best empföhlenen Methoden gestorben.

Behandlung.

Da nach meinen Erfahrungen und denen der beschäftigten Kinderärzte überhaupt der einmal entwickelte Trismus neonatorum zum Tode führt, so ist es doppelt wichtig, die prophylactische Behandlung scharf in's Auge zu fassen; denn es wird nicht leicht ein Fall vorkommen, wo man nicht bei genauer Nachforschung irgend eine Vernachlässigung in der Pflege der Nabelschnur entdecken kann. Wo freilich das Leiden so endemisch herrscht, dass regelmässig ein grösserer Theil der Neugeborenen daran zu Grunde geht, ist Frank's Rath zu befolgen, wonach die Schwangeren den gefährlichen Landstrich verlassen müssen und erst nach vollendeter Vernarbung des Nabels ihres Neugeborenen zurückkehren dürfen.

Eine sorgsame Pflege der Nabelschnur, wie sie sich pag. 53 schon angegeben findet, und eine reinliche, schonende Behandlung der noch nicht vollkommen gebildeten Nabelnarbe, wozu hauptsächlich auch gleichmässige Temperatur von 15–16 Graden, reine Luft und gesunde Muttermilch gehört, sind also auf das strengste zu empfehlen.

Da ich noch nie ein Kind mit Trismus geheilt habe, so kann ich selbstverständlich auch kein Mittel gegen die einmal entwickelte Krankheit bevorzugen, sondern muss mich begnügen, die verschiedenen als mittels erkannten Behandlungsweisen aufzuzählen. Man hat 1) eine antiplogistische Behandlung, namentlich Blutentziehungen versucht, 2) hat man Antispasmodica und Narcotica, 3) Diaphoretica und Hautreize und 4) die ausleerende Methode in Anwendung gebracht. Jede dieser Behandlungsweisen hat ihre Fürsprecher und jede hat ihre Verächter.

Am meisten hoffte ich noch von den Narcoticis: In einem Falle gab ich Opiumtinctur, stündlich einen Tropfen, in einem andern dreistündlich einen Tropfen Opiumtinctur, in einem andern wieder chloroformirte ich das Kind alle zwei Stunden. Während jeder Narcose liess bei diesem Kinde die Steifheit nach und kam erst nach $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde wieder. Am nächsten Tage waren die Symptome dieselben, als ich aber das Kind, um es aus lebendem Male zu markatisiren, aufmachte, war es todt. Das Vermuthigste scheint zu sein, dass man die Kinder wenigstens nicht verschmachten lässt, indem man ihnen täglich zwei Mal mittelst eines elastischen Catheters, der sich sehr leicht durch

den Oesophagus in den Magen bringen lässt, Milch oder Fleischbrühe mit Eigelb in den Magen injicirt, und dass man den Ort, von dem der Triumna ausgeht, die Nabelnarbe, mit einem kleinen Ferrum candens cauterisirt. Eine Behandlung, die bei dem nächsten sich mir bietenden Falle versucht werden soll.

F. Skleroma (*εὐ σκλήρωσις*, die Verhärtung). *Induratio testae cellulosae.*
Zellgewebsverhärtung.

Das Sklerom, von andern auch *Oedema neonatorum*, oder *Oedema compactum* darum genannt, besteht in einem Hartwerden einzelner Hautstellen, welches sich in dieser Weise nur bei Neugeborenen in den ersten Lebenswochen findet.

Symptome.

Die Infiltration der Haut beginnt an den unteren Extremitäten, deren Rötze zunimmt, während zu gleicher Zeit die Temperatur sinkt. Zuerst schwellen die Waden hart an und werden ganz steif, die Gesehswalst ergreift hierauf auch die Füße, wobei die Fusssohlen eigenthümlich convex werden, und erstreckt sich aufwärts über das Knie zu die Oberschenkel bis zu den Genitalien, dem Schamberg, den Nates und zum Nabel; die Brust bleibt auffallender Weise immer verschont, hingegen werden die oberen Extremitäten und das Gesicht, vorzüglich die Lippen und Wangen, die dann einen eigenthümlichen Glanz bekommen, sehr gewöhnlich vom Sklerom befallen. Die anfängs dunkelrothe Farbe der ergriffenen Stellen erblickt bald und macht einer gelblichen Platz, die Haut wird trocken und die Epidermis, die sich sonst immer abtöset, kommt hier nicht zur Abschuppung. Bei den höchsten Graden des Skleroms liegen die Kinder hochgeschwollen, kalt und starr, gleich einer erfrorenen Leiche da. Die harten, glänzenden Wangen, die aufgetriebenen, nach vorwärts geschobenen Lippen, die mehr oedematösen als verhärteten Augenlider, welche sich nur wenig öffnen können, vorstellen das Gesicht zur Unkenntlichkeit. Zu Anfang der Krankheit lassen sich die einzelnen Hautpartien noch etwas verschieben, und man vermag mit dem Finger einen längere Zeit bleibenden Eindruck in das Sklerom zu machen, später aber gelingt beides nicht mehr. Sehr charakteristisch ist die Temperaturerniedrigung solcher Kinder, nicht nur an der Oberfläche, sondern auch in der Mundhöhle, wo sie nach Léger's Messungen bis auf 23° C. sinken kann. Durch künstliche Erwärmung mittelst Warmlaschen, warmer Tücher, heisser Bäder kann man die kalten Glieder nur vorübergehend, wie oben jeden andern leblosen Gegenstand auch, erwärmen.

Sämmtliche physiologische Funktionen sind hohes unterdrückt oder nur sehr schwach entwickelt. Die Respiration oberflächlich und selten, die Stimme schwach und winselnd, meistens wird hartes anhaltendes Geschrei gehört. Die Kinder saugen nur wenige Minuten und ziehen nur sehr geringe Quantitäten Milch aus den Brüsten. Das Meconium entleert sich lange nicht, die Urinsecretion ist sehr vermindert. Der Puls ist immer sehr klein und langsam, nach Valleix 60—72 Schläge in der Minute, später bei überhandnehmendem Sklerom

wegen des Hautexsudates an keiner Extremität mehr zu bilden. Die Herzbewegungen sind ausserordentlich schwach, der zweite Ton ist kaum zu hören. Die Sensibilität in den erkrankten Hautstellen ist fast vollständig verschwunden, wenn man sich durch leichte Nadelstiche leicht überzeugen kann.

Indem alle diese eben beschriebenen Symptome nur allmählig überhandnehmen, so ist eine Stadieneintheilung nicht möglich und auch nicht nöthig. Je mehr das harte Oedem fortschreitet, desto tiefer wird die Lethargie, desto langsamer die Respiration, desto merklicher die Kälte. Endlich fliesst ein blutiges Serum aus Mund und Nase und es erfolgt der Tod ohne Contusionen einfach unter langsamer werdenden Athemzügen.

In den seltenen Fällen, welche in Genesung übergehen, bemerkt man zuerst freiere und tiefere Athemzüge, Zunahme und Kräftigung der Herzbewegungen, vermehrten Appetit und zuletzt eine Abnahme der geschwellenen Parthien. Nach Valletix werden zuerst die Augenlider und die Vorderarme dünn und geschmeidig, dann die Hinterbacken und das Hypogastrium, später die Hände; Unterschenkel und Füsse bleiben zuweilen noch lange ödematös, wenn die übrigen Theile schon normal sind. So lange die Füsse noch geschwellen sind, darf man die Kinder noch nicht ausser Gefahr erklären, sie pflegen schläfrig zu sein und wenig zu trinken und sterben dann noch nach zwei bis drei Wochen.

Ist das Oedem ganz verschwunden, so behalten die Theile noch eine Zeit lang eine violettrothe Farbe, die Haut ist schlaff, weich und rünzlich und bekommt erst spät ihre normale Beschaffenheit wieder.

Die häufigste Complication ist bilobuläre Pneumonie, die Valletix unter 25 Fällen fünf Mal beobachtete; sehr selten sind Darmcatarrhe, was bei der mangelhaften Zufuhr der Nahrungsmittel wohl erklärlich ist. Gelbe Färbungen der Neugeborenen kommen natürlich häufig vor, wirkliche Gelbsuchten mit gelber Sklera, gallenfarbstoffhaltigem Harn und grauen Faeces sind bei Kindern überhaupt sehr selten und haben auch zum Sclerem keine besondern Beziehungen.

Sectionsbefund.

Die von Sclerem befallenen Theile werden nach dem Tode schnell blau und behalten ihre Stüfigkeit und Härte, die übrige Haut, besonders am Rumpfe, ist normal, gelblich weiss. In Folge der Senkung nach den abhängigsten Stellen ist die Infiltration am stärksten auf der Seite, auf welche die Leiche gelegt wurde. Schneidet man auf die erkrankte Haut ein, so fliesst zunächst schwarzes flüssiges Blut ab, aus dem Unterhautzellgewebe aber, das gewaltig angeschwollen ist und die Vergrösserung der Extremitäten bedingt, sickert eine grosse Menge einer gelben oder von heigemischtem Blute noch rothgefärbten Flüssigkeit aus, die sich weder chemisch noch morphologisch vom gewöhnlichen hydrogischen Serum unterscheidet. Nach Abfluss desselben werden die vorher harten Theile weich und wolk. Das Bindegewebe über den Aponeurosen ist zu einer zwei bis vier Linien dicken gallertartigen Masse umgewandelt, unter der Aponeurose, im Zwischenmuskulgewebe findet sich niemals Oedem. Nicht zu verwechseln mit diesem Befunde ist die Verhärtung des Fettes, wenn die Leichen der Kälte

ausgesetzt waren. Hier fühlten sich die Extremitäten wohl auch hart an, sind aber nicht geschwollen und nicht so blau, und auf dem Einschnitt findet man das Unterhautbindegewebe normal, trocken, nicht gallertig infiltrirt.

Wir haben es also beim Sclerom im Wesentlichen mit einem acuten Hautödem zu thun, dessen Veranlassung in allgemeinen Verhältnissen zu suchen sein dürfte. Die übrigen Organe sind nicht constant verändert, am häufigsten finden sich noch seröse Ergüsse im Peritoneum oder in den Pleurahöhlen, und zuweilen entwickeln sich lobuläre Pneumonien. Die fötalen Circulationswege sind bald geschlossen, bald noch offen, wie man das überhaupt bei Kindern, die in den ersten Lebenstagen sterben, häufig trifft, so dass das Sclerom mit grossen Veränderungen der Circulation nicht in Zusammenhang gebracht werden kann.

Aetiology.

Das Sclerom befallt vorzugsweise nicht ausgetragene Kinder. Es lässt sich übrigens viel leichter bestimmen, wober das Sclerom nicht kommt, als wober es kommt. Es entsteht nicht durch Offenbleiben der fötalen Wege, und nicht durch lobuläre Pneumonie. An die Verlangsamung der Respiration und des Pulses, die mit Ausnahme jener Fälle, welche mit Pneumonie complicirt sind, eine constante ist, muss vor allen erinnert werden. Es fehlt also wahrscheinlich an der Interraction des Herzmuskels, der sich zu sehr contractirt und nun die Kälte und periphere Transsudation bedingt. Im Winter ist die Krankheit entschieden häufiger als im Sommer.

Behandlung.

Valleix hat zwei Kinder gesehen, von denen einem jeden zwei Blutegel hinter die Ohren gesetzt worden waren. Andere Kinder starben unter dieser Behandlung. Das Wesentlichste scheint eine fortwährend sehr hohe Temperatur zu sein, die man durch Wärflaschen, heisse Krüge, Sandsäcke, warme Tücher zu erhalten sucht. Auch ist es rationell durch Alcoholia die Herzcontractionen zu beschleunigen, wobei freilich nicht zu leugnen ist, dass alle diese Versuche in der Regel misslingen und nur in Ausnahmefällen bei wenig verbreitetem Sclerom zu einem günstigen Resultate führen.

6. Die Entzündung der Brustdrüse. Mastitis neonatorum.

Zum Verständniss dieses eigenthümlichen, nur in den ersten Lebenswochen zu beobachtenden Processes muss vorausgeschickt werden, dass die Brustdrüsen Neugeborener in den meisten Fällen auf sanften Druck etwas dünne Milch entleeren, die erst nach 8—14 Tagen, bei männlichen auf immer, bei weiblichen bis zur ersten Schwangerschaft, versiegt.

Nach den Untersuchungen Guillet's reagirt sie neutral oder alkalisch, wird nach längerem Stehen sauer und theilt sich leicht in zwei Theile. Mikroskopisch findet man in ihr vorherrschend Colostrumkugeln. Sie schmeckt, wie ich mich selbst öfters überzeugt habe, durchaus nicht süss, sondern entweder fade oder gar etwas salzig.

Diese vorübergehende Milchsecretion macht die Brustdrüsen der Neugeborenen ebenso zu Entzündungen geneigt, als wir diess oft genug bei stillenden Frauen beobachten. Ein Druck, eine Quetschung, die ja bei der Geburt schon unvermeidlich sind, genügen, die Brustdrüsen zur Schwellung und Abscedirung zu beugen. Häufig tragen geschäftige Hebammen die Schuld an dieser Krankheit, indem sie den unerfahrenen Müttern glauben machen, man müsse die Milch sorgfältig ausdrücken. Es entsteht hierauf fast regelmässig eine Schwellung und Rötzung der Brustdrüse. Die Kinder erheben ein klägliches Geschrei, wenn man sie berührt, die Geschwulst nimmt mehr und mehr zu, fluktuirt an einzelnen Stellen und leicht unter Entleerung einer grösseren Menge dicken Eiters auf. Nachdem die Eiterung einige Tage gedauert, schliesst sich der Abscess, die Drüse bleibt noch einige Zeit indurirt, nach einigen Wochen aber ist eine völlige Restitutio in integrum eingetreten. Bei kachektischen Kindern, die zu gleicher Zeit an Scur und Durchfall leiden, erstreckt sich die erysipelatöse Rötze über einen grossen Theil der Brust, es stossen sich nach spontaner oder künstlicher Eröffnung des Abscesses grössere Fetzen Zellgewebes ab und längere Zeit hindurch bleiben Fistelgeschwüre zurück. Die einzige schlimme Folge der eitrigen Mastitis bei Mädchen ist, dass durch die Eiterung die Brustwarze und selbst die ganze Drüse schrumpfen kann, worauf die so veränderte Mamma zur Zeit, wo das Geschäft des Stillens beginnen sollte, gar nicht oder nur unvollkommen funktioniert.

Therapie.

Die Hauptsache ist eine vernünftige Prophylaxis. Sind die Brustdrüsen geschwollen, jedoch noch nicht geröthet und schmerzhaft, so kann man den Uebergang in Eiterung meistens verhüten, wenn man mit Sorgfalt allen Druck, jede Reibung vermeidet und der Verstopfung der Milchgänge durch saute Oelbepinselung vorbeugt. Zur Erfüllung der ersteren Indication legt man auf die Brust eine weisse, grobe Leinwand und über dieselbe etwas Baumwolle. Auf diese Weise gelingt es in den meisten Fällen, die Drüsen ohne Eiterung zum Schwinden zu bringen und auf ihre normale Beschaffenheit zurückzuführen. Geht sie dennoch in Eiterung über, so ist der Oellappen nichtsdestoweniger am Platze, die Baumwolle vertauscht man passender mit trocknen, gewärmten Kleinstückchen, weil hiadurch die Reifung des Abscesses beschleunigt wird. Fühlt man nach 2—4 Tagen deutliche Fluktuation, so ist es rathsamer, den Abscess zu öffnen als ihn der Natur zu überlassen, indem in letzterem Falle die Öffnung meistens zu klein und der Eiterabfluss somit gehindert wird. Man hat beim Einstiche die Brustwarze zu meiden, denn die hierauf folgende Narbencontraction muss dieselbe in allen Fällen verkleinern und verzerrn, was bei Mädchen in späterer Zeit sehr ungünstigen Einfluss auf das Stillen ausüben könnte. Der Schnitt falle in einen Radius der Mamma. Nach Entleerung des Eiters legt man am einfachsten feuchte, warme Compressen auf, wodurch Krustenbildung und vorzeitige Verklebung der Wundränder verhütet wird. Die Wunde schliesst sich bei sonst gesunden Kindern nach wenigen Tagen, bei atrophischen, wodurch die Eiterung der Collaps nur beschleunigt wird, wird der Eiter flockig, dünnflüssig und die Wunde bleibt offen bis zum Tode.

H. *Melaena neonatorum.*

Am ersten bis dritten Lebenstage kommen bei Kindern zuweilen Darm- und Magenblutungen vor. Das Erbrechen des Blutes ist seltener, als eine blutige Färbung der Faeces. Fast immer sind die blutigen Stühle sehr reichliche und kehren in kurzen Zwischenräumen wieder. Das Blut ist bald flüssig, bald mit grossen geronnenen Klumpen vermischt. Die Kinder collabiren hierbei sehr schnell, bekommen blassc Lippen, kühle Haut, kaum fühlbaren Puls, und die Symptome von acuter Gehirnämie. Gewöhnlich verläuft die Blutung in 24 Stunden, doch kann sie auch 3—5 Tage dauern. Die Stühle behalten noch mehrere Tage ein schwarzes Farbe. Nach Rilliet genest die Hälfte der davon ergriffenen Kinder.

In der Sektion findet man noch grosse Mengen flüssigen oder geronnenen Blutes im Magen und Darmkanal, und in den anderen Organen die höchste Anämie. Die fötalen Blutwege sind offen, was übrigens auch bei vielen andern nicht an Melaena verstorbenen Neugeborenen vorkommt. Als Ursache dieser Krankheit lässt sich die schon im physiologischen Zustand eintretende Turgescenz der Mesenterialarterien und ihres Capillarsystems betrachten, welche durch den plötzlichen Verschluss der unmittelbar aus der Arteria hypogastrica entspringenden, im Fötus sehr bedeutenden Nabelarterien bedingt ist. Eine besondere Dünnwandigkeit oder Brüchigkeit des betreffenden Gefässsystems muss freilich noch dabei im Spiele sein, weil sonst diese in Wirklichkeit sehr schwere Blutung viel häufiger vorkommen müsste. Auch der Verschluss des ductus venosus Arantii und namentlich des in die Pfortader mündenden Armes der Nabelvene verdiente zur Aufklärung dieser Blutung eine öftere, genauere Untersuchung.

Ausser durch diese Darmblutungen können die Faeces noch blutig gefärbt werden durch in den Mund gekommenes und verschlucktes Blut. Dieses kann sich ereignen bei allen Operationen an den Lippen und der Zunge, nach Nasenbluten durch Anreissen der Nase auf eine harte Fläche, durch Verschlucken mütterlichen Blutes während der Geburt, und endlich kann das neugeborene Kind auch aus den Brüsten der eigenen Mutter Blut saugen, wenn sich hier blutende Risse gebildet haben oder wenn ein starkes Kind aus mildereeren Brüsten lange Zeit zu saugen sich bemüht hat. Alle diese zufälligen Beimischungen von Blut sind sehr selten, das Blut findet sich jedoch nicht in grosser Quantität und wird gewöhnlich nicht durch den Darm entleert, sondern wieder erbrochen. Dabei collabiren die Kinder nicht so wie bei einer wirklichen Darmblutung.

Behandlung.

Die einzige Darmblutung, die ich bisher bei einem Neugeborenen zu behandeln hatte, trat 36 Stunden nach der Geburt ein. Es wurden in 24 Stunden 10 blutige Windeln mit Blutesagulis von der Grösse einer Haselnuss verbraucht. Das kräftige Kind wurde abald wieder bleich, kühl an den Extremitäten und der Puls war kaum mehr zu fühlen. Ich liess die Temperatur des Zimmers bis auf 18° R. erhöhen, legte um das Kind drei Krüge mit heissem Sande gefüllt und liess es

alle Stunden an der Mutterbrust trinken. Als nach zwölf Stunden die Blutung nicht nachliess, gab ich ihm

Rp. Liq. Ferri sesquichlorat. 1, 2

Aq. destillat.

Aq. cinnamon.

Syz. simpl. ana 15,0

wovon das Kind nach zwölf Stunden ungefähr die Hälfte genommen hatte und hierauf kein Blut mehr entleerte. Zu der von Rilliet vorgeschlagenen Behandlung mit eiskalter Milch und kalten Umschlägen auf den Bauch konnte ich mich nicht entschliessen wegen der Abkühlung der Prominenzon und halte es für rationeller bei diesen Darmblutungen der Neugeborenen einen möglichst starken Torpor nach der äusseren Haut zu erzeugen, was am besten durch hohe Temperatur erreicht wird. Nachdem die blutigen Stühle aufgehört hatten, erholte sich das Kind in wenigen Tagen vollständig und gedieh seit jener Zeit vortreflich. —

I. Icterus neonatorum. (à Jersig, Gelbsucht).

Ausser der pag. 5 angegebenen physiologischen gelben Färbung der Haut, wohn in der That die meisten für Icterus gehaltenen Hautveränderungen gehören, gibt es noch eine wirkliche Zurückhaltung des Gallenfarbstoffes im Blute, in vielen Fällen ein sehr bedenklicher Zustand. Die Sclerotica ist hierbei gelb gefärbt, der Eiter der Ophthalmoblonnerhöe, die zufälliger Weise daneben vorkommt, wird orangegelb, der Harn färbt die Windeln dunkelgelb. Die Fäces werden aber fast nie so grau, wie bei Erwachsenen, sondern behalten eine hellgelbe oder grünliche Färbung. Bei der Section findet man die serösen Häute, die Muskeln, Knochen etc. von Gallenfarbstoff durchtränkt, wie dies bei erwachsenen Ictericen auch vorkommt. Viele icterische Kinder haben Fieber und leiden an einem noch nicht vernachlässigten, excorirten Nabel, womit der Icterus neonatorum im engsten Connex steht, und dem entsprechend man in den lethal ausgehenden Fällen gewöhnlich Phlebitis der Nabelvene und zuweilen der Pfortader, im Leberparenchym aber kleine Abscesse findet. Es ist demnach der wahre Icterus neonatorum in diesen Fällen als eine Theilerscheinung oder Complication der Phlebitis umbilicalis zu betrachten, ohne dass jedoch behauptet werden darf, dass nicht eine hochgradige Stauung im Gebiete der Lebervene, ein Duodenalkatarth oder eine mechanische Verschlussung der Gallenausführungsgänge auch hier und da einen Icterus verursachen könnten. Alle günstig verlaufenden Icterus der Neugeborenen gehören wohl in diese Kategorie. Ihre gewöhnliche Voraussetzung dürfte nach Frerichs in der verminderten Spannung der Capillaren des Leberparenchyms zu suchen sein, welche beim Aufhören des Zuflusses von Seiten der Umbilicalvene sich einstellt und vermehrten Uebertritt von Galle in's Blut veranlasst.

Was den Verlauf betrifft, so gilt für die erste Kategorie alles, was bei der Phlebitis umbilicalis pag. 49 gesagt worden; die Kinder leben selten länger als 14 Tage, atrophiren sehr rasch und gehen meist mit Diarrhöe zu Grunde. Die letztere Art, der einfache Icterus, dauert zwischen 8—14 Tage. Die gelbe Färbung wird niemals sehr satirt

und das Allgemeinbefinden ist während des ganzen Verlaufes kaum merklich getrübt.

Behandlung.

Die Behandlung des pernicious Icterus ist eine höchst undankbare. Es findet sich meines Wissens in der ganzen Literatur kein einziger Fall von Heilung. Um so dankbarer dagegen ist die der fälschlich Icterus genannten gelben Hautfärbung bei frühgeborenen Kindern oder nach schweren Geburten. Dieselbe schwindet regelmäßig nach einigen Tagen von selbst, und man hat nichts zu thun, als die Verdauung des Kindes zu beaufsichtigen. Neugeborene Kinder sind sehr selten wirklich obstipirt und es wird daher auch der so allgemein beliebte Rhabarbersaft auf diese Fälle zu reduciren sein.

K. Conjunctivitis bleonorrhoica neonatorum.

Unter bleonorrhoischer Bindehautentzündung (*δίπρωγ*, Schleim, Eiter) verstehen wir eine Entzündung, welche nicht nur mit profuser Eiterung an der freien Oberfläche der Conjunctiva, sondern auch mit Erguss eines plastischen Exsudates in deren Parenchym verläuft. Der eiterartige Eiter ist ansteckend und wird von der ganzen Oberfläche der Lidbindehaut secernirt. Das ansteckende, reichliche Secret und das überall gleichmässige und gleichzeitige Erkranken des Papillarkörpers charakterisiren diese Krankheit vor allem.

Je nach der Heftigkeit des Verlaufes unterscheiden wir nach Art zweierlei Arten von Bleonorrhöen.

Erste Art. Fälle, welche gleich vom Anfang an einen sehr raschen Verlauf und die Tendenz, rasch den höchsten Grad zu erreichen, darbieten.

Im ersten Grade dieser Art ist die Bindehaut der Lider ge- lockert, geschwollen, gleichmässig geröthet und secernirt eine ziemliche Menge Eiter, alle diese Symptome sind acut aufgetreten. Oft tritt die einfach eiterige Secretion rasch und macht einem dünnflüssigen, molken- oder fleischwasserähnlichen Secrete Platz, in welchem consistenzere Flocken und Fäden herumschwimmen und sich häufig an der Conjunctiva ziemlich fest anheben. Es findet hierbei eine merkliche Schwellung, ein acutes Oedem der Lider statt. Gewöhnlich dauert dieser Zustand nur so kurze Zeit (12—24 Stunden), dass der Arzt ihn selbst zu Gesicht bekommt.

Im zweiten Grade dieser Art ist die Lidbindehaut dunkelroth und sehr geschwollen, so dass die innere Lidkante nicht mehr scharf erscheint und die Aufsaugung der Thränen wegen Wegdrängung der Thränenpunkte gehindert ist. Die Bindehaut der Sclera ist auch schon bedeutend infiltrirt und injicirt, das Secret ist meist fleischwasserartig, selten eiterig dickflüssig und exocorirt die nächstgelegenen Hautparthien. Die Geschwulst der Lider ist schon so stark, dass die Eröffnung der Lidspalte höchst schmerzhaft und schwierig ist.

Im dritten Grade endlich sind alle Erscheinungen des zweiten nur noch in erhöhtem Maasse zugegen und dazu kommt noch eine erhöhte Geschwulst der Conjunctiva bulbi. Die Geschwulst der äusseren Lidhaut steigt über den Augenbrauenbogen nach oben und über das

Wangenbein nach unten und ist vom äusseren bis zum inneren Augenwinkel gleichmässig, weil sie eben nur eine secundäre Erkrankung der gleichmässig entzündeten Conjunctiva ist. Das Secret ist ausserordentlich reichlich, flusst fast unmerklich über die Wangen herab, und ist bald dünn- bald dickflüssig, wässrig oder eiterig, zuweilen bräunlich von beigemischtem Blute gefärbt. Die Conjunctiva bulbi ist entweder gleichmässig infiltrirt und umgibt die tieferliegende Cornea als ein rother, wallartiger Kranz oder erhebt sich in schweren Fällen ungleichmässig in Form von schlaffen, blasenähnlichen Wülsten.

Zweite Art. Fälle mit mehr chronischem Verlauf und ohne blennorrhöische Secretion von vorn herein. Die letztere nimmt erst nach einigen Tagen zu, die Veränderungen der Conjunctiva aber sind bedeutend, sie wuchern allenthalben und bilden kleine Wärrchen, die an der Uebergangsstelle sich zu halbkugelförmigen Höckern vereinigen.

Im ersten Grade dieser zweiten Art ist die Secretion sehr unbedeutend, die rothe Färbung und die löcherige Beschaffenheit der Conjunctiva, verbunden mit etwas Lichtsehen, sind ihre einzigen charakteristischen Merkmale. Dieser Zustand kann mehrere Tage dauern, ohne dass nennhafte Veränderungen eintreten.

Im zweiten Grade ist die Erkrankung der Conjunctiva palpebrarum folgende: So weit der Papillarkörper reicht, also am unteren etwa $\frac{1}{4}$ ", am oberen gegen 1" über des Orbitalrand des Tarsus hinaus, erscheint die hochrothe Bindehaut mit dicht aneinander gedrängten, gleichbleichen und gleichgrossen Wärrchen besetzt. Am Anfang bluten diese Wärrchen fast bei jeder Berührung, nach längerem Bestehen — sie wahren, nicht behandelt, oft Monate lang — erblassen sie an der Oberfläche, werden durch den Druck des Bulbus etwas abgeplattet, und bluten dann nicht leicht mehr. Gegen den Orbitalrand hin zeigt sich immer die stärkste Tendenz zur Wucherung, es bilden sich dort hohe kammartige Wülste.

Das Oedem und die Rötung der Lidée ist hierbei unbedeutend und vergeht früher als die Conjunctivalerkrankung.

Zum dritten Grade kommt es bei dieser Art Blennorrhöe selten; in der Regel nur dann, wenn während der Krankheit noch weitere schädliche Einflüsse auf das Auge einwirken. Die anatomischen Charaktere sind übrigens dieselben wie die des dritten Grades der ersten Art.

Verlauf. Es ist nicht notwendig, dass die Blennorrhöe immer alle drei Grade durchläuft, sie können auch auf dem zweiten, zuweilen auch auf dem ersten stehen bleiben. Es müssen auch nicht immer beide Augen ergriffen werden, gewöhnlich aber steckt der Eiter des erst ergriffenen Auges das andere an, weshalb dem weiter unten näher zu beschreibenden Verschluss des noch gesunden Auges die höchste Wichtigkeit beizulegen ist. Hat eine wirkliche Uebertragung blennorrhöischen Eiters stattgefunden, wie dies bei Neugeborenen eben meistens der Fall ist, so durchläuft der Process den ersten und zweiten Grad so schnell, dass der schon nach 24 Stunden zugegriffene Arzt den dritten Grad vollkommen ausgebildet findet, und das Auge zu dieser Zeit schon unrettbar verloren sein kann durch ausgebreitete Zerstörung der Hornhaut.

Bleibt die Affection auf dem ersten Grade stehen, so verläuft

sie langsam und spärlich und ohne gefährliche Folgen. Durch Einwirkung kasserer Schädlichkeiten kann sie zu einem höheren Grad sich steigern.

Der zweite Grad ist fast ohne Ausnahme durch Berührung mit inficirendem Eiter veranlasst. Hier ist schon viel weniger Tendenz zur spontanen Heilung zu gewärtigen, indem die Wucherung des Papillarkörpers und die daraus hervorgehende Eiterung unbelandelt viele Monate lang bestehen können. Die Lider verdicken und vergrössern sich bei diesem chronischen Verlaufe beträchtlich; trotz der später erfolgenden Vernarbung der Conjunctiva verkürzen sie sich aber niemals nach innen, es entsteht vielmehr häufig ein Ectropium des oberen und unteren Augenlides. In anderen Fällen kann sich durch Excoriationen eine Verkleinerung der Lidspalte, Bopharophimosis, bilden. Die Hornhaut wird beim zweiten Grade nur wenig gefährdet, nur kleine und oberflächliche Hornhautgeschwüre kommen vor.

Der dritte Grad, der zu jeder Zeit sich aus dem ersten und zweiten entwickeln, aber auch sehr spät ohne länger vorausgehende Erkrankung auftreten kann, ist immer ein höchst gefährlicher Zustand.

In der Regel wird die Cornea ergriffen. Man kann bei der ersten Untersuchung die Hornhaut ganz rein, durchsichtig und glänzend gefunden haben, untersucht man nach wenigen Stunden wieder, so ist sie erweicht, eiterig infiltrirt und zum grossen Theil zerstört. Zur Erleichterung des Unglückes findet dieser Process fast regelmässig in der Mitte, gerade der Pupille gegenüber, statt, während die Peripherie der Cornea bei unversehrtem Centrum nur höchst selten zerstört wird. Eigenthümlich ist bei diesen Hornhautgeschwüren, dass sich nie eine Eiterung zwischen die Schichten der Hornhaut, ein Unguis, bildet. Sie haben eine ausserordentlich grosse Neigung zu perforiren, die Iris fällt abwärts vor und bedeckt sich schnell mit grauem Exsudate, woraus sich dann später die Staphyloeme entwickeln. Ist die Iris und das sie bedeckende Exsudat nicht im Stande die Perforationsöffnung zu verschliessen, so tritt Phthisis bulbi ein. Im Allgemeinen kann als Regel gelten, dass die Hornhautaffection, je später sie nach überschrittenem Hostenstadium der Blemorrhoe auftritt, um so weniger eine destructive Tendenz an den Tag legt. Bilden sich nach längerem, 2—3 wöchentlichem Bestehen der Blemorrhoe noch Geschwüre, so greifen sie zwar bei weitem weniger an sich, können aber doch noch häufig genug zu begrenzten Hornhautperforationen und deren Folgen, Vorfalle der Iris, und unzureichenden Narben, vorderen Syneschien, Verwachsung der Pupille, Centralknospelstar, Staphyloem etc. Veranlassung geben. Bei diesem dritten, höchsten Grade haben die Kinder in Folge des Schmierens und der Schlaflosigkeit gewöhnlich heisse Haut und Fieber.

Ursachen.

Die Fälle, welche in der Privatpraxis vorkommen, müssen von jenen in den Gebär- und Findelhäusern gesondert betrachtet werden. Das ausserordentlich häufige Vorkommen der Blemorrhoe in den ersten 6—8 Lebenstagen kann unmöglich auf allgemeine Ursachen, grelles Licht, Kälte, unreine Luft, unreinliche Behandlung der Augen etc. allein zurückgeführt werden, indem diese Momente in den folgenden Wochen doch auch noch einigermaassen einwirken, während die Entstehung

einer Blemorrhöe nach überstandenen achten Lebenstage in der Privatpraxis zu den größten Seltenheiten gehört.

Man nimmt deshalb ziemlich allgemein eine Ansteckung durch Menorrhöischen Vaginalschleim beim Durchgange des Kindskopfes durch die Geburtswege an, wobei nicht nothwendig Syphilis im Spiele zu sein braucht. Die Infectionsbedingungen sind dann dieselben wie die eines Trippers, der nach einem unreinen Beischlaf entstanden ist. Nicht jeder Fluor albus erzeugt beim Coitus einen Tripper und noch viel weniger während der Geburt eine Blemorrhöe der Conjunctiva. Wäre das letztere der Fall, so müssten die meisten Neugeborenen erkranken; denn fast alle Weiber haben in den letzten Schwangerschaftswochen eine vermehrte Vaginalsecretion, deren höherer Grad eben eine Vaginalblemorrhöe darstellt. Die Neugeborenen sind übrigens durch die während der Geburt fest zugeklebten Augenlider und eine gehörige Decke von Vernix caseosa gut gegen Ansteckung geschützt, woraus sich der zur Vaginalblemorrhöe der Mutter verhältnissmäßig seltene Zutritt der Conjunctivalblemorrhöe erklären lässt. Dass diese Ansteckungsart während des Durchtrittes des Kindes durch die Geburtswege eine nicht gar intensive ist, geht daraus hervor, dass die neugeborenen Knäbchen niemals einen Harathrenstripper und die Mädchen nie eine Vaginalblemorrhöe in den ersten Lebenstagen acquiriren. Sei dem nun, wie ihm wolle, so viel steht fest, dass wenigstens 80 bis 90 Procente aller Conjunctivalblemorrhöen bei uns auf Neugeborene treffen, und dass innerlich der Geburtsakt selbst als das wichtigste ätiologische Moment zu betrachten ist.

Wo viele Kinder beisammen sind, in Findel- und Gebärhäusern, kommt die Blemorrhöe auch epidemisch vor, besonders, wenn in den Gebärhäusern Puerperalfieber herrscht. Hier ist es um äusserst schwierig zu entscheiden, auf welche Weise die Verbreitung stattfindet. Da man weiss, dass Schwämme, Handtücher, Windeln und die Hände der Wärterinnen, wenn sie mit blemorrhöischem Eiter beschmutzt sind, die Blemorrhöe auch auf gesunde Augen zu übertragen vermögen, so sind der Gelegenheiten zur Ansteckung so viele und mannigfache gegeben, dass man wahrscheinlich nicht die Luft etc. zur Erklärung bedarf.

Die Prognose richtet sich lediglich nach dem Verhalten der Hornhaut. Mögen die Granulationen und Wucherungen der Conjunctiva auch noch so grässlich aussehen, mag die Eimersecretion auch noch so profus sein, alles dies geht spurlos vorüber, die Hornhautveränderungen aber lassen für das ganze Leben ihre Spuren zurück. Je früher die Cornea ergriffen wird, um so grösser ist die Gefahr gänzlicher Zerstörung. Primär oder secundär syphilitische Vaginalblemorrhöen bedingen in der Regel solche intensive Hornhautbetheiligung. Die Geschwulst der Augenlider steht in der Regel in geradem Verhältnisse zur Gefährlichkeit des Processes.

Behandlung.

Eine Prüfung und Kritik der verschiedenen anangefohlenen und von Anderen wieder verworfenen Behandlungsmethoden wird dadurch sehr erschwert, dass erstaunlich viele Blemorrhöen ohne alle Medicamente und ohne minutiöse Reinigung von selbst heilen und keine Hornhautveränderungen zurücklassen.

In München, wo in den untersten Volksklassen eine grosse Sorglosigkeit bezüglich des Aufkommens und Gedehens der Neugeborenen herrscht, kommt es oft genug vor, dass die Mütter 3—4 Wochen alte Kinder mit heftigen Blemorrhöen wegen irgend eines anderen Leidens zum Arzte bringen, und auf genaueres Befragen über die Augenaaffektion ganz naiv bemerken, „es habe sich gleich in den ersten Lebenstagen die Gelbsucht auf die Augen geschlagen, jetzt sei es schon wieder viel besser, am Anfänge aber wären die Augen stark geschwellen gewesen. Der Eiter und blutiges Wasser sei fortwährend über die Wangen heruntergetropft.“ Untersucht man nun solche nicht behandelte Augen, so findet man sehr häufig die Cornea vollkommen rein und intakt. Die Genesung erfolgt ohne alle Behandlung. In andern Fällen freilich findet man zur grossen Bestürzung der Angehörigen beide Bulbi auch vollständig zerstört. Diese Thatsache muss offenbar vorausgeschickt und bei Beurtheilung der am folgenden Heilmethoden im Auge behalten werden.

Als Prophylacticum gegen das Uebergreifen der Blemorrhöe von dem einen erkrankten Auge auf das andere noch gesunde ist ein Schutzverband besonders zu empfehlen. Man bedeckt zu diesem Zwecke das gesunde Auge mit einem leichten Polster von trockener Charpie und hält dasselbe durch mehrfache Heftpflasterstreifen fest. Zweimal täglich muss dieser Verband abgenommen und das Auge genau untersucht werden. Hat sich dennoch auch auf diesem Blemorrhöe eingestellt, so muss behufs der Eiterentfernung dieser Verband, der seinen Zweck hiemit erfüllt hat, ganz weggelassen werden.

Der wesentlichste Theil der ganzen Behandlung besteht in einer gehörigen Reinigung des Auges. In Spitälern und Gehärsäusern, wo die Kinder fortwährend unter der Aufsicht von Sachverständigen sind, bedient man sich am besten eines an der Wand hängenden Wasserbehälters, aus welchem mit einem Cautschukrohr ein Wasserstrahl in das Auge des Kindes geleitet wird. Die Temperatur des Wassers braucht nicht höher als die des Zimmers zu sein. In der Privatpraxis bei ordentlicher Pflege kann man das Wasser auch mittelst eines eng-halsigen Kännchens oder einer Spritze in das Auge bringen, was wenigstens stündlich einmal geschehen muss. Es gehört zu dieser Manipulation schon ziemlich viel Geschick, gewöhnlich spritzen die Wartfrauen das Wasser auf die fest zugedrückten Augenlider und der Eiter bleibt vor wie nach auf dem Bulbus liegen. Bei jeder Reinigung die Lider mittelst Löffelbäl auseinander zu zerren, halte ich für sehr ungesünder, weil dadurch in der kürzesten Zeit ein so gewaltiges Oedem derselben entsteht, dass das obere Augenlid weit über das untere sich hinauseckt, und man auf keine Weise mehr den Bulbus zu Gesicht bekommt. In Anbetracht dieser Schwierigkeiten, und weil die Leute mit dem Spritzen sich gelegentlich auch den blemorrhöischen Eiter in ihr eigenes Auge spritzen, auf welche Weise ein Freund von mir sein Auge durch Blemorrhöe verloren hat, begnüge ich mich damit, einen feinen schon gebrauchten Radeschwamm in scharfkantige Stöckchen zu schneiden und mit diesem die Reinigung halbstündlich oder wenigstens stündlich vornehmen zu lassen. Die Wartfrauen müssen mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand die Lidspalte etwas öffnen und dann mit der scharfen Kante des wohl angefeuchteten Schwamm-

chens die Conjunctiva abtupfen. Es ist das eine Manipulation, die eine jede Person mit gutem Willen lernen kann, die auch vollkommen zur Reinigung der Conjunctiva genügt, und bei der nicht das ganze Kopfkissen und die Ledewäsche des Kindes durchlässt wird, wie dies bei den Einspritzungen zu geschehen pflegt.

Die locale Behandlung. Seit v. Graefe die Cauterisation mit Höllenstein so dringend empfohlen hat, cauterisirt man die blennorrhoeische Conjunctiva fast allenthalben. Vor allem ist dabei zu bemerken, dass man zu einer ordentlichen Cauterisation einen Assistenten nöthig hat, der den Kopf scheinlich fixirt und die zu cauterisirenden Lider auch gehörig instülzt. Zur Cauterisation bedient man sich des gewöhnlichen Höllensteins oder eines aus gleichen Theilen Salpeter und Höllenstein zusammengesetzten mitgiftigen Stiftes. Durch Oel oder Salzwasser muss die Weiterverbreitung des Caeteriums verhütet werden. Nach der Cauterisation wird die Secretion in der Regel etwas vermindert, tritt aber häufig am nächsten Tage nur um so profuser auf. Man cauterisirt nun täglich, oder einen um den andern Tag fort, bis sie nach und nach abnimmt. Es müssen jedesmal beide Augenlider bis zur Orbitalfalte bestrichen werden, weil die Erkrankung eben die ganze Conjunctiva palpebrarum betrifft. Dass diese Behandlungsweise eine sehr schmerzhafte ist und viele Frauen ihre Kinder zu einer zweiten Cauterisation deshalb nicht mehr bringen, kann nicht geleugnet werden. Auch habe ich trotz genau befolgter Vorschriften schon mehrmals Perforation der Cornea entstehen sehen. Die Blennorrhoe der Conjunctiva scheint ein dem Tripper der Harnröhre analoger Process zu sein. Beim Tripper war man vor wenigen Jahren auch von den Höllensteininjectionen ganz enthusiastisch. Jetzt wendet sie Niemand mehr an.

Weniger schmerzhaft und ungefähr von demselben Erfolge ist statt der Cauterisation mit dem Höllensteinstift ein Collyrium von Sublimat oder schwefelsaurem Zink oder Kupfercitrat, von erstem 1 : 1000, von beiden letzteren 2 : 1000 Wasser. Man bringt von diesen Collyrien täglich 6—8 Mal einen Tropfen in den inneren Augwinkel und öffnet dann die Lidspalte ein wenig, wobei der Kopf des Kindes so gelagert sein muss, dass der angebrachte Tropfen vermöge seiner eigenen Schwere in die Lidspalte rinnt. Das souveränste Mittel in den ersten Tagen der Blennorrhoe ist die

Kälte. Anhaltende Kälte auf einer Stelle der Haut erzeugen, ist nicht so leicht als man glaubt. Compressen, in kaltes Wasser getaucht und auf die Haut gelegt, nehmen in der kürzesten Zeit, in weniger als einer Minute, die Temperatur der Haut selbst an. Man müsste sie also in der Stunde 60 Mal, in einem Tage 1440 Mal erneuern, wenn mindestens zwei Personen notwendig wären. Bringt man aber zwischen die einzelnen Blätter der angefeuchteten Compressen 2—3 Stückchen Eis von der Grösse einer Erbse, so werden die schmelzenden Eistückchen 6—10 Minuten dem Auge eine sehr niedrige Temperatur verleihen. Eine so kleine Quantität Eis erzeugt auch beim langsamen Schmelzen nicht so viel Wasser, dass es über das Gesicht herunterflieset, sondern von der Compressen aufgesogen wird. Zur sicheren Wahrung des Rumpfes vor Durchnässung kann man den Hals mit einem trockenen Tuche, das man dann leicht wechseln kann, um-

gaben. Durch unauflöflich fortgesetzte Kälte kann gewöhnlich die wässere Geschwulst der Lider beseitigt und die Binnenhöhle in wässrigen Schranken gehalten werden. Bei fortgesetzter fleißiger Reinigung, einem adstringirenden Augenwasser, und, dauert die profuse Secretion länger, bei Einreibungen von grauer Salbe auf die Stirne wird die Hornhaut selten perforiren. Hahnemannartige Wucherungen an der Umschlagstelle der Conjunctiva, die die Binnenhöhle ausserordentlich lang unterhalten, trägt man am besten mit der Schere ab. Ist Perforation und Irisvorfall eingetreten, so läßt sich wenigstens die Bildung eines Staphyloms durch energische Cauterisation der Hornhaut und anhaltende Compression sicher vermeiden. Bei circumscribten centralen Leukemen kann in späteren Jahren durch künstliche Pupillenbildung das Sehvermögen bedeutend verbessert werden. Ist Ptosis eingetreten, so muß man die Entstellung durch ein künstliches Auge, in deren Anfertigung die Technik jetzt gewaltige Fortschritte gemacht hat, zu heben suchen.

2. Capitel.

Krankheiten des Digestionsapparates.

A. Mundhöhle.

1) Hasenscharte und Wolfzungen. *Labium leporinum.* *Palatum fissum.*

Die Hasenscharte ist eine angeborene Spaltung der Oberlippe, der Wolfzungen eine angeborene Spaltbildung des harten Gaumens. Zum gründlichen Verständniß dieser Bildungsfelder muß man auf die Entwicklungsgeschichte zurückgehen.

So lange beide Oberkiefer in der Mittellinie noch nicht mit den aus dem mittleren Stirnfortsatz entstandenen Maxillarknochen zur Bildung des harten Gaumens verwachsen sind, so lange steht Mund- und Nasenhöhle in weiter offener Communication.

Bei dem Wolfzungen unterbleibt nun diese Verwachsung auf einer Seite, bei der Hasenscharte kommt wohl eine Verwachsung der Knochen zu Stande, scheint aber retardirt worden zu sein, wodurch sich die ursprünglich aus zwei seitlichen und einem Mittelstück entstehende Oberlippe nicht mehr vereinigt, sondern der der verspäteten Verwachsung entsprechende Spalt der Oberlippe sich gleich dem Lippenrande überhäutet und dann zweiträglich nicht mehr verwächst. Aus diesen Angaben erhellt auch, warum niemals eine Hasenscharte in der Mitte der Oberlippe, deren Rima, sondern immer etwas seitlich, in ein Nasenloch mündend, beobachtet wird.

Je nach der Zeit, in welcher während des Fotallebens dieses Bildungshemmniss sich einstellt, haben wir verschiedenen Grade von Spaltungen. Die Spalte des harten Gaumens kann so weit sein, dass man einen Finger bequem hineinlegen und alle Choanen ohne Mühe

übersehen kann. Bei diesem hohen Grade ist fast gar keine Oberlippe zugegen, und ein oder beide Nasenlöcher sind ungeheuer in die Breite gezerrt. Oder der Internasillarknochen kann nach vorn gewuchert sein und bildet unter der Nase einen mit etwas überzogenen Knopf. Zu beiden Seiten dieses Knopfes gehen Lippenpalmen in die Nasenlöcher. Oder es findet sich nur eine schmale Spalte von der Breite eines Messerrückens im harten Gaumen, der entsprechend dann auch die Spalte der Oberlippe weniger klappt. Oder es sind die beiden Oberkiefer vollkommen normal gebildet und nur in der Oberlippe ist eine schmale Spalte, deren Ränder sich fast berühren und entweder bis in ein Nasenloch hinauf, oder bloss bis zur Hälfte der Oberlippe sich erstrecken.

Es gibt Familien, wo mehrere Glieder mit Hasenscharten behaftet sind, so dass man eine Art Prädisposition oder Erblichkeit anzunehmen gezwungen ist.

Die Folgen dieses Uebels sind zum:

1) Erschwertes Saugen, besonders bei gespaltenem Gaumen. Der Akt des Saugens besteht darin, dass die Lippen sich hermetisch um die Brustwarze herum anschliessen, und dass dann durch Erweiterung des Thorax die Luft in der Mundhöhle verdünnt und auf diese Weise die Milch angesaugt wird. Ist nun die Continuität der Lippen unterbrochen, so ist auch ein genaues Anschliessen derselben an die Warze, und damit das Milchsaugen unmöglich. Wenn der harte Gaumen nicht mit gespalten ist, so fassen die Kinder die Warzen statt mit den Lippen zwischen die Kiefer und saugen so ziemlich ungehört. Bei Gegenwart von Wolfzähnen aber sind sie niemals im Stande, sichtlich zu ziehen, die strömenden Brüste entleeren wohl etwas Milch in den Mund, sie fliessen aber zum grössten Theil zur Nase wieder heraus, was durch Hochhalten des Kopfes noch am besten vermieden werden kann.

2) Schiefstellung der Zähne. Werden die Kinder nicht vor Durchbruch der ersten Zähne operirt, oder ist die Operation misslungen, so wachsen die Zähne an der Stelle, wo der Kiefer von den Lippen nicht bedeckt ist, nach auswärts statt nach abwärts, was, besonders bei Gegenwart von Wolfzähnen, eine schandhafte Entstellung des Gesichtes bedingt.

3) Unverständliche Sprache. Einzelne Buchstaben, zu deren Bildung die Oberlippe unumgänglich nöthwendig ist, hauptsächlich B, P, M, W, werden nur undeutlich bei der Hasenscharte, und höchst unvollkommen beim Wolfzahn ausgesprochen. Bei letzterem verlieren übrigens auch alle anderen Consonanten wegen des mangelhaften Gaumens an Deutlichkeit.

Behandlung.

Nur die Operation kann diesen Bildungfehler heben. Ueber die Zeit derselben ist schon viel geschrieben und gestritten worden. Ist die Ernährung des Kindes sehr erschwert, lernt es in den ersten Lebenswochen nicht ordentlich saugen und schlucken, so bleibt es natürlich in seiner Entwicklung zurück, und die Operation muss so schnell als möglich gemacht werden. Ist dies aber nicht der Fall, so wartet man besser bis nach zurückgelegtem vierten Lebensmonat.

Jedenfalls aber muss vor Durchbruch der ersten Zähne operirt werden; denn sowie die Zahnung einmal begonnen, sind die Kinder viel häufigeren Erkrankungen ausgesetzt und der Erfolg ist deshalb ein getrühter. Auch fangen sie nach überstandenen erstem Halbjahre schon an, ihre Hände zu gebrauchen, mit denen sie nach der Operation die Pflaster herunterreissen, an den Nadelspitzen hängen bleiben und den ganzen Erfolg vereiteln können.

Vor der Operation muss das Kind mehrere Stunden wach erhalten werden, damit es nachher in einen um so längeren Schlaf verfällt, und die Brust genommen haben, damit der Durst es nicht zu bald aufweckt. Am besten schlägt man es in ein grosses Leintuch bis zum Hals hinauf fest ein und setzt es einem Assistenten auf den Schooss. Zur Operation bedarf man nichts als ein scharfes Hakeiben, eine scharfe, starke Schere, den Nalapparat und einige Streifen Heftpflaster. Ein zweiter Assistent fasst nun mit Daumen und Zeigefinger den einen Theil der gespaltenen Oberlippe und comprimirt die Gefässe. Der Operateur, der dem Kinde gegenübersitzt, fasst den Rand der Lippe, da wo er in die Spalte nach oben übergeht, mit dem scharfen Hacken, schneidet die Schere längs der Spalte hinauf und trägt mit einem Schnitte den ganzen Rand der Spalte ab. Dasselbe Manoeuvr wird auf der anderen Seite wiederholt. Nach Anfrischung der Ränder werden 2—3 Insektennadeln, die unterste zuerst, angelegt, und mit Fäden umschlungen.

Bei breitem Wolfsrachen, wo fast gar keine Oberlippe vorhanden, muss man die Wangen weit nach hinten vom Knochen trennen, um eine gehörige Strecke dehnbarer Theile zu erzielen. Allenfalls vorstehende Zähne oder Knochenauswüchse müssen schon vor der Operation entfernt und deren Vernarbung muss erst abgewartet werden. Man darf die Fäden nicht zu fest anziehen, weil sonst die Circulation der Wundränder gar zu sehr leidet, und zu wenig Wundsecret ausgeschieden wird. Bei meiner ersten Hasenschartenoperation sag ich, um eine recht exakte Vereinigung zu bewirken, die Fäden sehr fest an, das Kind bekam nach 24 Stunden Trismus und Tetanus, und die Nadeln mussten natürlich so schnell als möglich entfernt werden. Der Trismus schwand hierauf wieder, der Erfolg der Operation war aber vereitelt.

Nach 48—60 Stunden entfernt man die vorher etwas mit Oel bestrichenen Insektennadeln, die Fäden selbst lässt man möglichst lange noch bleiben. Bei doppelten Hasenscharten, mit grossem Mittelstück, sucht man dasselbe zu erhalten. Bei Wolfsrachen, wo häufig der eine Schartenrand kürzer ist als der andere, macht man an dem kürzeren einen Begrenzschnitt, wodurch dann die Wundränder auch gleich lang werden.

Wenn die Operation auch noch so schön gelungen ist, so entsteht mit der Zeit durch Narbencontraktion doch wieder eine seitliche Einkerbung der Oberlippe. Für die fernere Gestaltung des Wolfsrachen ist das Gelingen der Operation von grosser Wichtigkeit. Die zusammengewachsene Oberlippe wirkt fortwährend als ein gelinder Druckverband auf die klaffenden Oefenklaffen, säubert sie mehr und mehr, bis sie endlich sich berühren und die Schleimhaut durch leichtes Cauterisiren oder Anfrischen zur Vereinigung gebracht werden kann.

2) Verengerung des Mundes. Mikrostoma. (σμικρός, klein
στόμα, Mund.)

Eine überaus seltene Krankheit. Die Kinder kommen entweder mit einem sehr kleinen Mund oder mit vollständig verwachsenen Lippen zur Welt, in welcher letzteren Fälle selbstverständlich die Operation der Mundbildung in den ersten Stunden des Lebens vorgenommen werden muss. Häufiger kommt Verengerung des Mundes nach syphilitischen Schleimhautplaques und Geschwüren vor. Es contrahiren sich die Narben mehr und mehr, bis endlich die Einführung eines kleinen Löffels und selbst eines Röhrchens unmöglich wird. Ist die Syphilis durch eine mercurielle Behandlung getilgt, so muss die Mundbildung nach Dieffenbach gemacht werden. Man schneidet zu beiden Seiten des verengerten Mundes ein myriophyllatförmiges Stück Haut aus der Narbe, ohne die Schleimhaut zu verletzen, und bildet hierdurch die zukünftigen Mundwinkel, dann schneidet man mit der Scheere die bisher ganz gelassene Schleimhaut gerade nach dem Winkel hin durch, so dass die Schleimhaut nach aussen gestülpt, mit dem äusseren Wundrand durch Nähte vereinigt werden kann. Sind die Kinder nicht marastisch, was nach überstandener Syphilis freilich ihr gewöhnliches Loos ist, so gelingt die Operation sehr leicht. Im entgegengesetzten Falle heilt die Schleimhaut nicht an, bedeckt sich mit Sprossknospen, und die Kinder gehen atrophisch zu Grunde.

3) Bildungsmangel der Zunge. Defectus linguae.

Statt der oralen Form zeigt die Zunge an ihrer Spitze zuweilen eine Einkerbung und selbst eine tiefere Spalte. Als grösste Rarität findet sich eine vollkommene Spaltung der Zunge, wobei bloss noch am Boden der Mundhöhle zwei etwas bewegliche Warzen oder Leisten bemerkt werden. Die hiemit behafteten Kinder vermögen nach Bednar zu schreien und der Geschmackssinn ist vorhanden sein. Aus der Entwicklungsgeschichte lässt sich dieser Bildungsfehler folgendermassen erklären: die Entwicklung der Zunge geht vom ersten Visceralbogen aus. Wenn nämlich die köstigen Enden der Visceralbogen sich schon in der Mitte erreicht und mit einander vereinigt haben, so bemerkt man an dem unteren Rande der hinteren Fläche des ersten Kiemenbogens, gerade an der Vereinigungsstelle seiner beiden Hälften, die Entwicklung einer kleinen Anschwellung, welche anfangs eine dreieckige, später mehr rundliche Form hat und sich allmählig zu einem nach vorn gebeugten, fleischigen Kegel (der Zunge) ausbildet. Hat aber die Vereinigung der Visceralbogen nicht vollständig und zu rechter Zeit sich eingestellt, so muss auch jener fleischige Kegel, die Zunge, gespalten bleiben, worauf sie in ihrer allgemeinen Entwicklung überhaupt zurückbleibt.

4) Hypertrophie und Vorfall der Zunge. Prolapsus linguae.

Nach der Geburt sieht die Zungenspitze nur wenig zwischen den Lippen vor, das vorragende Stück nimmt aber von Tag zu Tag an Grösse zu, wenn nichts gegen dieses Uebel geschieht. Die Kinder

vermögen nicht zu saugen und sind auch am Schlingen gehindert, weil die Zunge nicht nur nach vorne, sondern auch nach der Breite und Dicke vergrößert ist. Gewöhnlich ist diese Zungenvergrößerung mit Kretinismus verbunden. Kommen die Zähne zum Durchbruch, so verhindert die vorgestreckte Zunge die Schneidezähne am senkrechten Durchbruch und gibt ihnen eine Richtung nach vorne. Durch den Druck der Zähne wird die Infiltration der Zunge immer beträchtlicher, sie excoriirt, wird rissig, der Mundschleim fließt fortwährend über sie hervor, zersetzt sich und verbreitet einen widerlichen Fäulnisgeruch. Bei mehrjährigem Bestande bildet der Unterkiefer eine Rinne, in welcher die geschwulstige, trockne Zunge liegt. Die Unterlippe stülpt sich um, und von artikulirter Sprache kann natürlich nicht die Rede sein.

Erworben kommt dieser Zustand auch bei sonst gut entwickelten Kindern vor, die an häufigen Convulsionen gelitten haben, wodurch eine Schwäche oder partielle Lähmung einzelner Zungenmuskeln zurückbleiben kann.

Behandlung.

Ist das Uebel neu und die Zunge reponibel, so gelingt die Heilung sehr bald, wenn man das vorgestreckte Stück mit etwas Alumpulver oder Tinct. anara betupft. Ist die Zungenspitze aber auf diese Weise nicht zurückzuführen und hat die Schleimhaut schon Risse und Geschwüre, so muss das herausstehende Stück auf chirurgischem Wege entfernt werden. Früher bediente man sich hiezu der Ligatur oder des Messers, jetzt wird die Operation am einfachsten mit dem Escarator, am schnellsten und elegantesten durch Galvanokautik verrichtet.

5) Abnorme Anheftung der Zunge. Adhaesio linguae.

Es gibt Kinder, bei denen das Zungenbändchen kurz und dick weit vorn an der Zungenspitze inserirt ist, wodurch die Zunge in ihrer Bewegung, besonders im Vortreten und Saugen gehindert wird. Auch kommen Knoten und Verdickungen am Zungenbändchen vor, welche denselben Effect ausüben. So beschaffene Bändchen müssen durch einen Scherenschnitt getrennt werden, wenn das Saugen hierbei wirklich beeinträchtigt wird, was gewöhnlich nicht der Fall ist. Das Trennen des Zungenbändchens wird viele hundert Mal ausgeübt, bis es einmal dringend indicirt ist. Da die Operation, von sicherer Hand ausgeführt, durchaus unschädlich ist, so braucht man es bei der Indication nicht so streng zu nehmen, wenn den Angehörigen hienüt eine besondere Bernüßung verschafft werden kann. Die kleine Operation wird auf folgende Weise gemacht: Man lost den Kopf des Kindes, gegen das Fenster gewendet, fixiren, schiebt den Zeigefinger der linken Hand unter die Zunge neben das Zungenbändchen, das hierbei gespannt wird und schneidet nun dasselbe mit einer nach abwärts gerichteten Cooper'schen Schere durch, soweit es membranös ist. Die Blutung ist gleich Null.

Außer dieser Verkürzung des Zungenbändchens kommt aber auch eine wirkliche allgemeine Verwachsung der ganzen unteren Zungenfläche mit dem Boden der Mundhöhle vor, entweder angeboren, als

ein Fortbestehen der embryonischen Verwachsung der Zunge mit dem Mundboden, deren normaler Ueberrest die Schleimhautfalten zu beiden Seiten des Frenulums, die sog. Fäden finestrata, darstellt, oder erworben durch Syphilis und Mercurialgeschwüre. Es ist dies zum Glück ein ziemlich seltenes Ereigniss. Die Trennung der ganzen Zunge mit dem Messer ist eine sehr blutige Operation, und führt, wenn die Nachbehandlung, bestehend in fortwährender Einlegung von Charpiekugeln und häufigen passiven Bewegungen der Zunge, nicht sehr sorgfältig geleitet wird, gewöhnlich nicht zum Ziele. Die Galvanocaustik verspricht günstigere Resultate.

6) Die Ranula.

Unter Ranula, Froschgeschwulst, versteht man eine blasse Geschwulst mit füssigem Inhalt, die sich unter der Zunge am Boden der Mundhöhle vorfindet. Sie kommt entweder nur auf einer oder zu beiden Seiten des Frenulum linguae vor, ihre Grösse schwankt zwischen der einer Erbse und eines Taubeneies, in letzterem Falle ist sie auch von aussen unter dem Kinn zu fühlen. Die sie bedeckende Schleimhaut ist oft so atrophirt, dass die Cystenwandung frei zu Tage liegt. In anderen Fällen hingegen liegt die Geschwulst viel tiefer am vorderen und seitlichen Theile des Halses unter dem Musc. mylohyoideus. Die Folgen dieses Uebels sind je nach der Grösse verschieden. So lange die Geschwulst nicht grösser als eine Erbse ist, macht sie gar keine Erscheinungen. Bei zunehmendem Wachsthum aber wird die Zunge gegen den harten Gaumen gedrängt und hiemit das Saugen, Schlucken und Respiriren erschwert. Im höchsten Grade des Uebels entstehen Stückerfülle, die mit denen des Krup's einige Aehnlichkeit haben können. Gewöhnlich nimmt man an, dass nur auf chirurgischem Wege abgeholfen werden könne, es kommt aber auch eine spontane Heilung durch Vereiterung der Cyste und ihrer Umgebung vor, worüber mich vor kurzem folgender Fall belehrte:

Eine Mutter stürzt athemlos mit ihrem 1½-jährigen Knaaben auf dem Arme in mein Zimmer. Sie erzählt, das Kind sei immer wohl gewesen, habe aber in letzterer Zeit im Schlafe eigenthümlich geröchelt, und seit acht Tagen habe es Stückerfülle, die nach ihrer Meinung mit dem Zahnen zusammenhängen, weil das Kind viel geifere und die Händchen oft zum Munde führe. Während die Frau diese Angaben machte, fing ich an, das Kind zu untersuchen. Die Stirn war heiss, der Puls sehr beschleunigt, die Respiration laut, ähnlich wie bei Krup, der Gesichtsausdruck war leidend und ängstlich. Als ich den Finger in den Mund führte, um die Tonsillen und den Pharynx zu untersuchen, bekam das Kind einen heftigen Stückerfall und als ich deshalb die Zunge mit dem Finger niederdrückte, fühlte ich plötzlich etwas plätzen und das Volumen der Zunge sich vermindern. In demselben Moment floss neben meiner Hand aus dem Boden der Mundhöhle eine schleimige eiterige Flüssigkeit in ziemlicher Menge ab, die aus einer geplatzten Cyste unter der Zunge herrührte. Ich cauterisirte die collabirte Cystenwandung intensiv mit Höllenstein, worauf ein hartnäckiges Geschwür entstand, das sich erst nach mehreren Monaten mit einer weissen Narbe schloss.

Ueber die Natur der Ranula bestehen verschiedene Ansichten. Abgesehen von der etwas zu kühnen Anschauung des alten Paré, der sie von einer kalten, feuchten, klebrigen Materie, die sich vom Gehirne auf die Zunge versetzte, ableitete, hielten die einen sie für eine Balddrüse unbekannter Ursprungs, während die andern eine Verstopfung und nachfolgende Ausdehnung des Ausführungsganges der Submaxillardrüse, des Ductus Whartonianus, annahmen. Diese letztere Ansicht, von Munick's erdacht und von Vielen adoptirt, hat zu gewichtigen Gründen gegen sich, als dass sie fernere Geltung behalten könnte. A priori stünde dieser Anschauung nichts im Wege, sie findet im Gegentheil in der Dacryocystostomatosis eine gerechtfertigte Analogie, die chemische Untersuchung hat aber gezeigt, dass der Inhalt der Ranula kein Speichel ist, indem darin sich Eiweiss findet, das im Speichel nicht vorkommt, während das den Speichel charakterisirende Rhodankalium hier vollkommen mangelt. Die Entgegnung, dass die chemische Zusammensetzung nicht massgebend sein könne, weil der Speichel, lange abgesperrt, neue chemische Körper aufnehmen und ursprüngliche exosmotisch abgeben könne, wird durch das anatomische Messer entkräftet. Man hat nämlich nach Hyrtl neben der Ranula schon den gesunden, nicht erweiterten Speichelgang gefunden. Die Ranula also ist kein erweiterter Ductus Whartonianus, sondern eine Cyste, und da nach Fleischmann sich unter der Zunge ein Schleimbeutel findet, wahrscheinlich ein hydropischer Schleimbeutel, ein Ganglion.

Die Prognose ist nach diesen anatomischen Verhältnissen und nach erfahrungsgründes nicht ungünstig, zumal die erkrankten Stellen leicht zugänglich sind.

Therapie.

Die Behandlung besteht in Abtragung des vorderen Theiles der Cystenwand und öfter wiederholter Canterisation der blossgelegten Höhle mit Hülfsstein. Eine einfache Incision in die Cystenwand und Entleerung des Inhaltes genügt nicht, weil die Cysten grosse Neigung zur Wiederverwachsung haben, die durch den Druck der aufliegenden Zunge nur begünstigt wird. Aus der blossgelegten Höhle entsteht ein sehr torpides Geschwür, das erst auf öfter wiederholte, intensive Canterisation sich langsam schliesst.

7) Die catarrhalische Entzündung der Mundschleimhaut. Stomatitis catarrhalis.

Symptome.

Unter catarrhalischer Stomatitis versteht man Röthung, Schmerz und vermehrte Secretion der Mundschleimhaut. Die Röthung erreicht an Schleimhautstellen, die ein schlaffes und reichliches unterliegendes Bindegewebe haben, einen viel höheren Grad als an solchen, die direkt über den Knochen liegen, z. B. am harten Gaumen, wo sie gewöhnlich nur unbedeutend vermehrt ist. Am intensivsten ist sie auf der Zunge, die wie mit einer dicken Schichte Hindschleim beschichtet aussieht. Wenn der Zustand länger dauert, bedeckt sich die rothe Zunge mit einem weissen Belege. Es tritt hierbei wohl auch Schwellung der

Schleimhaut ein, dieselbe ist aber so gering, dass sie keine Formveränderung der Wangen und Lippen veranlasst, wie dies zum Beispiel bei der Stomatocoe, der Mundfäule, der Fall ist.

Der Schmerz ist hierbei sehr deutlich zu erkennen. Die Kinder saugen ungern, nehmen überhaupt sehr wenig und immer nur kalte Nahrungsmittel zu sich und lassen sich nicht mit dem Finger in den Mund greifen. Da die Stomatitis catarrhalis nur selten idiopathisch, sondern die gewöhnliche Begleiterin anderer, meistens fieberhafter Processen ist, so ist es schwer, ihren Einfluss auf das Allgemeinbefinden zu bestimmen. Reizbare Kinder leiden auch bei einfacher Stomatitis ohne alle weitere Organerkrankung. Wenn die Entzündung sich über die Mundschleimhaut hinaus auch auf den Larynx, die Nasenschleimhaut und die Eustachische Trompete fortpflanzt, so bedingt sie die bekannten Erscheinungen der catarrhalischen Laryngitis, der Coryza und des Catarrhes der Eustachischen Ohrtrompete und der Paukenhöhle, von denen eine jede einzelne schon genügt, Fieberbewegung hervorzurufen. Der Schmerz beim Saugen und Trinken ist zuweilen so gross, dass die Kinder mehrere Tage lang fast gar nichts über die Lippen bringen, wodurch die Ernährung und Entwicklung merklich beeinträchtigt wird.

Die Secretion einer so veränderten Schleimhaut ist immer vermehrt, der Schleim fließt fortwährend über die Mundwinkel herab, erodirt dieselben, röthet das Kinn und durchnässt die Kleider. Dieser Schleim riecht wohl etwas säuerlich, reagirt auch schwach sauer, hat aber nie den ekelhaften Geruch, den man bei wirklichen Eiterungen der Schleimhaut wahrnimmt.

Hat die Rothung und Schmerzhaftigkeit einige Tage bestanden und dauert die Ursache derselben immer noch fort, so erheben sich als wirkliche Exsudation kleine wasserhelle Bläschen auf der Zunge, dem Zahnfleisch und der Lippen- und Wangenschleimhaut, die im Aussehen und Verlauf viel Aehnlichkeit mit dem Herpes labialis haben — Stomatitis ulcerosa. — Dieselben platzen sehr bald und hinterlassen kleine flache Geschwürechen mit gelbbraunem Grunde, welche sich in den ersten Tagen nach allen Richtungen vergrössern, coaguliren und so ziemlich ausgehöhlte geschwürige Flächen, besonders am Zungenrande und an der Schleimhaut der Unterlippen darstellen. Auch diese Bläschen hat man, wie fast alle Krankheiten der Mundhöhle „Aphthen“ genannt, eine Benennung, die eine so heillose Verwirrung in der Bezeichnung der Mundkrankheiten angerichtet hat, dass es rathsam erscheint, sie ganz zu verlassen.

Nachdem diese Geschwüre sich einige Tage vergrössert und bei Berührung heftigen Schmerz verursacht haben, verschwindet die gelbliche Farbe ihres Grundes, derselbe röthet sich wieder und bedeckt sich, wie es scheint, unmittelbar mit Epithel, wenigstens geschieht die Heilung so schnell, oft in 2—3 Tagen, dass man nicht an eine Heilung durch Vernarbung, durch Contraction, denken kann.

Niemals verbreiten diese Geschwüre einen besonders Geruch. Der Athem der damit Behafteten riecht nur sehr schwach säuerlich, niemals ekelhaft wie bei Stomatocoe.

Die gewöhnlichste Veranlassung ist der Durchbruch der Zähne. Die Stomatitis tritt hierbei so regelmäßig auf, dass man sie als physio-

logische bezeichnen muss. Eine weitere häufige Ursache bieten die Sauglappen mit ihrem meist gährenden Inhalt. Bei älteren Kindern zu heisse oder zu kalte Nahrungsmittel, caries Zahnspitzen, gestürzte reizende Speisen, bei manchen Kindern die Antimonial- und Jodpräparate. Sie kommt auch in kleinen Epidemien vor, hauptsächlich im Sommer, vielleicht durch übermässigen Genuss saurer Früchte bedingt und ist übrigens auch die Begleiterin vieler fieberhafter Krankheiten, besonders der acuten Exantheme. —

Therapie.

Die Behandlung ist ausserordentlich einfach. Man entfernt die Ursachen, den Schreier etc., so gut als möglich, schützt die Brust durch ein Stückchen Guttapercha, das unter dem Jäckchen befestigt wird, vor Durchlässigkeit und gibt den Kindern nur kühle Milch und Wasser zu trinken.

Da der übermässig secretirte Schleim rasch sauer wird, so ist es rathsam, die Mundhöhle mit einer schwach alkalischen Lösung, z. B. Borax 1,20 Wasser 30,0, stündlich anzuspülen, damit die überschüssige Säure neutralisirt werde. Die schmerzhaften Geschwüre kann man mit dem Hollensteinpulver auf mehrere Stunden und sogar für immer schmerzlos machen, die Cauterisation selbst aber ist ziemlich schmerzhaft. Nach 8, längstens 14 Tagen tritt spontane Heilung der idiopathischen Stomatitis ein. Die symptomatische Stomatitis bei fieberhaften Krankheiten wird gewöhnlich nicht der Gegenstand einer speciellen Behandlung. —

8) Diphtheritis der Mundhöhle. (ὁ δειπρίος, Haut.)

Unter Diphtheritis oder Diphtherie, Angina membranacea, Angina cancrumosa der Franzosen, versteht man eine erst in den letzten Jahrzehnten wieder häufiger auftretende acute Allgemeinerkrankung, deren auffälligstes Symptom in einer ausgedehnten Membranhildung auf den hinteren Partien der Mundhöhle besteht.

Historische Forschungen haben ergeben, dass die Krankheit keineswegs neu ist, sondern schon Aretäus (zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Chr.) bekannt war. Es liegen ferner verschiedene Schilderungen von Epidemien in Holland (14. Jahrh.), in Paris (16. Jahrh.), in Spanien (17. Jahrh.) vor und in diesem Jahrhundert kam sie am häufigsten in Amerika, dann aber auch in England und Frankreich und zuletzt bei uns in Deutschland und zwar vorherrschend im nördlichen Theile desselben zur Beobachtung.

Man unterscheidet eine primäre und eine secundäre Diphtherie, welche letztere tamentlich zu Masern und Scharlach sich gesellt und sporadisch vorkommen kann, während die primäre fast ohne Ausnahme sich epidemisch zu verbreiten pflegt und entschieden contagios ist.

Symptome.

Die primäre Diphtherie beginnt regelmässig mit Fieber, beträchtlicher Pulsbeschleunigung, Temperaturerhöhung und allgemeiner Abgeschlagenheit. Doch sind diese Erscheinungen bei den verschiedenen Individuen ausserordentlich verschieden stark entwickelt, wie es über-

haupt eine Eigentümlichkeit dieser Krankheit ist, dass ihr ganzes Auftreten und ihr Verlauf unter gleichen Verhältnissen und bei gleichem Lebensalter ein sehr verschiedener ist.

Nachdem diese allgemeinen Erscheinungen einige Stunden, oder längstens 1—2 Tage bestanden, stellen sich die örtlichen Symptome ein. Die Kinder bekommen Schluchgeschwerden, nasale, etwas heisige Stimme und Stiefigkeit des Halses, die beiden erstgenannten Symptome rühren von dem diphtheritischen Belage auf den Mandeln, dem Gaumensegel und der Nasenhöhle, das letzte von der nie fehlenden Drüsenanschwellung der benachbarten Lymphdrüsen des Halses her.

Untersucht man nun bei guter Beleuchtung die Mundhöhle, so sieht man die Schleimhaut der Lippen, des Zahnfleisches, der Wangen und des harten Gaumens vollkommen intakt, das Gaumensegel aber, die Mandeln und die hintere Pharynxwand mit weissen Membranen bedeckt, welche besonders auf den Mandeln die Dicke einer halben und selbst einer ganzen Linie erreichen können. Die Farbe dieser Membranen ist Anfangs vollkommen weiss, geht nach einigen Tagen aber in eine gelblichweisse oder grauweisse über. Wenn durch Arzungen oder unvorsichtige Untersuchung die betroffenen Theile verletzt werden, so entstehen kleine Blutungen, in Folge deren diese Häutchen eine braunrothe, sogar schwarzhäutige Färbung annehmen können. Der Verlauf dieser Membranbildung ist nun je nach dem Charakter der Epidemie ein verschiedener. Es gibt Fälle, wo die Membranen nach 2—3 Tagen sich abheben und die Schleimhaut darunter unverletzt zum Vorschein kommt, dann wieder andere, und diese bilden die Regel, wo die Membranen und ihre Nachschübe 2—3 Wochen bestehen, die Schleimhaut dabei in einen Ulcerationsprocess gezogen wird und erst nach längerer Zeit heilt, und endlich hässliche Fälle, in denen sich abseits Gangrän und allgemeiner Collaps einstellt, so dass die Schleimhaut in schwarzen Fetzen zu Grunde geht. In diesem letzten ungünstigen Falle kommen beträchtliche Zerstörungen zu Stande, wozu gewöhnlich rasch der Tod, nur ganz ausnahmsweise noch Genesung eintritt.

Wenn die Membranen an den genannten Stellen zu sehen sind, so kann über die Diagnose kein Zweifel mehr bestehen. In einzelnen Fällen aber ist auf dem Hintergrund der Mundhöhle nur eine Röthe und leichte Schwellung zu bemerken und doch sind alle subjectiven und die übrigen objectiven Symptome der Diphtherie zugegen. Wir haben es hier mit einem Belage der hinteren Fläche des Gaumensegels und der Nasenhöhle zu thun, was durch Aufheben des Gaumensegels mit einer Pinzette, feilich nur bei Erwachsenen leicht ausführbar, und durch einen profusen, rötlich gefärbten Schleimabfluss aus den Nasenlöchern nachgewiesen werden kann. Dass die vordere Fläche des Gaumensegels ganz frei, hingegen die hintere mit Membranen bedeckt sein kann, habe ich selbst schon öfter bei Sectionen beobachten können. Weiters die gefährlichste und in manchen Epidemien leider auch häufigste Erscheinung ist das Ubergreifen der Membranen auf den Kehlkopf, wovon weiter unten, Capitel Krup, ausführlich gehandelt werden wird.

Die Diphtherie ist keine örtliche Krankheit, denn sonst könnten sich nicht zu gleicher Zeit auch die Vagina, Excreationen an verschie-

deren Hautstellen, die Conjunctiva, zuweilen auch der Anus mit Meibromen bedecken. —

Als die gewöhnlichsten Complicationen und Nachkrankheiten sind zu erwähnen, die Albuminurie und Nephritis, Krup, Bronchitis und Pneumonie, Darmcatarrhe, Myocarditis und endlich eine eigenthümliche Paralyse. Albuminurie soll in schweren Epidemien gleich zu Anfang der Krankheit häufig beobachtet werden, bei den gewöhnlichen Epidemien, wie ich eine solche in München im Jahr 1864 erlebte, ist der Urin Anfangs frei von Eiweiss, sehr arm an Chloriden, dunkel pigmentirt und wird spärlich ausgeschieden. Erst später nach vollständig abgelaufener Diphtherie stellt sich zuweilen eine wirkliche Nephritis ein, die sich bezüglich der Veränderungen im Urin von der nach Scharlach vorkommenden in keiner Weise unterscheidet. Der Urin wird Hütroch, enthält grosse Mengen von Blutkörperchen, Epithel und Fibrincylinder und zeigt beim Kochen einen entsprechend grossen Eiweissniederschlag. Während aber bei Nephritis nach Scharlach sich Anasarca und Hüllenwassersucht schnell und in bedenklich hohem Grade einstellen, schwellen hier die Extremitäten in der Regel gar nicht an und die Wassersucht der grossen serösen Säcke wird nach seltener beobachtet. Der gewöhnliche Ausgang dieser Nephritis ist Genesung, welche jedoch Monate lang auf sich warten lässt und erst nach einer Besorgniss erregenden allgemeinen Abmagerung unter allmählicher Abnahme des Eiweisses eintritt. Der Mangel des Hydrops wird sich wohl am einfachsten durch die Annahme erklären, dass im Scharlach fast immer beide Nieren erkranken, bei Diphtherie aber wahrscheinlich nur die eine ergriffen wird, während die andere in normalen Verhältnissen bleibt und dadurch den Hydrops verhältet.

Bronchitis und Pneumonie als Complicationen der Diphtherie werden zweckmässiger beim Krup besprochen werden.

Die Myocarditis, der microscopische Zerfall des Herzmuskels, ist bei plötzlich Verstorbenen ein ziemlich regelmässiger anatomischer Befund, der in jeder beträchtlicheren Epidemie ab und zu einmal vorkommt.

Die Darmcatarrhe während und nach der Diphtherie sind bei kleineren Kindern, welche noch in der Zahnung begriffen sind, oft von besonders langer Dauer und führen häufig unter zunehmender Anämie zum Tode.

Die diphtheritische Lähmung ist ganz eigenthümlicher Natur, ihr Zusammenhang mit der Diphtherie war schon Glazi 1749 und Brotonneau 1826 bekannt. Was die Frequenz dieser Erscheinung betrifft, so ist dieselbe in den verschiedenen Epidemien eine sehr verschiedene. In einzelnen Epidemien sollen fast alle Reconvalescenten Lähmungssymptome zeigen, in andern, z. B. in den von mir beobachteten, wieder nur ein kleiner Theil derselben. Die Zeit des Auftretens fällt meist in die dritte oder vierte Woche nach Beginn der Krankheit, nicht leicht früher, zuweilen aber bedenkend später, so dass die Kinder 6 bis 8 Wochen lang scheinend vollkommen wohl sein und doch noch plötzlich von der Lähmung befallen werden können. Sie beginnt fast ohne Ausnahme am Gaumensegel. Die Kinder bekommen mit einem Male eine undeutliche, nieselnde Sprache, wie sie bei Menschen mit angeborenem oder durch Syphilis erworbenem Defekt des Gaumensegels

beobachtet wird, und namentlich wird die Aussprache der Gaumenlaute beeinträchtigt. Zu gleicher Zeit stellen sich Schlingbeschwerden ein, und ein Theil der genossenen Getränke fließt mit oder ohne Hustenreiz zur Nase wieder heraus. In den meisten Fällen bleibt die Lähmung auf diesen kleinen Raum beschränkt, das Allgemeinbefinden ist mit Ausnahme einer auffallenden Blässe nicht getrübt, und der gewöhnliche Ausgang ist nach einigen Wochen eine plötzliche Genesung. Viel schlimmer gestaltet sich die Prognose, wenn auch die Extremitäten gelähmt werden, und bei der Lähmung der Muskeln des Rumpfes tritt in Folge der erschwerten, mühsamen Respiration gewöhnlich der Tod ein. Die Lähmung der Extremitäten betrifft häufiger die unteren als die oberen, ist meist doppelseitig und unterscheidet sich in nichts von der nach Typhus oder Scharlach eintretenden.

Eigenthümlich ist schließlich noch die diphtheritische Amaurose. Die Erblindung ist keine vollständige, sondern besteht nur in einer Schwäche, so dass kleinere Gegenstände nicht mehr genau erkannt werden. Ophthalmoscopisch lassen sich keine constanten Veränderungen nachweisen und die Spezialisten nehmen nach Donders' Vorgang eine Lähmung der Mm. sphincter iridis und des tensor choroidae an. Auch dieses Uebel verschwindet in der Regel in einigen Wochen vollständig. Recidive dieser sämtlichen Lähmungssymptome sind beobachtet worden, scheinen jedoch selten zu sein.

Pathologische Anatomie.

Der wesentlichste pathologisch anatomische Befund besteht immer im Nachweis der Membranen, welche sich am häufigsten an den hinteren Partien der Mundhöhle, im Rachen und Kehlkopf finden. Sie sind gewöhnlich gelblich weiss, werden aber in der Leiche, besonders bei geöffnetem Munde bald dunkelgelb, braun oder schwärzlich in Folge der Verrottung. Sie lassen sich bald leicht, bald schwer von der unterliegenden Schleimhaut entfernen, und die letztere zeigt in der Regel keinen Substanzverlust, sondern bloss einen Verlust ihres natürlichen Glanzes. Die mikroskopische Untersuchung der Membranen liefert wenig Prägnantes. In der Hauptmasse bestehen dieselben aus Körnchen, Micrococcen, Kernen und Zellen, einzelnen Epithelien und Fibrinstreifen. Von den Veränderungen des Larynx und der Lungen weiter unten.

Therapie.

Ueber die Behandlung der Diphtherie herrschen die verschiedensten, geradezu sich widersprechenden Ansichten, woraus allein schon hervorgeht, dass alle bisher angewandten Mittel von zweifelhaftem Erfolge sind. Da man den Sitz der Krankheit mit den Augen und Händen kaum erreichen kann, so ist von jeder eine örtliche Behandlung angestrebt und empfohlen worden. Es gibt kein Aetzmittel, das hiergegen noch nicht versucht worden wäre. Den grössten Ruf unter denselben hat sich der Höllenstein und die Salzsäure erworben. In neuester Zeit unterliessen einige bedeutende englische Aerzte diese Aetzungen ganz und fanden, dass sich ihre therapeutischen Resultate in keinem Falle verschlimmerten, ja sogar etwas günstiger gestalteten. Auf diese Beobachtung hin habe auch ich seit mehreren Jahren die Aetzungen der

Rachenhöhle vollständig verbannt und mich in vielen 100 Fällen von der Richtigkeit jener Angaben überzeugt. Ich kann mit gutem Gewissen und zum Wohle der viel gequälten diphtheritischen Kinder erklären, dass die Aetzungen mit den bisher üblichen Mitteln keinen günstigen Einfluss auf den lokalen Verlauf haben. Bei grösseren, über fünf Jahre alten Kindern lasse ich mit dem jetzt so sehr vereinfachten Pulverisator reines Kalkwasser täglich 5—6 Mal mindestens fünf Minuten lang einathmen und habe bei dieser schonenden Behandlung, zu welcher man die Kinder in diesem Alter auch in Guss bringen kann, auffallend günstige Resultate gesehen. Weber in Darmstadt empfiehlt halbstündlich wiederholte Inhalationen von Milchsäure gut. xx auf 15.0 Wasser. Einblasen von gewöhnlichen, nicht gereinigten Schwefelblumen mittels eines Federkies in die Rachenhöhle leistet zuweilen auffallend gute Dienste. Es hat diess Verfahren den Vortheil, dass es auch bei kleineren Kindern, welche noch nicht zu Inhalationen zu bringen sind, leicht ausführbar ist. Intern gebe ich seit Jahren nichts als chloresaurer Kali, bei Kindern unter einem Jahr 0.5—1.25, von 1—3 Jahren 2.0, von 3—5 Jahren 2.5, bei älteren Kindern 4.0 in 24 Stunden, gelöst in einigen Unzen Wasser. Wenn Durchfall oder grosse Unruhe vorhanden, wird zweckmässig eine entsprechende Dosis Opium oder Morphinum zugesetzt. Das von den Franzosen als specifisch gerühmte kohlensaure Natron zu 4.0 pro die hat sich bei uns keineswegs bewährt und steht in seiner Wirkung dem Kali chloricum jedenfalls weit nach. Bei beginnendem Verfall der Kräfte muss man durch Wein, China, Campher, Castoreum etc. das Leben zu fristen suchen. Ueber die Behandlung des diphtheritischen Krups weiter unten bei den Kehlkopfkrankheiten. —

9) Die Mundfäule, Stomatocoe.

Den ersten Anfang der Stomatocoe hatte ich noch nie Gelegenheit zu sehen, und kann also den Angaben der Autoren, nach welchen zuerst eine catarrhalische Stomatitis vorhanden sein soll, weder beistimmen noch entgegenstellen. Die einmal entwickelte Stomatocoe — nur wegen dieser wird gewöhnlich Hilfe gesucht — hat folgende Symptome:

Der Rand des Zahnfleisches ist an einzelnen Stellen gelb, mit einer dünnen Schichte gelben Schleimes bedeckt und der scharfe Rand desselben ist nicht mehr vorhanden, so dass die Zähne etwas grösser erscheinen. Eine leichte Berührung solchen Zahnfleisches verursacht eine Rötung der geschwollenen Partien. Trotz der geringen Ausdehnung der Geschwüre erkennt man sie schon bei einer Entfernung von mehreren Zollen durch den Geruchssinn. Die Stomatocoe entwickelt immer einen eigenthümlichen fétiden Geruch, und dieser Geruch ist es, der sie mit Bestimmtheit und Leichtigkeit von höheren Graden der catarrhalischen Stomatitis, wo es nach dem Platzen der Bläschen auch zu fachen gelben Geschwüren kommt, unterscheiden lässt.

Bei diesem, dem ersten Grade der Stomatocoe ist die Mundschleimhaut nur wenig geschwollen, und ihre Secretion nicht bedeutend vermehrt.

Beim zweiten höheren Grade werden die dem Zahnfleisch anliegenden Theile durch Contact angesteckt und erleiden dieselben Ver-

änderungen, wie dasselbe. Die Wangenschleimhaut schwillt bedeutend an, so dass man den Eindruck der einzelnen Zähne in ihr deutlich erkennen kann, ebenso die Schleimhaut der Zunge, welche an ihrer Oberfläche einen weissen Beleg und an ihren Rändern ebenfalls die Zahnindrücke zeigt, Taf. III, Fig. 1 schematische Contour einer solchen Zunge. Ueberdies wird ihre ganze Peripherie in Folge der Schwellung und der Compression der oberen und unteren Zahnreihe scharfkantig. Es entstehen nun schnell an der Wange, den Lippen und der Zunge dieselben gelben Geschwüre, wie sie ursprünglich nur am Zahnfleisch waren. Die Geschwulst nimmt rasch zu. In Folge derselben können die Kinder den Mund nicht mehr schliessen, sie öffnen nicht nur die Lippen, sondern auch die Kiefer, um jede Berührung und Reibung der höchst schmerzhaften Geschwüre zu vermeiden, und ein beständiger, faulig riechender Speichel fliesst ihnen in grosser Menge über die geschwollene Unterlippe herab. Fast ebenso regelmässig wie bei Diphtheritis tritt schwellen auch hier die Halsdrüsen schmerzhaft an. Menstruation auf den Geschwüren konnte ich niemals bemerken. Ihre Neigung zur spontanen Heilung ist eine sehr geringe, die Geschwulst, die Geschwüre und der Geruch können unbehandelt Monate lang bestehen, die Zähne werden dabei locker und fallen aus und die Kinder atrophiren bedenklich. Endlich nach langer Zeit scheint spontane Heilung einzutreten.

Das Schlucken, Kauen und Sprechen werden bei höherem Grade fast ganz unmöglich, die Kinder trinken lange Zeit nichts, bis der Durst quälend wird, worauf sie grosse Quantitäten kaltes Wasser oder kalte Milch unter deutlichen Schmerzmässigerungen auf einmal zu sich nehmen. Bei grösseren Kindern tritt gewöhnlich kein Fieber ein, der Schmerz aber bei jeder Bewegung des Mundes und besonders auch beim Schlucken macht sie im höchsten Grade missmuthig.

Die Aetiologie ist eine mehrfache. Vor allem ist die Ansteckung häufig zu constatiren. Die Kinder einer Familie, oder die Nachbarn auf den Schulbänken theilen sich die Stomatitis sehr leicht mit. Ein Incubationsstadium, wie bei den Exanthemen, scheint hier gar nicht oder nur kurze Zeit zu bestehen, wenigstens habe ich in Familien immer ein ziemlich gleichzeitiges Auftreten beobachtet. Ausserdem kann sie auch bei Kindern wie bei Erwachsenen spontan eintreten, wobei cariöse Zähne ein prädisponirendes Moment sind, und endlich wird durch innerlichen und äusserlichen Gebrauch des Quecksilbers bei Kindern eine Mundkrankheit erzeugt, die von der eben beschriebenen Stomatitis in keiner Beziehung zu unterscheiden ist, es sei denn, dass der Mangel der Ansteckungsfähigkeit der sogenannten Stomatitis mercurialis als differentiales Merkmal geltend gemacht werden soll. Auf Quecksilber treten bei Kindern die Mundschleimhautkrankheiten viel später und seltener auf, als bei Erwachsenen. Auf äussere Application in Form der grauen Salbe, die ich seit vielen Jahren bei allen syphilitischen Kindern anwende, wenn anders die Beschaffenheit der Haut es zulässt, sah ich noch niemals Stomatitis eintreten. Salivation ist bei kleinen Kindern ein ausserordentlich seltenes Ereigniss.

Behandlung.

Wir sind so glücklich, gegen die Stomatocoe nur ein Mittel zu besitzen, womit schon genug zu dessen Entzündung gesagt ist. Es ist dies das chloresäure Kali, Kalichlorium, in der im vorigen Abschnitte angegebenen Dosirung von 0,6—4,0 pro die. Die verschiedenen Quantitäten werden jedesmal in 120,0 Wasser gelöst, mit einem Syrup versetzt, und im Verlaufe von 12—18 Stunden gereicht. Nach dieser Zeit ist in allen Fällen und bei jedem Grade von Stomatocoe der Geruch vollständig verschwunden. Bei geringer Ausdehnung der Geschwüre tritt sofort Heilung ein, das Zahnfleisch wird wieder fest, der gelbe Rand stösst sich ab, man kann durch Berührung mit dem Finger keine Blutung mehr verursachen und die Kinder können wieder ohne Schmerzen sprechen und kauen. Bei höherem Grade genügt der eintägige Gebrauch des chloresäuren Kali's wohl auch zur Tilgung des Geruches vollständig, wenn man dasselbe aber nicht 3 bis 4 Tage lang fortsetzt, so kehrt er wieder und die Krankheit macht neue Fortschritte. Länger als vier Tage habe ich dieses Mittel noch nie angewendet. Anderweitige Wirkungen, Diarrhöe, Appetitmangel, Leibschmerz, Störungen der Digestion etc., konnte ich trotz mehr als hundertförmigem Gebrauche noch nie beobachten, und bin deshalb auch noch gar nicht dazu gekommen, diese Lösung statt schlucken nur gurgeln zu lassen, zumal die Kinder sich sehr ungeschickt zum Gurgeln stellen und auch die grösseren nur mit Mühe dazu zu bringen sind. Die Contamination der nicht mehr riechenden und dann auch nicht mehr schmerzenden Geschwüre an den Wangen und der Zunge ist durchaus unnöthig, indem die Heilung ohnedies ausserordentlich rasch erfolgt. Früher glaubte man, die kariösen Zähne, deren sich bei Kindern vor Beginn der zweiten Dentition oft eine bedeutende Zahl findet, müssten alle herausgenommen werden, damit Heilung eintreten könne. Es ist dies keineswegs töthig und sogar direct schädlich, weil die gepulverten Zahnfleischründer in der Nähe des extrahirten Zahnes sogleich wieder von Stomatocoe ergriffen und so der Schmerz und die eiternden Flächen nur vergrößert werden. Eine örtliche Behandlung ist bei dieser innerlichen Darreichung des Kali chloricum durchaus überflüssig.

10) Die scorbutische Entzündung der Mundschleimhaut.

Unter Scorbut versteht man eine ausgedehnte Erkrankung der Capillaren, welche an verschiedenen Stellen eintreten und je nach der Menge der Continuitätsstörungen grössere oder kleinere Mengen Blut in das nächstgelegene Gewebe austreten lassen. Ob hieran die chemische Beschaffenheit des Blutes Schuld ist, lässt sich nicht ermitteln, nur so viel weiss man, dass der Faserstoff des scorbutischen Blutes langsamer gerinnt, als der des normalen.

Diese Blutungen finden nun auch in der Mundhöhle in so charakteristischer Weise statt, dass man aus ihrer Beschaffenheit allein schon auf die Gegenwart und den Grad des Scorbutes schliessen kann.

Ich kann aus Erfahrung nur von unserem Landescorbut referiren, wie sich die Kinder gegen den Seescorbut verhalten, liegt ausser meinem Bereiche. Ein gesundes wohl genährtes Kind in guter Wohnung bekommt niemals Scorbut. Bei der wohlhabenden Klasse kommt

derselbe nur in Folge eben überstandener schwerer langwieriger Krankheiten, namentlich nach Abdominaltyphus vor, in der untern Mitteln Klasse werden in feuchten Wohnungen und bei schlechter Kost ganze Familien scorbutisch.

Symptome.

Gewöhnlich geht schon längere Zeit Blässe, Abmagerung, Traurigkeit oder auch ein langwieriger Typhus dem Ausbruch des Scorbutus voraus. Hierauf fängt das Zahnfleisch an beim Kaen zu schmerzen und ist zu kleinen Blutungen sehr geneigt. Der äussere Zahnfleischrand liegt nicht mehr fest an den Zähnen an, ist etwas geschwellen und von einer bläulichen Farbe, an einzelnen Stellen finden sich Defecte der Schleimhaut.

Die übrige Schleimhaut am harten Gaumen und an den Wangen ist nicht von catarrhalischer Stomatitis ergriffen, sondern vielmehr blass und anämisch. Der Geruch aus dem Munde ist auch hier ein ziemlich intensiver, lässt sich aber deutlich von dem der Stomatose unterscheiden.

Bei länger bestehendem Prozesse bildet der Zahnfleischrand nur bläurothe Wülste mit kleinen Excrescenzen besetzt, und blutet bei der leisesten Berührung. Die Zähne sind mit einem gelben Schleim beschlagen, den ganzen Tag fliesst braunrother überflüssiger Speichel aus dem Munde, und es erscheinen nun grössere und kleinere Ecchymosen auf der Schleimhaut der Zunge, der Wangen und Lippen, welche an einzelnen Stellen wieder resorbirt werden, an anderen aber platzen und fungöse Geschwüre mit leicht blutendem Grunde darstellen. Unter günstigen Verhältnissen bilden sich alle diese Veränderungen, wenn auch meist nur sehr langsam, wieder zurück, das Zahnfleisch behält noch lange Zeit seine Neigung zu Blutungen, bestehen aber die ungünstigen westlichen Momente fort, so nehmen die scorbutischen Symptome mehr zu, die Zähne fallen aus, ganze Stücke Zahnfleisch stossen sich brandig ab, die ecchymotischen unteren Extremitäten werden ödematös, es tritt allgemeiner Hydrops ein und die Kinder gehen anämisch zu Grunde.

Therapie.

Die Behandlung des idiopathischen nur durch öfters Verhältnisse entstandenen Scorbutus ist sehr einfach, wenn man im Stande ist, diese Verhältnisse zu verbessern, wenn man die Kinder in eine trockene gut ventilirte Wohnung bringen und ihnen eine reinliche Pflege und gute, zum Theil animalische Kost verschaffen kann. Im entgegengesetzten Falle hingegen lassen uns alle angepriesenen Mittel im Stiche. Es kommen hier wohl auch Genesungen vor, besonders wenn bei wärmerer Jahreszeit die Kinder wenigstens auf der Strasse frische Luft geniessen können. Als eines der beliebtesten Heilmittel wird der Citronensaft oder eine Pflanzensäure überhaupt empfohlen. Die Mundaffection wird mit adstringirenden Gurgelwässern, bestehend aus Alum, Eichenrinde, Ratanhja, Catechu etc., denen man sehr vortheilhaft einige Tropfen Myrrhainktur mischt, bekämpft. Profusere Blutungen sucht man durch Liqueur ferri sesquichlorati, oder durch Cauterisation mit Höllenstein oder concentrirter Salzsäure zu stillen. Bei gangränöser

Zerstörung muss man durch Chinin, Wein, excitirende Mittel und gute Ernährung die Kräfte möglichst aufrecht zu erhalten suchen. Scorbut nach Typhus ist eine der übelsten Typhuscomplicationen. Bei der darniederliegenden Resorption schlagen in der Regel die Ernährungsversuche fehl. —

11) Die Noma ($\chi \nu \alpha \mu \alpha$, fressendes Geschwür).

Unter Noma, Wasserkrebs, Cancer aquaticus, Gangraena oris, Stomatocrosis versteht man einen Brand der Wange, der unter so eigenartigen und constanten Erscheinungen zu Stande kommt, dass er als eine specielle Art von Gangrän eine separate Beschreibung und Bezeichnung erfordert. Unseren alten Autoren scheint dieselbe nicht bekannt gewesen zu sein, die erste Arbeit hierüber hat Battus, ein holländischer Arzt, zu Anfang des 17. Jahrhunderts geliefert.

Die Noma kommt fast nur bei Kindern von 2—12 Jahren vor. Säuglinge scheinen ganz von ihr verschont zu bleiben. Erwachsene werden auch nur ausserordentlich selten davon ergriffen, viele Ärzte haben sie bei diesen nie beobachtet. Immer geht eine längere, fieberhafte Krankheit, Scharlach, Masern oder Typhus der Noma voraus, und es ist kein Beispiel bekannt, dass ein vorher ganz gesundes Kind daran erkrankt wäre. Epidemisch tritt sie nicht auf, in südlichen Ländern soll sie gar nicht vorkommen, am häufigsten scheint sie in Holland zu sein, Mädchen erkranken öfter daran als Knaben, und fast immer wird nur eine Gesichtshälfte ergriffen.

Symptome.

Der Sitz der Noma ist immer die Wange und zwar der dem Mundwinkel zunächst gelegene Theil derselben. Nur ein einziges Mal sah ich eine acute, rasch um sich greifende Gangrän in der Vertiefung unter dem Ohrflüppchen entstehen, welche wie die gewöhnliche Noma rasch in die Tiefe der Parotis und seitwärts auf die Wangen, den Hals und das Ohrflüppchen übergreif und in wenigen Tagen zum tödlichen Ende fuhrte. Man fühlt gewöhnlich bei einem im besten Reconvalescenz begriffenen Kinde eine ziemlich genau umschriebene harte Stelle in der Wange nahe dem Mundwinkel, wobei das Kind keinen lebhaften Schmerz äussert. Besichtigt man die Mundhöhle, so sieht man nur ganz ausnahmsweise eine der Härte entsprechende, jucklige Blase, gewöhnlich ist dieselbe schon geplatzt und es zeigt sich die Schleimhaut zu braunschwarzen Fetzen zerfallen.

Die Wange schwillt an und wird edematös, das Oedem erstreckt sich über die ganze Gesichtshälfte, auch die nächst gelegenen Halsdrüsen werden infiltrirt. Die Haut ist dabei nicht geröthet, sondern blass, wachsartig, glänzend. Der innern Zerstörung entsprechend wird die äussere Haut an der Stelle der ersten Härte blau, die Epidermis löst sich bei leiser Berührung ab und es zeigt sich, dass die Gangrän von innen nach aussen fortschreitend, an der Cutis angelangt ist. Das brandige Stück Wange, am Anfang kaum von Groschengrösse, contrahirt sich durch Vertrocknung, es entsteht ein braunrother Graben zwischen der lebenden und necrosirten Haut, und dieser Graben dehnt sich peripherisch mehr und mehr aus, so dass von Stunde zu Stunde

die brandigen Parthien an Umfang zunehmen. Der Brand erstreckt sich weiter und weiter, bis er in manchen Fällen die ganze Wange bis zum Augapfel, zum Ohr und zur Halsgegend ergriffen hat, und die Kinder das ekelhafte Bild einer grünen Zerstörung bieten. Nicht nur nach aussen dehnt sich die Noma aus, sondern sie greift auch tief in die Kieferknochen, der Ober- und zuweilen auch der Unterkiefer werden rasch nekrotisch, die Zähne fallen aus und nach wenigen Tagen ist die Nekrose so vollendet, dass man grosse Knochenstücke mit der Kornzange entfernen kann. Aus der wenig empfindlichen, unregelmässigen Geschwürsfläche ergiesst sich eine cadaverös stinkende, blutige Jauche. Die Ränder der gesunden Parthien sind hart und geröthet, zuweilen führen einige Linsen vom Brande entfernt auf der scheinbar noch gesunden Wange Jaucheblassen auf, das unterliegende Gewebe mortificirt rasch und die Ränder des alten und neuen Brandgeschwüres nähern sich mehr und mehr, bis sie endlich eine um so grössere Brandfläche bilden. Untersucht man die brandigen Theile, so findet man viel freies Fett, Spuren von Muskeln, die Nerven sind weissgelb und die Gefässe mit Thromben erfüllt. Die Thrombose scheint sehr frühzeitig und in hohem Grade einzutreten, denn Blutungen kommen ausserordentlich selten vor. In 3—6 Tagen gehen alle diese grossartigen Zerstörungen vor sich.

Allgemeine Erscheinungen und Fieber sind zu Anfang unbedeutend und treten erst als Folge der örtlichen Zerstörung und der Jaucheresorption ein, bald aber stellen sich Durchfälle colligativer Art, Ohnmachten, Sopor oder Delirien ein und zuweilen schwellen zum Schluss noch die Füsse ödematös an. In der Leiche findet man ausserdem häufig lobuläre Pneumonie, welche zu Lungen bei dem tiefen Ergriffensein des ganzen Organismus nur wenige subjective und objective Symptome geboten hat. Die Diagnose der Noma ist leicht. Von allen anderen Arten von Stomatitiden unterscheidet sie sich durch das schnelle Ergriffenwerden der äusseren Bedeckung und das rasche Umsichgreifen des Brandes. Die Prognose ist sehr übel. Unter fünf Fällen, die ich zu beobachten hatte, ist nur einer genesen, und zwar mit einem schmerzhaften Defect der Wange und Nase, der erst nach mehrfachen plastischen Operationen und nur mit grosser Verzerrung der Nachbartheile gedeckt werden konnte. Nach einer Zusammenstellung von Tourdes sind von 238 Fällen 63 genesen.

Behandlung.

Zur Verminderung des Geraches gibt man auch hier wieder das chlorsaure Kali in der bei der Stomatite angegebenen Weise. Die Wirkung desselben ist aber keine edulante, der Brand macht seine Fortschritte und der Geruch wird nur wenig gemindert. Zur möglichsten Verminderung desselben ist es nöthwendig, die Kinder täglich zu baden und mehrmals ihre Kleider zu wechseln, weil sie an dieselben ihre mit Jauche beschmutzten Hände fortwährend abwischen. Durch Cantharisation der dem brandigen zunächst gelegenen gesunden Theile muss man den Fortschritt des Brandes aufzuhalten suchen. Als das passendste Acetmittel empfiehlt sich die concentrirte Salzsäure, womit täglich 2—3 Mal der ganze Rand der Noma zussen und innen bepinselt werden muss. Das Kind werde hierbei gut fixirt; denn der Schmerz ist

sehr heftig und an der Schleimhautfläche der Noma muss mit kleinen Schwämmchen jedesmal die überflüssige Salzsäure abgetupft werden. Auf diese Weise gelingt es in einzelnen Fällen, dem Uebel Einhalt zu thun. Der Brand macht aber meistens unumfängliche Fortschritte und die Kinder sterben nach 2—14 Tagen unter den oben angegebenen Symptomen. Mit der ebreirenden Behandlung, Wein, Dett. China, Eier etc. lässt sich bei diesen Kindern nicht viel anrichten, indem sie gewöhnlich nichts dergleichen nehmen, am liebsten verstehen sie sich noch zu Milch oder Kaffee, wovon man ihnen möglichst oft und möglichst viel herzubringen sucht.

12) Der Soor.

Unter Soor, Mehlmaul, Schwämmchen, Mundsohr, Muguet, Blanche, Stomatitis pseudomembranacea, Stomatitis cronaca, Aphthophyta, unter allen diesen vielen Bezeichnungen versteht man nur einen Process, nämlich die Bildung weisser Membranen in der Mundhöhle, welche mikroskopisch 1) aus einer Körnermasse, 2) aus Pflasterepithel und 3) aus Pilzen und ihren verschiedenen Entwicklungsstufen bestehen (Tafel III, Fig. 2). Robin hat diesen Pilz *Oidium albicans* genannt. Obwohl nun diese Krankheit ausserordentlich häufig vorkommt und sich jedem Arzte fast täglich zur Untersuchung aufdrängt, obwohl die Mundhöhle allen Sinnes zugänglich ist, so findet man doch die Angabe der verschiedenen Autoren bis auf den heutigen Tag in vieler Beziehung differirend.

Der Soor befällt vorzugsweise kleine Kinder in den ersten Lebensmonaten, wird aber in einzelnen Fällen auch bei ein- und mehrjährigen Kindern und ausserdem auch bei kachektischen erwachsenen Individuen, namentlich Tuberculösen und Krebskranken, beobachtet.

Symptome.

Zuerst verändert sich die natürliche bethrothe Farbe der Mundhöhle: es tritt eine tief dunkelrothe an ihre Stelle, ungefähr so als wenn man eine dicke Schichte Himbeersyrup auf die Schleimhaut aufgeschüttet hätte. Diese Farbenveränderung findet sich nie in Form von Flecken oder Inseln, sondern ist gleichmässig über die ganze Mundhöhle ausgedehnt. Nur am harten Gaumen, wo die Schleimhaut fest mit dem Knochen verwachsen ist, und am Rande des Unterkiefers, wo die dem Durchbruche nahen Zähne eine bedeutende Ausdehnung und Spannung der darüberliegenden Schleimhaut verursachen, kann keine so beträchtliche Erweiterung der Capillaren stattfinden, und es ist deshalb die Röthe hier weniger entwickelt; zuweilen steht der ganze harte Gaumen ziemlich grell mit seiner gelbrothen Farbe von der übrigen dunkelrothen Schleimhaut ab. Die Zunge ist am dunkelsten gefärbt, und ihre Papillen, besonders die an den Basillen, ragen etwas mehr hervor. Die Temperatur der Mundhöhle ist hierbei dem Gefühle nach erhöht, exacte Thermometermessungen lassen sich in der Mundhöhle eines Kindes schwer anstellen. Zu gleicher Zeit wird die Berührung der Mundhöhle schmerzhaft, was die Kinder zu erkennen geben, indem sie, wenn man ihnen einen Finger in den Mund steckt,

nicht wie gewöhnlich daran saugen, sondern unwillig durch Hin- und Herwenden des Kopfes den Finger zu entfernen suchen. Aus gleichem Grunde setzen sie beim Sagen häufig ab und ruhen von dem durch die Schlagbewegungen hervorgerufenen Schmerz der entzündeten Schleimhaut einige Momente aus.

Ferner tritt eine Anomalie in den Secretionen der Mundhöhle auf. Die Schleimhaut verliert ihre Schlüpfrigkeit, fühlt sich klebrig an und saugt ein aufgelegtes Stückchen Filterpapier fest an, während ein solches auf einer normalen Schleimhaut nicht leicht haften bleibt. Höchst wichtig und massgebend für die Anschauung des ganzen Krankheitsprocesses ist die schon deutlich saure Reaction des Mundsecretes zu einer Zeit, wo noch keine anderen als die eben angeführten Veränderungen der Schleimhaut wahrgenommen werden können.

Wir haben in der Mundhöhle ein Gemisch von zweierlei Drüsensecreten, dem der Speichel- und dem der Schleimdrüsen. Reines Speicheldrüsensecret reagirt immer alkalisch und zwar am deutlichsten unmittelbar nach dem Essen, am undeutlichsten im nüchternen Zustande. Das Secret der Schleimdrüsen wird sehr bald sauer und diese saure Reaction zeigt sich beim Stichtlassen des frischen Schleimes immer deutlicher, indem sich in Folge dieser eintretenden Gährung rasch freie Säure bildet. Wir haben also in der Mundhöhle zwei entgegengesetzt reagirende Flüssigkeiten, und es wird nur auf deren quantitatives Verhältniss zu einander und ihren Concentrationsgrad ankommen, ob ihr Gemisch mehr die Eigenschaften des Speichels oder des Schleimes an sich trägt. Ist eine herrschende Menge alkalischen Speichels vorhanden, so wird die im Schleim sich bildende freie Säure hierdurch neutralisirt, wo nicht, entsteht ein deutlich sauer reagirendes Mundsecret. —

Die klebrige, hochrothe Schleimhaut beim Beginn des Soors reagirt immer sauer, wenn man sie auch mit Wasser abspült und eine Stunde lang durchaus mit keinem Nahrungsmittel mehr in Berührung gebracht hat. Schabt man eine so beschaffene Schleimhaut etwas ab, und untersucht das Abgeschabte mikroskopisch, so findet man neben den Epithelien schon eine beträchtliche Menge eiförmiger, scharf-contourirter, zuweilen schon zu zwei oder drei zusammenhängender Körper, welche sich deutlich als Pilzsporen zu erkennen geben. Man trifft wohl auch eine hochrothe sauer reagirende Schleimhaut, ohne irgendwo diese Sporen auf ihr entdecken zu können, niemals aber ist es mir gelungen, auf einer gesunden bläurothen Schleimhaut, welche eine Stunde vorher mit Wasser gut gervünigt und mit Nahrungsmitteln nicht mehr in Contact gebracht worden ist, dieselben zu beobachten. Daraus erhellt, dass wohl diese Erkrankung der Schleimhaut anfänglich ohne Pilzbildung, aber nicht eine Pilzbildung auf gesunder Schleimhaut entstehen kann. Diese Pilze verursachen nicht die saure Reaction und Rötzung, sondern die im Munde sich sammelnden, chemisch veränderten Drüsensecrete reizen die Schleimhaut, machen sie roth, wärmer und schmerzhaft und gestalten sie zu einem für die Pilzwucherung günstigen Boden um. Die Pilzbildung macht in der Mundhöhle gerade solche Fortschritte, wie auf irgend einer feinen Oberfläche, nur mit dem Unterschied, dass hier der Boden sich nicht mehr verändert, während er dort einem lebenden Organismus

angehöret und deshalb keinen Augenblick aufhört, sich von unten zu regeneriren und an der Oberfläche abzustossen.

Bei der Besichtigung der Mundhöhle bekömmt man nun, wenn diese Pilzwucherung nur wenige Stunden gefestert hat, weisse Punkte zu sehen, welche bald an einzelnen Stellen confluiren, grössere Flecke bilden und oft genug die ganze Schleimhaut mit einem dicken weissen Schorf, der an der Luft gelblich vertrocknen und durch Blutmischung selbst braun gefärbt werden kann, bedecken. Ueber diese weissen Membranen konnte man sich bisher nicht recht einigen, besonders ist die Art ihrer Befestigung auf der Schleimhaut, ihr Verhalten zu den Epithelien und der Ort ihres ersten Auftretens Controvers.

Was vorerst ihren Zusammenhang mit der Schleimhaut selbst betrifft, so behaupten die Einen, es lassen sich diese Membranen ohne Blutung von der unterliegenden Schleimhaut trennen, die Andern verneinen diess, Beide aber haben Recht. Es kommt nur darauf an, wie lange nach dem Entstehen man so zu trennen versucht. Kurz nach ihrem Auftritt ist der Zusammenhang wirklich ein sehr fester und kann auch von geübter Hand nicht ohne kleine Blutung getrennt werden, während nach einigen Tagen sich die Membranen von selbst lösen und die Mütter ohne alle Blutung oder Schmerzmischung die grössten Stücke einfach mit dem Finger aus dem Munde wischen.

Zur Beantwortung der Frage von den Epithelien muss ich zunächst auf die mikroskopische Beschaffenheit dieser Membranen überhaupt genauer eingehen. Man bemerkt bei jeder Soorermembran: Sporen, Sporenträger, Thallusfäden und Pflasterepithel, alles eingebüllt und umgeben von einer feinkörnigen weissen Masse, aus welcher man nur an den Rändern durch Quetschen die genannten Gebilde hervorrufen sieht. Gelingt es, ein grösseres Stück zu lösen, so dass man die Flächen unterscheiden und gesondert untersuchen kann, so findet man an der freien Fläche die meisten Sporen, weniger Thallusfäden und viel ausgebildetes Pflasterepithel, an der andern der Schleimhaut zugekehrten Fläche wenig oder gar kein Pflasterepithel, wenig Sporen, aber ein dichtes Gewebe von Thallusfäden, das die ganze Körnchenmasse durchsetzt. Legt man ein Stückchen Soorermembran einen Tag lang in eine concentrirte Lösung von kohlensaurem Kali, so schwindet hier zuerst das Epithel, die weisse Körnchenmasse wird homogener, durchscheinender und ist nur mehr an einzelnen Stellen deutlich zu erkennen, die Thallusfäden aber, deren dichtes Gewebe man nun durch die ganze Dicke der Membran deutlich unterscheiden kann, haben keine Veränderung erlitten.

An einzelnen gelben Stellen der Membranen sieht man einen diffusen, die Körnchenmasse gelbfärbenden Farbstoff, der seinen Ursprung wohl kleinen Blutungen zu verdanken hat. Man kann zweierlei Arten von Thallusfäden unterscheiden.

1) Breitere mit vielen Querleisten, ganz nach der Form der Hefepilze und 2) schmalere mit fast gar keinen Querleisten. Diese letzteren haben weniger scharfe Contouren, sind meistens etwas granulirt und kommen überall und in allen Fällen vor, während die erste Art nur ausnahmsweise gefunden wird. Es gelähnen diese Pilze nicht bloss in der Mundhöhle, sondern wachsen auch auf andern feuchten gährenden

Flächen, z. B. auf einer Aufschneide, fort, wie durch meine Versuche (Hentle und Pfeifers Zeitschr. N. F. VIII. Bd. 2. Heft) dargethan worden ist. Auch werden Erosionen an den äusseren Theilen der Lippen und selbst am Arme damit bedeckt.

Nach all dem Gesagten hat man sich die Entstehung der weissen Membranen und das Verhalten der Pilze zu denselben auf folgende Weise vorzustellen: Die ersten Thallusfilen wachsen auf und zwischen den obersten Epithelschichten, suchen überall, wie die Wurzeln eines Baumes auf steinigem Erdreich nach günstigem Raum und Boden und schliessen endlich die ganze Epithelschichte in ein dicht verfilztes Gewebe ein. Auf der Oberfläche der Schleimhaut selbst, wo die Epithelien gebildet werden, angelangt, reizen sie dieselbe zu vermehrter Secretion oder vermehren wenigstens die durch die saure Reaction der Mundflüssigkeit bedingte Reizung und es entsteht nun aus dem für die Epithelbildung secretirten Hornstoff kein vollkommenes Epithel mehr, sondern bloss eine dicke Schichte körnigen Exsudates. Die Pilze sind also weder auf dem Epithel noch unter demselben, sondern sie schliessen es ein; in den untern der Schleimhaut zugewandten Schichten kommt es aber nicht mehr zur Bildung fertigen Pflasterepithels, sondern die Thallusfilen benützen sich gleich der Korallenmassen und durchsetzen sie nach allen Richtungen hin.

Was den Ort des ersten Auftretens betrifft, so geben viele Autoren an, dass die ersten weissen Punkte Schleimdrüsen entsprechen, und dass die Pilze aus diesen hervorsprossen. Es lässt sich diese Angabe weder beweisen noch widerlegen, indem man bekanntlich am lebenden Kinde die Mündungen dieser Drüsen nicht unterscheiden kann und an der Leiche das Auffinden von Thallusfilen in den Drüsen keinen Beweis abgibt, dass sie wirklich hier früher als auf der freien Schleimhautfläche entstanden sind.

Bezüglich der Ausbreitung des Soors hat Reubold zuerst gefunden, dass sich der Pilz an das Pflasterepithel hält und auf Flimmer- und Cylinderepithel nicht keimt, es gehören also zu seinem Gebiete die ganze Mundhöhle, der Rachen, der Oesophagus und der Kehldackel bis zu den obern Stimmbändern, wodurch die zuweilen sich einstellende Heiserkeit hinlänglich erklärt ist. Die ziemlich verbreitete Ansicht vieler älterer Aerzte, dass der Soor sich in den Magen und Darmkanal fortsetzen könne, wurde noch niemals durch eine Section begründet. Wenn auch die Möglichkeit, dass verschluckte Soormembranen unverdaut durch den Arm wieder abgehen, durchaus nicht in Abrede gestellt werden darf, so resultirt hiernach noch lange nicht ihre Entstehung auf der Magen- und Darmschleimhaut.

Die Dauer des Soors ist in der Regel eine kurze und erstreckt sich bei kräftigen Kindern und reinerer Pflege fast nie über acht Tage hinaus. Bei atrophischen Kindern, besonders wenn ihre fortwährende Unruhe mit dem Schnuller gestillt wird, besteht er mehrere Monate bis zum Tode.

Diese Erkrankung der Mundhöhle ist besonders in Finkel- und Gebärmuttern ausserordentlich häufig mit Darmcatarrh complicirt, und zwar mit Darmcatarrh von höchst perniciossem Charakter. Diese Complication ist so gewöhnlich, dass Valleix, Arzt am Pariser Findelhaus, die Darmaffection für einen integrierenden Theil der Erkrankung hält

und als solchen beschrieb, was jedoch durch Beobachtungen der Privatpraxis sich hinlänglich widerlegt.

Die Kinder bekommen Cholera-ähnliche Symptome, collabiren rasch, die grosse Fontanelle sinkt ein, die bulbi treten tief in die Augenhöhle zurück, die Haut verliert ihre Elasticität und Wärme, und die Fettpolster nehmen oft schon nach 12–24 Stunden merklich ab. Die grünen, dünnflüssigen, stark nach Fettsäuren riechenden Faeces reagiren hierbei deutlich sauer und röthen und erodiren in der kürzesten Zeit den Anus, die Genitalien, die innere Schenkelfläche und die Fersen. Dass diese Diarrhöe oder vielmehr ihre Folgen die Kinder tötet und nicht die Mundkrankheit, geht daraus hervor, dass zwei Kinder bei starkem Soor keinen Darmcatarrh bekommen und nach Abtöschung der Membranen sogleich wieder vollkommen gesund sind.

Die Ursachen des Soors sind nun: 1) Die vorwiegend saure Reaction der Mundhöhle, welche auf einer mangelhaften Speichelsecretion bei Neugeborenen beruht. Es gewinnt die Quantität des sauren Schleimes das Uebergewicht über den alkalischen Speichel, und das Gemisch reagirt dann sauer. 2) Die Uebertragung von einem Kinde auf das andere, besonders durch ein- und dieselbe Amme in den Fingerringern. 3) Der fast durchgängig gährende Schmutz enthaltende Schnuller, welcher zudem an allen schmutzigen Tischen und Winkeln herumgewischt und dann den Kindern in den Mund geschoben wird.

Therapie.

Aus einer grösseren Reihe von Versuchen, die ich in dieser Richtung angestellt, geht hervor, dass eine Soormembran in Zuckerwasser, Brunnenwasser und in nicht alkalisch reagirenden Salzlösungen bei einer Temperatur von circa 35° R. nach zwei Tagen Ausläufer eines neuen Sporogonorkos von Pilzen aussendet, während diese in alkalischen oder in Metallsalzen nicht zu beobachten ist. Wirklich gelöst werden die Soormembranen nur in concentrirten kaustischen Alkalilösungen, die zu therapeutischen Zwecken natürlich nicht benutzt werden können. Wir haben also kein brauchbares Mittel, die einmal vorhandenen Membranen in der Mundhöhle chemisch zu zerstören, wohl aber können wir ihre Weiterverbreitung aufhalten durch örtliche Anwendung schwach alkalisch reagirender Salzlösungen. Die ganze Therapie beruht darauf, die saure Reaction der Mundhöhle zu beseitigen und es entspricht in der That eine Lösung des schon längst in Gebrauch gezeigten Borax diesem Zwecke vollständig. Es genügt, wenn man jede Stunde einmal eine Boraxlösung von 1,0 : 25,0 auf die Schleimhaut pinseln lässt. Die günstige Wirkung dieses Mittels wird aber zum grössten Theil durch die allgemein übliche Beimischung von Honig oder Syrup wieder paralisirt, indem zuckerhaltige Substanzen die Pilzbildung entschieden befördern. Durch diese Boraxlösung wird keine Diarrhöe erzeugt, noch eine schon vorhandene vermehrt. Es ist hierbei aber unbedingt notwendig, die Schnuller wegzulassen, selbst Milchkost schadet durch ihren Gehalt an Zucker und Casein. Am besten reicht man, so lange die Membranen bestehen, als Nahrung dünne Bouillon oder Schleimsuppe und zum Getränk Infus. Verbase mit wenig oder gar keinem Zucker.

Anhang.

a) Die Bedeutung des Zungenbelegs bei Kindern.

Vor allem ist zu bemerken, dass bei den meisten Säuglingen in den ersten Lebenswochen die Zunge einen weissen Beleg zeigt, wobei die Kinder nicht die geringste Verdauungsstörung erkennen lassen.

Ausserdem wird bei den meisten Magen- und Darmaffectionen kleiner Kinder die Zunge weiss belegt, und wahrscheinlich erst in Folge dieses Belegteins stimmt der Appetit ab. Dicke Belege kommen bei Kindern selten vor, in der Regel haben wir nur einen leichten weissen Anflug, der aber noch lange Zeit fortbestehen kann, nachdem der Appetit schon wiedergekehrt ist, und ebenso durch örtliche Krankheiten der Mundhöhle, Sore, Stomatitis catarrhalis, Diphtheritis, Traumen, chemische Reiz- und Verletzungen, als durch eine Erkrankung des Magens oder Darms erzeugt wird. Es kommen auch bleibende oder wenigstens einige Monate bestehende partielle Belege der Zunge vor, welche ohne allen Einfluss auf den Fortbestand der Gesundheit sind. Man hat hierfür sogar einen eigenen Namen, *Pityriasis linguae*, erfunden. Sie bestehen in weissen Inself- oder weissen Kreisen und Halbkreisen auf der übrigens normalen, rosenrothen Zunge, und verdanken ihren Ursprung lediglich einer Anhäufung von Epithelien. Bei atrophischen Kindern kommen zuweilen auf einer ganz glatten rothen Zunge quere Einrisse vor, welche auf dem Riss einen gelben Grund durchblicken lassen, den Cantharisationen hartnäckig widerstehen und bis zum Tode nicht mehr verschwinden. Bei älteren Kindern hat der Zungenbeleg im Scharlach, dem Masern, dem Typhus etc. denselben Eigenschaften wie bei Erwachsenen, und wird bei jeder einzelnen Krankheit speciell beschrieben werden.

Die diagnostische und praktische Verwerthung des Zungenbeleges der älteren Kinder ist übrigens auch keine besonders grosse. Bei einem gleichmässigen, wenn auch nur ganz dünnen Belege ist es rathlich, die Diät der Kinder fortwährend zu überwachen und durch Reguliren derselben eine bessere Verdauung, und alsbald eine Reinigung der Zunge zu erzielen.

b) Dentitionsbeschwerden. *Dentitio difficilis*.

Nachdem die physiologischen Verhältnisse des Zahndurchbruches schon im allgemeinen Theil ausführlich abgehandelt sind, erübrigt nur mehr auf die pathologischen Zustände, die während desselben entstehen und entschieden davon abhängen, aufmerksam zu machen.

Entzündung, Schwellung, Schmerz und vermehrte Secretion, oder kurz die catarrhalische Stomatitis, findet sich in allen Fällen. Die häufige Bildung von schmerzhaften Geschwüren ist als eine Steigerung derselben anzusehen und nach den pag. 81 angegebenen Vorschriften zu behandeln. Das Bedürfniss der Kinder, auf etwas zu beißen, befriedigt man durch ein Stück Eibischwurzel oder durch einen fest an den Finger gesteckten silbernen Fingerhut.

Als allgemeine oder sympathische Zufälle beim Zahndurchbruch machen sich geltend:

1) Fieber, bestehend in Schlaflosigkeit und erhöhter Hauttemperatur, besonders an der Stirne und den Wangen, welche häufig auch einseitig roth werden. Da an den Kindern durchaus keine andere Ursache des Fiebers entdeckt werden kann und dasselbe doch sehr häufig beim Zahndurchbruch sich einstellt, so ist anzunehmen, dass es durch letzteren bedingt ist.

2) Convulsionen, die sogenannten Fraisen. Die hier auftretenden Convulsionen haben durchaus nichts Charakteristisches, sondern verhalten sich wie überhaupt alle symptomatischen Krämpfe. Die häufigsten Muskelcontractionen kommen an den Augenmuskeln vor; die zahnenden Kinder schlafen oft mit halbgeöffneten Augen, die halb nach oben gerichtet, und man sieht durch die ziemlich weit offene Lidspalte nichts als die weisse Sclera, ein Anblick, der für unerfahrene Eltern etwas so erschreckendes hat, dass gewöhnlich ärztliche Hülfe gesucht wird. Zuckungen der Gesichtsmuskeln, ein eigenthümliches Lächeln im Schlaf und leise Zuckungen der Extremitäten kommen bei vielen zahnenden Kindern vor, es sind das überhaupt reizbare Kinder, welche auch bei andern krankhaften Zuständen, ja schon bei Gemüthsbewegungen Reflexerscheinungen bekommen. Da sie bei vielen Kindern jedesmal, so oft ein Zahn durchbricht, sich einstellen, so ist nicht einzusehen, warum sie nicht direct mit der Zahnung in Verbindung gebracht werden sollen. Es kommen übrigens mit und ohne Zahndurchbruch bei einzelnen Kindern oclampsische Anfälle vor, welchen sie in wenigen Minuten erliegen können, und welche in der Section durchaus keine materielle Veränderung der Nervencentren nachweisen.

Behandlung.

Da diese Convulsionen vornehmlich bei Kindern mit träger Verdauung und hartem Stuhlgange auftreten und mit eintretender Durchfälle schwinden, so liegt in der Vermehrung des Darmsecretes und in der Beschleunigung der peristaltischen Bewegung die erste Indication. Man gibt ihnen ein oder mehrere Klystiere mit kaltem Wasser, wenn diess nicht genügt, etwas Manna oder einige Kaffeeöl-Tinet. Rhei aquosa. Ist aber die Haut dabei sehr heiss, so kann man Stuhl und Abnahme der Hauttemperatur zugleich durch einige Calomelpulver 0,01—gr. 0,015 erzielen. Gegen die Schlaflosigkeit zahnender Kinder ist Bromkalium, p. dos. 0,06, nämlich ein Pulver bis zur Wirkung, ein vortreffliches Mittel, welches vor den Opianen den Vorzug hat, dass es auch die Darmsecretion etwas anregt. In England und Frankreich hat man mit der Scarification des Zahnfleisches viel Lärm gemacht. Die einen empfehlen einen Kreuzzchnitt, die andern die orale Abtragung des ganzen Kappchens, das die Zahnschmelz noch bedeckt. Vorsichtiger Weise wird aber bei allen diesen Berichten und Anpreisungen hinzugesetzt, dass der Zahn am Durchbruche sein müsse, sonst helfen die Scarificationen nichts. Ich habe dieselben auch öfter gemacht, habe aber immer gefunden, dass die scarificirten Wunden einer entzündeten Schleimhaut sehr schlecht heilen und längere Zeit ulceriren, dass aber die Nervensymptome fortdauern, bis sich künstlich oder spontane Durchfälle einstellen.

Wenn man freilich so lange warten muss, bis der Zahn „sehr nahe“ am Durchbrechen ist, so ist man überhaupt am Ende des ganzen

Symptomencomplexes, und dann hilft eine jede beliebige unschädliche Behandlung gerade so viel als diese mit ziemlichem Schmerz verbunden. Stündlich oder zweistündlich eine kalte Waschung oder Begießung des ganzen Kopfes vorzunehmen, ist ein zwar nicht saftiges und bei dem Angehörigen nicht leichtes aber sehr entschieden nützlich Heilverfahren gegen alle Convulsionen der Kinder und somit auch gegen die während der Dentition.

3) Hauteruptionen. Kinder mit feiner, glatter Haut, oder von Eltern stammend, die mit chronischen Hautkrankheiten befallen sind, bekommen in jeder der fünf Zahuperioden eine oder die andere Ausschlagsform, die in den späteren Zahuperioden ziemlich dieselben anatomischen Merkmale zeigt, welche bei ihrem ersten Auftreten sich einstellen. Die Hauptformen sind zum:

a) Urticaria. Ausbruch von Quaddeln (Pomphi). Man versteht hierunter stark juckende Anschwellungen der Haut vom Umfange mehrerer Linien und von unregelmäßig runder, zuweilen auch länglicher Gestalt, die nicht stark prominiren und eine abgeplattete Oberfläche haben. Sie haben meist normale Hautfarbe, während die sie zunächst umgebenden Hautpartien geröthet erscheinen. Zuweilen sind die Quaddeln wohl auch blässer als die übrige Haut. Eine Losrennung der Epidermis von der Cutis findet nirgends statt. Durch Brennwoodn (daher der Name), bei einzelnen Individuen auch durch Fleischiels entstehen Quaddeln, welche in keiner Beziehung von denen zu unterscheiden sind, die durch innere Ursachen z. B. die Dentition veranlaßt werden. Sie verschwinden nach einer oder mehreren Stunden fast spurlos, der rothe Hof ist noch eine kurze Zeit zu erkennen, erblasst aber auch wieder sehr rasch, und dann ist von der ganzen bestehenden Eruption nichts mehr zu entdecken. Von diesen Quaddeln schlossen bis zu 15 und 20 bei den Kindern mit- oder nacheinander auf, verschwinden wieder und werden an andern Stellen durch neue ersetzt. Gewöhnlich sistirt diese Hautaffection erst nach Beendigung einer Zahuperiode und bricht bei Beginn einer neuen wieder neu hervor. Die Behandlung muss sich darauf beschränken, durch Kleider und Fettschreibungen das höchst lästige und die Kinder beunruhigende Jucken möglichst zu mindern.

b) Lichen und Prurigo. Man versteht hierunter zwei papulöse Exantheme, von denen das erstere, auch Lichen strophilus genannt, die harten Papeln meist in Haufen beisammen, das zweite seine flacheren, niedrigen Papeln ver einzelt stehen hat. Die Knötchen sind in beiden Exanthenen zu Anfang blässer als die übrige gesunde Haut, werden aber bald durch Kratzen ihres Gipfels herab und zeigen nun statt dessen eine kleine braune Kruste von der Grösse eines Nadellopfes. Sticht man eine Lichempapel mit einer feinen Nadel ganz oberflächlich an, so dringt ein Tropfen Blut hervor, bei einer Prurigopapel aber kommt kein Blut, sondern ein Tropfchen seröser Flüssigkeit zum Vorschein, durch anhaltendes Kratzen aber bluten schließlich auch die Prurigopapeln. Wenn diese verkrusteten Papeln nahe bei einander stehen, so vereinigen sich die Krusten und stellen dann grössere Geschwürflächen dar, deren ursprüngliche Entstehungsweise nicht mehr zu erkennen ist.

c) Eczem und Impetigo. Unter Eczem versteht man eine Haut-

entzündung, bei welcher durch Anhäufung von flüssigem Exsudat unter der Epidermis sich kleine gewöhnlich nahe bei einander stehende Bläschen bilden, und unterscheidet ein *Eczema simplex* und *rubrum*. Bei *Eczema simplex* ist die Haut nur wenig geröthet und nicht geschwollen. Nach dem Eintrocknen oder Bersten der Bläschen bilden sich dünne gelbe Schuppen und Krusten, nach deren Abfall rasch eine neue Oberhaut entsteht. Das *Eczema rubrum* entwickelt sich meist aus dem ersteren und unterscheidet sich von demselben dadurch, dass neben der Bläschenbildung eine viel stärkere Rötze und Anschwellung der Haut besteht, und dass dann der Verlauf ein viel chronischerer wird. Nach Abfall der Krusten bleibt noch lange die Neigung zu neuer Bläschenbildung und eine infiltrirte, rothe schuppige Haut zurück. Einen noch heftigeren Entzündungsgrad, als er beim *Eczema rubrum* beobachtet wird, bedingt der *Impetigo*. Statt der Bläschen entstehen beim *Impetigo* grössere mit Eiter gefüllte Pusteln, gewöhnlich nahe aneinander, so dass nach ihrem Platzen dicke, massende, grüngelbe oder braune Gründe sich bilden, nach deren Abfallen das geröthete Corium blossliegt, stark juckt und bald wieder von neuen Krusten bedeckt wird. Nach der Heilung bleibt die erkrankte Hautstelle noch längere Zeit infiltrirt und braunroth. —

Die unter b und c aufgeführten Ausschlagsformen heilen nach Durchbruch eines Zahnes natürlich nicht mit einem Male, bessern sich aber ganz entschieden, während sie vor demselben sich verschlimmern. Auch soll durchaus nicht gesagt sein, dass sie immer mit dem Zahnen zusammenhängen, da es ja bekanntlich viele Kinder gibt, die auch vollendetester erster Dentition erst diese Ausschläge verspüren. Das aber ist Thatsache, dass sehr viele Kinder mit dem Durchbruch des ersten Zahnes eines dieser Exantheme, am häufigsten den Lichen, bekommen und gewöhnlich längere Zeit durch behalten, dann wieder verlieren, um bei neuen Dentitionsbeschwerden von Neuem davon befallen zu werden.

Die Behandlung dieser Hautkrankheiten ist ausserordentlich einfach. Die Haare müssen sorgfältig entfernt werden, wenn unter ihnen sich Ausschlag fadet. Dicke Krusten werden mit Oel erweicht, und dann die Haare mit einer guten Schere unter der Kruste an der Wurzel abgeschnitten. Gegen grosse Verkeirung und heftiges Jucken habe ich eine Einreibung von Ung. Zinci, täglich zwei Mal, sehr vortheilhaft gefunden. So lange die Kinder kein Fieber haben, müssen sie täglich $\frac{1}{2}$ Stunde lang in ein nicht zu warmes Weizenkleinbad gesetzt werden. Interne Mittel sind höchst nicht streng indicirt, die aber, welche die Verdauung stören, sind contraindicirt. Bei *Eczema rubrum*, das oft lang dauert, kann *Liquor arsenicalis Fowleri*, täglich 2—5 Tropfen nothwendig werden, wiewohl bei den Hautkrankheiten das Specieilere berührt werden wird. In allen Fällen ist es nothwendig, den kranken Kindern die Nägel recht kurz zu schneiden, um das Kratzen möglichst nachtheilich zu machen.

4) Darmcatarrh. Wenn ein Kind mit starker Rötzung des Mundes und vermehrter Speichelsecretion zähnt, so bekommt es in Folge des verschluckten Speichels immer dünne Ausleerungen, indem der Salzsäuregehalt des Speichels gleich einem leichten salinischem Abführmittel wirkt. Eine nicht zu profuse Diarrhöe von 5—6 Stühlen in 24 Stunden ist für die zahnenden Kinder sehr wohlthätig, weil die G.

hinzerscheinungen hiedurch am sichersten vermieden werden. Dieselbe tritt auch in der That ebenso häufig auf, als die Stomatitis catarrhalis, man könnte beide Prozesse füglich zu den physiologischen Vorgängen rechnen, wenn ihre Steigerungen, die doch oft genug zur Beobachtung kommen, sich nicht entschieden als Krankheiten und zwar von einem Charakters zu erkennen gäben. Es kommt nämlich der Uebergang von diesem einfachen Darmcatarrh zu einer Infiltration des Follikelapparates der Schleimhaut, verbunden mit profusom Durchfall und überaus rascher Abnahme des Fettes und der Kräfte, sehr häufig vor und endet in den meisten Fällen mit äusserstem Collapsus und dem Tode des Kindes.

Die Behandlung fällt mit der der Darmcatarrhe, aus anderen Ursachen entstanden, zusammen und wird bei den Erkrankungen des Darmesohres ausführlicher erklärt werden.

5) Bronchialcatarrh. Es gibt Kinder, welche beim Durchbruch eines jeden Zahnes eine heftige Bronchitis, die nach dem Durchbruch abkühlt wieder verschwindet, bekommen. Diese Bronchitis scheint eine äussere Veranlassung zu haben. Der massenhafte secretirte Speichel bei der Stomatitis catarrhalis durchlässt nämlich fortwährend die die Brust umhüllenden Kleider und bringt eine Temperaturniedrigung der Brust zu Stande, als deren nächste Folge sich Schwellung und vermehrte Secretion der Bronchialschleimhaut einstellt. Werden die Kleider nicht mehr durchlässt oder wird die Brust wenigstens durch wasserdichtes Gewebe sorgfältig geschützt, so entsteht diese Bronchitis beim Durchbruch späterer Zähne nicht mehr. Mir sind schon so oclantun und oft sich repetirende Beispiele dieser Dentitionsbronchitis vorgekommen, dass ich nicht anstehe, einen Theil der Bronchialcatarrhe zur Dentitis difficilis zu rechnen.

Behandlung.

Man lost recht gross gut ausgeschnittene Geisselröppchen anfertigen und sie auf der Rückseite mit der jetzt überall und zu billigen Preisen käuflichen gewaschen Guttapercha füttern, und wird fast ohne Ausnahme bemerken, dass dann kein Husten sich entwickelt.

6) Schliesslich muss noch eine bleonorrhöische Erkrankung der Conjunctiva palpebrarum, eine allerdings seltene Complication beim Durchbruch der oberen Backen- und Eckzähne erwähnt werden. Es schwelken hierbei plötzlich beide Augenlider, vorzüglich aber das obere zu und sind so infiltrirt, dass man nur mit der grössten Mühe und kaum ohne Blutung der gegenseitigen Augenlider den bullus zu sehen bekommt. Letzterer ist übrigens mit Ausnahme einer Injection und leichten Schwellung seiner Conjunctiva normal, die Cornea sah ich noch nie ergriffen. Das Secret ist nicht so gelb und eiterig dickflüssig wie bei Ophthalmoblepharorrhoea neonatorum, sondern mehr schleimig, fadenziehend, dem Nasenschleim nach überstandnem Catarrh der Nasenschleimhaut sehr ähnlich; von einer Ansteckungsfähigkeit desselben auf das andere Auge oder auf andere Individuen konnte ich nie etwas erfahren. Die Umgebung der Lider findet sich gewöhnlich erodirt. Untersucht man nun bei einem mit dieser Form von Augenentzündung befallenen Kinde die Mundhöhle, so findet man eine schmerzhaft- Rötze und Geschwulst des correspondirenden Oberkiefers und

einen oder zwei Höcker, dem durchsichenden ersten Backenzahn oder dem Eckzahn, der seine populäre Bezeichnung „Augenzahn“ also nicht ohne Grund hat, entsprechend.

Es ist übrigens diese Augenentzündung gar nichts Wunderbares, wenn man bedenkt, dass der Boden der Highmore's-Höhle oft kaum von Papierdicke ist und also eine Fortsetzung der Congestion oder Entzündung auf die Schleimhaut dieses Hohlraums leicht sich ereignen kann. Die Schleimhaut des Antrum Highmieri steht aber durch die Nasenhöhle und den Thränensack direct mit der Conjunctiva in Verbindung und wir haben hier eine einfach fortgepflanzte Schleimhautentzündung. Die Prognose dieses sehr gefährlich aussehenden Uebels ist günstig. Ich habe früher nach Vorschrift der grössten Ophthalmologen diese Kinder viel mit Hollensteinanstrichen gepulvt und war entsetzt von meinen günstigen Erfolgen. Seit mehreren Jahren habe ich aber wenigstens ein Dutzend Kinder nur mit trockener Wärme ohne Cantharisation behandelt und eine noch schnellere und schmerzlosere Heilung erzielt. Ich lege auf das Auge einen grossen Leinwandfleck mit einfachem Cerat oder Ung. Zinci bestrichen und binde über den Fleck gewärmte lockere Kleinsäckchen. Alle zwei Stunden lasse ich den Ceratfleck entfernen, das Auge mit einem spitzen Stückerhen Schwamm in warmes Wasser getaucht, sanft reinigen und dann mit dem warmen Säckchen sogleich fortsetzen. Nach einem, längstens zwei Tagen ist das Oedem schon so weit eingesunken, dass die Kinder das Auge wieder ziemlich gut öffnen können, worauf sie die Kleinsäckchen gewöhnlich nicht mehr dulden, und wieder nach einigen Tagen ist an dem erkrankten Auge nichts mehr als einige Röthung und Reizbarkeit der Lider zu entdecken. Untersucht man nun die Mundhöhle, so findet man die Stomatitis geringer oder ganz verschwunden und eine vorher nicht fühlbare Zahnpitze durchgebrochen. Leicht adstringierende Augentwasser, Zinc. sulfur. oder Cupr. sulfur. 2 : 1000, können während und nach Abnahme der Geschwulst der Lider mit einigen Vortheil eingeträufelt werden.

Diese sind die hauptsächlichsten und häufigsten Complicationen des Zahndurchbruchs, deren wirkliche Abhängigkeit von denselben allen denkenden Aerzten längst bekannt ist. In neuester Zeit haben einzelne, darunter ziemlich bekannte Pädiatruer diesen Zusammenhang vollständig geleugnet und das häufige Zusammentreffen der eben beschriebenen Krankheiten mit der Zahnung entweder nicht beobachtet oder für Zufall erklärt. Dass nicht alle Aerzte mit dem durchsichtigen Scharfblick in der Beobachtung begabt sein können, ist eine alte Thatsache und soll ihnen deshalb auch gar kein Vorwurf gemacht werden; denn Niemand, weder der Studierende selbst, noch dessen Angehörige oder Lehrer, können voraussagen, ob aus dem angehenden Mediciner jemals ein tüchtiger Beobachter werden wird. Mag er auch noch so gute und fleissige anatomische und klinische Studien gemacht haben, so kann aus ihm möglicher Weise wegen Mangel an Combinationstalent und praktischem Scharfblick doch immer noch ein sehr mittelmässiger Arzt werden, wie dies die Erfahrung leider häufig lehrt. Wenn aber dergleichen unglücklich ausgefallene Aerzte, statt sich bescheiden in ihrem Wirkungskreis zu finden, mit ihrem vollständigen Mangel an Beobachtungstalent noch raisonniren und glauben, etwas

nicht zu sehen, sei auch eine Kunst, so müssen sie sich auch gefallen lassen, dass man ihre Geistesconstitution als eine für einen praktischen Arzt durchaus ungünstige bezeichnet.

B. Parotia.

1) Entzündung der Ohr-Speicheldrüse. Parotitis.

Es gibt drei Arten von Parotitis: a) die idiopathische, b) die sekundäre und c) die metastatische Parotitis.

a) Die idiopathische Parotitis tritt fast nur epidemisch auf und hat wegen ihrer allgemeinen Verbreitung und dem fast komischen Aussehen, das sie den Kranken verleiht, eine Menge zum Theil scurriler Namen, als Ziegenpeter, Bäuerawetzeln, Mumps, Tölpelkrankheit etc., erhalten. Sie hat viel Analogien mit den neuen Exanthemen, sie befallt den Menschen nur einmal, trifft vornehmlich das jugendliche Alter und hat einen ziemlich cyclischen Verlauf, ist aber zum Unterschied von jenen nicht contagios. Kinder unter einem Jahre werden kaum davon ergriffen. Am häufigsten erscheint sie im Frühjahr, zuweilen auch im Herbst; an den feuchten Küstengegenden von Holland, England und Frankreich soll sie endemisch sein.

Symptome.

Gewöhnlich gehen dem Mumps einzelne Vorläufer voraus. Die Kinder sind einen oder einige Tage matt, übelgelaunt, fiebern, verlieren den Appetit, legen sich freiwillig zu Bett, reifere Kinder bekommen wohl auch Gehirnsymptome, Kopfweh, Delirien, Convulsionen, gefräßige Kinder erbrechen ihre letzte ohne Appetit hinuntergewürgte Mahlzeit. Nach einem, längstens 2–3 Tagen bekommen sie unter einem Ohr Schmerz, der sich durch Kauen, Öffnen des Mundes oder Druck von aussen bedeutend steigert. Zu gleicher Zeit bemerkt man eine Anschwellung der Parotisgegend, die Grube zwischen Unterkiefer und Zitzenfortsatz hebt sich vorerst, statt ihrer erhebt sich aber bald an dieser Stelle eine Geschwulst, welche das Ohrfläppchen nach aussen schiebt und sich weit über die Conturen der Drüse hinaus erstreckt. Das Unterkeulergewebe der entsprechenden Wange bis zum unteren Augenlid, und des Halses wird serös infiltrirt, so dass die Bewegungen des Unterkiefers und alle nützlichen Bewegungen der Gesichtsmuskeln auf der erkrankten Seite unmöglich werden. Die Härte ist an der Stelle, wo die Drüse selbst liegt, am bedeutendsten und nimmt peripherisch ab. Die äussere Geschwulst ist ziemlich weich, teigig, der Fingerdruck hinterlässt eine Delle. Die die Geschwulst deckende Haut ist gewöhnlich etwas geröthet. Oft schwillt nur die eine Ohrspeicheldrüse an; wenn beide anschwellen, so geschieht dies gewöhnlich nicht gleichzeitig, sondern die eine erkrankt ein paar Tage später als die andere, auch ist es nicht notwendig, dass die Geschwulst auf beiden Seiten gleich gross wird. Auf der Höhe der Krankheit können die Kranken den Mund fast gar nicht öffnen und sprechen nur sehr undeutlich; die Speichelsecretion ist selten vermindert, eher vermehrt, zuweilen kommen auch profuse Speichelflüsse vor, die aber wegen Abwesenheit aller Geschwüre der Mundschleimhaut nicht den ekelhaften

Gesch, wie die mercurielle Salivation, verbreiten. Angilla tonsillaris und Laryngitis ist eine sehr seltene Complication. Suffocative Anfälle kommen fast gar nicht vor, weil die Geschwulst nach aussen, nicht nach innen sich ausdehnt. Die Allgemeinerkrankung ist bei den meisten Kindern nur von kurzer Dauer und geringer Bedeutung. So lange die Geschwulst ausgehult, hart und schmerzhaft ist, fiebern sie meistens, am 3.—5. Tage aber sind nur locale Beschwerden mehr vorhanden. Die bei Erwachsenen von Hippokrates schon beobachtete consensuelle Anschwellung eines Hodens, häufig des der nämlichen Seite, kommt überhaupt ausserordentlich selten vor, z. B. bei der im Jahre 1837 in München aufgetretenen Epidemie, wo gewiss auch mehrere hundert Männer erkrankt sind, meines Wissens nur ein einziges Mal; bei Kindern aber wird sie nie getroffen.

Auch die andern Metastasen auf die Gehirnhäute, auf seröse Säcke, auf die Bronchial- und Darmschleimhaut habe ich noch nie gesehen, wage aber nicht, sie gerade ganz zu leugnen, indem es ja bekannt ist, dass in einzelnen Epidemien derselben Krankheit zu verschiedenen Zeiten grosse Verschleidenheiten sich einstellten können. Wenn unsere Nachkommen einmal eine Parotitisepidemie erleben, auf welche die Beschreibung unserer gegenwärtigen nicht mehr passt, so werden sie hoffentlich auch so viel Einsicht haben, unsere jetzigen Schätzungen nicht für erlogen zu halten.

Verlauf und Ausgänge.

Der Verlauf der idiopathischen epidemischen Parotitis ist fast ausnahmslos ein günstiger. Nachdem die Krankheit 2—5 Tage zugenommen, nimmt das Fieber und bald darauf die Geschwulst ab, so dass nach 10—14 Tagen alle allgemeinen und örtlichen Symptome vollständig geschwunden sind. Fast immer tritt complete Zertheilung der Geschwulst ein, bei einzelnen scrophulösen Kindern lässt dieselbe länger auf sich warten, die Speicheldrüse und die sie umlagernden Lymphdrüsen bleiben noch lange Zeit vergrössert und indurirt. Abscedirung der Drüse scheint in früheren Epidemien nicht so selten gewesen zu sein, wie jetzt, wo sie fast gar nicht vorkommt. Der Abscess öffnet sich entweder direct nach aussen oder in den äussern Gehörgang, wo dann lange Zeit Otitis media und Schwerhörigkeit, bei Perforation des Trommelfells selbst lebenslängliche Taubheit zurückbleiben kann. Drückt die chronisch indurirte Drüse auf den N. facialis oder kam derselbe in den Bereich der Eiterung, so kann vorübergehende oder bleibende motorische Gesichtslähmung eintreten. Die Prognose ist all dem Gesagten nach ausserordentlich günstig. Bei Beginn einer Epidemie bekommt man viele Kinder zu sehen, nach einigen Wochen aber hat sich das Publikum so mannigfach von der Gefährlichkeit des Uebels überzeugt, dass die meisten Eltern keine ärztliche Hilfe mehr requiriren.

Pathologische Anatomie.

Die pathologische Anatomie dieser Krankheit ist wegen der seltenen Sterbefälle ziemlich dürftig. Ich selbst habe noch nie die Section einer Parotitis epidemica gemacht. Bamberger berichtet folgendermassen hierüber: Die ganze Drüse erscheint vergrössert, geröthet und ihr Gewebe geschwollen und gelockert, indem es in verschiedenen Graden

faserstoffiges Exsudat zuerst in das interstitielle, die Drüsencanali mit einander verbindende und die ganze Drüse umgebende Zellgewebe abgelagert wird. In den höheren Graden geht die Entzündung auch auf die Drüsensubstanz selbst über, diese ist geröthet und injicirt und die ganze Drüse erscheint zu einer gleichmässigen, fleischartig derben Geschwulst vergrössert. Das Exsudat kann nun entweder resorbirt werden, worauf die Drüse wieder zu ihren normalen Grösse- und Consistenzverhältnissen zurückkehrt oder das in das Zellgewebe abgelagerte Exsudat verdichtet und organisiert sich und führt entweder zu einer bleibenden Volumszunahme oder zu Schwund und Obleescenz der Drüse, wenn in Folge von Compression die eigentliche Drüsensubstanz allmählig verödet und zu Grunde geht.

Therapie.

Die Behandlung der Parotitis ist die der Drüseneitzündungen überhaupt. So lange allgemeine, fieberhafte Symptome zugegen, ist Ruhe, strenge Diät und ein säuerliches Getränk indicirt. Am bequemsten wird die Geschwulst selbst mit Oeifeinreibungen behandelt. Die Kälte befördert die Zerkleinerung nicht im geringsten. Die Cataplasmen und Kleinstückchen sind umständlich, machen Kopfcongestionen und werden besonders von kleinen Kindern nur mit Willenszügen ertragen. Bei grossen Schmerzen und sehr ausgedehnter, gespannter Geschwulst sind einige Blütgelein von Nutzen. Grosse Unruhe wird ohne Schaden durch eine Mercuriallösung 0,005 : 30,0 stündlich ein Kaffelöffel bis zum Eintritt der Wirkung beseitigt. Zurückbleibende Indurationen müssen mit grauer Salbe eingerieben werden. Da die damit befallenen Kinder gewöhnlich cretules sind, so ist ein mehrmonatlicher Gebrauch des Leberthrans sehr empfehllich.

b) Die secundäre Parotitis ist eine sehr seltene Krankheit und entsteht bei länger bestehenden, tieferen Erkrankungen der Mundhöhle. Die hauptsächlichste Veranlassung zur secundären Parotitis ist der Mercurialspeichelfluss, die Diphtheritis oder eine vernachlässigte Stomatitis. Sie erreicht nie die Grösse, Ausdehnung und Härte der epidemischen Parotitis, das Gesicht ist nie in so hohem Grade entsetzt, das Ohrfläppchen steht niemals weit nach aufwärts. Die Symptome beschränken sich auf leichte Geschwulst und auf Schmerz bei Druck von aussen oder beim Kauen. Die um und über der Parotis liegenden Lymphdrüsen, welche bei Mundkrankheiten viel früher und häufiger anschwellen als jene, erschweren die Diagnose bedeutend. Der beste diagnostische Anhaltspunkt bleibt immer der Stand des Ohrfläppchens und der Verlauf. Die geschwellte Speicheldrüse zertheilt sich nämlich schneller und regelmässiger als die häufig indurirenden oder in Eiterung übergehenden Halslymphdrüsen. In seltenen Fällen kommt es auch zur Eiterbildung, wobei heftige allgemeine Erscheinungen, heftiger Zschmerz und endlich Fluctuation und Zuspitzung sich einstellen. Nach einer sehr profusen und verschöppenden Eiterung endet dieser Process mit vollständiger Atrophie der verödeten Drüse. Da die secundäre Parotitis gewöhnlich nur einseitig und die Mundhöhle dabei sehr intensiv erkrankt ist, so lässt sich über das Verhalten der Speichelsecretion in der erkrankten Drüse nichts Bestimmtes angeben.

Die Behandlung hat hauptsächlich ihr Augenmerk auf die Mundhöhlenkrankung zu richten, wobei das Kali chloricum wieder als erstes Mittel erwähnt werden muss. Das weitere der Behandlung der Mundhöhlenaffection findet sich in den entsprechenden Abschnitten bereits angegeben.

c) Die metastatische Parotitis tritt auf im Verlaufe eines Typhus oder von Scharlach, von Variola, von Masern und zwar schon in den ersten Tagen, auf der Höhe der Krankheit, wo dann fast regelmäßig der Tod erfolgt, oder mit eintretender Convalescenz, in welchem Falle die Prognose bei weitem günstiger gestellt werden kann. Der ätiologische Zusammenhang der Parotitis mit diesem Exanthem ist sehr anklar; unter anderen Ursachen muss jedenfalls, besonders für den Typhus, eine mechanische Verstopfung des Ductus Stenosis in Folge der Trockenheit der Mundhöhle gehend gemacht werden. In der Leiche findet man die Parotitis und ihre Umgebung geschwellt und die Drüse von einer Menge kleiner Abscess durchsetzt, deren Inhalt entweder gelber, dickflüssiger Eiter oder braune blutige Jauche ist. In sehr putriden Fiebern tritt rasch eine allgemeine braunliche Verjauchung ein, wobei die ganze Drüse und ihre Umgebung in eine jauchige, braungrüne, stinkende Masse zerfällt.

Die Symptome sind je nach dem Grade der Allgemeinerkrankung verschieden. Ist der Typhus oder das acute Exanthem zu einer beträchtlichen Höhe gediehen, so bemerken die Kranken selbst gar nichts von der sich einstellenden Parotitis, tritt dieselbe hingegen in der Convalescenz auf, so geben sie dieselben subjectiven Erscheinungen an wie bei der idiopathischen, epidemischen Form. Im Allgemeinen kann bemerkt werden, dass die metastatische Parotitis langsamer verläuft und viel häufiger in Eiterung übergeht als die secundäre oder gar die idiopathische. Der Uebergang in Eiterung findet hier sehr gewöhnlich statt. Die objectiven Zeichen, Rötze, Anschwellung und Härte der Geschwulst verhalten sich hier gerade wie bei der epidemischen Parotitis. Wenn bei den andern Formen immer noch die Frage offen bleiben muss, ob wirklich das Drüsenparenchym und nicht bloss das zwischen den Acinis befindliche und das die ganze Drüse umgebende Bindegewebe erkrankt sei, so ist bei dieser metastatischen Parotitis wegen der Häufigkeit und Vielfältigkeit der Abscess doch mit Bestimmtheit eine Parenchymerkrankung anzunehmen.

Die Behandlung spielt bei der Schwere der Complication gewöhnlich eine untergeordnete Rolle. Warme Kleinsäckchen scheinen, wenn die Kinder sie dulden, einen günstigen Einfluss auf die Rückbildung der Geschwulst zu haben und die Schmerzen zu mildern. Einstiche können mit Vortheil nur gemacht werden, wenn deutliche Fluctuation gefühlt wird. Wird durch tiefe Einstiche kein Eiter entleert und also keiner der Abscess geöffnet, so tritt durchaus keine Erleichterung, vielmehr durch die zugefügte traumatische Parotitis nur grössere Schwellung und Beschwerden ein. Ist der Process in der Convalescenz aufgetreten, so wird dieselbe ungemein in die Länge gezogen und man hat durch möglichst rubisirende Behandlung, Wein, Eier, Infus. carnis, Fleisch, China etc., die Kräfte aufrecht zu erhalten.

2) Hypertrophie der Parotis.

Es gibt a) eine gut- und b) eine bösartige Hypertrophie.

a) Die gutartige kann spontane und langsam entstehend, ist aber viel häufiger die Folge der vorerwähnten entzündlichen Zustände. Zuweilen entwickeln sich auch gutartige Geschwülste, Fibroide, Fett- oder Balggeschwülste in der Drüse. Die Haut ist über der gutartigen Hypertrophie verschiebbar. Ihre Entwicklung ist immer nur einseitig, der Schmerz bei Druck auf die Drüse sehr gering, der Unterkiefer deshalb auch bei ziemlich grossen Geschwülsten noch hinlänglich beweglich. Von scrophulöser Anschwellung der Halsdrüsen lässt sie sich dadurch unterscheiden, dass das Ohrlippchen bei dieser nicht absteht, dass sie beweglicher sind und meist in grösserer Zahl gefunden werden.

Behandlung.

Einfache Hypertrophien können durch längere fortgesetzte Einpinselung von Jodtinktur, wöchentlich 1—2 Mal, bedeutend verkleinert und selbst zum vollkommenen Schwund gebracht werden, die gutartigen Lipome und anderen Geschwülste im Parenchym der Drüsen verkleinern sich auf Jodtinktur natürlich nicht, sondern müssen durch das Messer entfernt werden, wenn anders sie oberflächlich genug sind, dass man erwarten darf, sie ohne zu grosse Gefäss- und Nervenverletzung herauszuschälen.

b) Die bösartige Hypertrophie der Parotis besteht in der Wucherung eines Medullar- oder Faserkrebses im Parenchym der Drüse. Dieselbe kommt aber nie primär und isolirt in der Parotis vor, sondern erscheint meistens mit gleichzeitigen Krebsablagerungen in andern Organen, und ist bei Kindern, wie überhaupt alle Krebse, ausserordentlich selten. Bei bedeutenderem Wachsthum des Carcinoms nach innen kann Druck auf Pharynx und Larynx und auf die grösseren Gefässe und Nerven des Halses entstehen. Zuweilen wächst die Geschwulst auch nach vorne über den aufsteigenden Ast des Unterkiefers heraus, wodurch dessen Contouren nicht mehr ermittelt werden können, sie ist immer vollständig unbeweglich, je nach der Beschaffenheit der Neubildung hart (beim Faserkrebs) oder weich, selbst fluctirend (beim Medullarkrebs).

Bei der ersteren Art ist die bedeckende Haut unbeweglich mit der harten Geschwulst verwachsen. Tuberculose etablirt sich fast nie in der Speicheldrüse.

Die Behandlung ist wie die der Krebskranken überhaupt lediglich eine Leben fristende. Ob durch Extirpation der carcinomatösen Parotis, eine der schwierigsten und lebensgefährlichsten Operationen der ganzen Chirurgie, schon ein Kind gerettet worden, ist mir unbekannt.

C. Pharynx und Oesophagus.

- 1) Angina tonsillaris. Cynanche (wörtlich das Hundehalsband von *cin* der Haut, und *angis* zusehören).

Die Mandeln sind Aggregate von Schleimdrüsen, welche im gesunden Zustand kaum über die Gaumenbogen, zwischen denen sie liegen, hervorragen dürfen. An der dem Rachen faucium zugekehrten Fläche

finden sich 10–20 Ausführungsgänge der Schlemmkrypten, die der Mandeloberfläche ein durchlöcheretes Aussehen verleihen und den Vergleich mit den Mandelschalen veranlassen haben. Diese 10–20 Krypten auf der Mandel sind nun Verschwürungen ausgesetzt, bei denen gleich den Furunkeln der Cutis jedesmal der Inhalt einer oder einiger Krypten eine Eiterung der Umgebung hervorruft und endlich durch Öffnung des Abscesses aus der Mandel ausgeschieden wird. Bei diesem Process schwillt das ganze Parenchym der Mandel an und hat grosse Neigung, eine chronische Induration einzugehen, welche sogar auch ohne Verschwörung der Krypten spontan und dann beiderseitig eintreten kann. Nach jeder Verschwörung blüht auf der Mandel eine buchtartige Vertiefung zurück, so dass, wenn sich das Leiden öfter repetirt hat, die Mandeln ganz zerklüftet und zerrissen aussehen, hiedurch aber sich merklich verkleinern. Je öfter Angina tonsillaris aufgetreten, um so wahrscheinlicher wird es, dass alle Krypten zerstört sind und hienüt die Gelegenheit zu ferneren Anginen entzogen ist, ein seltenes Beispiel einer radicalen Naturselbtheilung.

Symptome.

Die Krankheit beginnt mit Schlingbeschwerden, Schmerz, Hitze und Trockenheit des Halses. Die erkrankte Mandel vergrössert sich allseitig und ist auch von aussen unter dem Unterkiefer als leichte Geschwulst zu fühlen. Schwellen, was sehr häufig vorkommt, höle zugleich an, so berühren sie sich und steigen nun alle Symptome beträchtlich, bis endlich selbst Suffocation eintritt. Die Stimme ist hierbei immer nieselnd; die Schmerzen strahlen nach dem Ohre aus, es kann durch Hinaufdrängen des hinteren Gaumenlappens der Zugang zur Rachenhöhle der Eustachischen Trompete mechanisch verlagert und auf diese Weise Ohrenschmerzen und Schwerhörigkeit bedingt werden. Die Schlingbeschwerden sind bei Flüssigkeiten grösser als bei compacten Bissen, z. B. von Brod oder Fleisch, weil die letzteren durch ihre Festigkeit sich selbst den Weg bahnen, während die Getränke nur durch gleichmässige Compression der ganzen Mundhöhle gegen die geschwellten Mandeln durchgedrückt werden können.

Untersucht man nun die Mundhöhle, so muss man mit einiger Schonung zu Werke gehen, die Kinder einen heissen Fester gegenüber placiren und sie zuerst nur einfach den Mund öffnen lassen, wobei man häufig schon den ganzen Process übersehen kann, besonders wenn die Kinder auch die Zunge dabei herausstrecken und tief inspiriren. Gelingt es auf diese Weise nicht, die Mandeln vollständig zu sehen, so muss man die Zunge niederdrücken, was nach meinen Erfahrungen sich die Kinder viel lieber mit dem Finger als mit dem Spatel oder einem Löffelstiel gefallen lassen. Uebrigens kann man mit dem Finger die Zunge viel tiefer herunter drücken und zu gleicher Zeit den Kopf besser fixiren als mit einem Löffelstiel. Man sieht nun das Gaumensegel geröthet und die hochrothen Mandeln mit dickem, säurem Schleim bedeckt. Sie füllen den grössten Theil des Isthmus faucium aus. Wenn die Angina ein paar Tage bestanden hat, so kommen einige gelbe Punkte an den Mandeln zum Vorschein, aus welchen sich beim Anstechen eine ziemliche Menge eiterförmigen Eiters entleert, worauf eine rasche Besserung und wieder nach einigen Tagen vollständige

Heilung eintritt, wenigstens was die subjectiven Symptome betrifft; denn trotz des Substanzverlustes bleibt eine solche Mandel noch lange Jahre vergrößert. Eine acute Angina tonsillaris mit Schmerz, Schlundbeschwerden und Fieber dauert bei Kindern niemals länger als fünf bis sechs Tage, dann geht der Abscess entweder auf, oder es kommt gar nicht zur Eiterbildung, sondern der Process geht über in die chronische, schmerzlose Induration.

Was die Aetiologie betrifft, so tritt sie zuweilen epidemisch auf, meist aber sind die Fälle nur sporadisch und treffen die besonders disponirten Individuen. Ansofern ist die Mandelentzündung eine constante Begleiterin des Schädels, geht aber hier gewöhnlich nicht in Eiterung über, und kommt zuweilen auch bei secundärer Syphilis vor, die sich bei Kindern jedoch seltener als bei Erwachsenen am Gaumensegel und den Tonsillen entwickelt.

Therapie.

Die Behandlung ist verschieden nach dem Alter des Kindes. Kleine Kinder unter 3—4 Jahren, die der Krankheit viel weniger unterworfen sind als die Kinder nach dem Durchbruch der bleibenden Zähne, können bekanntlich nicht gurgeln und behalten niemals Wasser im Mund, sondern schlucken es immer gleich hinunter. Es fällt bei diesen also ein Haupterleichterungsmittel, das Gargarisma, weg. Die so beliebten Eisküchegargarismen mildern den Schmerz weniger und können den Schleim, der fortwährend die Mandeln und die hintere Pharynxwand dick bedeckt, nicht so gut entfernen, als frisches kaltes Wasser, das man die Kinder so lange ruhig im Mund behalten, nicht aber gurgeln lässt, bis es ihnen durch seine Wärme unangenehm wird. Es wird dann durch frisches ersetzt. Die dicken Cataplasmen und Kleinstücke, mit denen man den Kindern den kalten Kopf zu verbinden pflegt, sollen die Eiterung befördern, machen aber jedenfalls den Kopf heiss und eingenommen. Ich bin von dieser ihrer letzten Wirkung viel gewisser überzeugt als von der ersten und gebe auch die deshalb nicht. Oelreizungen des Halses wirken schmerzstillend und erhitzen nicht. Bei Erwachsenen kann man heftige angustöse Beschwerden durch einige Blutegel sehr rasch mindern, bei Kindern ist aber der Blutverlust und dann die durch die Application der Blutegel hervorgerufene Angst und Aufregung mehr zu berücksichtigen. Die Incisionen in die hochgeschwollenen Mandeln, durch welche man bei Erwachsenen grosse Erleichterung und Abkürzung der Schmerzen bewirken kann, erfordern vor Allem die Einstimmung des zu Operirenden, auf welche man bei Kindern vergebens hoffen wird. Bei grosser Athemnoth und Suffocation müssen sie aber gemacht werden und können durch den mannigfach gehandelten Brechstein nicht ersetzt werden. Es gelingt nur selten durch Brechbewegungen die Abscessen zum Platzen zu bringen. Der Eiter muss dabei jedenfalls sehr oberflächlich sein und lässt sich wahrscheinlich in den nächsten Stunden spontan entleeren.

Man kann sich also bei acuter Angina tonsillaris auf Gargarismen aus kaltem Wasser und auf Oelreizungen beschränken. Bei Suffocation müssen Einschnitte in die Mandeln gemacht werden, und wenn dies wegen zu grosser Unruhe des Kindes und mangelnder Assistenten nicht sicher ausgeführt werden kann, kann man ein Brechmittel ver-

sachen. Die gewöhnlich bestehende Oslipation wird sehr passend durch ein leichtes Abführmittel, Det. tamarind, oder ein Infus. Rhei oder einige Kaffeeölöl Tinct. Rhei aquosa beseitigt.

2) Hypertrophia tonsillarum.

Es gibt eine erbliche Hypertrophie beider Tonsillen, welche sich schon sehr früh, oft schon im zweiten Lebensjahre entwickelt und nicht die Folge von Anginen ist. Beide Mandeln sind hier gleichmässig angeschwollen, drängen das Gaumensegel nach vorne, schliessen das Zäpfchen zwischen sich ein, vergrössern sich nach oben gegen die Nasenhöhle und bedingen dadurch eine nasale Stimme. Durch die Verlagerung der Eustachischen Trompete tritt Ohrenschmerz und Schwerhörigkeit ein. Rötung, Schmerz und subjective Symptome sind hierbei nicht zugegen, die Schwerhörigkeit, die nasale Stimme, der Tag und Nacht offene Mund, ein fortwährendes Schnarchen im Schlafe sind die Hauptmomente, welche uns zu einer Untersuchung der Mandeln, die man bei bedeutender Vergrösserung auch von aussen fühlt, auffordern müssen.

Die von Dupuytren zuerst als Folge der hypertrophischen Mandeln angegebene Atrophie der Respirationsmuskeln und das *Pectus carinatum* (Hühnerbrust) konnte ich nicht finden oder wenigstens kein so häufiges Zusammentreffen dieser Zustände beobachten, dass sich hieraus ein striktes Abhängigkeitsverhältnis erachtesse liesse. Es gibt eine Menge ganz gut entwickelter Kinder, welche keine Spur von Hühnerbrust oder überhaupt irgend einer Erkrankung der Brust und der Brusteingeweide zeigen und doch an hypertrophischen Mandeln leiden und eine noch grössere Menge von Kindern leidet trotz ganz normaler Mandeln an hochgradiger Hühnerbrust und mangelhafter Entwicklung der Brustmuskeln.

Schon vor Beginn der Pubertät tritt ein Stillstand im Wachsthum der hypertrophischen Mandeln ein, und der freie Raum zwischen denselben vergrössert sich wieder bei den Erwachsenen. Zu acuten Anginen sind die damit behafteten Kinder häufig disponirt, und sehr gewöhnlich begleiten scrofulöse Erkrankungen der Haut, der Augen und der Knochen dieses Uebel.

Behandlung.

Die niedrigen Grade erfordern gar keine Behandlung. Bei mehrere Monate andauerndem Gebrauche des Leberthraus, der wegen anderer scrofulöser Affectionen gegeben wurde, sah ich mehrmals eine auffallende Vorkleinerung der hypertrophischen Mandeln, in den höchsten Graden des Uebels aber liess mich derselbe im Stiche. Durch lange Zeit fortgesetzte Bienensteinsanctionen, die wöchentlich zweimal vorgenommen werden können und, gewandt applicirt, den Kindern gar keine Schmerzen und Beschwerden machen, erreicht man eine ziemlich beträchtliche Vorkleinerung der Tonsillen, so dass man in vielen Fällen den Kindern oder eigentlich deren Angehörigen die Operation ersparen kann. Wenn aber das Uebel hochgradig ist, so ist die Exstirpation der Mandeln dringend indicirt, weil sonst die Kinder suffocatorisch zu Grunde gehen können. Die Operation wird entschieden am besten mit dem neuen Mathieu'schen Tonsillotom, wo man mit einem Ruck die

Mandel anspiesset und mit dem zweiten das hervorragende Stück guillotiniert, zur Ausführung gebracht. Wenn man die Kinder überrascht und sie von der Operation nichts ahnen, so lassen sie sich gutwillig das in einen stumpfen Stab hing endende Instrument, in welchem die Klinge verborgen ist, um die Mandel legen, in demselben Moment ist sie schon ausgespiesset und im nächsten abgeschnitten, so dass sie kaum zum Bewusstsein des Geschehens gelangen können. Die Abtragung einer Mandel genügt, den *Infans facinus* zu öffnen; zuweilen kann man die zweite unmittelbar darauf noch wegnehmen, gewöhnlich weihen sich die Kinder aber sehr hiegegen und das Chloroformiren ist wegen des hinabfließenden Blutes nicht rathsam.

Man lässt die Wundfläche heilen und schneidet später, sollten die Symptome sich nicht gehörig mindern, auch die andere ab. Die Amputation mit der Mussey'schen Zange und dem Messer ist sehr mühsam und wegen der Nähe der *Carotis interna*, die nach aussen und hinten an die Mandel grenzt und bei unruhigen Kindern leicht verletzt werden kann, auch gefährlich.

3) Retropharyngealabscess.

Die Abscesse der internen Pharynxwand lassen sich nach Bokai bezüglich ihrer Entstehungsweise in drei Arten einteilen: a) in solche, die sich idiopathisch aus einer Entzündung des Pharynx und des denselben umgebenden Zellgewebes entwickelten; b) in solche, die sich secundär in Folge einer Vereiterung von entzündeten Halsdrüsen bilden und c) in solche, die mit Halswirbelcaries complicirt sind.

Bei allen drei Arten ist immer das erste Symptom ein langsam sich steigender Schmerz beim Schlucken, wobei bald eine gewisse Steifheit des Halses bei Bewegungen des Kopfes ohne äusserlich wahrnehmbare krankhafte Erscheinungen dieser Theile sich einstellt. Die Stimme wird nasal und bei der Untersuchung der Mundhöhle findet man den Pharynxraum verkleinert, die hintere Pharynxwand nicht auf beiden Seiten gleichmässig weit vom Gaumensegel entfernt, geröthet. Bei vorgerückterem Stadium der Krankheit wird die Steifheit des Halses immer auffallender, die Kinder beugen den Kopf constant nach rückwärts und bekommen Athemnoth, so bald man das Kind dem Stuhne nähert. Der Hals wird in der Gegend der Unterkieferwinkel etwas dicker. Fieber und Unruhe stellt sich ein und nimmt mit Vergrösserung des Abscesses von Tag zu Tag zu. In den höchsten Graden des Uebels vermögen die Kinder nicht mehr zu schlucken, athmen nur sehr mühsam mit schmerzhaft verzerrten Gesichtszügen, das Athmen ist hart schnarchend, jedoch nicht pfeifend wie beim Krup, wofür man im ersten Augenblicke die Krankheit halten könnte, wenn auch noch die Sprache unverständlich, die Stimme klanglos wird. Die Mundhöhle ist fortwährend mit Schleim erfüllt und die hintere Pharynxwand flakirt endlich bei Berührung ziemlich deutlich. Der Abscess kann so gross werden, dass er bis zum Gaumensegel, das auf ihm aufliegen scheint, vorwächst. Reicht er tief hinab, so ist selbst das Zungenbein und der Larynx nach vorne oder zur Seite gedrängt, und wird er endlich geöffnet, so strömt eine grosse Menge Eiter hervor, worauf sämtliche Erscheinungen augenblicklich nachlassen; trotz der

spontane Aufbruch im Schlafe stattfindet, so sollen schon Kinder durch den Elter, der ihnen in den Larynx fluss, erstickt sein.

Bei der zweiten auf Halsdrüsenvergrößerung folgenden Art findet man ausserdem noch vergrösserte oder vereterte Lymphdrüsen am Halse und bei der dritten, der häufigsten Art, die Erscheinungen eines Monate lang vorausgehenden Halswirbelleidens, schmerzhafte Halswirbel, schmerzhafte, erschwerte Bewegung, Rückwärtsbengung des Kopfes, Aufwärtsziehung der Schultern und Auftreibung oder Formveränderung der ergriffenen Wirbel. Obwohl Halsdrüsenvergrößerung zu den alltäglichen Leiden des kindlichen Alters gehören, so kommen doch Retropharyngealabscess in Folge von Drüsenvergrößerung ausserordentlich selten vor. Mir z. B. ist noch nie dieser Ausgang eines Lymphdrüsenabscesses begegnet. Die Prognose ist bei Retropharyngealabscessen immer zweifelhaft, bei Wirbelleiden mit Durchbruch des Eiters in den Rachen fast tödtlich zu stellen.

Behandlung.

Da die Diagnose erst mit Bestimmtheit gestellt werden kann, wenn der Abscess sich schon gebildet hat, so lässt sich von der Antiphlogose, von Blutgehn, Eisumschlägen und Laxantien so wenig wie von den zertheilenden Mitteln, der grossen Salbe, Jodsalben, Jodtinctur oder Cataplasmen, etwas erwarten.

Grösseren Kindern gewähren in den Mund gestemmte Eisstückchen durch ihre adstringierende und schmerzstillende Eigenschaft die grösste Erleichterung. Hat man sich aber einmal wirklich von der Gegenwart eines Abscesses überzeugt, so ist schnelle Eröffnung das einzige Mittel, die quälenden Symptome zu heben. Nur bei gleichzeitigen Leiden der Wirbelsäule, das übrigens nicht immer leicht zu diagnostizieren ist, rath Bamberger mit Recht, mit der Eröffnung so lange zu zögern, bis wirkliche Gefahr droht; denn der Zutritt der atmosphärischen Luft beschleunige stets das Fortschreiten der carieösen Wirbelerkrankung. Wenn bei Halswirbelleiden überhaupt etwas erwartet werden darf, so ist eine ruhige Rückenlage, mehrere Monate lang fortgesetzt, unerlässlich. Hierbei müssen natürlich die Kräfte möglichest aufrecht erhalten werden und durch ein später zu verordnendes Haarseil, sowie den lang fortgesetzten Gebrauch des Jodtincturs muss man versuchen die verdickten Wirbelkörper zur Resorption zu bringen.

4) Entzündung des Oesophagus. Oesophagitis.

Fast alle Schleimhautkrankungen der Mundhöhle können sich auf die Schleimhaut des Oesophagus bis zur Cardia fortsetzen. Es gibt eine catarrhalische, mercurielle und diphtheritische Entzündung desselben; auch kann sich der Sore bis zum Magen erstrecken. Die gewöhnlichste Art der Erkrankung der Speiseröhre aber ist die durch ätzende Substanzen und die durch mechanisch wirkende fremde Körper. Sie kommen fast nie bei Kindern unter einem Jahre vor, weil diese noch zu einfach genährt werden und zu ungeschickt sind, um selbst nach schädlichen Stoffen zu greifen und sie zu verschlucken.

Die Symptome der Oesophagitis sind folgende:

Brennender oder stechender Schmerz an irgend einer Stelle des

Oesophagus, am Halse, am Rücken zwischen den Schulterblättern oder in der Herzgrube, das Schlucken ist immer mit Schmerz verbunden, selbst die mindeste Flüssigkeit, der eigene Speichel gleitet nicht ohne Schmerz hinunter. Je nach der Heftigkeit des Schmerzes tritt Moss Würgbewegung oder wirkliches Erbrechen ein, besonders in der Rückenlage ist das Schlucken erschwert, weil bei zurückgebeugtem Kopfe die vordere Wand der Wirbelsäule eine in die Rachenhöhle hineinragende Convexität bildet, weshalb man ja auch allen Kranken den Kopf emporziehen pflegt, wenn man ihnen Medicin reichen will. Der Durst ist bei Oesophagitis sehr quälend und die Kinder vorwiegend aus Furcht vor dem Schmerze beim Schlucken Tage lang alles Getränke. Da die gewöhnlichsten Veranlassungen zur Oesophagitis Verbrennung mit heissem Wasser, Lauge oder concentrirte Säuren sind, so ist immer die Hauptveränderung im Munde, und es lässt sich von dieser ein Schluss auf die Veränderung der Oesophagusschleimhaut machen. Ist es einmal zur Geschwürsbildung gekommen, so heilen dieselben, weil die Schleimhaut der Speiseröhre bei jedem Schlucke eine bedeutende Ausdehnung erfährt, nur sehr langsam und fast immer mit Verengung des Lumens, welche Monate lang anhält und erst spät einen höheren Grad erreicht. Ausser diesen Verbrennungen, die hauptsächlich wegen der Ungeschicklichkeit der Kinder und ihrem Mangel an Geistesgegenwart entstehen, indem sie die in den Mund genommene ätzende Substanz nicht gleich wieder ausspucken sondern verschlucken, gibt es noch eine Oesophagitis traumatischen Ursprungs. Sie entsteht durch Verschlucken und Steckenbleiben von Fischgräten, Knochenfragmenten, Nadeln und spitzen Körpern aller Art und hauptsächlich auch durch ungeschickte und rohe Versuche, dieselben zu entfernen. Endlich hat man auch Geschwürsbildung im Oesophagus auf grosse Dosen Tartarus stibiatus in Pulverform gereicht, entstehen sehen.

Behandlung.

Der Erfolg der Extraktionsversuche fremder Körper hängt häufig bloss vom Zufall ab, da man den Fixirungsort nicht genau wissen und oft auch nicht erfahren kann, um welche Art fremden Körpers es sich handelt. Sie sind auch nicht immer notwendig, denn es gibt eine Menge von Stoffen, z. B. Brodkrusten, hartes Zuckerwerk aller Art, selbst Stückchen Holz, welche bei längerem Liegenbleiben erweichen und durch Nachtrinken hinuntergespült werden können. Je länger der fremde Körper festsass, um so schwieriger wird seine Entfernung, da die Entzündung der Speiseröhre ihr Lumen noch mehr verengt. Der Versuch, spitze Körper in den Magen zu stoßen, kann sehr schlimm ausfallen, da man ihr oben nicht durch die Oesophaguswand durch als in den Magen hinabstoßen kann. Füllt er die Höhle der Speiseröhre nicht vollkommen aus, was bei spitzen Körpern wohl niemals der Fall sein wird, so wird er durch ein über ihn hinausgebrachtes Instrument, dessen Ende ein paar stumpfe Haken hat, oder nach Art eines Regenschirms entfaltet werden kann, zuweilen herausgezogen.

Gegen die chemischen Verbrennungen muss man, wenn sie erst ganz kurz geschehen sind, die Alkalien, gegen Säuren die Alkalien und umgekehrt, in passender Verdünnung anwenden. Später reicht man Emulsionen und lässt zur Stillung des Durstes Eisstückchen im

Munde vergehen, wenn die Kinder sich hartnäckig weigern zu schlucken. Es wird kaum nöthwendig sein, den Genuss fester Nahrungsmittel noch speziell zu verbieten, da beim ersten Versuche sich der Schmerz schon gewaltig steigert. Bei grossen Schmerzen legt man eine warme feuchte Cravatte um den Hals und gibt Opium dem Alter entsprechend, einem zweijährigen Kinde einen Tropfen Opiumtinktur, einem dreijährigen zwei Tropfen und so mit jedem Lebensjahre einen Tropfen mehr. Ein schlimmer, aber sehr häufiger Ausgang der Oesophagusgeschwüre, wie sie eben auf chemische oder mechanische Reize folgen, ist die Strikture. Die Bildung der Strikturen muss durch Bougiekuren, die man ganz in der Weise ordnen kann, wie bei den Strikturen der Harnröhre, verhindert werden. Wo sie schon entstanden, ist das Bougie und seine consequente Anwendung die einzige Rettung vor dem Hungertode.

5) Angeborene Halsfistel. *Fistula colli congenita.*

Eine sehr seltene, wenig beschriebene Krankheit, die erst von wenigen Aerzten beobachtet worden ist. Ich selbst hatte nur einmal Gelegenheit sie zu sehen. Nach Bednar verläuft sie ihren Ursprung dem Offenbleiben der zweiten oder dritten Kiemenspalte. Nach demselben Autor befindet sich ihre äussere Mündung, in deren Umgebung die äussere Haut an dem unterliegenden Zellgewebe festhängend ein Grübchen bildet, an der Seitengegend des Halses, $\frac{1}{2}$ Zoll vom Schlüsselbein und seiner Vereinigung mit dem Brustbein entfernt. Ihre innere Oeffnung mündet entweder in dem Schlundkopf neben dem Kehldeckel oder sie endet blind in der Nähe desselben. Das Secret dieser Fistel besteht in zähem Schleim und kommt hauptsächlich beim Kauen und Schlingen zum Vorschein, in die Fistel eingespritztes Wasser ruft eine Schlingbewegung hervor.

Die Heilver suche mittelst Canterisation blieben bis jetzt ohne Erfolg.

6) Sklerose des Musculus sternocléidomastoideus.

In den ersten Lebenswochen kommt zuweilen eine eigenthümliche strangartige Verdickung eines Kopfnickers vor, deren Deutung noch keineswegs klar ist. Der harte Strang sitzt offenbar im Muskel, sitzt aber oder neben demselben, tritt stets einseitig auf, hat eine cylindrische Bleistift ähnliche Form und ist $\frac{1}{2}$ —1 Zoll lang. Die Geschwulst ist meist ziemlich beweglich, tritt bei der Bandpresse deutlich hervor und theilnähmt sich bei allen Bewegungen des Kopfnickers. Paget gibt an, dass das Gewicht nicht nach der erkrankten Seite hin gedreht werden könnte, in den drei Fällen, die mir bisher vorgekommen, war von einer Funktionsentzug des Muskels nichts zu bemerken. Die Aetiologie der französischen Autoren, welche die Geschwulst einfach durch eine schwere Geburt, Zangenoperation etc., entstehen lassen, passt für meine Fälle nicht, da bei allen dreien die Entbindung ohne Kunsthilfe von Statten ging und die Geschwulst erst einige Tage nach der Geburt bemerkt wurde. Gegen die Annahme einer geschwellenen Lymphdrüse spricht die offenbar walzenförmige Gestalt und das Fehlen anderweitiger Drüsenanschwellungen.

Behandlung.

Sämmtliche Autoren, Lallemand, Mehlhor, Dolbeau, Paget, Wilks etc. stimmen darin überein, dass die Geschwulst nach einigen Wochen auf innerlichen Jodgebrauch spurlos verschwinde, was ich durch meine eigene Erfahrung, einfache Einsparungen mit Jodtinktur, vollkommen bestätigen kann.

D. Magen- und Darmkanal.

1) Die wichtigsten Symptome der Magen- und Darmkrankheiten.

Es repetiren sich bei den verschiedenen Magen- und Darmkrankungen so viele Symptome, dass es praktischer erscheint, sich über dieselben von vornherein zu verständigen, bevor wir zur Beschreibung der einzelnen Krankheiten, die dann mehr pathologisch anatomisch aufgefasst werden können, übergehen.

a) Dyspepsie (d. Zerknirschung, Verdauungsstörung).

Unter Dyspepsie versteht man eine vollkommene Aufhebung oder bloße Verminderung des Appetits; in dem letzteren Falle werden die gewöhnlichen Nahrungsmittel verschmälzt und es besteht bloss ein Verlangen nach den Lieblingsgerichten, von denen aber auch verhältnissmässig nur sehr wenig genossen wird. Der Appetit ist der zuverlässigste Wegweiser bei Beurtheilung einer Allgemeinerkrankung, und das hierüber anzustellende Examen macht den wichtigsten und schwierigsten Theil des ganzen Krankexamens aus. Man darf sich niemals mit allgemein gehaltenen, vagen Antworten abfertigen lassen, sondern muss ganz genau die Menge und Qualität der genossenen Nahrungsmittel erforschen, muss sich das Gefäss zeigen lassen, aus welchem die Kinder zu essen bekommen, wie weit es voll war, wie viel übrig geblieben ist etc., nur dann bekommt man eine richtige Ansicht von der wirklichen oder eingebildeten Abnahme des Appetites eines Kindes.

Bambergers führt in seinem Lehrbuch der Krankheiten des chylopoetischen Systems folgende vier Arten von Dyspepsien an.

1) Dyspepsie durch anatomische Veränderungen der Verdauungsorgane.

2) Dyspepsie durch quantitative und qualitative Anomalien der Verdauungssecrete.

3) Dyspepsie durch veränderten Nervenreiz, wohn auch die secundär bei verschiedenen Krankheiten vorkommenden Verdauungsstörungen gehören und

4) Dyspepsie durch abnormen Reiz der Nahrungsmittel.

Alle diese Arten von Dyspepsien kommen, wie bei Erwachsenen, auch bei Kindern vor. Die seltenste ist die erste, die zweite ist sehr häufig und begleitet hauptsächlich die verstärkte Ausscheidung des Darmsecretes, die Diarrhöe. Die dritte findet sich bei allen acuten fieberhaften Erkrankungen und gibt den besten Anhaltspunkt für die Beurtheilung der Schwere und Dauer eines Fiebers, und die vierte ist die allhäufigste Erkrankung in der ganzen Pädiatrik, an der die Mehrzahl aller künstlich aufgefütterten Kinder das ganze erste Lebens-

jahr hindurch laborirt. Dass diese einzelnen Arten nicht immer streng von einander geschieden werden können, braucht kaum besonders erwähnt zu werden, indem ja einzelne sich gegenseitig direkt bedingen und in innigstem Zusammenhange stehen.

Bei jeder Dyspepsie ist der Verdauungsakt nicht nur verzögert, sondern auch von den mannigfachsten localen und allgemeinen Beschwerden begleitet. Die längere Zeit im Magen unverdaut liegenden Nahrungsmittel entwickeln stets Gase, welche einen denselben verwandten wenn auch nur unbedeutenden Geruch haben, und von denen die geruchlosen Gase, die bloss durch Schlürfen mit in den Magen gerathen sind und aus atmosphärischer Luft bestehen, wohl unterschieden werden müssen. Der grössere Theil der riechenden Gase entwickelt sich erst im Darmrohr und dehnt dasselbe aus, wodurch bei Berührung des Abdomens oder durch Bewegung des Körpers Schmerzen entstehen, die gewöhnlich mit dem Entweichen einer grossen Quantität von Gas endigen. Grössere Kinder klagen auch bei gestörter Verdauung über ein Gefühl von Druck, Völle und Schmerz in der Herzgrube und fast regelmässig gesellt sich hienzu ein consensuseller Stimm- oder Schilddrüsenschmerz, der nicht eher weicht, als bis der Appetit wiedergekehrt ist. Das gewöhnliche und bald eintretende Ende jeder Dyspepsie, besonders aber der durch abnormen Reiz der Nahrungsmittel bedingten ist Erbrechen, worauf, wenn bloss unverdaut Nahrungsmittel die Schuld trugen, der Appetit schnell wiederkehrt und die übrigen consensusellen Symptome verschwinden.

Therapie.

Die Behandlung der Dyspepsie erfordert ein gründliches Eingehen in ihre Ursachen und ist je nach diesen bald eine radicale, bald eine symptomatische, bald eine rein expectative. Die Verhältnisse sind häufig so complicirt, die Ursachen so schwer zu ermitteln, dass es zu den schwierigsten Aufgaben gehört, allgemeine rationelle Regeln für diese Behandlung aufzustellen. Die Basis der ganzen Behandlung beruht auf strenger Diät, auf Entziehung der Nahrungsmittel, wie ja überhaupt Ruhe im Allgemeinen, Ruhe des erkrankten Organs insbesondere der erste Grundsatz der ganzen Therapie ist. Mag die Ursache der Dyspepsie sein, welche sie will, ihr Effect ist immer derselbe — verminderte oder aufgehobene Verdauungsfähigkeit — und die Zufuhr neuer, der Verdauung bedürftiger, breiiger oder gar fester Nahrung ist also unter allen Umständen schädlich. Bei anatomischen Veränderungen der Verdauungsorgane kann natürlich auf den Appetitverlust nicht eingewirkt werden, da er nur eine Folge der Schleimhaut-erkrankung ist und so lange bestehen wird, als diese sich nicht zur Heilung anschickt. Dyspepsien, verursacht durch Anomalien der Verdauungssecrete, lassen sich durch richtig gewählte Medicamente oft schnell beseitigen. Bei künstlich aufgefütterten Kindern ist es nützlich sehr gewöhnlich, dass in Folge der vielen Nahrungsmittel, die für den jugendlichen Magen noch nicht geeignet sind, ein viel stärker Magen-saft als bei Brustkindern secretirt wird, und dass, wenn auch die Diät schon längere Zeit dem kindlichen Alter entsprechend regulirt ist, diese Secretion noch in reichlicher Menge fort dauert und Dyspepsie und Erbrechen bedingt. Man warte diese Zustände schon in den ältesten

Zeiten und gab dagegen die *oculi cancerum*, die jetzt von kohlensauren Kalk, von der kohlensauren Magnesia oder vom doppelt kohlensauren Natrium mit Recht verdrängt worden sind. Welches dieser drei Mittel man geben will, ist ziemlich gleichgültig, sie neutralisiren alle auf gleiche Weise den überschüssigen, zu sauren Magensaft und wenn ein Kind ein paar Tage lang 0,1—0,2 dieser Mittel genommen hat, bekommt es regelmäßig guten Appetit und gute Verdauung, vorausgesetzt, dass die Präsumtion der Ursache richtig war.

Ältere Kinder bekommen ziemlich häufig Icterus und wenigstens in den ersten Tagen vollkommene Appetitlosigkeit. Dieselbe sah ich in mehreren Fällen auf Argent. nitric., das man vom fünften Jahre an ganz passend in Pillen geben kann, deren jede 0,01 Höllenstein enthält, mit einem Male weichen. Nach 3—4 Pillen kehrte der Appetit wieder, obwohl der Icterus noch Wochen lang bestand.

Die Dyspepsie, welche fieberhafte Krankheiten begleitet, erfordert keine specielle Behandlung. Der Instinkt ist bei den Kindern noch viel lebhafter und richtiger als bei Erwachsenen. Kinder mit wirklich heisser trockener Haut und beschleunigtem Pulse rühren niemals vorgewetzte Speisen an und trinken auch nicht gerne stickstoffhaltige Getränke, wie Milch oder Suppe, sondern verlangen immer nach kaltem Wasser, das sie allen Säften und säuerlichen Getränken vorziehen. Es gibt kein Mittel, diese Dyspepsie zu heben und wenn es auch eines gäbe, so wäre es jedenfalls während der Dauer des Fiebers contraindicirt. Hingegen kommt es häufig vor, dass man durch gar zu eilige Darreichung von Mitteln, z. B. des so sehr beliebten Tartarus emeticus in refin. des., der Ipecacuanha, der Nitchelhalbe, der Säuren etc. die Verdauung der Kinder länger als das Fieber währt, beeinträchtigt und hierdurch die Reconvalescentz verlangsamt.

Bei der durch abnormen Reiz der Nahrungsmittel bedingten Dyspepsie muss einige Tage strenge Diät, bestehend in dünner Schleimsuppe oder mit Chamillensteeo gemischter Milch, gehalten werden, dann können die pag. 36 ff. angegebenen Ernährungsweisen versucht werden. Eine entschieden günstige Wirkung äussert auf eine so gereizte Schleimhaut das Calomel zu 0,01 täglich 2—3 Mal gegeben. Es erfolgen einige grüne Stühle, der matorisch aufgetriebene Leib wird kleiner, es tritt Ruhe und Schlaf ein und die Kinder fangen wieder an zu verdauen.

b) *Bulimia* (ἡ βούλιμα, der Heissunger). *Polyphagia* (ἡ πολυφαγία, die Gessamgült). *Facies canina*.

Eine krankhafte Vermehrung des Appetites kann zwar auch durch alte Gewohnheit und verkürrte Erziehung erworben werden, ist aber viel häufiger ein Symptom verschiedener krankhafter Zustände, bei Kindern vor allem der Eingeweideschwüre, dann der Hypertrophie der Mesenterialdrüsen und der chronischen Gehirleiden. Der nach acuten Krankheiten, besonders nach Typhus, sich einstellende Heissunger gehört nicht hierher, sondern findet seine physiologische Erklärung in dem raschen Ersatz der verloren gegangenen Fettmasse. Auch zu jener Bulimie, welche bei allgemeinem Wohlbefinden und ohne alle Organerkrankungen entsteht, muss eine besondere Disposition angenommen werden, denn es werden sehr viele Kinder von ihren unver-

zünftigen Angehörigen fortwährend zum Essen angehalten und durch Abwechslung in den Leckerbissen dazu geizt und nur wenige können sich diesen sehr seltenen Zustand erworben. In diesen Fällen gehören die Gegenstände, womit die Kinder sich ihren Heissungen zu stillen suchen, immer in die Klasse der wohlchmeckenden Nahrungsmittel, bei der auf krankhaften Organveränderungen beruhendes Gefässigkeit aber kommen Gelfüste, ähnlich wie bei schwangeren Frauen, vor. Solche Kinder essen dann rohe und schlechte Nahrungsmittel, Rüben, Kräuter, Wurzeln aller Art und verzweigen zu keiner Tageszeit, auch nicht unmittelbar nach dem Mittagessen das schwarze Roggenbrot, von dem sie gottessen so viel sie überhaupt bekommen können. Kann diesem Zustand nicht frühzeitig abgeholfen werden, so wird er chronisch, ohne dass die Kinder dabei an Körpergewicht und Grösse rascher zunehmen als andere mässige Kinder. Im Gegentheil, sie sehen in der Regel blass und anämisch aus, entleeren copiose, stark riechende Stühle und bleiben im Wachsthum zurück. Bei der Section findet man einen ausserordentlich grossen Magen mit verdickten Wandungen und, wie Eingangs bemerkt, gewöhnlich noch andere Veränderungen in verschiedenen Organen.

Therapie.

Die Behandlung ist glücklich und rasch, wenn Eingeweidewürmer, die man mit den verschiedenen Wurmmitteln abtreiben kann, die Ursache der Polyphagie sind, unglücklich und erfolglos aber, wenn, wie bei den atrophischen Kindern, die Mesenterialdrüsen sammtlich vergrössert und infiltrirt sind, oder wenn ein Hydrocephalus chronicus der Grund der Gefässigkeit ist. Man muss sich hier darauf beschränken, wenigstens nur blande, leicht verdauliche Nahrungsmittel zu gestatten, die Quantität derselben lässt sich kaum verringern.

c) Erbrechen. Vomitus.

Das Erbrechen hat bei Kindern oft eine andere Bedeutung als bei Erwachsenen. Es gibt nämlich eine grosse Anzahl von Säuglingen, welche, so oft sie getrunken haben, ohne alle Würgehewegungen, ohne Verzerrung des Gesichts und ohne alle Folgen die Milch zum Theil wieder heransbrechen, was am sichersten geschieht, wenn man sie nach dem Trinken hin- und herbewegt oder schaukelt. Sehr begünstigt wird dieses Erbrechen durch das fast vollständige Fehlen des Blinddarmes, des Fundus ventriculi bei Kindern, wodurch bei peristaltischen Bewegungen des Magens dessen Inhalt nicht wie bei Erwachsenen in den Fundus, sondern direct gegen die Cardia gedrängt und bei mangelhaftem Verschluss derselben sogleich nach oben befördert wird. Hat man Gelegenheit, entkleidete Kinder Milch brechen zu sehen, so kann man sich leicht überzeugen, dass hierbei durchaus keine Bauchpresse stattfindet, sondern dass mit einem Male, während die Kinder ganz ruhig respiren und die Zeichen allgemeinen Wohlbefindens an sich tragen, die Milch ruhig aus dem Munde herausschiesst. Sie brechen übrigens nie sehr viel Milch heraus und gedeihen bei diesem Zustand vortreflich, so dass das alte Spitzwort der Kinderfrauen „Speikinder, Gedeihkinder“ als wahr anerkannt werden muss.

Es findet dass Erbrechen nur bei Brustkindern statt, die künst-

lich aufgezogenem Erbrechen zwar auch oft genug, es geht aber hier dem Brechakt Unbelaglichkeit, Schlaffigkeit und Hitze voraus, das Erbrechen selbst ist mit Würgen und Contraction der Bauchmuskeln verbunden und seine Folgen sind Abmagerung und Verdauungsstörungen aller Art. Das Erbrechen besteht nicht rein aus den unverdauten, gemauerten Speisen, der Kuhmilch, dem Brei oder der Suppe, sondern es ist ihm schon eine grössere Menge sauren Schleimes beigemengt und die Kuhmilch ist zu grösseren Klumpen geronnen. Wer zum ersten Male ein grösseres Kind bis zu fünf Jahren mit Ueblichkeiten bealachtet, hält es für sehr schwer erkrankt, dem Tode nahe. Solche Kinder entfallen sich vollständig, die Stirne ist mit kaltem Schweise bedeckt, das Auge matt, die Respiration schwach, unregelmässig, der Puls so klein, dass er kaum zu fühlen ist. Die Kinder legen sich hin und stöhnen leise, stecken zuweilen die Hand in den Mund und haben im Gesichte den Ausdruck der höchsten Angst. Dieser Zustand kann mehrere Stunden lang dauern. Plötzlich tritt heftiges Erbrechen ein, eine grosse Menge von Speisebrei strömt in heftigem Bogen aus dem Munde, es folgen noch einige Würgebewegungen unter heftigen Schreien der erschrockenen Kinder nach, und das ganze Krankheitsbild ist mit einem Male verschwunden. In der Regel tritt bald hierauf ein tiefer langer Schlaf ein, aus welchem die Kinder, wenn bloss eine Ueberladung des Magens mit schweren unverdaulichen Speisen die Schuld der Erkrankung war, vollkommen gesund erwachen, oder höchstens noch einige Zeit verminderten Appetit und belegte Zunge zeigen.

Werden Kinder von acuten Exanthemen, von Typhus oder Pneumonie befallen, so findet in der Regel am ersten Tage der Krankheit Erbrechen der letztgenannten Mahlzeit statt; wenn dasselbe nicht spontan entsteht, so beschränke ich mich darauf, durch mechanische Mittel Brechreiz zu veranlassen, Ipecacuanha aber und Tartarus emeticus sollen niemals gereicht werden, weil sie immer zugleich auf den Stuhl wirken und Diarrhöen die genannten Krankheiten nur erschweren.

Kommt ein Spulwurm in den Magen, was bei Kindern unter einem Jahre um sehr selten, bei grösseren dagegen ziemlich häufig vorkommt, so scheint ihm dessen süsser Inhalt schlecht zu belagen, er bewegt sich rasch und veranlasst antiperistaltische Bewegungen und Erbrechen, womit er zum grösseren Schrecken unerfahrener Angehöriger entleert wird. Ueble Folgen sind hiervon nicht zu beobachten, gewöhnlich aber tödten solche Kinder immer an einer grossen Zahl von *Ascaris lumbricoides* und man thut gut, ihnen einige Tage nach dem Brechen wurmtreibende Mittel zu reichen.

Ganz eigenthümlich ist das Erbrechen bei acuten Gehirnerkrankheiten, bei *Comotio cerebri* und besonders bei *Hydrocephalus acutus*. Wenn man die hieran Leidenden auf die andere Seite legt oder aufrechtsetzt, so kommt plötzlich, ohne dass die Kinder dadurch unangenehm afficirt würden, wenn andere sie bei Bewusstsein sind, ein Guss schleimigen, weissen oder gelbgrünen Wassers zum Munde heraus, worauf sie ohne alles Würgen und ohne Zeichen von Ueblichkeit wieder zu trinken hegehren oder einschlafen. Man hat also in allen Fällen zu examiniren und wohl zu beachten, ob dem Erbrechen Ueblichkeit und Würgen vorausgeht oder nicht. Gehen diese Symptome nicht voraus, so hat man es mit sehr ernstem cerebralen Erbrechen

zu thun, wozu das zuerst besprochene Erbrechen der gesunden Säuglinge, das sich ohne Würgen sich einstellt, die einzige Ausnahme macht.

Behandlung.

Gegen das Erbrechen der Säuglinge hat man nicht einzuschreiten, so lange die Ernährung nicht darunter leidet und nicht grosse Quantitäten Milch entleert werden. Ist aber diess der Fall, so muss das Stillen in anderer Weise vorgenommen werden, die Kinder dürfen nicht trinken, bis sie von selbst die Brust verlassen, sondern man muss sie noch halb so langer Zeit abnehmen und möglichst ruhig hinlegen. Das dadurch entstehende Geschrei giebt sich bald. Durch diese Prozedur allein sehen gelingt es gewöhnlich, das allzuhäufige und massenhafte Erbrechen zu verhüten. Reicht diess nicht aus, so giebt man einige Kaffeelöffel eines gezuckerten, starken Chamillenthees, bevor man die Kinder an die Brust legt.

Das Erbrechen künstlich ernährter Kinder ist immer ein Symptom von geschwächter Verdauung und muss unter jeder Bedingung bekämpft werden. Es passt hier die Behandlung mit kohlensaurem Kalk oder mit kohlensaurem Magnesia vortreflich und führt, wenn die Diät ausserdem gütlich regulirt ist, bald zum Ziele. Ist der Darm mit erkrankt, ist Diarrhöe zugegen, so muss erst diese gestillt werden, bevor man ein Aufhören des Erbrechens erwarten darf. Auch hier steht das Calomel zu 0,01 2—3 Mal im Tage gerichtet, unter allen bekannten Mitteln an.

Glaubt man, dass die Kinder Brechreiz haben und nur in Folge dessen unruhig und von Angst ergriffen sind, so gestügen gewöhnlich mechanische Mittel, den Brechakt selbst hervorzurufen. Das sicherste ist die direkte Compression des Magens, die ich in der Weise ausführe, dass ich mit den Fingerspitzen oberhalb des Nabels gegen die Herzgrube hin einen allmählig zunehmenden Druck mit rotirender Handbewegung ausübe, wodurch gewöhnlich heftige, zeitweilen fühlbare Contractionen des Magens bedingt werden. Kommt es auf diese Weise nicht zum Erbrechen, so führe ich den Finger in den Mund, drücke die Zunge nieder und kitzle das Gaumensegel. Erfolgt auch nach dieser Manipulation kein Erbrechen, so kann man mit Bestimmtheit annehmen, dass die Kinder keinen Brechreiz haben, und dass ein gereiztes Emetikum keine günstige Veränderung in dem Zustand hervorbringen wird. Glaubt man ganz deutliche Zeichen von Ueblichkeiten bei einem Kinde, dem auf diese Weise keine Brechbewegungen gemacht werden konnten, bemerkt zu haben, so streut man ihnen am praktischsten 0,25—0,5 Ipecacuanhapulver auf die Zungenwurzel, indem man mit dem Zeigefinger der linken Hand die Kiefer möglichst weit auseinander hält, und giebt ihnen darauf einige Kaffeelöffel Wasser zu trinken. Reicht auch diese Quantität Ipecacuanha nicht hin, so darf man sich versichert halten, dass der Magen keinen ihm belästigenden Inhalt hat und dass durch stärkere Brechmittel nur grosser Schaden angerichtet wird.

Das Erbrechen bei Gehirnerkrankungen ist nur ein symptomatisches, und lässt sich meines Wissens auf keine Weise stillen oder nur mindern; kommt in ganz seltenen Fällen der Hydrocephalus acutus noch einmal zum Stillstand, so hört es spontan wieder auf.

Das auf *Comotio cerebri* durch einen Sturz oder Schlag entstandene dauert, wenn keine Knochenverletzungen noch Gehirnläsionen zugegen sind, nur einen oder wenige Tage, um dann einer vollständigen Genesung Platz zu machen.

d) Flatulenzia und Colic.

Wenn die im Magen und Darmkanal physiologisch immer sich befindende Luft beträchtlich an Menge zunimmt und hierbei die peristaltische Bewegung dennoch nicht in der Weise beschleunigt ist, dass die abnorme Gasanhäufung durch den Aft sich entleert, so entsteht eine Ausdehnung des Magens und Darmcolons und in Folge dessen eine vermehrte Spannung der Bauchdecken, die man, wenn sie acut ist, *Meteorismus*, wenn sie chronisch geworden, *Flatulenz* oder *Tympanites* nennt. Diese Vermehrung von Gas verdankt der Darm grössten Theils einer Vermehrung seines eignen Secretes; denn nirgends ist dieselbe constant, als vor und während der Diarrhöen. Verstopfung führt wohl auch Flatulenz herbei, dieselbe ist jedoch nie so häufig und beträchtlich, als die die Diarrhöen begleitende. Zu den höheren Graden von *Meteorismus* gehört immer auch eine Verminderung des Tonus der Magen- und Darmmuskularis, ohne welche die entstehenden Gase immer gleich wieder zum Aft gelangen und nach aussen strömen müssen; diese findet sich hauptsächlich im Typhus, zuweilen auch in acuten Exanthemen. Die Nahrungsmittel, welche Kindern unter einem Jahre gereicht werden, Milch, Brod, Suppe und Amylacea, machen, so lange sie vertragen werden, niemals Flatulenz, tritt aber Diarrhöe ein, so lässt sich nicht mehr entscheiden, ob die darauf entstehende Darmausdehnung eine Folge der Nahrungsmittel oder des vermehrten Darmsecretes ist.

Mechanische Hindernisse, Carcinome des Magens oder Darmrohrs, eingeklemmte Hernien, bandartige Peritonäalexsudate, einschnürende Geschwürnarben, die bei Erwachsenen so gefährliche meist tödtliche Gasauftreibungen bedingen, kommen bei Kindern fast nie, bei Säuglingen absolut nie vor.

Symptome.

Unter Flatulenz versteht man eine Vergrößerung des Unterleibes, welche entweder die ganze Bauchhöhle oder nur einzelne Theile derselben treffen kann, je nachdem der Magen und das ganze Darmrohr oder nur einzelne Abschnitte des letzteren besonders ausgedehnt sind.

Gewöhnlich nimmt man an, dass bei einem mehr zugespitzten Unterleib der Dünndarm, bei einem breiten kugelförmig aufgetriebenen der Dickdarm ausgedehnt sei, wobei aber jedenfalls ein completter Abschluss zwischen Dick- und Dünndarm bestehen müsste, da in mit einander communicirenden Räumen die Luft gleiche Spannung und nur gleichmässige Ausdehnung ihrer Schranken bewirken kann. Dass ein so completter Abschluss jemals an der Cecalklappe vorkomme, ist nicht denkbar, wohl aber ist ein ungleicher Tonus der Dick- und Dünndarmmuskularis möglich.

Bei acuten Krankheiten, besonders im Abdominaltyphus, wird der Zustand durch *Meteorismus* wesentlich verschlimmert, indem die

Lungen und das Herz dadurch comprimirt und so Athemnoth und Circulationsstörungen begünstigt werden.

Die Colik (*ἡ κοιλία νόσος*, Leibschmerzen) ist ein in den Darmanwandungen entstehender Schmerz, welcher meist anfallsweise wiederkehrt und exacerbiert. Derselbe ist natürlich nur Symptom und zwar der verschiedenartigsten Unterleibskrankungen, seine häufigste Veranlassung aber ist die Flatulenz. Die Colik ist deren stete Begleiterin. Ausserdem kommen bei Kindern mit jeder Diarrhöe, die in Folge anomalen Reizes der Nahrungsmittel entstanden ist, Kolikschmerzen vor und dieselben feldern nie, wenn einmal materielle Veränderungen auf der Darmschleimhaut, wenn Enteritis folliculosa oder Dysenterie selbst nur in ihren leichteren Graden sich entwickelt haben.

Grössere Mengen von Spulwürmern können heftige Colikschmerzen verursachen, einzelne Spulwürmer gehen häufig von Kindern ab, die durchaus keine Colik und überhaupt keine Symptome derselben gezeigt haben, wie bei dem Abschnitt von den Entozoen noch ausführlicher erörtert werden wird. Auch gibt es Kinder, welche nach jeder Verkühlung, besonders bei nassem Füssen, plötzlich von Colik befallen werden, ohne dass die Verdauung vor oder während desselben merklich gestört wurde. Solche Kinder vertragen gewöhnlich das Baden und selbst die Waschungen mit kaltem Wasser nicht, sondern müssen oft Jahre lang mit warmem Wasser und nur sehr vorsichtig gewaschen werden.

Die Symptome sind gewöhnlich folgende: Plötzlich schmerzhaftte Verzerrung der Mundwinkel und der Gesichtszüge überhaupt, plötzliches lautes schallendes Geschrei, unruhige Bewegungen der Arme, Stampfen mit den Füßen, Aufwärtsziehen desselben zu dem Leib, Schmerzhaftigkeit des Leibes, die bei Bestührung zunimmt, Meteorismus, bei Knaben ist das Schreien im Zustande masserter Contraction. Gewöhnlich tritt aber bald Entleerung von Gasen oder flüssigen Fäces, häufig auch Erbrechen ein. Bei sehr reizbaren Kindern und hohem Grade von Colik kann es sogar zu Convulsionen kommen. Die Diagnose hat ihren Hauptanhaltspunkt an den vollständigen Interventionen der Schmerzen und an den vorausgehenden Verdauungsbeschwerden.

Man darf sich nieigens nie auf die Aussagen der Angehörigen verlassen, welche sehr geneigt sind, jede Unruhe der Kinder auf Colikschmerzen zu schieben, sondern muss immer die Kinder vollständig entkleiden lassen, und sie 10–20 Minuten lang massig beobachtet und untersuchen. Ein anderer Theil der Mütter hält das Colikgeschrei immer für Hunger und beist sich mit der Milch oder gar mit Brei den Mund zu stopfen, was merkwürdiger Weise oft gelingt, indem die Kinder nach einigen Schlucken wirklich sich beruhigen, aber nur, um nach kurzer Zeit in Folge des Reizes der neu eingebrachten Nahrungsmittel ein nie so lautes und längeres Geschrei zu erheben.

Therapie.

Die Behandlung der Flatulenz hat das Ziel, das Gas aus dem Darme zu entleeren, was am besten momentan durch Clystiere erreicht wird. Meistens genügt schon ein gewöhnliches Clystier mit warmem Wasser, dem ein Kaffeelöffel Oel beigelegt worden; wenn hierauf

keine capillare Färbung von Fäces und Gasen erfolgt, so gibt man Clystiere entweder von ganz kaltem Wasser ohne Oel, oder von einem starken, warmen Chamilleninfusum; die ersteren haben eine plötzlich vermehrte peristaltische Bewegung des ganzen Darmkanals zur Folge, die häufig von lebhaften Schmerzausschüßungen begleitet wird und deshalb bei vorherrschenden Koliksymptomen nicht wünschenswerth ist, die letzteren hingegen sind hauptsächlich gegen die Kolikschmerzen gerichtet und wirken mehr krampfstillend als Gas entziehend. Die bei Erwachsenen so beliebten Eisbäder oder kalten Umschläge auf den Leib wirken bei kleinen Kindern sehr ungünstig und verschärfen die Schmerzen ohne folgende Erleichterung. Es kann mit dieser Behandlungsweise Moss ein momentaner Nutzen gebracht werden, gegen die Ursachen der Flatulenz aber kann man nur einschreiten, wenn man die ganze Ernährung des Kindes prüft und genau die Wirkung der einzelnen Nahrungsmittel beobachtet. Es stellt sich bei diesen Untersuchungen, wie schon gesagt, heraus, dass hauptsächlich das diarrhoische Darmscret, bevor es ausgeschieden wird, grosse Mengen Gas entwickelt, und dass also alle Nahrungsmittel, welche den Kindern leicht diarrhoische Stühle verursachen, mittelbar auch die Flatulenz bedingen; als die bekanntesten sind das Mehlreis und überhaupt alle mit Kuhmilch und Amylaceen bereiteter Speisen anzuführen, die Brustkinder leiden fast niemals an Flatulenz. Es ergibt sich ferner, dass man künstlich aufzunehmende Kinder, die Neigung dazu haben, bald an Flusssuppe gewöhnen muss, die man ihnen Anfangs mit etwas Zucker und nur einmal im Tage, später zweimal und ungezuckert reichen kann. Sich auf einzelne Fleischsorten, Kalbfleisch, Hühnerfleisch zu capriciren, halte ich für Luxus, die Hauptsache ist, das die Suppe nicht zu concentrirt, nicht stark gesalzen und von Fettungen möglichst befreit sei. Das beste Material, der Suppe eine breiige Consistenz zu geben, ist geriebenes Weizenbrot; Reis-, Griss- und Schleimsuppen werden nicht lange genossen und widerstehen bald.

Die Colik erfordert während der Anfälle eine symptomatische, nachher aber eine causale Behandlung. Die symptomatische Behandlung besteht entweder in vorsichtiger Anwendung der Narcotica, besonders der Opiumpräparate, der Blausäure, und Nux. vomica, oder in ätherischen, aromatischen Mitteln, Chamillen-, Pfefferminz- oder Melissenthee, per os et anum applicirt. Wärme ist vor allen Dingen nöthig und muss durch Wärmflaschen, warme Tücher, warme Getränke und durch warme Säckchen, die man mit Chamillenblumen gefüllt den Kindern auf den Leib legt, hergestellt werden.

Die causale Behandlung hat die verschiedenen Ursachen zu beseitigen.

1) Colik durch Anomalie des Magen- und Darmkanals. Hier ist wo möglich der Magen durch mechanische Mittel, oder wenn diess nicht gelingt, durch 0,25—0,5 Ipecacuanapulver zu entleeren. Sind schwer- oder unverdauliche Nahrungsmittel einmal über den Pylorus hinaus, so verursachen sich schon durch ihren eignen Reiz Diarrhöe und man hat kaum je Veranlassung, dasselbe medicamentös zu bewirken, vielmehr trifft es sich häufig, dass die Diarrhöe, weil sie zu profus geworden, durch stopfende Mittel gestillt werden muss. Die Wurmscoliken müssen Anfangs mit Opium zur Beruhigung der Colik,

dann aber mit grossen Portionen wurmtreibender Mittel, deren Besprechung weiter unten folgen wird, behandelt werden. Einem mit Diarrhöe und Colik behafteten Kinde soll man wie Vernixfuga reichen.

2) Durch stagnirende Kothmassen bedingte Coliken kommen bei Kindern wegen ihrer überhaupt rascheren Verdauung und Resorption fast nie vor. Nur die Obstkerne, besonders die der Trauben und Kirschen, bleiben, wenn der Stuhl trotz der genossenen Früchte hart bleibt und grosse Mengen derselben verschluckt worden sind, zu grossen Klumpen zusammen, die heftige Colikschmerzen und selbst Symptome von Darmatrose bedingen können. Da diese Obstkerneklumpen meist schon im Dünndarm liegen bleiben, so genügen Clysmata zu ihrer Entfernung gewöhnlich nicht, sondern es handelt sich darum, sie durch eine grössere Menge Darmsaure zu erweichen und zu verflüssigen, wozu einige grössere Dosen Calomel von je 0,25 vollständig genügen.

3) Die auf Texturkrankheiten des Darmrohrs selbst beruhenden Coliken verlangen nur eine symptomatische Behandlung, wie sie schon oben gelehrt worden, die Behandlung der Texturkrankungen wird bei der Besprechung derselben ausführlicher gegeben werden.

Bleiccoliken, Arsenicoliken und überhaupt alle toxischen Coliken müssen, wie bei Erwachsenen, durch die entsprechenden Antidota, welche die Toxicologie lehrt, behandelt werden.

e) Diarrhöe. (z. B. gelbes, Durchflosses.)

Unter Diarrhöe versteht man eine qualitative und quantitative Veränderung der Excremente. Die Qualität der Excremente ist, abgesehen von den später zu erörternden chemischen und mikroskopischen Eigenschaften, in so fern verändert, dass ihre Form nicht mehr die bräunliche, sondern vielmehr wasserdünnere Flüssigkeit allein oder wasserdünnere Flüssigkeit, in der noch Fäcalmassen oder Speisereste suspendirt sind, zur Ausscheidung kommt. Die Quantität ist bei Diarrhöe immer vermehrt, genauere Zahlenangaben lassen sich nicht geben, weil gerade im kindlichen Alter sich die Stühle nie gehörig sammeln lassen und die Wägungen deshalb nur ein höchst approximatives Resultat liefern; das Augenmass genügt aber vollständig zur Rechtfertigung des Ausspruchs, dass in der Diarrhöe eine grössere Menge Fäces entleert wird, als im Normalzustand. Dass zur Entfernung einer grösseren Menge von Fäces der Mastdarm sich häufiger öffnen muss als gewöhnlich, bedarf keiner weiteren Erklärung. Wegen des abnormen Reizes, den der flüssige salzreichere Darminhalt auf die Sphincteren ausübt, findet die Defecation noch viel häufiger statt, als gemäss der Totalmenge des Ausgeschiedenen unumgänglich nöthig wäre.

Man kann je nach Form, Farbe und Geruch, ferner nach den chemischen und mikroskopischen Eigenschaften verschiedene Arten von Stühlen unterscheiden.

Die normale Form der kindlichen Fäces im ersten Lebensjahre — im späteren Jahren unterscheiden sie sich nicht mehr von denen Erwachsener — ist die bräunliche, die Farbe ist gelb, wie die eines Eidotters, der Geruch ist schwach säuerlich, niemals aschhaft und nur bei Kindern, welche schon Fleischkost bekommen, so widerlich penetrant, wie bei Erwachsenen.

Die Diarrhöen können nun einfach in weicheren, dünnflüssigeren, aber gelb gefärbten und noch flüchtigen Materien bestehen, *Diarrhöa simplex, stercoraria sive fusa*, oder es gehen mit so beschaffenen Stühlen unverdauliche Nahrungsmittel ab, was man *Diarrhöa lienterica, Lienterie* (kürer glatt und lappiger Eingeweide, *levitas intestinalis*) genannt hat. Bei künstlich aufgefütterten Kindern finden sich dieselben ausserordentlich häufig, indem die sorglosen Eltern von Zeit zu Zeit Versuche machen, ob man nicht endlich einmal aufhören dürfe, für das Kind spart zu kochen, und anfangen könnte, es aus der grossen Schüssel mitessen zu lassen. Sie geben den Kindern Fleisch, Gemüse und Obst; Feingeschmittenen Fleisch wird zuweilen verdaut, in der Regel aber schlucken die Kinder wegen des Mangels der Zähne zu grosse Stücke hinunter, die der Magensaft nicht auflösen vermag, und die nun als fremde Körper, theilweis in Zersetzung begriffen, das ganze Darmrohr passieren. Gemüse und reines Obst gehen gewöhnlich unverändert wieder ab und machen oft eine sehr profuse, gefäßliche, oft wieder gar keine *Diarrhöe*.

Ferner gibt es Diarrhöen, wo die hellgelben Anmerkungen so dünn sind, dass so wie aus einer Spritze aus dem Mastdarm hervorspritzen, wie Wasser sogleich die Wäsche durchdringen und an der Oberfläche des Tragkissens zum Vorschein kommen. Sie treten hauptsächlich in der *Chorea nostras* und *acutica*, und bei Kindern, die eben von der Brust abgewöhnt werden sollen, *Diarrhöa alactatorum*, auf, sind entweder ganz geruchlos, oder haben einen nachläufigen, ebenfalls aber den physiologischen säuerlichen Geruch und reagiren nie sauer, wie die normalen Stühle der Brustkinder, sondern neutral, zuweilen selbst alkalisch bei Gegenwart von grösseren Mengen kohlensaurer Alkalien. Hat man Gelegenheit, sie in einem reinen Gefässe aufzufangen und bringt man sie dann in Reagensgläsern, so scheiden sie sich nach Art der Typhusstühle in zwei Schichten, in eine obere hellere, fast ganz durchsichtige, und in eine untere flockige mit kleinen braunen Kothbröckchen vermischte; diese untere Schichte ist oft sehr niedrig und wird von der oberen um das sechsfache an Volumen übertroffen. Die mikroskopische Untersuchung zeigt ausser den unverdaulichen Speiseresten, als Pflanzenzellen, Amylonkörnern, Milchkügelchen, Caseincoagula etc., nichts, als intensiv gelb oder leuchtend gefärbte Schollen, Fragmente von Epithelien — ganze Cylinderepithelien finden sich äusserst selten — und eine Menge brauner Kugeln von verschiedener Grösse und ohne Hülle, was man durch einfache Compression leicht nachweisen kann. In alkalischen Stühlen finden sich auch Tripelphosphate. Eisinhaltig sind diese dünnflüssigen Stühle gewöhnlich nicht; nur wenn sie rosenrothe oder rothbraune Färbung haben, was gewöhnlich von der Beimischung kleiner Quantitäten von Blut herrührt, lässt sich leicht Eisens durch Salpetersäure nachweisen. —

Die grünen Stühle der Kinder heissen gewöhnlich „gallige“, jedoch ohne triftigen Grund; denn es hat noch Niemand bewiesen, dass in denselben mehr Gallenbestandtheile enthalten sind als in den gelben oder braunen. Der Gallenfarbstoff ist ursprünglich braun und es sind desshalb die normalen Faeces braun oder, wenn die Kinder nur Milch bekommen, goldgelb. Der braune normale Gallenfarbstoff (das Biliphen) kann aber sehr leicht durch eine Menge chemischer Agentien,

selbst schon durch einfache Berührung mit atmosphärischer Luft in den grünen (das Biliverdin) umgewandelt werden, und dies geschieht medicamentös in der Pädiatrik sehr häufig durch Calomel. Die Annahme, dass die grünen Stühle nach kleinen Dosen Calomel von einer mechanischen Beimischung des mit einem schwarzen Ueberzug von Schwefelquecksilber bedeckten Mittels herrühren, ist eine irrige; denn 1) dauern diese grün gefärbten Stühle oft mehrere Tage und in grosser Menge fort, ohne dass man, nach dem zweiten Tage, Quecksilber in denselben nachweisen kann, und 2) kann man dieselben mit Wasser verdünnen und das Wasser abfiltriren, wobei es ganz grün durch das Filtrum läuft, so dass von einer mechanischen Färbung durchaus keine Sprache sein kann.

Während der Dentition und fast nach jedem Intestinalcatarrh durch indigeste Nahrungsmittel kommen bei kleinen Kindern die grünen Stühle vor, und es scheint das verätherte Darmsecret schon hinreichend, das Biliphäin in Biliverdin umzuwandeln. Eine sehr häufige Erscheinung ist auch die Entleerung vollkommen gelber Fäces, welche sich aber an der Luft nach wenigen Stunden grün färben. Dieses Farbenspiel beginnt an der Peripherie und den dünneren Schichten der Fäcalmasse zuerst, und ergreift erst nach längerer Zeit die dicke Hauptmasse, bis endlich das Ganze gleichmässig grün gefärbt erscheint. Gewöhnlich leiden die Kinder mit solchen Entleerungen an leichten Verdauungsbeschwerden. —

Bei einer anderen Art von Diarrhöe kommen Beimischungen von grossen Quantitäten Schleimes vor, welche in grösseren oder kleineren Klumpen und Fäden zwischen dem meist dünnflüssigen Darmsecret sich finden und die grösste Aehnlichkeit mit dem glasigen Nasenschleim haben. Sie lassen sich durch Schütteln mit Wasser vom Farbstoff ziemlich gut befreien, verlieren aber dabei an Durchsichtigkeit und zeigen unter dem Mikroskope Schleimbüschchen, Fragmente von Epithelen und körnige Massen. Die Entleerung derselben ist schmerzhaft. —

Bei künstlich aufgefütterten, langsam sich entwickelnden Kindern findet man zuweilen thonartige, festige, graue oder hellgelb gefärbte Stühle, welche sich zwischen den Windeln wie feuchte Thonerde verzhäutern lassen, und meist nur unter bedeutender Anstrengung den Anus passieren. Diese Entfärbung rührt von Mangel an Galle oder wenigstens an Gallenfarbstoff her, und hat meines Wissens keine schlimmen Folgen auf die Verdauung und Entwicklung überhaupt. Durch Tinct. Rhei aquosa oder 0.5 Rheinpulver kann man wohl eine vermehrte Gallensecretion erzielen, man läuft aber hierbei immer Gefahr, einen Darmcatarrh, dessen Ende nicht abzusehen ist, hervorzurufen, und kann desshalb mehr Schaden als Nutzen hierdurch stiften.

Sehr wichtig für die Beurtheilung der Schleimhautrekrankung und besonders für die Prognose ist der Geruch der diarrhöischen Fäces. Bei ganz gleichem Aussehen und gleicher Dünnflüssigkeit gibt es Stühle, die fast gar nicht, andere, die einfach fecal, und wieder andere, welche faulig aschhaft riechen. Diese letzteren sind immer Symptome einer schweren Erkrankung, einer Enteritis folliculosa, die in den meisten Fällen mit dem Tode endet. Der Geruch lässt sich schwer beschreiben und ähnelt am meisten dem verfaulten Eier; er ist oft so heftig, dass

die Pflege dieser Kinder nur mit der größten Aufopferung bewerkstelligt werden kann, und dass die übrigen Bewohner des Zimmers, in welchem ein solches sich befindet, dasselbe verlassen müssen. Die Entleerung dieser Fäces ist ebenfalls schmerzhaft und rückt den Arm und seine Umgebung. So kommen am häufigsten in Begleitung des Stools vor, wobei dann Arms, Genitalien, innere Schenkelfläche und die Fersen intensiv geröthet und theilweise noch erodirt erscheinen. Mikroskopisch und chemisch konnte ich an diesen Stühlen keine besonderen Merkmale entdecken, und weiss ausser dem Geruch nichts Charakteristisches anzugeben.

Eiter in den Stühlen kommt bei kleinen Kindern wohl nie vor, bei grösseren nach überstandenen Dysenterien. Tuberculöse Darmgeschwüre sitzen meist im Dünndarm und ihre Secretion ist nicht so copios, dass ganze Streifen von Eiter, denn nur diese sind gemeint, in den Stühlen sich finden.

b) Obstipation, Obstructio sive Verstopfung.

Wenn ein sonst gesundes Kind unter einem Jahre nicht täglich zwei, und vom 1—3 Jahre nicht wenigstens eine Analeerung hat, so wird die Consistenz der Fäces zu hart und es tritt der Zustand ein, den man Obstructio sive nennt. Unter den kleinen Kindern sind hauptsächlich die künstlich aufgefütterten derselben unterworfen, doch kommt sie auch bei Brustkindern vor, namentlich bei solchen, deren Mütter an diesem Uebel leiden. Die chemische Untersuchung solcher Anmengen führt zu negativen Resultaten.

Die Ursachen der Verstopfung finden sich in folgenden Momenten:

1) Mangelhafter oder zu zäher Darmchleim. Hierin ist der Grund der Verstopfung in den meisten fieberhaften Krankheiten oder bei vermehrter Schweiss- und Urinsecretion zu suchen, ohne dass die Beschaffenheit der Nahrungsmittel dabei beeinträchtigt ist.

2) Die Nahrungsmittel, besonders die Amylum haltigen Bece aus Mehl, Reis, Sago etc. Bei älteren Kindern die Speisen aus Erbsen, Bohnen, Linsen, Kastanien. Ferner alle adstringirenden Nahrungsmittel und Medicamente, rother Wein, die Bleipräparate, Alaun, Eisen, Wismuth, Kalk, Silbersalpetre und die gerbstoffhaltigen vegetabilischen Mittel, bei deren Anwendung gegen Diarrhöe ihre stopfende Wirkung lange Zeit nachhält.

3) Zu geringe peristaltische Bewegung des Darmrohrs, die fast nie primär sondern meistens secundär als Folge der Erkrankung anderer Organe beobachtet wird. Hieher gehört die hartnäckige Obstipatio bei Hydrocephalus acutus, bei welcher trotz ihres langen Bestehens der Leib immer kugelförmig eingezo-gen bleibt; ferner die durch Opiumnarcose bewirkte. Bei atrophischen Kindern in ultimo stadio stellt sich ausser der Verminderung des Darmsecretes auch Atrophie der Darmmucularis und damit aus doppeltem Grunde Verstopfung ein, und endlich kommen noch periphere lähmungsartige Zustände des Darmes vorzüglich bei mechanischer oder perforativer Peritonitis vor.

4) Mechanische Hindernisse, incarcirte Hernien, Intussusceptiones, Achsendrehungen, vollständige Verstopfung des Darmlumens durch harte Kothmassen etc. kommen bei Kindern ausserordentlich

sehen vor. In neuester Zeit machte A. Jacobi in New-York auf ein anatomisches Verhältniss aufmerksam, von dessen Richtigkeit ich mich früher bei einigen Sectionen Neugeborener überzeugen konnte. Der Darmkanal ist nämlich bei Neugeborenen relativ länger als bei Erwachsenen, der Dickdarm z. B. bei einem achtmonatlichen Fötus ist $2\frac{1}{2}$ Mal so lang als sein Körper, beim Erwachsenen nur 2 Mal so lang. Diese Verlängerung beruht auf einer stärkeren Entwicklung des colon descendens, während colon ascendens und transversum eher verkürzt als im richtigen Verhältniss gebildet erscheinen. Die übrige Kleinheit des Bauchraumes und die grosse Leber bedingen nun stärkere Krümmungen des colon descendens, das anstatt einer Carvatur (C. sigmoidea) deren mehrere beschreibt. Die eigentliche flexura sigmoidea findet sich deshalb entweder mehr in der Mittellinie oder aber entschieden rechts. Dass in Folge dieser vermehrten und verstärkten Krümmungen des Darmes die Fortbewegung seines Inhaltes erschwert werden müsse, ist klar. Bei Neugeborenen muss endlich auf Imperforatio ani, deren Besprechung weiter unten folgen wird, Bedacht genommen werden. —

Die Beschreibung der Symptome ist durch die Bezeichnung des Uebels fast schon erschöpft. Der Leib ist aufgetrieben, aber bei einfacher Verstopfung nicht schmerzhaft bei Berührung. Die spärlichen Fäces liegen trocken wie die der Ziegen oder Schafe in den Windeln. Bei längerer Dauer und höherem Grade nimmt der Meteorismus in einer Weise zu, dass die Leber nach oben gedrängt, die Milz nicht mehr zu percutiren und das ganze Abdomen trommelartig anzufühlen ist, wobei natürlich ein Druck auf dasselbe schmerzhaft wird. Die Kinder soon dann nicht mehr, sind sehr müdig, bekommen Aufstossen und endlich Erbrechen, es gehen mit einiger vorübergehender Erleichterung stinkende Darmgase ab, und sämtliche Symptome verschwinden mit einem Male, wenn eine oder einige copiose Ausleerungen erfolgt sind.

Bei längerer Dauer wird der Meteorismus chronisch. Unter dem fortbestehenden Appetitmangel kommen die Kinder sehr herunter und es entwickeln sich in Folge der anhaltenden Compression der Abdominalvenen unter der Bauchhaut beträchtliche collaterale Venenverästelungen.

Bei jeder bedeutenderen Obstruction ist es rathsam, den Anus und den Mastdarm mit dem Finger zu untersuchen, weil dadurch eine interne Behandlung zuweilen überflüssig wird. Die Folgen derselben sind häufig Harnen und, bei kleinen Kindern, Convulsionen. Die Prognose ist, wenn keine mechanischen, unüberwindlichen Hindernisse, wie sub 4) angegeben, vorhanden sind, günstig zu stellen.

Therapie.

Die Behandlung muss die Ursachen aufsuchen, wobei vor Allem die Diät genau geprüft und regulirt werden muss. Oft genügt schon eine kleine Modification der Ernährung, z. B. wenn man statt drei Mal nur zwei Mal Brei geben lässt und dafür mehr Milch reicht, oder wenn man statt der sehr stopfenden Schleimsuppen dünne Fleischbrühe mit etwas Weissbrod oder Gries als tägliche Nahrung und etwas concentrirtes Zuckerwasser als Getränk einführt. Bei etwas älteren Kindern

kann man durch gekochtes oder auch rohes reifes Obst, Trauben, Äpfel, Birnen etc., dann durch reichliches Trinken kalten Wassers den Stuhl leicht vornehmen, und überhaupt ist es in allen Fällen rathsam, die Verstopfung durch geänderte Diät und nicht durch Abführmittel, was immer für Namen sie haben mögen, zu heben. Gelingt es auf diese einfache Weise nicht, das Uebel zu bekämpfen, so ist die Tinct. Rhei aquosa zu 1—2 Kaffelöffel gegeben, das beste und unschädlichste Mittel. Zur Beförderung des Stuhles ohne weitere Nebenzwecke soll man nicht immer gleich Calomel reichen, weil von Quecksilber eben doch der Verdacht nicht weggewälzt werden kann, dass es in vielen Fällen die Entwicklung in der Folge retardirt und die Zahnaries befördert. Auf einfache Weise lässt sich oft durch ein Seifenzipfchen von der Länge eines Fingergliedes und der Dicke eines Federkiels Verstopfung heilen. Clysmata mit kaltem oder Seifenwasser haben den doppelten Nutzen, die harten Faecalmassen im Rectum zu erweichen und durch chemischen Reiz den ganzen Darm zu vermehrter peristaltischer Bewegung und vermehrter Secretion anzuregen. Wenn übrigens die Kothmassen sehr compact sind, so gelingt es nicht, ein Clysmata zu geben, sondern das Wasser fließt regelmäßig schon während des Einspritzens wieder ab, wo dann nichts übrig bleibt, als auf mechanische Weise mittelst Haarnadel oder Ohröffel dieselben zu entfernen. Die in Begleitung fieberhafter Krankheiten, dann die in Folge von Hydrocephalus acutus oder von Peritonitis entstehende Verstopfung wird nur selten Gegenstand specieller Behandlung und wird in den entsprechenden Abschnitten abgehandelt werden.

2) Catarrh der Magenschleimhaut. Catarrhus gastrici.

Der Catarrh der Magenschleimhaut oder die Gastritis catarrhalis findet sich in den Leichen vieler Kinder, die bei Lebzeiten durchaus keine Zeichen von gestörter Verdauung erkennen lassen. Wenn man bedenkt, dass bei Neugeborenen eine lebhaft rothe der Magenschleimhaut ein physiologischer Zustand ist, so wird man auf die so oft beschriebenen Injectionen und selbst Ecchymosen derselben kein grosses Gewicht legen können, zumal wir gar keine Anhaltspunkte haben, ob und welche Symptome hierdurch erzeugt werden. Nur wenn eine Blenorrhoe der Magenschleimhaut sich entwickelt hat und der profus secretirte Schleim mehrmals täglich ausgebrochen wird, hat man vom klinischen Standpunkte aus das Recht, von Magen-catarrh zu sprechen. Die Veranlassungen hierzu sind so mannigfach wie die, welche in den vorübergehenden Abschnitten für Dyspepsie, Erbrechen, Flatulenz etc. aufgeführt worden sind.

Symptome.

Die Symptome einer solchen Magenblenorrhoe sind nun meist fixer, anhaltender Magenschmerz, der auf Druck zunimmt, permanente Aufreibung der Magengegend, fühlbar erhöhte Temperatur derselben und Anhäufung von Gas im Magen. Aufnahme von warmen oder festen Speisen und von warmen Getränken vermehrt den Schmerz, kalte Getränke, besonders kalte Milch beruhigt die Kinder merklich. Sie erbrechen zwar häufig auch die eingenommene Nahrung, hierauf

allein aber lässt die Diagnose des Magenkatarrhs sich nicht gründen, sondern es muss ohne viel Warten vor oder einige Stunden nach der Mahlzeit Erbrechen von reinem, glasigem, trübem oder grünlichem Schleim erfolgen. Die Ernährung leidet hierbei Anfangs nicht besonders, weil, wie schon bemerkt, die Nahrungsmittel nicht regelmäßig erbrochen werden und die Darmschleimhaut resorptionsfähig gelassen ist. Mit der Zeit aber tritt natürlich Abmagerung ein, und man findet dann in der Leiche die Magenschleimhaut verdickt, mit einer dicken Schleimmasse belegt und ihre Oberfläche neben warzig, was die Franzosen *état mammelé* genannt haben. Hierbei ist zu bemerken, dass besser man eine Schleimhaut als mammellonirt bezeichnen darf, man vorher die contrahierte Muscularis des Magens ausgedehnt haben muss, indem bei stark contrahiertem Magen eine jede, auch die gesündeste Schleimhaut ein warziges Aussehen bekommt. Die übrigen in den Lehrbüchern angegebenen Symptome, die den Puls, das Allgemeinbefinden, die Stühle, den Urin etc. betreffen, sind nicht charakteristisch genug, dass sie hier aufgeführt werden müssten.

Therapie.

Die Behandlung hat hauptsächlich die Diät ins Auge zu fassen, wobei mehrere Tage lang nichts als kalte Milch gestattet werden soll. Gegen die profuse Schleimsecretion hat sich der Höllestein als souveränes Mittel herausgestellt. Bei kleinen Kindern unter einem bis zu zwei Jahren gebe ich ihn in Lösung zu 0,03 auf 100,0 destillierten Wassers ohne allen Syrup oder schleimigen Zusatz. Bei mehrjährigen Kindern, die schon geschmeckt genug sind, ganz kleine Pillen von 0,06 zu schlucken, wirken Pillen, von denen jede 0,01 Argent. nitric. enthält, besser als die Lösung und sind leichter beizubringen. Ein einziges Mal erinnere ich mich bei einem zehnjährigen Knaben mit dieser Behandlung zu keinem Resultate gekommen zu sein. Derselbe nahm 10 Tage hindurch täglich 4—6 Höllesteinpillen ohne allen Erfolg, worauf ich ihn in 150,0 schleimigen Vehikel fünf Tropfen Kresot ordinirte und zu meinem Erstaunen das Erbrechen der Schleimmassen plötzlich zu Stillstand gebracht sah. Wegen des ählichen Geruches und überaus schlechten Geschmacks des Kresotes ist der Höllestein *causticis paribus* immer vorzuziehen. Conf. der Behandlung des Erbrechens, pag. 119.

3) Die toxische Entzündung des Magens.

Alle Kinder naschen gerne, und es geschieht es nicht gar selten, dass Kinder von 1—5 Jahren — die grösseren sind meist schon zu vorsichtig — besonders in Werkstätten, wo viel starke Säuren oder caust. Alkalien gebraucht werden, grössere Mengen Schwefelsäure, Salpetersäure, Aetzkali, Aetzkalk, gewöhnliche Lauge oder kohlensaures Natron hastig verschlucken und schon ziemlich grosse Mengen in den Magen bekommen, bevor sie ihren folgeschweren Irrthum inne werden. Die allgemeinen Wirkungen der caustischen Gifte zu erörtern, gehört vor das Forum der Toxicologie, wir wollen uns hier darauf beschränken, die örtlichen Veränderungen am Magen und den Eingeweiden zu betrachten.

Symptome und anatomische Charaktere.

Die Mundhöhle ist der sicherste Wegweiser für die Zerstörungen im Magen. Ihre Schleimhaut findet sich bei allen concentrirten Causticis zu einer weissgrauen Masse verwandelt, nach deren Entfernung das submucöse Gewebe dunkelroth zu Tage liegt und zuweilen bedeutende Blutungen erleidet. Nur bei der Salpetersäure ist die Schleimhaut gelb geläutert und weniger erweicht als geschrumpft. Bei sehr concentrirten und in grosser Menge in den Mund gebrachten Causticis ergreift die Zerstörung auch das submucöse Gewebe und man glaubt bei der ersten Besichtigung eine ausgedehnte Gangrän wie z. B. bei Noma vor sich zu haben. Einen ähnlichen Befund trifft man auch im Magen. Die leichtere Cantharisation mit schwächeren Causticis oder so kleinen Portionen, dass sie durch Verdünnung des Mageninhaltes kaum mehr kautisch wirken, kommen kaum jemals zur anatomischen Untersuchung, da das letale Ende erst viel später oder in den meisten Fällen gar nicht erfolgt. In den schnell tödtlichen Fällen findet man die Schleimhaut zu schwarzen Fetzen zerstört, die Muscularis und Serosa ebenfalls aufgelockert und gewöhnlich durchlöcheret, so dass der Mageninhalt in die Peritonäalhöhle ausgetreten ist. Der Zwölffingerdarm kann auch noch von dem Causticum erreicht werden, die Erscheinungen des Darmes sind aber im Verhältniss zu denen des Magens in allen Fällen sehr gering. Tritt nicht sofort der Tod durch Perforation des Magens ein, was bei wachsenden Kindern sich viel seltener ereignet als bei Selbstmördern, die mit Vorsatz eine grosse Menge ätzender Flüssigkeit verschlucken, so entstehen doch häufig Magen- und besonders Oesophagusgeschwüre (s. Oesophagitis, pag. 112), die nur sehr langsam mit Stricturen und harten Narben heilen.

Die ein solches Missgeschick begleitenden Symptome sind verschieden, je nach der Menge und Stärke des Causticums, je nach der Tiefe, bis auf welche sie im Oesophagus vorgedrungen, je nach der Zeit, die sie im Magen unverändert geblieben, und je nach der Menge von Speisestoffen oder Flüssigkeit, die sie im Magen vorgefunden haben. Gewöhnlich tritt unmittelbar nach der Einführung in den Mund Brechbewegung und krampfartige Verschlössung des Oesophagus ein, in Folge deren die ätzende Flüssigkeit gar nicht in den Magen gelangt, sondern wieder zum Munde herabgedrückt wird.

Viel schlimmer ist der Fall, wenn wirklich auch der Magen geätzt worden ist. Die Kinder setzen dann in der grössten Angst da, bewegen sich nur wenig, weil die enormen Magenschmerzen hiedurch noch vermehrt würden und fortwährend fliesst ihnen blutiger Speichel, dem zuweilen sich etwas erbrochene schwarze Masse hinzugesellt, aus dem Munde. Die Sprache ist vollkommen klanglos, jede Schlingbewegung ruft heisse heftige Schmerzen, selbst Ohnmachten oder Convulsionen hervor, und kalter Angstschweiss bedeckt das Gesicht, die Augen sehen ängstlich umher, liegen tief in der Orbits und sind mit einem leichten, blassen Hof umgeben. Der Puls ist klein, kaum zu fühlen, die Prominenten des Körpers sind cyanotisch. Ist der Darmkanal auch noch mit dem Aetzmittel in Berührung gekommen, so sollen auch blutige Stühle eintreten. Haben die Erscheinungen den oben beschriebenen hohen Grad erreicht, so tritt in der Regel bald der Tod

durch Perforation des Magens oder auch ohne diese, wie es scheint, in Folge einer Paralyse der N. Vagi ein. Erfolgt der Tod nicht in den ersten Tagen, so tritt gewöhnlich nach Monate langen Schmerzen und unter gewaltiger Abmagerung Heilung ein, die abnormen Aufknochen, Formveränderungen, Divertikelbildungen oder Strikturen können jedoch lebenslängliche Nachteile hinterlassen.

Therapie.

Die Behandlung wird bei Vergiftung mit kautischen oder kohlensauren Alkalien durch möglichst rasche Neutralisation mittelst verdünnter Pflanzensäuren, Essig, Citronensaft oder Weinsäure eingeleitet, oder man versetzt sie mit fetten Oelen, Mandel- oder Olivenöl, das die Kinder tassendweise nehmen müssen. Eines dieser Mittel findet sich in jedem Hause und man hat deshalb nicht nöthig, zuerst schleimige Mittel, deren einhüllende Wirkung durchaus nicht klar ist, zu geben, noch viel weniger sind Brechmittel indicirt, weil ohnedem immer spontanes Erbrechen erfolgt und durch noch kräftigere Magencontraktionen die Gelegenheit zu endlicher Perforation nur vermehrt wird.

Die atzenden Säuren verlangen ebenfalls möglichst rasche Neutralisation und hierzu wäre am besten die Magnesia usta geeignet, die sich aber in keinem Hause vorfindet und immer erst aus der Apotheke geholt werden muss, wodurch eine Zeitverzögerung, die dem Kinde leicht das Leben kosten kann, entsteht. Man greift deshalb besser zum Seifenwasser oder zu geschabter Kreide, wodurch sich aber sehr viel Kohlensäure entwickelt, die, bevor sie durch Aufsaugen entleert wird, eine gefährliche Ausdehnung des Magens bedingen kann. Asche und gewöhnliche Lauge dürfen nur mit Vorsicht und bei gehöriger Verdünnung gereicht werden, weil sie selbst neue Aetzung bedingen können. Hat man in dieser Weise nach mehrstündiger Behandlung die drohendsten Symptome gemildert, so ist Opium das beste und rationellste Mittel zur Milderung des Schmerzes und zur Aufhebung der antiperistaltischen Magenbewegungen. Man gibt einem Kinde Opiumtinktur, immer einen Tropfen weniger als es Jahre zählt, welche Dosis von zwei zu zwei Stunden wiederholt wird, bis Ruhe und leichte Toxications Symptome eintreten. Als bestes Nahrungsmittel, wobei auch ältere Kinder viele Wochen gut bestehen können, hat sich die Kuhmilch erwiesen, welche Anfangs kalt, später lauwarm nach Belieben gewärmt werden kann.

4) Das perforirende Magengeschwür. *Ulcus ventriculi rotundum sive perforans.*

Das perforirende Magengeschwür kommt bei Kindern unter zehn Jahren nur äusserst selten vor, hingegen ereignet es sich häufig bei chlorotischen Mädchen vor Eintritt der Pubertät. Wir haben es also hier mit keiner Kinderkrankheit im engeren Sinne zu thun, sondern führen dasselbe nur an, um es bei zweifelhafter Diagnose einer Magenkrankheit eines Kindes unter zehn Jahren anschliessen zu können. Erkrankten aber ältere Kinder, besonders Mädchen, daran, so unterscheiden sich die Symptome, die pathologische Anatomie, die Ausgänge und die Behandlung in nichts von denen, die bei Erwachsenen beob-

arbeitet werden. Wir verweisen deshalb auf die classischen Arbeiten von Rokitsansky, Cruveilhier und Bamberger, in dessen Krankheiten des chylopoetischen Systemes man eine erschöpfende Besprechung dieses Zustandes findet.

b) Die hämorrhagischen Erosionen der Magenschleimhaut.

Man sieht bei sehr vielen Sectionen von Kindern, die an den verschiedensten Krankheiten gestorben sind, auf der Magenschleimhaut eine grössere oder geringere Menge von kleinen Blutextravasaten. Es sind runde Stellen von kaum hirsekorng- bis kiselkorn Fasergrösse, oder längere, schmale, den aussersten Prominenzien der gewulbten Magenschleimhaut entsprechende Streifen, an denen die Schleimhaut dunkel geröthet, blutend erscheint, oder bei längerem Bestehen eine weiche Depression in Folge von Substanzverlust darbietet. Gewöhnlich flutten über solchen Stellen braunrothe Fibrinflocken, nach deren Entfernung man die beschriebenen Verhältnisse erst deutlicher wahrnimmt. Ein Weitergreifen in das submucöse Gewebe und die Muscularis konnte ich niemals bemerken.

In der Gegend des Pylorus sind diese Erosionen am häufigsten und zahlreichsten. Ob sie ihren Ursprung im drüsigen Apparat der Magenschleimhaut haben, weshalb Cruveilhier diesen Zustand Gastritis folliculosa genannt wissen will, ist in der Leiche, wo sich die Erythrasmen nicht auf einzelne Schleimfollikel beschränken, sondern über grössere Flächen in runder oder länglicher Form sich ausdehnen, nicht mehr zu entscheiden.

Die Symptome sind gemäss der schon Eingangs erwähnten Thatsache, dass man diese Erosionen in den Leichen der an den verschiedensten Krankheiten gestorbenen Kinder finden kann, sehr unbestimmt und mangelhaft. Am häufigsten konnten sie bei tuberculösen und atrophischen Kindern vor. Ausserdem findet man sie oft bei Kindern, die mit Tartarus stibiatus, mit andern Brechmitteln, mit Drastica behandelt worden sind, oder welche im Verlaufe ihrer letzten Krankheit an spontanem Erbrechen gelitten haben. Uebrigens kann man sich nicht verhehlen, dass sie auch zuweilen bei Kindern gefunden werden, bei denen keiner dieser Umstände vorhanden war, und die an ganz andern Krankheiten, an lobulärer oder lobärer Pneumonie, an Pyämie etc. zu Grunde gegangen sind, so dass es problematisch erscheint, für diesen Leichenbefund überhaupt Symptome bei Lebzeiten anzugeben und dass dieser Zustand also fast nur pathologisch anatomisches Interesse hat.

Anhang.

Die Magenerweichung. Gastromalacia.

Die Magenerweichung ist keine Krankheit, sondern ein Leichenphänomen; da aber noch eine grosse Anzahl von Autoren und beschäftigten Aerzten zweifelt an ihrer cadaverischen Natur, so sollen im Folgenden die Gründe hierfür etwas ausführlicher, als es die Einfachheit der ganzen Sache eigentlich erheischt, entwickelt werden.

Vor dem Erscheinen der Jäger'schen Artikel hielt Jedermann

die Magenverweichung für eine Leichenerscheinung, eine nach dem Tode eintretende Selbstverdauung des Magens, in welchem Sinne schon Morgagni und Hunter, später Armstrong, Trevisanum, Carswell hieselben schrieben. Da trat 1811 Jäger mit seiner Entdeckung einer neuen Krankheit, der Magenverweichung, auf, die er in mehreren Journalartikeln im Hufeland'schen Journal der praktischen Heilkunde publicirte. Die Symptome der neuen Krankheit fielen, wie später von Kreuser ganz richtig bemerkt wurde, mit der gewöhnlichen Brechruhr genau zusammen. Sie gibt sich bei ihrem Beginn durch Fieber, unregelmäßiges Athmen, schmerzhaften Unterleib, grossen Durst, Appetitlosigkeit, Brechen und Durchfall zu erkennen, worauf in kürzester Zeit eine ausserordentliche Abmagerung, fortwährende Unruhe und Schlaflosigkeit, Kühlwerden des Gesichtes und der Extremitäten und fast regelmässig der Tod erfolgt.

Es dauerte aber nicht lange, so fand man, dass dieser Symptomencomplex nicht bei allen in der Leiche gefundenen Gastronatrien pauste, und man nahm deshalb seine Zuflucht zur Entdeckung von zwei Formen, einer acuten und einer chronischen. Für die acute blieben die oben beschriebenen Symptome aufrecht erhalten, der Tod sollte am 7.—8. Tage, der Übergang in die chronische Form schon am vierten Tage erfolgen. Diese letztere Form kann sich aber ausserdem aus Anfangs milden und wenig in die Augen fallenden Symptomen entwickeln und die Kinder gehen unter dem Bilde der Atrophie zu Grunde. Da fast ein jedes Kind im Verlaufe des ersten Lebensjahres das eine oder andere Mal Brechen und Diarrhöe gehabt hat, so liess sich nun, so oft man bei einer Section Magenverweichung fand, in sehr bequemer Weise diese chronische Form construiren. Dass bei einer grossen Anzahl von Kindern, die wirklich an acuter Brechruhr, an der sogenannten Cholera nostras, zu Grunde gegangen waren, keine Spur von Magenverweichung zu finden war, wurde lange Zeit ignoriert, wie dies eben zu gehen pflegt, wenn man von einer Idee einmal erfasst ist. Mit der Zeit mehrten sich aber die Zweifel über den Zusammenhang des Leichenbefundes mit dem künstlich construirten Symptomencomplex in einer Weise, dass die Stimme der Ungläubigen endlich gehört werden musste. Zu diesen gehören vor Allen Virchow und seine Schüler, dann Engel, Bodak, Oppolzer, Bamberger, W. King und Troussseau. Ihnen stand und steht zum Theil noch ein ganzes Heer von deutschen und französischen Aerzten entgegen, die sich auch Bamberger in verschiedenen Gruppen beugen lassen. Louis, Lallemand, Billard, Richter, Nagel betrachten die Erweichung als Produkt einer Entzündung. Andral, Craveilhier, Berndt, Winter glauben sie durch veränderte Säftbeschaffenheit, zum Theil durch Reizung und Congestion bedingt. Jäger, Camerer, Anthonieth, Schönlein, Naumann, Moos, Toufflet und andere sehen als ihren Grund eine veränderte Beschaffenheit des Nerven-systems, eine Neuroplogose oder Neuroparalyse an. Auch Rokitsansky hält, wenigstens in der älteren Auflage seiner pathologischen Anatomie, diese Ursache für wahrscheinlich und nimmt ausserdem für eine andere Reihe von Fällen eine Degeneration dyskrasischer Prozesse an. Canstatt sucht die Ursache in einer Veränderung des Magensecretes und Eschenmann wittert gar ein eigenthümliches Miasm.

Endlich gibt es auch noch eine grosse Menge von Aezten, die es mit beiden Parteien halten wollen, indem sie Magenverweichung wohl im Leben begreifen, aber erst nach dem Tode zu den höheren Graden und zur Perforation des Magens kommen lassen. Hierher gehören Chausseier, Meckel, zum Theil auch Andenl.

Das meiste Licht in diesen verwickelten Streit brachte Elsässer durch seine 1845 erschienene Monographie, in welcher er nachwies, warum und unter welchen Bedingungen die Erweichung in einer Leiche eintritt, in einer andern nicht gefunden wird. Bevor wir genauer auf die Gründe für die cadaverische Natur der Magenverweichung eingehen, müssen vorerst die pathologisch-anatomischen Befunde demonstriert werden.

Man begreift unter Gastrimalacie eine Veränderung des Magens, bei welcher seine Hülle ohne alle Zeichen von Entzündung, Geschwür- oder Pseudoplasmenbildung in grösserer Ausdehnung erweicht und selbst vollkommen zerstört sind. Der Sitz dieses Processes ist in der grossen Mehrzahl der Fälle der Blindsack, und vorzugsweise dessen hintere Wand. Dass gerade diese Parthien am häufigsten ergriffen werden, ergibt sich aus der Rückenlage, in welche man die Kinderleichen zu bringen pflegt. Das zuerst ergriffene Gewebe ist immer die Schleimhaut, erst wenn diese zerstört ist, greift der Process auf die Muscularis und nach dieser endlich auf die Serosa über. An den Uebergangsstellen der erweichten Magenparthien zu den unversehrt gebliebenen lassen sich diese Verhältnisse leicht und klar demonstrieren.

Man hat auch eine gallertige und eine schwarze Erweichung unterschieden. Bei der gallertigen sind die betreffenden Stellen in eine gelbgrüne, zutrige, bei der schwarzen in eine dunkelbraune oder schwärzliche Masse zerfallen. Ob die Farbe eine dunklere oder hellere ist, hängt lediglich von dem mehr oder minder grossen Blutgehalt des Magens zur Zeit des eintretenden Todes ab. Je blutreicher die Magenwände, um so dunkler werden die erweichten Stellen sich annehmen. Zweifeln beschränkt sich die Erweichung so präcis auf die Schleimhaut und das submucöse Gewebe, dass die Muscularis wie präparirt daliegt, ist aber auch diese zerstört, so bekommt die allein noch übrig bleibende Serosa ein ähnliches Aussehen und zerfällt bei der leisesten Berührung, die man zur Herausnahme des Magens vernehmen muss. In andern Fällen ist der Magen schon vor Eröffnung des Abdomens geplatzt und sein Inhalt in den Peritonealsack ausgetreten. Dabei ist aber wohl zu beachten, dass man noch niemals bei einem so durchlöchereten Magen eine Reaction des Peritoneums, frische Rothung oder eitrigen Erguss wahrgenommen hat.

Scharfe Begrenzung der erweichten Stellen findet sich fast niemals, die Erweichung wird allmählig weicher und verliert sich ohne alle entzündliche oder zur congestionsähnliche Demarkation in die gesunde Schleimhaut. Was den Mageninhalt betrifft, so war Elsässer der Erste, der darauf aufmerksam machte, dass ein erweichter Magen niemals leer d. h. nur mit Schleim erfüllt ist und dass der vorhandene Speisebrei immer stark säuer reagirt. In der grossen Mehrzahl der Magenverweichungen besteht der Inhalt in geronnener Milch. Oefters wird auch die Umgebung des Magens von der Erweichung ergriffen, ohne dass deshalb eine Perforation hätte stattfinden müssen. Es wird die

Mils, die linke Hälfte des Zwerchfells und der Ösophagus in die Erweiterung hineingezogen, so dass nach Platzen des letzteren, was häufig durch aussetzte Belandlung der Leichen geschehen mag, der Speisebrei in den linken Pleurasack austreten kann. Auch hier hat man natürlich noch niemals Spuren von Resection gefunden. Es ist sogar eine Erweiterung des Lungengewebes und schon Spasmodie in den Bronchien beobachtet worden, was wohl so gedeutet werden muss, dass durch Abwärtshalten der Kindesleiche auf dem Transport oder zum Behufe der Reinigung sich Mageninhalt in den Pharynx entleert und nun durch die klastische Sinnenritze in die Lungen sich ergossen hat, wo die die Erweiterung bedingenden Stoffe ebenso zu wirken beginnen, als wären sie im Magen geblieben. In den übrigen Organen findet man überdies meistens Veränderungen mannigfacher Art, aus welchen sich der Tod hinlänglich erklären lässt. Folgende Gründe nun lassen sich anführen für die cadaveröse Natur der Magenerweichung und für ihr Nichtbestehen während des Lebens.

1) Die Magenerweichung findet sich immer in dem am tiefsten gelegenen Theile des Magens, in welchem sich nach dem Gesetze der Schwere der Inhalt ansammelt, also unter den gewöhnlichen Umständen, bei der Rückenlage der Leichen, im Blindsack und zwar vorzugsweise auf dessen hinterer Fläche. Dass die Erweiterung immer nur die Stellen der Schleimhaut trifft, welche mit dem Speisebrei längere Zeit in Berührung waren, kann man bei Thieren, die man bald nach einer Fütterung mit gährungsfähigen Substanzen getödtet hat, leicht dadurch nachweisen, dass man verschiedenen Thierleichen verschiedene Lagerungen gibt, indem man sie auf den Rücken, auf den Bauch, auf die Seite legt oder sie aufhängt. *Elkasser* hat auch an einer Kindesleiche diesen Nachweis geliefert, indem er dieselbe unmittelbar nach dem Tode 22 Stunden lang auf die rechte Seite legte und nun den Blindsack ganz umverkehrt, die rechte Hälfte des Magens aber gegen den Pylorus zu erweicht fand. Die Schleimhaut war an diesen Partien vollkommen, die Muscularis zum Theil in eine schleimigetrügte Masse verandelt, der Mageninhalt bestand in einer grauen, miltgrüchenden, sauer reagirenden, mit geronnenen Milchklümpchen vermischten Brühe. Diese Versuche zeigen evident, dass die Magenerweichung im Augenblicke des Todes noch nicht vorhanden ist und erst dann entsteht, wenn ein geeigneter Mageninhalt in der Leiche mit der Wandung längere Zeit in Berührung bleibt. Sie zeigen ferner, dass die Flächenausdehnung der erweichten Stellen im Verhältnisse steht zu den Berührungsflächen des Magens und der Contents. Bei einer Leiche, die bis zur Section ruhig gelegen ist, geht die Magenerweichung niemals über den Raum, den der Speisebrei einnahm, hinaus.

2) Direkte Versuche, vorzugsweise von *Elkasser* angeregt und nach ihm von Vielen wiederholt und bestätigt, haben dargethan, dass der aus der Leiche herausgenommene gesunde Magen nicht nur durch alle Säuren, sondern auch durch alle Stoffe, die der sauren Gährung fähig sind, besonders Milch und Zucker, unter Erhaltung jener Temperatur, die auch in der Leiche noch lange Zeit zurückbleibt, ebenso erweicht wird, als diess bei den Sectionen gefunden wird.

3) Direkte Versuche an Hunden und Kaninchen haben ergeben, dass ganz gesunde Thiere, wenn man sie mit Milch oder pflanzen-

durchhaltigen Vegetabilien füttert, während der Verdauung tödtet und 14 Stunden an einem nicht zu kalten Orte liegen lässt, die höchsten Grade von Magenerweichung, Perforation des Magens — bei Kaninchen fast vollständiges Verschwinden des ganzen Magens, der annähernd als hocker Schleim den grossen Klumpen der gegessenen Pflanzen anklebt, — zur Folge hat. Dasselbe findet man häufig bei der Section der Selbstmörder und Hingerichteten und vieler plötzlich Verstorbenen.

Die Magenerweichung lässt sich auch künstlich ausserhalb des Körpers und durch ein höchst einfaches Verfahren in jeder Thierleiche hervorrufen.

4) Die von Brechruhr befallenen Kinder, welche also nach der oben besprochenen Identität der Symptome der Brechruhr mit jenen der Magenerweichung auch an der letzteren liden, gemessen häufig und können dann bald darauf an einer andern Krankheit sterben. Man hat aber noch niemals die Spuren einer geheilten Magenerweichung in einer Kinderleiche gefunden, und doch müsste eine solche Zerstörung, wie sie schon bei den schwächsten Graden der Magenerweichung vorkommt, beträchtliche Narben und Contraction der ergriffenen Theile bedingen. Man fand auch, wie schon erwähnt, noch niemals in einem erweichten Magen eine Spur von Reaction oder Abgrenzung, wie sie sonst bei allen vitalen Processen sich einstellt.

5) Die Symptome, welche die Erweichung bei Lebzeiten charakterisiren sollen, sind von den Autoren sehr verschieden angegeben. Die meisten beschreiben allerdings die Symptome des Brechdurchfalls, der Cholera nostras, andere aber beobachteten Hirnreiz oder Hirndruck und wieder andere nur die gewöhnliche Atrophie, aus welcher dann die chronische Magenerweichung entstand. Uebrigens harmoniren auch die Symptome des Brechdurchfalls mit den anatomischen Veränderungen der Magenerweichung nicht. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein in Erweichung begriffener Magen fortwährend zu so kräftigen Contraktionen disponirt ist, wie sie zu den Brechbewegungen nöthig sind. Wenn aber Kinder bei Lebzeiten Magenerweichung hätten und sich erbrächen, so müsste offenbar Blut erbrechen werden, weil die Arterien der erweichten Stellen nicht obliterirt sind, wie alles mit Injectionen vertrauten Anatomen bekannt ist.

6) Das gefühligste Nervensystem wurde von den Vitalisten, so nannte man kurz diejenigen Aerzte, welche die Magenerweichung bei Lebzeiten entstehen liessen, mannigfaltig zu Hilfe gezogen. Namentlich erschien eine Halbblähung des Vagus sehr geeignet, alle Symptome zu erklären, und besonders wurde durch sie der Mangel des Schmerzes und der Reaction und ferner das häufige Auftreten der Magenerweichung bei Gehirn- und Lungenkrankheiten zu erklären gesucht. Elsässer bemerkt hingegen treffend, dass, wie die Magenerweichung, so auch anatomische Veränderungen in der Schädelhöhle bei Kindern überhaupt sehr häufig vorkommen und dass sich ihr Zusammentreffen so lange der Zufälligkeit verdächtig macht, bis einmal ausgedehnte statistische Zusammenstellungen ergeben haben, wie oft bei Kindern überhaupt Gehirnleiden, wie oft Magenerweichung für sich allein und wie oft beide zusammen gefunden werden. Nach der bisher gesammelten Statistik stellt Elsässer eine genetische Beziehung zwischen Hirnkrankheiten und Magenerweichung als Axiom. Die von Camerer

zum Belege dieser Vaguslähmung angestellten Versuche haben durchaus keine Beweiskraft. Dasselbe sind nämlich, dass gesunde Kaninchen, denen man den Inhalt von erweiterten Kindermägen in den Magen bringt, dadurch keinen Nachtheil erfahren, dass aber bei Kaninchen, denen man den n. vagus und sympathicus beider Seiten durchschnitten und hierauf von jenem Mageninhalt eingegeben hatte, der Tod nach ungefähr 16 Stunden erfolgte und dass hierauf bei einem 16½ Stunden nach dem Tode der Magen in allen Häuten merklich erweicht, bei einem andern, das erst 17 Stunden nach dem Tode geöffnet wurde, der Fundus des Magens grössentheils aufgelöst war. Er hat unglücklicherweise vergessen, den Gegenversuch mit einem gesunden Kaninchen anzustellen. Auch die gesunden Kaninchen zeigen Magen-erweichung, nur muss man die Thiere ziemlich bald, nachdem man ihnen den Inhalt erweiterter Kindermägen oder irgend eine andere säuerliche Nahrung beigebracht hat, tödten, weil sonst durch die Bewegungen des verdauenden Magens der schädliche Inhalt in den Darm gefördert und hier zu sehr vertheilt wird. Dass die Mägen der operirten Kaninchen noch in Erweichung übergingen, obwohl sie 16 Stunden lang nach Einführung des säuerlichen Mageninhaltes am Leben geblieben waren, lässt sich einfach aus der hierauf entstandenen Lähmung der Magenmuskulatur erklären. Es blieb in diesem Falle der Mageninhalt bis zum Tode unverändert in dem gelähmten Magen liegen. Zu gleicher Zeit aber paralytische Magennerven und ein „übersäuer-tes“ Magensecret anzunehmen, wie dies auch bei manchen Autoren vorkommt, ist physiologisch unrichtig, weil schon Tiedemann und nach ihm viele Physiologen nachgewiesen haben, dass nach Durchschneidung der n. vagi der Magensaft neutral oder wenigstens weniger sauer als im Normalzustand gefunden wird.

So wären nun meines Erachtens genug triftige Gründe angeführt, von denen jeder allein schon genügt, die Magen-erweichung als Krankheit zu negiren, und es wäre nur noch zu wünschen, dass sie auch so bestimmt und exakt als das, wofür man sie ansieht, bewiesen werden könnten, wie dies bei der Magen-erweichung als Leichenerscheinung gelungen ist.

6) Die catarrhalische Darmentzündung. Catarrhus intestinalis.

Nachdem in dem Abschnitte von der Diarrhoe die Stühle des Darmcatarrhs schon besprochen, erübrigt hier nur mehr, die pathologische Anatomie, die Aetiologie, die Symptome, die Ausgänge und die Behandlung zu erörtern.

Stirbt ein Kind, das in den letzten Lebenstagen einen acuten Darmcatarrh acquirirt, so findet man die Schleimhaut des Dünn- und Dickdarms im Allgemeinen turgescirend, an einzelnen Stellen entweder deutlich injicirt oder von einer diffusen dunkleren Röthe durchbrochen, welche Stellen häufig den Krümmungen der einzelnen Darmschlingen entsprechen. Die soliden Drüsen erscheinen besonders im Dickdarm deutlich geschwellt und ragen als kleine weissliche Prominenzen von der Grösse eines Stachnadelkopfes über die gestrichelte

Schleimhaut ausser. Sie enthalten dieselben Zellen, die man auch im Normalzustand in ihnen findet, nur in viel grösserer Menge. Hat der Darmcatarrh erst kurze Zeit bestanden, so findet man diese Lentikular-follikel und die Peyer'schen Drüsen, die ja nur als gruppenweise auftretende Lentikularfollikel zu betrachten sind, niemals oder sehr selten geplatzt, während sie bei chronischen Darmcatarrhen gewöhnlich geplatzt und stellenweise schwarz pigmentirt erscheinen. Auf grossen Strecken der Schleimhaut nehmen die neugebildeten Epithelzellen nach rasch erfolgter Abstossung der normalen Cylinderepithelien, worin eben das Wesen des Darmcatarrhs zu suchen ist, nicht wieder den Charakter der ursprünglichen Cylinderepithelien an, sondern behalten die runde Form der Schleimkörperchen. Die ganze Schleimhaut wird durch die vermehrte Blutzufuhr und die seröse Exsudation geschwellt, schwerer. Das submucöse Zellgewebe bleibt beim einfachen Catarrh intakt, beim chronischen nimmt es an Dicke zu, ebenso auch die Muscularis. Die schwarze Pigmentirung der einzelnen Darmzotten, die der ganzen Schleimhaut eine grauschwarze Färbung verleiht und beim chronischen Darmcatarrh der Erwachsenen fast regelmässig beobachtet wird, kommt bei Säuglingen niemals, bei grösseren Kindern nur in sehr geringem Grade vor, obwohl im Kindesalter chronische Diarrhöen ausserordentlich lange anzuhalten pflegen. Die Mesenterialdrüsen sind zum Unterschiede von der Enteritis folliculosa zuweilen geröthet, aber niemals infiltrirt und vergrössert. —

Ätiologie.

Der primäre, idiopathische Darmcatarrh kommt bei Säuglingen viel seltener vor als bei künstlich aufgefütterten Kindern. Bei jenen wird er fast nie durch die Nahrung, die Muttermilch, veranlasst, nur wenn die Stillende unwohl ist, künstlich erzeugte oder spontan entstandene Diarrhöe hat oder einer Gemüthsbebung ausgesetzt war, stellt sich beim Säugling Unruhe, Colikschmerzen und ein ganz leichter, nur kurze Zeit bestehender Darmcatarrh ein, durch welchen die Entwicklung des Kindes kaum merklich gehemmt wird. Am häufigsten entsteht bei Säuglingen der Darmcatarrh durch Erkältung, beim Durchbruch der Schneidezähne in Folge des Verschluckens des massenhaft secretirten Speichels und Schleims, und beim Abgewöhnen (Diarrhoea abductorum). — Bei aufgefütterten Kindern ist die Nahrung eine kaum zu ergründende Quelle der verschiedensten Erkrankungen, vor allem aber der Diarrhöe. Es wurde schon im allgemeinen Theile bei der „Ernährung“ bemerkt, dass das Casein der Kuhmilch im Kindermagen zu grossen Klumpen gerinnt, während das der Frauenmilch nur lose Flocken bildet, wodurch allein schon der grosse Unterschied zwischen der frischesten, besten Kuhmilch und der Milch einer Amme sich erklärt. Nun aber ist es in grösseren Städten, und gerade hier kommt das Auffüttern am häufigsten vor, wirklich unmöglich, sich mehrmals des Tages frische Milch zu verschaffen, der mannigfachen Verfälshungen nicht zu gedenken. Es gibt kaum ein künstlich aufgefüttertes Kind, das nicht wenigstens einmal, dann aber längere Zeit an Darmcatarrh gelitten und hierdurch um viele Monate in seiner Entwicklung aufgehalten worden wäre.

Bei grösseren Kindern über ein Jahr alt ist der Zahungsprocess

die häufigste Veranlassung. Derselbe ist bekanntlich schon bei physiologischem Vorgange von einer mässigen Diarrhöe begleitet, welche aber sehr leicht ausartet und zum profusen, choleraähnlichen Durchfall wird, der binnen 24 Stunden tödten oder einen unauflässlichen Marasmus herbeiführen kann.

Hingegen sind bei Kindern, die das erste Lebensjahr schon überstanden haben, die Diarrhöen in Folge abnormen Reizes der Nahrungsmittel seltener, indem der Magen schon viel schwerer verdauliche Nahrung zu bewältigen im Stande ist. Im Sommer, bevor die verschiedenen Omasorten ihre gehörige Reife erlangt haben, kommt der Darmcatarrh bei ihnen epidemisch vor, es ist aber dann gewöhnlich kein einfacher Catarrh, sondern der Process nähert sich mehr dem Ruhrartigen, indem die Kinder dabei noch heftige Colikschmerzen, hartnäckigen Tenesmus und zuweilen auch tödtige Stühle bekommen.

Symptome.

Sehen vor Eintritt des Hauptsymptomes der Diarrhöe sind an kleinen Kindern mannigfache Veränderungen zu bemerken. Sie werden unruhig, schreien fast fortwährend, ziehen die Schenkel an den Leib, nehmen die Brust und Saugflasche nicht mehr, kurz haben die verschiedenen Zeichen der Colik und Flatulenz. Mit dem ersten dünnflüssigen Stuhle treten, wenn er nur einigermaßen copios war, fast alle Symptome von Colik zurück und können auch fernerhin ausbleiben, wenn die den Durchfall bedingende Ursache eine vorübergehende war, z. B. eine einmal gereichte kleine Quantität säuerlicher Milch. Es ist dies aber der seltener Fall, der sich fast nur bei Brustkindern ereignet, gewöhnlich genügt eine einmalige Darmschlingung nicht frischer Milch, einen Wochen lang dauernden, heftigen Darmcatarrh hervorzurufen. Je grösser die Ausdehnung der catarrhalisch ergriffenen Stellen ist, um so profuser wird die Diarrhöe, um so länger dauert sie und um so merklicher leidet die Ernährung darunter. Catarrhe des Dünndarms veranlassen fast gar keine Colik und wenig Diarrhöe, indem hier das ausgeschiedene Secret im Dickdarme grösstentheils wieder resorbiert werden kann. Catarrhe des Dickdarms hingegen und besonders des Rectums sind mit heftigen Schmerzen, mit Tenesmus und fortwährend profuser Diarrhöe verbunden. Die Farbe der diarrhoischen Faeces ist anfangs normal, nimmt aber mit jeder Ansauerung ab, so dass schliesslich eine ganz bellgelbe, selbst graue, reisswasserähnliche Flüssigkeit ohne allen Geruch entleert wird. Die Wiederkehr der dunkleren Farbe und riechender Faeces ist als das günstigste Zeichen baldigen Stillstandes der Secretion zu betrachten. Der Unterleib ist etwas aufgetrieben, um den Nabel herum gewöhnlich schmerzhaft, oft hört man gurrende Geräusche (Borborygmi) in ihm; die Percussion ist, wenn gerade viel Flüssigkeit im Darmluße sich befindet, stellenweise gedämpft tympanisch. Die Harnsecretion ist sehr vermindert, der Harn ist verhältnissmässig sehr pigmentreich und lässt nach mehrstündigem Stehen an einem Orte mit niedriger Temperatur (mindestens unter 10° R.) ein Sediment von doppelkohlensaurem Natrium, den sog. Ziegelmehlniederschlag, herausfallen. Der Durst ist sehr vermehrt; es ereignet sich hier zuweilen der eigenthümliche Fall, dass die Brustkinder während eines starken Durchfalles die Brust nicht nehmen, wohl aber

Zuckerrwasser und noch lieber kaltes Wasser begierig trinken; sobald die Diarrhöe steht, rühren sie das Wasser nicht mehr an und trinken wieder mit dem früheren Eifer an der Amme. Die künstlich aufgefütterten Kinder nehmen wohl einige Löffel Brei, worauf sie sich kurze Zeit beruhigen, werden aber alsbald durch den neuen Reiz der eingeführten Nahrung nur um so aufgeregter, und lassen sich Stunden lang nicht mehr zur Ruhe bringen. Wenn ein Kind das Unglück hat, von Personen gepflegt zu werden, die der Ansicht sind, dass man die Unruhe des Kindes durch Füttern stillen könne, und die deshalb mehrmals in der Nacht aufstehen, um ein Mus zu kochen, wovon das Kind natürlich immer nur wenige Löffel nimmt, so kann man es, falls diese Personen sich über ihre verkehrte Anschauung nicht belehren lassen, als eine sichere Bote des Todes betrachten. Mir wenigstens ist es noch niemals gelungen, bei solchen Angehörigen ein Kind durchzubringen.

Am Anfange eines einfachen Darmcatarrhes haben die Kinder kein Fieber, keine Trockenheit und erhöhte Temperatur der Haut, sie werden im Gegentheil bei profuser farbloser Diarrhöe höchst kühl, die Nasenspitze wird weiss und kalt, der Athem hat nicht mehr die normale Wärme, die Lippen werden blass und bläulich, ebenso die Fingerspitzen, und das Per der Orläen schwindet sehr rasch, wodurch die halb etwas tiefer zurücksinken und der eigenthümliche Gesichtsausdruck dieser Kranken entsteht. Nachdem aber die Diarrhöe zum Stillstand gebracht, tritt in Folge des vermehrten Stoffumsatzes gewöhnlich Fieber ein, das meist lange währt, die Genesung aufhält und oft zur Enteritis folliculosa und Atrophie führt. Ist dieses Reactionsfieber von kurzer Dauer, so stellt sich nach seinem Verschwinden rasche Besserung ein. Die Stühle behalten einige Zeit noch eine abnorme Beschaffenheit, indem sie entweder sehr hart werden oder schleimig bleiben und dann einen ziemlich unangenehmen Geruch annehmen. Der Appetit kehrt wieder und die Kinder bleiben nach ihren Mahlzeiten ruhig, das sicherste Zeichen, dass die Verdauung wieder ohne Beschwerden von Statten geht.

Als häufigste Complication ist der Magencatarrh zu erwähnen, das Erbrechen hört aber in der Regel früher auf als die Diarrhöe. Bronchitis ist ebenfalls oft mit Darmcatarrh complicirt. Am schlimmsten ist der Uebergang in Enteritis folliculosa, der bei so unzählig vielen künstlich aufgefütterten Kindern sich einzustellen pflegt.

Behandlung.

Bei Brustkindern genügt gewöhnlich schon eine diätetische Behandlung der Amme. Hat dieselbe Dyspepsie oder Fieber und Darmcatarrh, wie das besonders nach Gemüthsbewegungen vorkommt, so hält man sie einige Tage diät und nährt sie einfach mit Milchsuppe, etwas Kaffee, Fleischsuppe und gekochtem Obst, zum Getränk gibt man ihr Mandelmilch, Wasser mit Wein, oder pures Wasser. Die Milch bleibt bei dieser Kost, so lange kein anhaltendes Fieber zugegen, niemals aus und wird höchstens in etwas geringerer Menge requirirt, was aber dem an Diarrhöe erkrankten Säugling gerade zuträglich ist.

Hat sich eine Amme durch einen Diarrhöer Erbrechen und Durchfall zugezogen, so tritt ein noch strengeres Regime ein, sie bekommt

nichts als Schleimsuppe, weisses Brod und schleimige Getränke, Reisswasser, Gummirassol, Salepwasser oder Mandelmilch, und steht auf diese Behandlung ihre Diarrhöe nach 2—3 Tagen nicht, so gibt man ihr 10—15 Tropfen Opiumtinktur unmittelbar nachdem sie das Kind gestillt hat, worauf sie es mindestens vier Stunden nicht mehr anlegen darf. Wird aber die Diarrhöe dennoch chronisch und hat die Opiumtinktur nicht gleich in dieser ersten Gabe einen günstigen Erfolg, so stehe ich bei Fortsetzung des strengen diätetischen Verfahrens vom Opium ab und gebe Adstringentien, Aloë, Tannin, Colombo, Argent. sulf. etc. Mit einer intensiven medicamentösen Behandlung der Brustkinder kommt man selten weit, indem die meisten ungenügend aus einem Löffel schlucken und die eingeschüttete Medicin wieder ausspucken. Am bequemsten ist die Einpinselung des Mundes mit Opiumtinktur. Ich bediene mich hierzu eines kleinen Pinsels von der Dicke eines schwachen Rabarberstängels, tauche denselben in T. Opi. crac., entferne mit einer schnellenden Fingerbewegung den ersten Tropfen der Tinktur aus dem Pinsel und stecke ihn nur mit dem Rest derselben in den Mund; dann drücke ich das Kinn etwas nach aufwärts und ziehe den Pinsel zwischen den zusammengeklebten Lippen heraus. Es kommt dadurch circa die Hälfte eines Tropfens in den Mund, und wenn man nun 2—3 Tropfen Wasser auf die Zunge nachtröpfeln lässt, so verschlucken die Kinder ohne Anstand die ganze Flüssigkeit ihrer Mundhöhle. Gewöhnlich tritt hierauf ein mehrstündiger Schlaf und Stillstand der Diarrhöe ein, die schlimmen Folgen, Gehirneitz und Gehirncongestion, die man auf Opium, wahrscheinlich auf grössere Gaben oder länger fortgesetzten Gebrauch geschoben haben will, konnte ich niemals bei dieser Application bemerken.

Mit grossem Vortheile gibt man den Brustkindern kleine Clystiere eines schleimigen Decoctes, z. B. eines dünnen Amylonbreies mit 1—2 Tropfen Opiumtinktur. Zur Einführung von Medicamenten in den Mastdarm, welche also mehrere Stunden zum Behufe einer Resorption daselbst verbleiben sollen, sind die gewöhnlichen Kinderklystierspritzen viel zu gross, ich bediene mich deshalb seit langer Zeit kleinerer Spritzen von Zinn, nach Art der Wund- oder Tripperspritzen und applicire sie eigeshändig, nachdem sie gut eingölt und gehörig erwärmt worden sind. So kleine Quantitäten von 4,0—8,0 bleiben fast immer bei den Kindern und nach $\frac{1}{2}$ —1 Stunde beginnt die Wirkung des Opiums.

Die künstlich aufgezogenen Kinder leiden an ganz andern Darmcatarrhen als die Brustkinder, indem die krankmachende Ursache, die ungesunden Nahrungsmittel, hier keine vorübergehende ist, sondern lange Zeit noch während der Erkrankung fortgesetzt wird. Im Allgemeinen ist der Grundsatz festzuhalten, dass kein Kind mit Darmcatarrh die Kuhmilch, sei sie nun pur oder mit Thee vermischt oder mit Mehl oder Brod zu einem Brei verkocht, verträgt, und dass die Diarrhöe nur ausnahmsweise bei Milchkeut zum Stillstand gebracht werden kann. Die erste Bedingung ist deshalb eine vollkommene Abstinenz der Kuhmilch. Sobald dünne Stühle sich einstellen, gibt man den Kindern bloss schleimige Getränke, worunter das beste und stöpsendste ein Decoct, Salep ist, das man täglich zwei mal frisch bereiten lässt, indem eine grosse Messerspitze Saleppulver mit 300,0 Wasser

gekecht wird. Mit Zucker versüßt und etwas erwärmt, trinken alle Kinder eine solche Salpalkkochung gerne, und seine stopfende Wirkung ist so merklich, dass oft die Ordination eines weiteren Medicamentes unnötig ist. Als Mahlzeit gibt man den Kindern statt des Milchbreies 2—3mal täglich eine Schleimsuppe aus dünner, fettarmer, ungesalzener Fleischbrühe und Reis, Hafer oder Rallgerste bereitet und mit etwas Zucker versüßt. Diese Diät wird beibehalten, bis die Stühle schon länger als 24 Stunden wieder ihre normale Consistenz angenommen haben; wenn deutlicher Appetit sich einstellt, so können zu jeder Mahlzeit 2—3 Kaffeelöffel geriebenen Weisbrodes mit der Schleimsuppe verkocht werden. Wir verweisen übrigens auf das Capitel der künstlichen Ernährung pag. 36. Nachdem die Stühle seit mindestens zwei Tagen normal geworden sind, versucht man täglich einen Mischkost, dann zwei und endlich drei, wobei das Salpawasser immer noch fortgebraucht wird, um schließlich auch durch gewöhnliches Brauwasser wieder ersetzt zu werden.

Die Einpinselung der Mundhöhle mit etwas Opiumtinctur und die kleinen Opiumklystiere stehen unter den therapeutischen Mitteln oben an. Nur bei den gelassenen Sommerdiarrhöen entspricht das Opium zuweilen nicht, hier wirken kleine Dosen Calomel 0,01 3—4 Dosen täglich, oder eine Höllesteinlösung (0,03 auf 90,0 mit Zusatz von einem Tropfen Opiumtinctur, ohne allen Syrup) entschieden besser. In Frankreich gibt man mit Vorliebe in diesen Fällen Magisterium Benzoë 0,02—0,06 pro dos, wovon auch ich zuweilen überraschende Erfolge gesehen habe. Die gelbstichhaltigen Vegetabilien, Colombo, Balaia etc., die reinen Tanninlösungen und die Adstringentia überhaupt sind den kleinen Kindern nur schwer, und dann nur mit grossen Quantitäten Syrup beizubringen, weshalb ich selten von ihnen Gebrauch mache und sie mehr bei chronischem Darmcatarrh der älteren Kinder benutze. In manchen Fällen sah ich auf eine Alaunlösung (0,4:100) Diarrhöen sistiren, welche durch keines der oben genannten Mittel gestillt werden konnten. Die Hauptsache bleibt immer eine geläuterte Prophylaxis. Man gebe den Kindern immer nur schwach alkalische Milch, indem man zu jeder Mahlzeit einen Kaffeelöffel der oben besprochenen Lösung von kohlens. Natrium (4,0:200) setzt, und wird dann bald die Erfahrung machen, dass die Darmcatarrhe sich bedeutend mindern. Hätte ich die Wahl, bloss durch die Kost oder bloss durch Medicamente einen Darmcatarrh stillen zu müssen, so würde ich vorziehen, durch diätetische Behandlung allein es zu versuchen; denn von der Wirkungslosigkeit aller Arzneimittel ohne sorgfältige Regulirung der Diät habe ich mich schon zu oft und zu evident überzeugt.

7) Enteritis folliculosa und Tabes mesenterica.

Es ist praktisch wichtig, vom einfachen Darmcatarrh die Enteritis folliculosa streng zu scheiden, obwohl die pathologisch-anatomischen Unterschiede nicht sehr frappant, und mannigfache Uebergänge von jenem zu dieser ungemein häufig sind.

Pathologische Anatomie.

Man findet hierbei das submucöse Gewebe beträchtlich infiltrirt, so dass der Darm an Gewicht fühlbar zugenommen hat, und auf der

ganzen Schleimhaut des Dick- und einer grossen Strecke des Dünndarms die Zeichen des acuten Darmcatarrhes, d. h. statt der normalen Cylinderepithelien nichts als Schleimkörperchen. Die solitären Follikel und Peyer'schen Plaques sind zum Theil stark geschwollen und sehen auf den ersten Blick als weisse Knöpfchen und Inseln über das Niveau der Schleimhaut hervorragend, zum Theil aber sind sie geplatt und stellen dann leere, kraterförmige Vertiefungen auf den durch die ursprüngliche Follikelschwellung erzeugten Erhabenheiten dar. Das Mesenterium ist turgescirend, die Chylusgefässe strömen meist und sind von rosenrother Färbung, die Mesenterialdrüsen sind, soweit der Darmcatarrh geht, um das 2—4fache ihres Volums vergrössert, auf dem Durchschnitt in rezenten Fällen rosenroth, nach längerem Bestehen aber gelblichweiss. Die mikroskopischen Elemente sind dieselben wie in den normalen Mesenterialdrüsen, nur wenn die Farbe gelblich ist und die Drüse an Härte zugenommen hat, findet man das Bindegewebe etwas vorherrschender. Auch hier, wie beim einfachen Darmcatarrh, findet man trotz der lange bestehenden Diarrhöen nur auffallend wenig Pigmentirungen der Schleimhaut. Der wesentliche pathologisch-anatomische Unterschied zwischen Darmcatarrh und Enteritis folliculosa liegt in der Bethheiligung der Mesenterialdrüsen in dem letzteren Falle. Es lässt sich leider weder durch Injectionen noch auf irgend eine andere Art experimentell nachweisen, dass die Resorption des Chylus durch diese vergrösserten Mesenterialdrüsen gehindert wird und hiermit eine Ernährung und Weiterentwicklung des Kindes nicht mehr stattfinden kann. Wenn man aber in einem atrophischen Kinde, dessen Atrophie durch Enteritis folliculosa ursprünglich bedingt war, ausser jenen vergrösserten und härter gewordenen Mesenterialdrüsen nichts findet, so wird die Annahme doch sehr wahrscheinlich, dass hier mechanisch die Passage des Chylus in den Dünndarm unterbrochen wurde und so die Kinder, obwohl sie in ihren letzten Lebenswochen und selbst Monaten viel gegessen und keine Diarrhöe mehr hatten, doch aus Mangel an neuer hinreichender Zufuhr von Chylus gewissermassen verhungerten sind. Die *Tabes mesenterica* der alten Aerzte ist also durchaus nicht so unmotivirt und obsolet, wie sie von einigen Neuereu dargestellt werden möchte, nur darin irren sich die Aelteren, dass sie glaubten, die vergrösserten Drüsen fühlen zu können; denn gerade bei ihrer Hypertrophie ist der Darm immer meteoristisch aufgetrieben, und es ist dann gar nicht möglich, unter oder zwischen den gespannten Därmen diese kleinen Geschwülste zu tasten, die kaum jemals die Grösse einer kleinen Haselnuss erreichen und jedenfalls gegen die Wirbelsäule gedrückt werden müssen, wenn man sie fühlen wollte.

In seltenen Fällen von entwickelter Mesenterialdrüsentuberculose, wie sie bei mehrjährigen Kindern zweilen vorkommt, fühlt man allerdings einzelne härtere Stellen durch die Bauchwand hindurch. Es sind dies aber grössere, unter einander zu Paaren verwachsenen Drüsen, welche mit käsiger Tuberkelmasse durchsetzt sind. So geringe Vergrösserungen, wie sie bei Enteritis folliculosa beobachtet werden, können bei Lebzeiten niemals durch den Tastsinn entdeckt werden.

Symptome.

Die Enteritis föllitiosa beginnt immer mit Darmcatarrh, und wir verweisen deshalb auf die im vorhergehenden Abschnitte angeführten Kennzeichen. Statt dass aber wie beim einfachen Darmcatarrh nach einigen Tagen die Stühle wieder leucig werden und die Ernährung sich wieder regelt, bleiben die Ausleerungen ganz dünn und nehmen einen aschastigen, faulen Geruch an, erodiren den Anus und seine Umgebung, die innere Schenkelfläche und die bei den angezogenen Oberschenkeln gerade den Anus berührenden Fersen. Es tritt ein starkes, anhaltendes Fieber mit bedeutender Temperaturerhöhung ein, die Kinder haben fortwährend grossen Durst, die Zunge ist roth und glatt oder mit einem dünnen weissen Belege bedeckt, in späteren Stadien fast immer mit Soor befallen. Erbrechen ist häufig, jedoch nicht in allen Fällen und nicht sehr anhaltend zu beobachten. Charakteristisch ist die rasch eintretende Abmagerung. An der inneren Schenkelfläche werden bei vorher ganz wohlgenährten Kindern mit harten Fettpolstern zuerst kleine Fältchen bemerklich, die früher kernig auszufühlenden Fettpolster werden weich und welk. Rasch schwindet nun unter Fortbestand der Diarrhöe mit ihrem aschastigen Geruche das Fett an allen Körpertheilen, so dass in wenigen Tagen die Knochen an den Händen und Füssen deutlich zu unterscheiden sind und die Schenkelarm weit herabhängende Falten bildet. In der Schenkelbuge lässt sich dann beiderseits ein Convolut von Inguinaldrüsen erkennen, welche auch um das 2-3fache ihres normalen Volums anschwellen. Die Augen liegen tief, vom inneren Augenwinkel zum Jochbogen bildet sich in Folge dessen eine starke Falte, die Wangen werden blass und welk und lassen die Contur der Masseteren durchscheinen, das Kinn wird spitz, der Hals wird faltig, die *M. sternocleidomastoidei* und der Larynx treten hervor, die Rippen lassen sich ohne Betastung zählen, die Wirbelsäule und die Beckenknochen sind nur mehr von einer atrophischen Haut bedeckt.

Am Hinterhaupt bemerkt man hierbei eine ganz eigenenthümliche Erscheinung. Es schiebt sich nämlich das Hinterhauptbein unter die Scheitelbeine hinein, so dass sich hier eine Treppe bildet, deren obere Stufe die Seitenwandbeine, deren untere das Occiput bildet. Nur sehr ausnahmsweise schiebt sich das Occiput über die Seitenwandbeine. Eine ähnliche, aber weniger solitäre Verschöbung findet an den Stirnbeinen statt, welche sich ebenfalls unter die Scheitelbeine hegeben. Diese Verkleinerung der Schädelhöhle wird bedingt durch eine Verkleinerung des Gehirns, indem dasselbe bei der allgemeinen Atrophie sich betheiligt, und da es zum grossen Theil aus Fett besteht, jedenfalls auch einen beträchtlichen Verlust an diesem Material erleidet. Es sind mir keine quantitativen chemischen Analysen des Gehirnes atrophischer Kinder bekannt, man weiss nur, dass das Gehirn kleiner Kinder überhaupt ärmer an Fett ist als das Erwachsener, und es wäre somit eine derartige Untersuchung ein Postulat, das die Pädiatrik an die pathologische Chemie zu stellen hat. Wenn einmal die Kopfknochen übereinander geschoben sind und die Atrophie des Gehirnes sich eingestellt hat, so ist nur sehr selten mehr eine Besserung zu erwarten, die Kinder atrophiren mehr und mehr und gehen regelmässig zu Grunde,

obwohl sie in den letzten Lebenswochen keine Diarrhöe gehabt, aber immer sauerlich riechende Stühle behalten haben und sogar mit grossem Appetit zu essen pflegen. Es resultirt aus dieser Gehirnatrophie eine Reihe von Gehirnsymptomen, welche wir später unter dem Namen Hydrocephalus kennen lernen werden. Einen der besten Anhaltspunkte für die Beurtheilung des Grades, zu welchem die Atrophie schon vorgeschritten ist, haben wir an der Bauchhaut. Wenn man dieselbe mit zwei Fingern zu einer Falte erhebt, und wenn diese Falte nach Zurückziehung der Finger längere Zeit noch bestehen bleibt, so ist die Prognose fast immer und unter allen Umständen lethal zu stellen, die Prognose bessert sich mehr und mehr, je schneller die so erzeugten Hautfalten wieder verschwinden.

Bei atrophischen Kindern mit meteoristisch aufgetriebenen Leibe, wie er eben bei Atrophie in Folge von Enteritis folliculosa gewöhnlich gefunden wird, sieht man auf der Bauchhaut einzelne kleine Knötchen von der Grösse eines Stecknadelskopfes, welche durch ganz dünne Stränge, gewöhnlich nur dem Gefühl erkennbar, mit einander verbunden sind. Gefüllte Venen sind diese Stränge nicht, weil Venen bei atrophischer Haut und so oberflächlicher Lage bläulich durchscheinen müssten, es können bloss obliterirte Venen, oder, was noch wahrscheinlicher ist, Lymphgefässe mit ihren Klappen sein, wodurch dann auch zugleich die Knötchen erklärt werden.

Behandlung.

Es gilt hier alles, was bei dem Catarrhus intestinalis, als dessen Folgen offenbar die Infiltration der Mesenterialdrüsen und die Tubos zu betrachten sind, erwähnt wurde. In der Regel führen alle Behandlungsmethoden zu demselben Resultate, zum Tode, nur ein Mittel gibt es, von dem ich frappante Erfolge gesehen habe, nämlich die Mutterbrust. Atrophische Kinder von vier, selbst noch von sechs Monaten, welche am Rande des Grabes waren, an schlaffen Diarrhöen und äusserem Scorbuto litten und mit ihrem langen, mageren Fingern sich in fortwährender Unruhe vor Schmerz das Gesicht kratzten, wurden, an die Brust einer Amme gelegt, plötzlich wie umgewandelt, sie tranken Anfangs nur wenige Mauten, um dann ihrer gewohnten Unruhe sich wieder hinzugeben, nach ein paar Tagen aber saugen sie schon wie ganz gesunde Kinder, schlafen mehrere Stunden nach einander, bekommen gelbe, normal überlich riechende Entleerungen und nehmen so schnell wieder zu, dass man sie nach wenigen Wochen gewöhnlich nicht mehr erkennt. Wo die Verhältnisse die Anschaffung einer Amme nicht erlauben, ist, wie schon gesagt, die Prognose fore lethalis. Einige Mal ist es mir in solchen Fällen gelungen, durch Chinapulver 0,00 täglich zwei Dosen die Erhöhung der Hauttemperatur zu besitzigen, worauf die Atrophie auch abnahm und bei höchst vorsichtiger, nährsamer Ernährung endlich die Kinder wieder zu gedeihen anfangen, wobei als Nachkur lange Zeit Tinct. mart. ponat. drei Mal täglich 10 Tropfen gereicht wurde. Gewöhnlich aber schlägt diese Behandlung auch nicht an, die Hauttemperatur verändert sich nur auf sehr kurze Zeit und die Kinder verfallen mehr und mehr, bis sie endlich oft erst nach vielen Wochen durch den Tod erlöst werden.

8) Dysenterie, die Ruhr.

In grossen Ruhrpandemien, wie sie hauptsächlich in Sumpfigegenenden und in den Tropen so verbreitend auftreten, bleiben die Kinder unter einem Jahr fast vollständig verschont. Nur wenige Beispiele sind erzählt, wo ruhrkranke Frauen Kinder zur Welt brachten, die bald nach der Geburt unter den Zeichen der Ruhr wieder zu Grunde gegangen sind. Ältere Kinder, namentlich nach der zweiten Dentition, werden von derselben wie die Erwachsenen ergriffen.

Die sporadische Ruhr hingegen kommt bei kleinen Kindern häufig vor, wird aber wegen ihres milden, meist gefahrlosen Verlaufes gewöhnlich nicht besonders beobachtet.

Symptome.

Es können die Symptome der sporadischen und epidemischen Ruhr füglich miteinander abgehandelt werden, nur muss die Bemerkung vorausgeschickt werden, dass sie bei der sporadischen niemals die Heftigkeit und Gefährlichkeit der epidemischen erreichen.

Zu Anfang bestehen einfache Diarrhöen, welche mehrere Tage lang ohne weitere charakteristische Merkmale fortauern, bis sich unter Zunahme von Kolik und Tenesmen die spezifischen Ruhrstühle einstellen.

Eine genaue Besichtigung und Zertheilung der Stühle gibt immer den besten Anhaltspunkt für die Beurtheilung der Darm Schleimhaut. Jeder Stuhl, in welchem glasartiger, zu Klümpchen geformter Schleim sich findet, zeigt eine Veränderung der Dickdarmschleimhaut oder wenigstens ihres Follikelapparates an. Zu diesem glasartigen, den gekochten Sagokörnern ähnlichen Schleim gesellen sich bald einige Blutstreifen oder es wird der ganze Stuhl gleichmässig roth gefärbt, je nachdem oben die Blutung näher oder entfernter vom Mastdarm stattgefunden und das Blut sich kürzere oder längere Zeit mit den Fäces vereinigt hat. Mit der Zunahme dieses Schleimes wird die eigentliche Fäcalmasse immer weniger und es werden schliesslich Schleimmassen ohne alle Beimischung von Fäces entleert. Die Erkennung des beigemischten Blutes ist niemals schwierig, finden sich Blutstreifen und Blutklümpchen, so genügt die einfache Besichtigung, ist das Blut aber schon länger mit dem Schleim in Berührung, so mischt es sich inniger mit ihm und verleiht der ganzen Ausleerung eine rosenrothe oder wirklich rothe Farbe. Diese Färbung reicht eigentlich schon hin, uns über die Gegenwart des Blutes zu belehren, weil ausser dem Blutfarbstoff überhaupt kein anderer rother Farbstoff in den Fäces vorkommt, es kann übrigens auch durch das Mikroskop das Blut mit Leichtigkeit nachgewiesen werden.

Ist es einmal zur Geschwürsbildung gekommen, so nehmen die Ausleerungen eine schmutziggroße oder grauröthliche Farbe und einen saueren Geruch an, indem nun die abgestossenen Schleimhautpartien und vorzüglich der von den Geschwüren massenhaft gelieferte Eiter sich hinzugesellen. Die Abstossung grösserer Schleimhautstücken, die in den tropischen Dysenterien häufig beobachtet werden soll, habe ich bei uns zu Lande noch niemals gesehen. Zumeist gehen, obwohl die übrigen Symptome durchaus keinen Stillstand der Krankheit erkennen lassen, in blutigen oder eitrigen Schleim pöhlte, festere Kotklumpen

ab, die wahrscheinlich aus einer von der Ruhr nicht ergriffenen Partie des Dickdarmes stammen und die Prognose deshalb keineswegs verbessern. Nach Abgang dieser auf Besserung deutenden Fäces stellt sich sogleich die frühere dysenterische Beschaffenheit wieder ein.

Man hat, je nachdem Blut beigemischt ist oder nicht, von einer rothen und weissen Ruhr gesprochen, eine Eintheilung, die natürlich jeder wissenschaftlichen Basis entbehrt, indem es recht wohl möglich ist, dass ein Kind am ersten Tage die weisse, am zweiten die rothe und am dritten oder vierten wieder die weisse Ruhr haben kann. Tritt wirkliche Besserung ein, so nehmen die Fäces ihren fäcalen Geruch, später auch die Consistenz wieder an und es schwindet allmählig die eitrige und schleimige Beschaffenheit. Sind Spulwürmer vorhanden gewesen, so gehen dieselben regelmässig mit ab. Der Geruch der Stühle ist zu Anfang der Krankheit fäcal und wird es wieder bei Eintritt der Genesung, auf der Höhe derselben ist er entweder gänzlich verschwunden oder wird säuerlich fide. Wenn bei der epidemischen Ruhr Eiter und abgestossene Schleimhautstücke mit den Fäces abgehen, so wird er höchst penetrant und faulig und erinnert an den der faulen Eier. Die mikroskopische Untersuchung zeigt Schleimkörperchen, Epithelien, Blutkörperchen, grössere Aggregate von Fettkügelchen, etwas Speisereste, Vileionen, Tripelphosphate, alles eingebettet in eine moleculäre, feinkörnige Masse; die chemische Reaction ist gewöhnlich alkalisch. Erweis lässt sich durch Abkühlen oder Schütteln des Stuhles mit destillirtem Wasser, Filtrirung und Ansäuerung dieses Filtrates mit Salpetersäure nachweisen. Die Zahl der Stühle ist sehr verschieden. In den leichteren Fällen erfolgen 4—8, in den schwereren 20—30 Aushoerungen binnen 24 Stunden, was sich nicht so fast nach der Quantität des zu Entleerenden, die oft sehr gering ist, als nach dem Grade des Tenismus richtet.

Unterleibsschmerzen und Tenismus fallen niemals; der Schmerz ist meist intermittirend, auffallweise, nur auf der Höhe der epidemischen Ruhr jammern und stöhnen die Kinder unaufhörlich. Gewöhnlich ist die Berührung des ganzen Leibes, sowohl an den Nabel herum als nach dem Verlaufe des Colon schmerzhaft. Der Tenismus ist sehr quälend, man sieht häufig die untersten Falten des Anus bläulich hervortreten und trotz des heftigen Pressens wird kaum ein Kaffeelöffel des oben beschriebenen Schleimes entleert. Mastdarmvorfall ist oft die Folge dieses Pressens. Die Application der Clysmata, die in der Ruhr die allerentschiedenste Wirkung hatten, wird durch den Tenismus sehr erschwert und oft unmöglich gemacht. Sensible Kinder bekommen bei der Einführung der Clysterspritze in Folge des gesteigerten Schmerzes Convulsionen. Der Tenismus tritt gewöhnlich schon mit den ersten schleimigen Aushoerungen ein und besteht bis zum Eintritt der Besserung fort. Bei zunehmender Verschlimmerung kann Paralyse des Mastdarmes und somit Aufhören des Tenismus erfolgen, wobei die Prognose äusserst ungünstig wird.

Erbrechen kommt zuweilen bei epidemischer Ruhr vor und ist, wenn es anhält, ein Zeichen beginnender Peritonitis, bei sporadischer Ruhr wird es nur sehr ausnahmeweise beobachtet.

Fieber ist gewöhnlich Anfangs nicht zugegen, sondern tritt erst im Verlaufe der Darmveränderung hinzu. Der Puls gibt durchaus

keinen Maaßstab für die Schwere und Ausdehnung der Erkrankung. Die Temperatur ist selten sehr erhöht, gewöhnlich normal, in schweren Fällen sogar vermindert. Delirien und Convulsionen stellen sich bei reichlichen Kindern ziemlich häufig, auch in sporadischer Ruhr, ein.

Als secundäre Erscheinungen sind bei sporadischer Ruhr nur die lokale Pneumonie und eine häufig folgende Tubo mesenterica mit Infiltration der Mesenterialdrüsen zu erwähnen. Bei epidemischer Ruhr kommen Anämie, Pyämie, Marasmus, Darmperforation und Peritonitis, Darmstricturen, Icterus und Leberabscesse in Betracht.

Die Genesung kann bei der sporadischen Ruhr in 4—6, bei der epidemischen in 10—14 Tagen eintreten. Die hierauf folgende Abmagerung ist immer sehr bedauernd und viele Kinder erliegen noch trotz beginnender Besserung den Nachkrankheiten. Der Tod tritt entweder in den ersten Tagen der Krankheit oder im chronischen Stadium ein.

Die epidemische Dysenterie complicirt sich bekanntlich mit allen möglichen acuten und chronischen Krankheiten. Die sporadische befißt hauptsächlich die Kinder in der ersten Dentition und die grösseren Kinder im heissen Sommer zur Zeit des unreifen Obstes.

Pathologische Anatomie.

Das dysenterische Exsudat findet sich nur im Dick- und Mastdarm und vorzugsweise auf der Höhe der Falten, an den Flexuren, an den Umbiegungsstellen des Darmrohrs und erscheint als ein schmutziggelbes, graugelbes, grauweißliches oder dunkelgefärbtes Stratum, das oft die Dicke einer Linse erreicht und sich leicht abstreifen lässt. Die darunter zum Vorschein kommende Schleimhaut ist geröthet, erweicht und geschwollen, so dass die Lumenfläche des Darmes ein höckeriges Ansehen bekommt. Im Darne findet sich der bei den Stühlen näher beschriebene dysenterische Schleim etc. Nach wenigen Tagen löst sich nun diese Membran in kleineren oder selbst in grösseren Partien ab, und je nach der Tiefe, in welcher die Schleimhaut ergriffen worden, entstehen nun leichtere oder tiefere Geschwüre mit lang gedehnten Ecken und Zacken. Die solitären Follikel sind immer geschwellt und sogar exulcerirt. In den übrigen Organen die Zeichen der Anämie, nur das Peritonäum ist an verschiedenen, besonders den Schleimhautveränderungen entsprechenden Stellen injicirt. Bei der sporadischen Ruhr ist eine ausgedehnte oder irgend tiefer gehende Geschwürebildung sehr selten.

Behandlung.

Gleichmässige Wärme in einem gut ventilirten Zimmer und strenge Diät ist vor allem nöthwendig. Kalte Getränke vermehren die Schmerzen, weshalb Alles lauwarm gereicht werden muss. Am besten gibt man den Kindern bloss Schlemmsuppen und schleimige Getränke, Brustkinder vertragen die Ammenmilch sehr gut, künstlich aufgefütterte aber bekommen heftige Schmerzen auf Kuhmilch, die also zu vermeiden ist. In der epidemischen Ruhr gibt man so bald als möglich einige Dosen Ricinusöl, wodurch manchmal erstaunlich grosse Mengen von Fäces entleert werden und der Zustand sich rasch bessert. Das vorverste Mittel bei der sporadischen Dysenterie ist das Opium, und die

stärkste Application ist die in Clystieren, woran man leider häufig durch den Tenismus gehindert ist. Es wird dann am besten die bei der Therapie des Darmcatarrhs besprochene Einpressung der Mundhöhle ausgeübt. Ich lasse mich übrigens niemals mit der Versicherung der Pflegerinnen, das es nicht möglich wäre, das Kind zu clystieren, abfertigen, sondern versuche immer selbst noch einmal 6—10 C.C. einer mit Opiumtinktur versetzten schleimigen Flüssigkeit zu injizieren, was sehr häufig gelingt, obwohl die Umgebung das Gegenteil versichert hat. Sehr guten Erfolg sieht man auch von der Verbindung des Calomel mit Opium z. B. für ein einjähriges Kind:

Rp. Calomel 0,01
Op. pur. 0,003
Sacch. alb. 0,30
Dent. tal. des. N. viii
S. 2stündlich ein Pulver.

Die adstringierenden Vegetabilien, der Bienenstein und der Alann finden erst ihre Anwendung nach Stillung des Schmerzes im chronischen Stadium.

9) Intussusception.

Unter Intussusception oder Invagination des Darms (auch Volvulus genannt) versteht man die Einstülpung eines Darmstückes in ein anderes beschlanktes nach Art der Handschuhfinger, die sich beim Abziehen eines engen Handschuhes durch Uebereinanderschieben verkürzen.

Pathologische Anatomie.

Bei weitem nicht alle Invaginationen, die man in den Kinderleichen findet, waren bei Lebzeiten bestehende Krankheiten, sondern die meisten sind erst in Agone entstanden, zeigen keine Spur von Reaction, lassen sich ohne alle Mühe entwickeln und sind an mehreren verschiedenen Stellen zugleich, immer aber nur am Dünnarm zu beobachten. Sie kommen auffallender Weise nur bei ganz gesundem Darms, nicht bei Sectionen von Cholera, Ruhr, Typhus oder Peritonitis, wohl aber von Gehirnerkrankheiten vor und scheinen das Ergebnis einer ungleichmässigen Innervation der Darmmuskulatur, die sich vorzüglich erst in Agone geltend macht, zu sein. Indess gibt es auch eine Reihe von Fällen, wo schon bei Kindern unter einem Jahre Invagination mit allen ihren Folgen: Darmstenose, Darmblutung, Kathabrechen, rascher Collapsus etc., auftrat und in der Regel zum Tode führte. Die anatomische Lagerveränderung ist bei beiden Invaginationen dieselbe.

Eine jede Einstülpung besteht aus drei aufeinander folgenden Schichten, von denen die äussere und mittlere einander ihre Schleimlorenzflächen, die mittlere und innerste ihre Peritonealfächen zukehren, wie aus einem schematischen Durchschnitt, Taf. III. Fig. 3 B., leicht zu sehen ist. Die äussere Schichte c. c. nennt Rokitsansky die Scheide oder das Intussusceptum, die innerste a. a. das eintretende, die mittlere b. b. das austretende Rohr und beide zusammen das Intussusceptum. Zwischen dem eintretenden und austretenden Rohr befindet sich das mithineingesetzte zwischen zusammengefaltete Gekrösestück des

Intussusceptum und übt einen besonderen Einfluss auf die Gestaltung der Invagination. Die Zerrung des Mesenteriums bewirkt nämlich, dass das eingestülpte Darmstück nie ganz parallel seiner Scheide verläuft, sondern immer eine Krümmung darbietet, und dass seine Mündung nicht in der Axe oder dem Centrum der Scheide, sondern excentrisch liegt, indem es dem Zuge des miteingestülpten Mesenteriums folgt, weshalb auch die Mündung des Intussusceptum (d) niemals rund, sondern zu einer Spalte verzogen ist.

Die Vergrößerung der Invagination kommt so zu Stande, dass die Mündung des Volvulus (d) den festen Punkt bildet, während die Scheide sich bei c. e. immer weiter anstülpt.

Die Ursache der Entstehung eines Volvulus lässt sich schwer erklären, wahrscheinlich ist das eindringende Darmstück stärker contractirt und hat eine kräftigere peristaltische Bewegung als das weitere, es aufzunehmende Darmstück. Hiefür spricht der Umstand, dass ihrer Bildung meist langwierige Durchfälle vorausgehen, wobei das aufzunehmende Darmstück wahrscheinlich catarrhalisch erschläfft ist, während das eindringende eine normale Schleimhaut und normale Bewegung hat.

Die unumkehrlichen Folgen einer Invagination sind Circulationsstörungen im invaginierten Mesenterium, Oedem und Hyperämie des invaginierten Darmes, und Entzündung und plastisches Exsudat am Peritonalfalthezug des ein- und austretenden Rohres (a. und b. h.). Das Oedem und die Schwellung des invaginierten Darmstückes kann einen so hohen Grad erreichen, dass das Lumen des anfangs noch offenen, entretenden Rohres aufgehoben wird, worauf gar keine Kothmassen, sondern bloss mehr blättriger Schleim per anum abgeht und fäcales Erbrechen sich einstellt.

Gewöhnlich geschieht die Einschübelung von oben nach abwärts, häufig kommt sie im Dickdarm vor, wobei man dann möglicher Weise das eingestülpte Stück per anum fühlen kann.

Die Intussusception ist entweder durch die von den selben Oberflächen sich nach aufwärts über den Darmkanal verbreitende Peritonitis oder durch Brand des invaginierten Stückes.

Symptome.

So lange das Darmlumen noch nicht ganz verschlossen ist, sind die Symptome nicht besonders charakteristisch, ist aber einmal vollständige Stenose eingetreten, so treten die bekannten Zeichen, wie bei eingeklemmten Hernien hervor. Die Einstülpung des Darmes erzeugt für sich, ohne vollkommene Abocclusion, immer heftige Colikschmerzen, wobei der Leib bald meteoristisch aufgetrieben wird. In einzelnen Fällen fühlt man einen länglichen Tumor, der von einigen Autoren für das invaginierte Darmstück gehalten wird, viel wahrscheinlicher aber aus Kothmassen besteht, die über der Invagination stagniren. Die Kinder sind dabei meist verstopft, es kommen jedoch auch Diarrhöen vor, und den Stühlen mischen sich in allen Fällen grössere oder kleinere Quantitäten Blut bei, was als das constante und charakteristischste Symptom des ganzen Zustandes zu betrachten ist. Fast ebenso constant ist das Erbrechen alles Genossenen, wobei sich schliesslich auch ein gelber oder grüner Magenschleim entleert. Die Kinder collabiren äusserst rasch und haben im Ausdruck viel Aehnlichkeit mit den Cholerakranken,

der Puls wird kleiner, endlich kann mehr zu fühlen, es treten Ohnmachten und am 3.—4. Tage in der Regel der Tod ein.

Der günstigste, jedoch ziemlich seltene Ausgang ist allseitige Auflösung des invaginierten Darmes und hierauf leuchtige Abstoßung desselben; hieweil sollen sich die Symptome auch ohne Abgang und Brandigwerden des Darmstückes mildern, das Lumen sich wieder erweitern und es kann so die Invagination fixirt bleiben, wobei aber der Kanal immer stark verengt und zur Ableitung der Darmentente nicht gehörig sufficient bleibt. Es besteht hierbei ein chronischer, häufig recidivirender Zustand von entzündlicher Schwellung, der leicht in Darmentzündung ausartet und acute Intussusceptionen veranlaßt.

Behandlung.

Die theoretischen Vorschläge Rokitsansky's, vor eingetretener Fixirung des Volvulus durch Exsclat Injectionen von Luft oder Aspiration mittelst der Saugspitze zu versuchen, werden wohl immer theoretisch bleiben. Alle Mittel, welche vermehrte peristaltische Bewegung bewirken, können ebenso gut schaden als nützen, indem der Volvulus möglicher Weise zwar wieder gelöst wird, allein bei umgekehrter Bewegung sich auch vergrößern und eine heftigere glückliche Verklebung verrathen werden kann. Man gibt deshalb weder milde, noch drastische Abführmittel und noch viel weniger Brechmittel. Die behrteste Anwendung des Mercurius vivus ist jedenfalls unschädlich und häufig nützlich, weil hiedurch das zum Verschwinden verengerte Lumen des ödematösen, invaginierten Darmstückes mechanisch wieder etwas wegsamer wird.

Das rationellste scheint die von Pfenfer vorgeschlagene und schon mit Glück durchgeführte Behandlung zu sein, welche in absoluter Diät und Ruhe, und in Erzeugung einer Opiumnarkose besteht und eine Sistirung der peristaltischen Bewegung bewirkt, während welcher sich allseitige Verlebung bilden kann. Der Bauchschnitt ist trotz seiner grossen Gefahr schon mehrfach glücklich ausgeführt worden.

10) Der Leistenbruch. *Hernia inguinalis.*

Nachdem der Nabelbruch schon pag. 57 bei den Krankheiten des Nabels abgehandelt worden ist, Cruralhernien bei Kindern aber so gut wie gar nicht vorkommen, so bleibt nunmehr der Leistenbruch zu besprechen.

Die Inguinalhernien der Kinder sind in der übergrossen Mehrzahl äussere und zwar angeborene, jedoch nicht angeboren im strengen Sinne des Wortes, sondern nur in den ersten Lebenstagen durch beginnende Wirkung der Bauchpresse erworben, wobei dann durch den noch offenen Processus vaginalis peritonaei eine oder einige Darmschlingen in den Hodensack oder bei Mädchen in die grosse Schamlippe dringen. Die vorgestellten Eingeweide stehen bei Knaben mit der freien Fläche des Hodens in Contact, was bei keiner erworbenen Hernie möglich ist.

Man findet eine kuglich runde, nicht eng abgegrenzte, vom äusseren Leistenringe bis in's Scrotum reichende, welche compressible Geschwulst, die sich durch gleichmässigen, etwas retirirenden Druck

ohne Schwierigkeit wegdrücken lässt. Man findet den Hoden nicht ganz leicht, bei genauerer Untersuchung kommt er nach hinten und oben legend zum Vorschein, Blähungen, Schwellung, Schreien, Husten, erzeugen den reponirten Bruch sogleich wieder. Bei Mädchen, wo der Bruch „amstrer Schamletztehbruch“ genannt wird, zeigt die eine oder andere grosse Schamlippe eine weiche linsförmige Geschwulst, welche ähnliche Merkmale wie der angeborene Inguinalbruch des männlichen Geschlechtes darstellt, übrigens niemals so gross wird und viel seltener beobachtet wird, als jener. Der Bruch entsteht hier in der Art, dass durch den beim weiblichen Fötus zur Aufnahme des runden Mutterbandes bestimmten Inguinalkanal (*Canalis ligamenti rotundi*), der in seinem Anfange offen ist, sich aber gewöhnlich schon vor der Geburt durchaus schliesst, eine Darmpartie oder, in ganz seltenen Fällen, das Ovarium sich hineinfrängt. Nur ausnahmsweise geschieht es nach v. Arnim, dass sich in den Scheidenkanal bei Entstehung des Bruches eine eigene neue Falte des Bauchfelles als Hülle des Bruchsackes vorfrängt und so ein wirklicher besonderer Bruchsack entsteht. *

Der Inhalt des angeborenen Inguinalbruches besteht fast immer aus einer oder einigen Darmschlingen, sehr selten aus Netz. Der Bruch ist Anfangs klein wie eine Erbse, vergrössert sich aber bald und dringt in den Hodensack, wobei der *Canalis vaginalis* weiter, kürzer und gerader wird. Zuweilen wird eine seröse Flüssigkeit abgesondert, wodurch sich dann zur *Hernia inguinalis* noch *Hydrocele* gesellt. Durch Quetschungen, rohe Repositionsversuche, vielleicht auch ohne diese, durch eine Art inflammatorischer Disposition entstehen zuweilen selbst phlegmische Anschwellungen, die flammige Adhäsionen zwischen dem vorgefallenen Darmsack und dem Hoden bewirken und eine Reposition der Hernie unmöglich machen. Einklemmungen sind ausserordentlich selten, und wenn auch momentan ein solcher Bruch hart, schmerzhaft und irreponibel wird, so gelingt die Reposition doch regelmässig im warmen Bade und noch sicherer in der Chloroformnarkose.

Haben die Brüche einmal ein bedeutenderes Volumen erreicht und hat sich der *Canalis vaginalis* beträchtlich ausgedehnt, so dringt er sogleich nach jeder Reposition wieder vor und bleibt nur in liegender Stellung bei schlafenden Kindern zurück. Es ist sehr schwierig, solche Kinder vor dem Frattwerden zu schützen oder schon vorhandene Epidermisdéfekte zu heilen. Bei der Untersuchung eines kleinen Kindes auf Inguinalhernie muss man sich immer erst des Hodens versichern: weil ein verspäteter *descensus testiculis* bei eben stattfindendem Austritt des Hodens aus dem innern Leistenringe die nämliche Geschwulst darstellt wie eine beginnende Hernie. Zum Unterschiede von *Hydrocele* haben wir hier die Reponirbarkeit, die ausserdem in den meisten Fällen mit einem gurrenden Geräusche verbunden ist, den Mangel der Durchsichtigkeit, der leicht durch ein Licht constatirt werden kann, und den Mangel einer Fluctuation zu berücksichtigen. Die Untersuchung wird in der Weise angestellt, dass man das Kind auf den Rücken legt, die Geschwulst sanft zu reponiren sucht und nach gelingener Reposition den kleinen Finger in den Hodensack einstellt. Man führt ihn dann nach aufwärts gegen den Leistenring, sucht die Bruchforte auf und bestimmt hierauf mit Leichtigkeit deren Lage und Ausdehnung.

Resümiren wir noch einmal die wichtigsten Varietäten der angeborenen Inguinalhernie, so haben wir:

In Bezug auf die Zeit der Entstehung:

- 1) *Hernia canalis vaginalis congenita* (seltener Form).
- 2) *Hernia canalis vaginalis mox post partum acquista* (häufigere Form).

In Bezug auf Geschlechtsverschiedenheit:

Bei Knaben:

- 1) *Hernia canalis vaginalis testicali congenita*.

Bei Mädchen:

- 2) *Hernia canalis ligamenti rotundi congenita*.

In Bezug auf die Complication:

- 1) *Hernia inguinalis congenita cum Hydrocele*.
- 2) *Hernia inguinalis congenita cum adhesione testiculi ad intestina*.

Behandlung.

Die meisten Inguinalhernien heilen von selbst nach einer Bandage, und die beste und einfachste Compression des Canalis vaginalis wird durch die Zunahme der Fettpolster des Kindes bewirkt. Es genügt in der Regel eine gute Ernährung, eine Ueberwachung der Ausleerungen und die Verhütung zu grosser und anhaltender Unruhe zur Heilung. Wenn nur dafür Sorge getragen wird, dass während des Schlafes der Bruch reposit ist, so hat es dann nichts zu sagen, wenn er einen grossen Theil des Tages herausgetreten bleibt. Es lässt sich die Reposition beim Einschlafen sehr leicht bewerkstelligen, indem man den Kindfrauen lehrt, hierbei immer die eine Hand an der Hernie zu fixiren.

Von Bruchbändern habe ich nur bei Kindern, die über ein Jahr alt waren, entschiedene Vortheile gesehen. Bei Wickelkindern ist die Application der Bandagen ausserordentlich schwierig und in vielen Fällen schädlich. Erstlich muss man wenigstens deren drei haben, damit man bei jeder Durchförsung und Stuhlentleerung wechseln kann; gedeiht dann das Kind wirklich, so werden die kaum angeschafften Bänder nach 8—10 Wochen zu klein und gänzlich unbrauchbar und müssen wieder durch drei neue ersetzt werden, so dass man oft ein Dutzend und mehr Bruchbänder fertigen lassen muss. Ferner gelingt es fast nie, die Kinder vor Wandwanden zu litzen, die einmal wurd gewanderten Stellen besuchen mehrere Tage zur Heilung und die neue Epidermis geht gewöhnlich gleich wieder zu Grunde, sobald der Druck des Bruchbands von Neuem beginnt. Blei- und Zinksalben, sowie die häufigen Waschungen mit kaltem Wasser oder mit Wasser und Branntwein scheinen zwar einen günstigen Einfluss auf die Verhütung der Erosionen zu haben, genügen aber doch nur selten, sie gänzlich abzuhalten. Bei ungeren Kindern endlich ist die Anlegung eines Bruchbandes geradezu unmöglich, weil es nie gehörig befestigt werden kann. Wenn also ungeliche Eltern absicht die Anlegung einer Bandage zu versuchen, so muss man sie auf die daraus erwachsenden Kosten und die möglicher Weise entstehenden Nachteile der langsameren Entwicklung des Kindes aufmerksam machen. Solaminis causa bedecke ich die Hernie gewöhnlich mit einem Stückchen Heftpflaster oder lasse sie täglich mit irgend einer unschädlichen Salbe einreiben, sorge fleissig für strenge Reinlichkeit, gute Pflege, passende Kost und regelmässige

Entleerungen und habe auf diese Weise schon sehr viele Hernien heilen sehen. Je schneller die Fettpolster eines Kindes zunehmen, um so sicherer blüht die Hernie zurück und tritt ständiger Verschluss des Canalis vaginalis ein.

11) Fissura ani.

Es kommen bei Säuglingen und Kindern jedes Alters zuweilen am Anus heftige Schmerzen vor, die mit jeder Stuhlentleerung sich einstellen und ihren Grund in einem kleinen Einrisse des Anus haben. In vielen Fällen sind diese kleinen Schunden (Rhagaden) eine Theilerscheinung der Syphilis, auf welche also stets genau zu untersuchen ist, in andern aber sind sie rein idiopathisch, nur als locale Erkrankung aufzufassen. Die hie mit befallenen Kinder sind immer sehr obstipirt und der Riss ist wahrscheinlich durch das heftige Auspressen der harten Faeces entstanden. Die harten trocknen Stühle sind stellenweise blutig gefärbt, und es fliessen auch nach der Defecation noch einige Tropfen Blut aus dem Risse ab, wobei die Kinder ein durchdringendes Schmerzgeschrei heben. Besonders ersicht man wohl, dass diese kleinen Amrisse bei oberflächlicher Besichtigung nicht zu sehen sind, sondern dass man zu ihrer Entdeckung die Nates gehörig auseinanderheben und Falte für Falte des Anus genau untersuchen muss. Sie sind oft kaum 1—3 Millimeter lang und unterscheiden sich in der Farbe nur wenig von der übrigen gerötheten Schleimhaut. Der Schmerz tritt fast nur während und nach der Stuhlentleerung ein, scheint aber sehr heftig zu sein, indem die Kinder dabei entsetzte Gesichtszüge und zitternde Reflexbewegungen am ganzen Körper bekommen.

Behandlung.

Vor Allem ist notwendig, dass die Obstipation gehoben wird, was am besten durch $\frac{1}{2}$ bis 1 Kaffeelöffel der wässrigen Rhabarberinctur sich bewerkstelligen lässt. Die von Troussseau angegebene Methode, bestehend in Clystieren mit 1,20 Ratanhalextrakt habe ich nicht bewährt gefunden, weil die Application des Clystieres selbst die heftigsten Schmerzen verursacht. Ich cautionire diese Einrisse leicht mit Bollenstein, was zwar auch bedeutende Schmerzen hervorruft, aber nur einmal zu geschehen braucht, während jene Clystiere oft wiederholt werden müssen, und habe darauf, dass die Anleerung niemals hart wird. Diarrhoe darf hierbei nicht bestehen, denn das diarrhoische Secret hindert ebenfalls die Heilung des Risses.

12) Polypen des Mastdarms.

Diese Polypen kommen nur sehr selten vor, werden vielleicht auch manchmal übersehen. Alle daran leidenden Kinder, deren in der Literatur gedacht wird, haben das zweite Lebensjahr schon überschritten.

Das Hauptsymptom ist eine kleine oder zuweilen auch grössere Mastdarmlähmung mit und unmittelbar nach der Defecation, welche bei Mädchen, die der Pubertät schon nahe sind, leicht als beginnende Menstruation gedeutet wird. An den Händen lassen sich die Men-

situationsbesenken von denen durch Mastdarneuthnung verursachten schon dadurch annähernd unterscheiden, dass die ersteren vorzugsweise die Vorderseite des Hemdes einnehmen, während die letzteren sich fast ausschliesslich auf dessen Rückseite finden.

Die Entfernung der Fäces hat immer Schwierigkeit und ist mit Schmerz verbunden, zuweilen erscheint hierbei der Polyp vor der Anusöffnung, zieht sich aber nach Remission des Zwanges schnell wieder zurück. Bei der Exploration des Mastdarnes mit dem Finger, wodurch sehr heftige Schmerzen verursacht werden, fühlt man den Polypen meist nahe am Anus aufsitzen. Der Verlauf des Uebels scheint in den meisten Fällen eine Spontanheilung zu sein, indem der Polyp sich mehr und mehr zurückzieht und endlich bei einer harten Defaecation abreist. Die gewöhnliche Form ist die der Schlingpolypen.

Behandlung.

Die Entfernung des Polypen geschieht sehr leicht, wenn man unmittelbar nach dem Stuhlgang ihn vor dem Anus trifft, wo man ihn dann sogleich mit den Fingernägeln abknippen oder seinen Stiel mit einem Faden unterbinden kann. Um nicht zu lange auf eine Schlulentleerung warten zu müssen, thut man gut, dem Kinde einige Stunden vor der zur Operation bestimmten Zeit ein Infus, Senna oder ein anderes Draclicum zu geben, indem bei dem dadurch erzeugten Tenismus der Polyp am sichersten und längsten antritt.

13) Vorfall des Mastdarnes. Prolapsus ani.

Man bezeichnet mit dem Namen Mastdarneuvorfall zwei Zustände, die von einander ziemlich verschieden sind, nämlich 1) die einfache Umstülpung der untersten Schleimhautfalten und 2) eine Invagination der oberen Mastdarnparthie in den Anus, wobei dieselbe vor dem Anus zum Vorschein kommt.

Der Mastdarm lässt bekanntlich drei Portionen, eine obere, mittlere und untere unterscheiden, Taf. III, Fig. 4, a, b, c. Die obere schliesst sich in ihrer Structur an das S. rectum an, ist wie dieses vom Bauchfell überzogen, hat eine Cylinderform und verläuft von oben nach unten und etwas von links nach rechts. Diese Portion bildet fast die Hälfte des ganzen Mastdarnes und erstreckt sich vom S. rectum bis zu jener Linie, wo die Peritonäalhülle aufhört, Taf. III, Fig. 4, Nr. 3. Der Mastdarm verliert diesen Ueberzug an seiner hinteren Fläche höher oben als an der vorderen, wo er bis in die Gegend des dritten Kreuzbeinwirbels damit bekleidet ist. Die mittlere Portion (b) beginnt da, wo das Peritonäum den Mastdarm verlässt und wo derselbe nur mehr durch lockeres Zellgewebe an das Kreuzbein und beim Manne an die Blase und Prostata, beim Weibe an die Vagina angeheftet ist. Es zeichnet sich diese Parthie durch die Stärke ihrer Längsmuskeln aus, während die Quer- oder Ringfasern nur schwach entwickelt sind. Sie kann sich bei Obstipation beträchtlich ausdehnen und grosse Mengen harter Fäces bergen. Die untere, dritte Portion (c) ist die kürzeste, sie geht von der Prostata nach abwärts bis zum After und besitzt eine dicke Schicht Kreisfaserfibrillen, die beiden Afterschliessmuskeln.

Es werden nun entweder die Schließmuskeln, die unterste Portion des Mastdarmes, einfach nach aussen umgestülpt und kommen als hochrothe oder blaurothe Wülste mit einer centralen Oeffnung zum Vorschein, oder es wird die mittlere Mastdarmportion (h) in die untere invaginirt und hängt roseuroth, oder wenn die Splinkteren durch starke Contractionen den venösen Rückfluss hemmen, bleuroth als ein mehrere Zell langer, wurstförmiger Vorfall vom Anus heraus. Eine Umstülpung der Splinkteren und eine Invagination der mittleren Portion scheint nicht gleichzeitig vorzukommen. Bei der ersten Art, der einfachen Umstülpung der Splinkteren, kann der untersuchende Finger wohl in die centrale Oeffnung eindringen, wobei gewöhnlich sogleich eine Reposition des Vorfalles sich ergibt, bei der zweiten Art kann der Finger oder wenigstens eine Sonde noch noch neben dem Vorfall ein bis zwei Zell eindringen, bis er an die obere Umbiegung des Vorfalles anstößt.

Ätiologie.

Die Umstülpung der Splinkteren oder wenigstens ein partieller Prolapsus ihrer Schleimhaut kommen bei kleinen Kindern ausserordentlich häufig vor. Gewöhnlich ist längere Zeit Diarrhöe vorausgegangen, wodurch die besagte Schleimhaut sich wulstet, während die Splinkteren erschaffen. Aber auch anhaltende Verstopfung kann den Prolapsus bedingen, wo dann der Mastdarm durch die harten grossen Kothmassen mit herausgerissen wird. Es erfolgt hier häufiger Invagination der mittleren Portion als Umstülpung der unteren. Bei jungen Hunden, die an der sog. Sucht leiden, sind grosse Invaginationen des Mittelstückes sehr gewöhnlich zu beobachten.

Die Prognose ist bei beiden Arten günstig, wenn die Kinder nur sonst gut genährt und nicht atrophisch sind; eine radicale Heilung ist ohne Operation möglich.

Behandlung.

Was die allgemeine Behandlung betrifft, so versteht es sich von selbst, dass man bei Prolapsus in Folge von Diarrhöe stopfende Mittel, und bei dem in Folge von Obstipation gelind eröffnende Mittel geben muss. Zu den ersten gehören das Opium, die Mucilagines, und die vegetabilischen Adstringentien, sowie der Höllestein und der Alaun; zu den letzteren das Rheum und die Mittelsalze in kleinen Dosen. Das Bicinnöl ist den Kindern schwer beizubringen und wird gewöhnlich gleich wieder ausgespuckt oder erbrochen.

Bei der Reposition des Vorfalles selbst fragt es sich weniger darum wie, sondern wann sie zu geschehen hat. Die Hauptsache ist, dass man den Angehörigen, wenn sie nicht von selbst geschickt genug sind ihn zu reponiren, gleich bei dem erstmaligen Vorfallen die Reposition lehrt, indem man sie nicht selbst macht, sondern die Kindsmutter dazu instruirt. Dieselbe hat ein auf beiden Seiten mit Cerat bestrichenes Leinwandlappchen auf den Vorfall zu legen und nun mit dem Finger die centrale Oeffnung zu suchen, worauf sie den Finger direkt in den Anus hineinschiebt. Nachdem nun Vorfall und Finger in An eingebracht sind, hat sie den Finger durch langsame rotirende Bewegungen heranzuziehen, worauf das schlüpfrige Ceratlappchen sich

ganz leicht und ohne neuen Vorfall zu erzeugen, entfernen lässt. Im Winter, oder wo Eis schnell zur Hand ist, ist es sehr nützlich, bevor man die Reposition vornimmt, ein rundes Stückchen Eis in den Vorfall zu schieben und dasselbe dann mit zu reponiren.

Bei atrophischen Kindern geht der Mastdarm immer wieder heraus, so oft man ihn auch zurückbeugen, sitzen oder brechen mag, bei gut sich entwickelnden Kindern genügt meist schon die oben beschriebene interne und örtliche Behandlung, nur wenn die Neigung zum Vorfall schon sehr lange besteht, können einige Längstriche mit dem Bismutstift oder mit der rauchenden Salpetersäure notwendig werden. In neuester Zeit wurden von Fouchet subcutane Strychninjectionen gegen veraltete Mastdarmvorfälle empfohlen. Dieselben sind jedoch wegen der äusserst gefährlichen Wirkung dieses Mittels nur bei grösseren, mehrjährigen Kindern rathsam. Man sticht die Pravaz'sche Spritze ein Paar Linien vom After entfernt in das den Mastdarm umgebende Zellgewebe und spritzt von einer schwefelsauren Strychninlösung 1:100 ungefähr 8—10 Tropfen ein. Diese Injectionen 3—4mal repetirt üben nach meiner eigenen Erfahrung eine sehr günstige Wirkung auf den Mastdarmvorfall. Wer aber wie ich auf sehr kleine vorsichtige Dosen Strychnin schon die furchterlichsten tetanischen Krämpfe hat eintreten sehen, wird sich nur im äussersten Nothfalle zu diesem heimtückischen Mittel entschliessen können. Das Glühisen war ich noch niemals genöthigt anzuwenden.

Um das Pressen aus Gewohnheit, das manche Kinder an sich haben, zu verhindern, ist es rathsam, den Nachstopf der Kinder auf eine Fussbank zu stellen, so dass das Kind mit seinen Füßen den Fussboden nicht erreichen und hiemit keine so kräftige Bauchpresse anwenden kann. Erfahrene Wärterinnen verfahren es auch sehr gut, die Kinder während des Stuhlganges frei schwebend hinzuhalten und zugleich die Aussapfe von unten und seitwärts zusammenzudrücken, wodurch der Wiedervorfall häufig verhütet wird.

14) Bildungsfehler des Mastdarms und des After.

Wir haben am After zweierlei Veränderungen, a) eine Verengerung und b) eine Verschlussung desselben.

a) Verengerung des Mastdarms.

Ein geringerer Grad von Verengerung wird kaum so merkliche Symptome liefern, dass ärztliche Abhülfe notwendig erscheint, samal im ersten Lebensjahre die Päces im Normalzustand niemals fest, sondern immer breiig, formlos entfernt werden. Nur wenn Obstipation eintritt, kommt das Uebel an den Tag, die Kinder können etwas festere Päces nicht mehr entleeren, bekommen Meteorismus und selbst die Symptome von Darmstenose. Durch öfter applicirte Clystiere werden die harten Kothmassen wieder erweicht, entleert und damit alle Krankheits Symptome gehoben, durch Laxantien erreicht man diesen Zweck wohl auch, doch wird deren Wirkung in diesen Fällen immer von Colikschmerzen begleitet.

Es werden zwar auch Kinder mit so bedeutender Verengerung des After gehören, dass schon die Defecation des Meconiums

sehr verspätet und mühsam erfolgt und dass man kaum mit einer gewöhnlichen Sonde in den Mastdarm gelangen kann. Hier ist natürlich ein kleiner chirurgischer Eingriff notwendig, darin bestehend, dass man eine Hohlsonde einführt und auf derselben die verengerte Aftermündung mit dem Messer ein Centimeter weit dilatirt. Es müssen dann mehrere Wochen lang Ceratläppchen in die Wunde eingelegt werden, um frühzeitige Verwachsung zu verhüten. Die täglich mehrmals erfolgenden Erweiterungen des After durch die Faeces verhindern die Bildung einer centralisirten Narbe.

b) Verschluss des After. Imperforatio ani.

Zum richtigen Verständnis dieses Zustandes müssen die Vorbemerkungen aus der Embryologie vorausgeschickt werden, dass in einer ganz frühen Zeit des Embryolebens eine Cloake, d. h. eine Verbindung zwischen Blase und Mastdarm besteht, und ferner, dass der Mastdarm ursprünglich blind endet, blind in das kleine Becken hinabwächst, hier auf eine ebenfalls blind endigende Einstülpung der äusseren Haut, auf die Anlage des After stösst und dass erst nach einer gegenseitigen Verwachsung dieser beiden blinden Endigungen und nach schliesslicher Atrophie der verschliessenden Quermembranen sich eine Communication zwischen Mastdarm und Anus herstellt.

Es können sich nun folgende Bildungsstörungen, die auf Tafel III, Fig. 5, 6, 7, 8 und 9 schematisch veranschaulicht sind, ereignen.

1) Der Mastdarm ist vollkommen entwickelt, auf der äusseren Haut aber in der Natesfalte, wo der Anus sich einstülpen sollte, in diese Einstülpung nicht entwickelt, das blinde Ende des Mastdarmes wächst fort und fort nach abwärts, bis es die Cutis, die es nicht zur Atrophie bringen kann, erreicht. Dies ist die einfachste und glücklichste Art der Imperforatio oder Atrisia ani. Das nach der Geburt sich sammelnde und den Mastdarm ausdehnende Meconium wölbt die Stelle, an der der Mastdarm sich unter der Haut befindet, mehr und mehr hervor und ein einfacher Kreuzechnitt auf dieser Herberwölbung genügt, einen After für alle Zukunft zu bilden. (Fig. 5.)

2) Die äussere Anuseinstülpung hat sich normal entwickelt, kann aber das blinde Ende des Mastdarmes nicht erreichen, weil dasselbe entweder in seinem Wachsthum zurückgeblieben ist (Fig. 6), oder in die Vagina (Fig. 8) oder in die Blase (Fig. 9) einmündet. Es bleibt bei diesen Fällen die einfache Bezeichnung des Anus resultatlos, indem derselbe gebildet ist, wie bei jedem gesunden Kinde. Erst nachdem in den ersten 24 Stunden kein Meconium entleert worden ist und wenn die Kinder unruhig werden, einen meteorisch aufgetriebenen Leib bekommen und die Brust nicht nehmen, entdeckt die Hebamme, die durch ein Clystier abhelfen will, dass das Röhrchen ihrer Spritze entweder nicht weit genug eindringt oder, wenn auch tiefer kein Anstand sich ergibt, dass das Clystema total zurückspitzt. Untersucht man nun mit der Sonde oder mit einem silbernen Katheter, so findet man, dass die Anuseinstülpung 2—5 Centim. höher oben blind endet.

3) Es hat sich weder eine Anuseinstülpung entwickelt, noch ist das blinde Ende des Mastdarmes so weit herabgewachsen, dass er nach der Geburt durch eine Herberwölbung der Cutis sich zu erkennen gäbe (Fig. 7). In diesen Fällen ist gewöhnlich in der Gesässfurche gar

keine Andeutung von einer Aftervertiefung zu beobachten und man hat keine Anhaltspunkte für die Beurtheilung des Mastdarmes, dessen blindes Ende oft 5—8 Centim. von der äusseren Haut entfernt im kleinen Becken sich findet. Zuweilen setzt sich ein kompakter Strang vom S. rectum bis zur Cutis fort, der als ein rudimentärer Mastdarm zu betrachten ist und bei der Auffindung des blinden Darmendes wesentliche Dienste leistet.

4) Der Mastdarm mündet nicht nach aussen, sondern in die Vagina, die Blase oder einen Ureter, wobei eine Anusentstülpung vorhanden sein oder auch fehlen kann (Fig. 8 und 9). Die Erscheinungen sind hier insofern andere, als das Meconium nicht vollständig zurückgehalten wird, sondern in dem einen Fall mit dem Urin, im anderen durch die Vagina abgeht. Die Diagnose ist leicht zu machen, wenn man mit einer silbernen Sonde oder einem kleinen Katheter die Blase untersucht und den Meconium haltigen Urin auffängt, und noch leichter, wenn man das Meconium in der Vagina und in derselben die Einmündung des Mastdarmes durch eine Sonde findet. Die Folgen dieser Missbildung sind verschieden. Bei Communication des Mastdarmes mit einem Harnleiter oder der Blase wird der Urin immer alkalisch, reizt die Blasenschleimhaut fortwährend und bedingt Cystitis, Atrophie und den Tod. Mündet der Mastdarm aber in die Vagina, so entsteht durch den continuirlichen Abfluss der Faeces, die durch keinen Sphinkter willkürlich zurückgehalten und entleert werden können, wohl ein ekelhaftes Gebrechen, indem die Kinder nach Faeces riechen und an den Schenkeln fortwährend beschmutzt sind, keineswegs aber ist Lebensunfähigkeit anzunehmen. Es gibt Beispiele, wo auf operativen Wege der Mastdarm hergestellt und dann die Verbindung zwischen Vagina und Mastdarm aufgehoben wurde.

5) Endlich gibt es noch Fälle, wo der Anus gar nicht oder nur rudimentär vorhanden ist. Es existirt nur eine Parthie des Dickdarmes und diese mündet in der Nabelgegend, indem der embryonale Ductus omphalo-entericus offen geblieben ist, ein Zustand, den man Anus praeternaturalis oder Ectopia ani genannt hat.

Behandlung.

Die Behandlung kann natürlich nur eine operative sein. Bei den sub 1 besprochenen Fällen besteht dieselbe, wie schon angedeutet, einfach in einem Kreuzschnitt auf der vorgewölbten Haut, worauf das Meconium sich entleert. Um zu schnelle Verwachsung der Schnittwunden zu verhindern, ist es rathsam, die ersten Wochen nach jeder Stuhlentleerung ein Ceratläppchen einführen zu lassen.

Bei den sub 2 angeführten Fällen muss man durch einen oder einige vorsichtige Einstiche mit einem gewöhnlichen grossen Troikart, wie man sich dessen zur Punktion des Ascites bedient, versuchen, das rudimentäre Rectum zu finden, woeüber uns das Hervorquellen von Meconium Gewissheit verschafft. Man führt dann durch die Troikart-canüle einen oben abgeschnittenen elastischen Katheter ein und spritzt zur Verflüssigung der Faeces 3—4 Mal täglich warmes Wasser in dosseßen. Nach einigen Tagen ersetzt man ihn durch einen von stärkerem Caliber und führt so mehrere Wochen fort, bis die Defecation auch ohne Katheter regelmässig von Statten geht. Die Sphinkteren

des Anus functioniren gewöhnlich ziemlich gut, oft bleibt aber eine Neigung zur nachträglichen Verengung zurück, die durch Bougiesciren beseitigt werden muss.

Bei der sub 3 angegebenen Art der Atresia ani muss zuerst an der Stelle, wo der Anus normal sich findet, ein Kreuzschnitt bis zur Tiefe von 2½ Centim. angelegt werden, worauf man dann nochmals nach dem blinden Ende des Mastdarmes mit dem Finger sucht und mit dem Troikart ebenso verfährt, wie sub 2. Dass diese Operationen häufiger erfolglos sind und, selbst wenn der Mastdarm eröffnet ist, häufig noch lethal ausgehen, versteht sich bei der Lebensschwäche und Vulnerabilität eines neugeborenen Kindes von selbst.

Bei der Communication des Mastdarmes mit der Blase muss man ebenfalls so schnell als möglich suchen, den Fäces einen anderen Ausweg durch einen künstlichen After zu verschaffen, weil im Falle des Misslingens das lethale Ende gewiss ist. Bei der Ansmündung des Mastdarmes in die Vagina hingegen ist Eile weniger nöthig, weil dieser Zustand lange ertragen wird und es schon Kinder gegeben hat, die mit dieser Missbildung ohne alle chirurgische Eingriffe gross geworden sind; wo möglich muss aber auch hier, wenn das Kind anfängt zu gehähen, der Mastdarm von aussen aufgesucht werden, worauf sich die Verbindung mit der Vagina von selbst hebt oder durch eine spätere Operation gehoben werden muss.

Wenn sub 2 und 3 die Auffindung des Mastdarmes nicht gelingen ist, so soll nach den Gesetzen der Chirurgie der künstliche After in der linken Leistengegend oder in einer Inguinalgegend angelegt werden. Dass so operirte Kinder durchkommen können, ist mehrfach schon berichtet worden, ob sie aber gedeihen und gross werden, ist mir nicht bekannt. Wenigstens habe ich noch nie einen Erwachsenen gesehen, dem in den ersten Lebenstagen wegen Verschlusses des Anus an diesen Stellen ein künstlicher After angelegt worden wäre.

16) Infectiouskrankheiten mit vorwiegender Localisation auf den Darmkanal

a) Typhus abdominalis.

Der Abdominaltyphus ist bei Kindern viel häufiger als gewöhnlich angenommen wird, die Diagnose kann aber in vielen Fällen nicht mit Bestimmtheit gestellt werden und hierin mag wohl der Grund liegen, dass viele Aerzte den Kindern eine grössere Resistenz gegen dasselbe zuschreiben. Die Ansteckungsfähigkeit ist, wenn überhaupt eine solche angenommen werden darf, eine ausserordentlich geringe und gar nicht zu vergleichen mit der der anderen ansteckenden Kinderkrankheiten, Masern, Scharlach, Variellen und Keuchhusten. Es kommt wohl häufig vor, dass gleichzeitig in einem Hause die Kinder verschiedener Familien an Typhus, gewöhnlich in einer leichten Form erkranken, noch viel öfter aber sieht man nur ein Kind unter zahlreichen Geschwistern, die alle dem Typhus noch nicht gelandt haben, typhus werden, während die übrigen mit ihm in derselben Stube lebenden vollkommen gesund bleiben.

Vor Beendigung des ersten Lebensjahres befällt der Typhus die Kinder ausserordentlich selten, doch finden sich auch einzelne Fälle

in der Literatur aufzeichnet, in denen Sänglinge dem Typhus erliegen sind, wobei aber zu bemerken ist, dass in den Sectionsberichten niemals von typhösen Darngeschwüren, sondern immer nur von Infiltration der Peyer'schen und Mesenterialdrüsen gesprochen wird. Im zweiten, und nach beendeter Dentition im dritten Lebensjahre wird der Abdominaltyphus ausserordentlich häufig und mit ziemlich charakteristischen Symptomen beobachtet, von welcher Zeit an er in jedem Lebensalter und zu jeder Jahreszeit sich einstellen kann.

Da bei der ganzen Anlage dieses Lehrbuches gründliche Kenntnisse der speciellen Pathologie und Therapie vorausgesetzt wird und nur die durch das kindliche Alter bedingten Abweichungen genauer berücksichtigt werden können, so liegt es nicht im Plane, die gegenwärtig herrschenden Ansichten über Infectionskrankheiten und über den Zusammenhang der localen zur allgemeinen Erkrankung einer Kritik zu unterwerfen. Nur so viel sei hierüber bemerkt, 1) dass die Erscheinungen im Darmkanal nicht im geraden Verhältnis zur Gesamterkrankung stehen und 2) dass noch niemals im Blute Typhöser qualitative noch quantitative Veränderungen gefunden worden sind. Die Veränderungen im Blute Typhöser, welche schon seit mehreren Wochen erkrankt sind, sind Folgen der langwierigen Störungen im Stoffwechsel und Kreislauf, und das sogenannte Typhusblut in den Leichen, wosunter man ein dunkelrothes, dünnflüssiges Blut mit weichen, losem Coagulis versteht, findet sich nicht constant in den Typhusleichen, wohl aber in den Leichen der meisten Kranken, deren Krankheit mit Störung der Respiration und Assimilation verbunden war.

Leichenbefund.

Man kann im Allgemeinen an dem Typhusleichen eine erste und zweite Periode unterscheiden.

Erfolgt der Tod in der ersten Periode, so finden sich die typhösen Veränderungen nur im Dünndarm, in allen Mesenterialdrüsen, in der Milz und auf der Bronchialschleimhaut. — Die Leichen sind noch nicht abgemagert, haben tieflila Todtenflecken und eine trockene dunkle Muskulatur. Das Gehirn ist fest und trocken. Die Bronchialschleimhaut ist geröthet, geschwollen und allenthalben mit einem weissgelben, zähen Schleim bedeckt, so dass an einzelnen Stellen die Bronchien dritter Ordnung davon schon ganz erfüllt sind. Die unabwehrliche Folge dieser Schleimüberfüllung ist in den Lungenpartien, hauptsächlich nach hinten und unten, Circulationsstörung, Hypostase und endlich Splenisation. Das Herz ist ausserordentlich schlaff, enthält sehr lose Coagula und der Muskel ist an einzelnen Stellen erbläut. Unter dem Mikroskope zeigen diese blässeren Stellen beginnende fettige Degeneration. Die Milz ist vergrössert und die Vergrösserung trifft besonders ihren Längendurchmesser, die Kapsel ist prall gespannt, das Gewebe sehr dunkel und weich, oft bis zum Zerfließen brüchig.

Der Darm ist meteoristisch aufgetrieben und enthält viel dünnflüssige, höchst penetrant riechende Flüssigkeit, fast die ganze Mucosa des Dünndarmes ist im Zustande des acuten Catarrhes und die Peyer'schen Drüsen sowie die solitären Follikel sind eigenthümlich infiltrirt. Die Vergrösserung der genannten Drüsen beruht auf einer grauweissen,

markigen Masse, die hauptsächlich die Drüsenkapselfn erfüllt und schwellt, aber auch in das submucöse Gewebe und die Mucosa selbst übergreift. Die Veränderungen und der Verlauf dieser Infiltrationen sind bei Kindern etwas abweichend von denen, die bei Erwachsenen beobachtet werden. Während die übergesse Mehrzahl erwachsener Typhusleichen Verschwärung der Plaques zeigt, kommt dieselbe bei Kindern nur sehr ausnahmsweise vor, indem sich in den meisten Fällen die Infiltration zurückbildet oder wenigstens nach einfachem Platzen der Kapseln eine Entleerung derselben ohne Verschorfung eintritt zu sehen scheint. Wenn in seltenen Fällen wirkliche Schorfe oder Geschwüre gefunden werden, so sind sie doch immer nur vermischt und haben nur einen oder wenige Plaques ergriffen; die Mehrzahl der Peyer'schen Drüsen bleibt immer auf der markigen Infiltration stehen, daher es wohl auch kommt, dass Darmblutungen und Perforationen bei Kindern so ausserordentlich selten sind. Je länger die Kinder, um so seltener trifft man Geschwürsbildung; ich habe sie noch nie bei Kindern unter vier Jahren gefunden, obwohl ich schon mehrere Kinder von 2—4 Jahren, die an exquisitem Typhus gestorben sind, sectirt habe.

Die Mesenterialdrüsen erkranken ganz in derselben Weise, wie die Peyer'schen Plaques, sie schwellen um das 3—4fache ihres Volumens an, sind auf dem Durchschnitt gelblichgrau und markig; je stärker jene infiltrirt sind, um so grösser werden diese, und da die meisten Peyer'schen Plaques sich gegen die Oesophagusklappe zu finden, so sind auch die Mesenterialdrüsen gegen diese Klappe zu mehr und mehr vergrössert.

Sectirt man eine Kinderleiche, die in der zweiten Periode erlegen ist, so fällt vor allem schon die grosse Abmagerung auf, die Haut ist blass und welk, die Todtenflecken sind nicht mehr so violett, die Muskulatur ist blass und oedematös durchgefeuchtet. Die Haut zeigt oft Decubitus, Eiterbläschen, Sadanias und Ecchymosen; die unteren Extremitäten sind meistens etwas hydrophisch. Die Parotis kann geschwollen und mit Eiterbeeren durchsetzt sein. Im Larynx findet sich meistens Perichondritis und Necrose einzelner Knorpelpartlien, die Lungen zeigen noch grössere Splenisationen als in der ersten Periode, die Bronchien sind mit Schleim erfüllt. Die Milz ist geschwollen, runzelig, oben die Mesenterialdrüsen, in welchen man hier und da centrale Abscess findet. Die Peyer'schen Platten und die solitären Follikel sind etwas grau pigmentirt, die Kapseln sind meist geplatzt, wodurch die ganze Drüsenfläche ein reticulirtes Aussehen bekommt, und wenn bei älteren Kindern einzelne Verschwärungen vorhanden waren, sind dieselben in der Vernarbung begriffen. Sind die Kinder an Pyämie zu Grunde gegangen, so findet man die bekannten eitrigen Ergüsse und Keilbildungen in den serösen Säcken und parenchymatösen Organen; sind sie der Anämie und dem Scurbut erlegen, so findet man beträchtlichere seröse Ergüsse in den Körperhöhlen und im subcutanen Gewebe, beim Scurbut ausserdem noch die Veränderungen am Zahnfleisch. Das Gehirn ist im Gegensatz zur ersten Periode ausserordentlich feucht und weich und lässt sich nur sehr schwer ganz aus der Schädelhöhle herausnehmen. Die Seltenheit der Verschwärung der Peyer'schen Plaques macht eine Verwechslung mit dem Leichenbefund der Enteritis folliculosa leicht möglich. Die Anschwellung der Milz und die Beschaffen-

heit der Lungen unterscheiden aber zur Geringen den Typhus von der folliculären Enteritis.

Symptome.

Wie schon aus der Beschreibung des Leichenbefundes hervorgeht, so sind die Veränderungen und Zerstörungen, die der Typhus im kindlichen Organismus anrichtet, nicht so beträchtlich, wie die bei Erwachsenen; dem entsprechend sind auch die Symptome gewöhnlich weniger stürmisch und bedrohlich und die Prognose im Allgemeinen eine sehr günstige. Schon sind die Symptome so heftig und charakteristisch, dass man schon beim ersten Anblick die Diagnose bestimmt auf Typhus stellen kann, wie ein geübter Beobachter dies wohl zu thun im Stande ist, wenn er an das Krankbett eines erwachsenen, schweren Typhuskranken tritt. Natronlich schwankt die Diagnose oft zwischen Typhus und Hydrocephalus acutus, und auf dieser Schwierigkeit der Differentialdiagnose mag wohl auch so manche Heilung eines vermeintlichen Hydrocephalus acutus beruhen. In den meisten Fällen aber haben die Kinder den Typhus so leicht, dass Verwechslungen mit Gastricismus oder Dentitionsbeschwerden vorkommen und dass weniger ängstliche Eltern ärztliche Hilfe gar nicht nachsuchen. Physikalisch ist an diesen Kindern mit leichter Febris typhoides auch nicht viel zu entdecken, die Mils vergrößert sich nicht bedeutend, der Leib ist nicht besonders von Gasen aufgetrieben, und der Bronchialcatarrh erreicht keine beunruhigende Höhe, die Diarrhöen sind mässig, die Kinder sind ruhig, klagen nicht über Schmerzen und schlafen viel. Die bedeutende, Wochen lang dauernde Mattigkeit, der anhaltende Appetitmangel und die langwierige Recrudescenz, bei der immer die Haut ausfallen und die Nägel an den Fingern und Fingerringen mit weissen Querstreifen und Furchen versehen sind, sind oft noch die am meisten charakteristischen Merkmale einer schleichenden Febris typhoides, die in Mänschen allgemein Sclimmsieber genannt wird.

Indessen lässt es sich nicht läugnen, dass einzelne Kinder, besonders nach vollendeter erster Dentition, auch ganz schwere complete Typhussymptome zeigen können und es ist deshalb nöthig, dieselben einer speciellen Analyse zu unterwerfen.

Was vorerst die Chronologie betrifft, so ist es bei keiner acuten Krankheit schwieriger als beim Typhus, die Anfangszeit zu bestimmen, doch ist diese bei Kindern gewöhnlich leichter als bei Erwachsenen, indem ihr zarterer Organismus durch eine Infektion und den Beginn ihrer Wirkung viel heftiger ergriffen wird und sie ausserdem weder durch Beruf noch Noth gezwungen werden, trotz begonnener Krankheit noch möglichst lange gegen dieselbe anzukämpfen. Der Tag, an welchem das Kind seine Heiterkeit verliert, sich gerne hinlegt und zu einer ungewohnten Stunde einschläft, ist, wenn später deutlichere Symptome nachfolgen, als der Anfang des Typhus zu betrachten. Oft even so noch an diesem Tage mit kaum verringertem Appetit, brechen aber gewöhnlich nach einigen Stunden die ganze Malloheit unverwand wieder heraus, worauf sich dann die typhösen Symptome rascher und heftiger einzustellen pflegen, als wenn kein Erbrechen erfolgt ist. Deutliche Fröste habe ich noch nicht beobachten können und kann sie deshalb zur Bestimmung des ersten Tages gar nicht verworthen.

Wenn sich der Typhus während der Dentition entwickelt, ist es kaum möglich, seine Anfangszeit zu bestimmen, indem hier die fast physiologischen Diarrhöen und Kopfeingestationen ganz unmerklich in die typhösen Symptome übergehen. Der Typhus der Kinder kann bezüglich der Zeitdauer ebenso unregelmässig und verschieden verlaufen, als der der Erwachsenen, und es lässt sich von dem stürmischen Ausbrechen der ersten Symptome kein bestimmter Schluss auf dessen Verlauf und Dauer machen. Einzelne Kinder genesen von einem intensiven Typhus schneller als andere von einem ganz leichten schleichernden Febris typhoides. Im Allgemeinen aber ist als Norm anzunehmen, dass ein Kind, welches noch weniger als drei Wochen vollkommen genesen und nicht erschöpfend abgemagert ist, keinen Typhus und nicht einmal eine Febris typhoides gehabt habe, dass also die davon befallenen Kinder länger als drei Wochen in ihrer Ernährung und Entwicklung aufgehalten werden.

Die febrilen Erscheinungen lassen sich bei Kindern eben so leicht in Ziffern ausdrücken, wie dies in neuerer Zeit für die Temperatur, die Pulsschläge und die Harnstoffausscheidung bei Erwachsenen gelungen ist. Zu bemerken ist hierbei, dass Temperaturen von 41,0 bis 41,5 bei Kindern noch nicht von so ominöser Bedeutung sind.

Auch der Puls, auf dessen Beschaffenheit und Frequenz bei Erwachsenen mit Recht so grosser Werth gelegt wird, gibt minder sichere Anhaltspunkte bei Kindern. Er kann sich enorm beschleunigen, bis zu 100 und 170 Schlägen in der Minute, ohne dass deshalb die Gefahr eine sehr grosse und die Prognose besonders ungünstig würde. In der Reconvalescenz lässt er sich ausserordentlich leicht wegdrücken, in Agonie wird er unzählbar und ist nicht mehr zu fühlen. Aussetzen des Pulses kommt bei Kindern selten vor, einen diastolischen Puls kann ich mich nicht erinnern bei Kindern unter zehn Jahren jemals gefunden zu haben.

Von subjectiven Fiebersymptomen sind immer die Abgeschlagenheit, die Aufregung oder auch die Schlafsucht die wichtigsten. Deutliche Fröste haben die Kinder fast nie, der Kopf ist immer gestöhrt, das Auge matt oder, bei starker Aufregung, eigenhümlich glänzend, der Ausdruck des Gesichts ist entweder der der Apathie oder der Erregtheit, oder in heftigsten Fällen, der Wuth.

Die Ernährungsverhältnisse gestalten sich in der kürzesten Zeit sehr ungünstig, der Appetitmangel und die nicht zu stillenden profusen Diarrhöen einerseits und der an Harnstoff reiche Harn andererseits erklären hinlänglich die rasche Abmagerung typhöser Kinder. Ich habe mich oft bemüht, meine Harnstoffbestimmungen, die ich bei Erwachsenen Jahre lang im grossen Masssstabe durchgeführt habe, auch auf die Kinder auszudehnen. Alle Bemühungen scheiterten aber an der Unmöglichkeit, von Kindern unter zehn Jahren den Harn von 24 Stunden zu sammeln. Einzelne procentische Harnstoffuntersuchungen ergaben bei typhösen Kindern immer einen Harnstoffgehalt von 2,5—3,5%, und, da sie dem Augennmass nach eine ziemlich grosse Menge entleeren, so lässt sich approximativ wohl angeben, dass auch die Kinder, wie die Erwachsenen, im Typhus eine grössere Quantität Harnstoff produciren. Eigenhümlich ist, dass die Abmagerung immer noch Fortschritte macht und erst ihren Höhepunkt erreicht, wenn der Appetit

schon wiedergekehrt ist und die Kranken sich vollständig in *Reconvalescenza* befinden. Stellen sich Nachkrankheiten, z. B. Tuberculosis, Scurbut, Phlebitis an verschiedenen Hautvenen oder grössere mehrfache Abscesse ein, so mageru die Kinder oft bis zum Skelet ab, weshalb die Prognose jedoch nicht unbedingt lethäl zu stellen ist, indem solche Kinder zuweilen eine wunderbare Widerstandskraft zeigen und sich nach vielen Monaten endlich doch noch erholen. Nach jedem intensiveren Typhus verlieren die Kinder ihre Haare fast vollständig und bekommen anfangs sehr dünne, glanzlose wieder, schliesslich aber wachsen doch die stärkeren mit ihrem ursprünglichen Glanze in reicher Fülle nach. Bei den so häufigen leichten Formen, bei denen die typhösen Symptome gewissermassen nur angedeutet sind, ist das Ausfallen der Haare weniger bemerklich.

Die wichtigsten Veränderungen finden immer im Gebiete der Digestion statt. Der Appetitmangel ist eines der constantesten Symptome, gewöhnlich ist er vollständig, zuweilen kommen aber auch eigenthümliche Gelüste, z. B. nach Schwarzbrot, auch Obst etc. vor, die man den Kindern ohne besonderen Schaden gewähren kann, wenn man die Vorsicht gebraucht, ihnen hiervon recht grosse Quantitäten auf einmal vorzusetzen. Sie spielen gewöhnlich mit den vorgesetzten Nahrungsmitteln, führen auch wohl etwas davon zum Munde, schlucken in den meisten Fällen aber nichts hinunter, sondern spucken Alles wieder aus, worauf dann die ganze Schwachheit gestillt und kein weiteres Vorlangen mehr kundgegeben wird. So lange die Fiebersymptome währen, dauert auch der Appetitmangel, 3—4 Wochen lang, und man hat dann oft die grösste Mühe, die Kinder nur einigermaßen zu nähren, was nur durch Getränke möglich ist. Nach und nach stellt sich der Appetit wieder ein und wird in wenigen Tagen zu einem Heisshunger, dessen unverstättigte Befriedigung oft heftige Rückfälle veranlasst.

Die Zunge wird bei Kindern selten so trocken als bei Erwachsenen, weil die Kinder meist mit geschlossenem Munde schlafen und hiemit die Hauptgelegenheit zur Entstehung der trockenen Zunge fehlt. Sie ist meistens ziemlich dick belegt und die Papillen sehen dunkelroth zwischen dem weissen Belege hervor, in schweren Fällen kommt aber allerdings auch die charakteristische, braune, trockene Zunge der Typhösen vor.

Die Lippen bläuen sich öfter und bluten viel, besonders bei grösseren Kindern, die fast unmerklich an den gespannten Lippen aufpöfen, worauf denn auch der sogenannte russige Lippenbeleg in Folge kleiner Blatungen sich einstellt. Der Geruch aus dem Munde, der bei erwachsenen Typhösen so ausserordentlich widerlich ist, wird bei Kindern weniger intensiv bemerkt.

Die Parotis schwillt bei typhösen Kindern zuweilen an, was nimmer als ein höchst gefährliches Symptom zu betrachten ist. Es lässt sich nicht mit Bestimmtheit angeben, ob alle Parotitiden metastatische Natur sind, indem ja auch eine direkte Fortpflanzung des Mundhöhlen-catarrhes auf den Stenonischen Gang und die Speicheldrüse selbst möglich ist. Die Gefährlichkeit des Uebels aber und der meistens sich erugnende lethale Ausgang machen es wahrscheinlich, dass in der Mehrzahl der Fälle doch eine wirkliche Metastase und keine einfache Fortpflanzung des Catarrhes die Ursache der Parotitis ist. Sie geht

regelmässig in Eiterung über, wenn andere die wenigen Lebenstage, die die Kranken gewöhnlich nur noch vor sich haben, der Drüse Zeit lassen zum eitrigen Zerfall. In der Leiche findet man neben einzelnen grösseren Abscessen immer noch eine Menge kleiner, von der Grösse eines Stecknadelkopfes.

Mit Erbrechen wird sehr gewöhnlich der Krankheitsprocess eingeleitet, kleinere Kinder erbrechen oft während des ganzen Verlaufes mehrmals im Tage, wadarch, wenn nebenbei keine Diarrhöen bestehen, die Differentialdiagnose von Hydrocephalus acutus sehr erschwert wird. Dieses hartnäckige Erbrechen beruht auf einem profusen Magencatarrh, denn die Kinder brechen nicht nur die wenigen flüssigen Nahrungsmittel, sondern auch beträchtliche Quantitäten von Schleim heraus, wobei sie ungemein schnell atrophiren und gewöhnlich zu Grunde gehen. Das Erbrechen, welches bei Erwachsenen die perforative Peritonitis begleitet, ist bei Kindern sehr selten, weil eben auch das vernachlässigende Moment, die Perforation, fast nie beobachtet wird.

Leibschmerzen sind bei Kindern unter zwei Jahren wohl kaum mit Sicherheit zu fühlen, kommen bei grösseren aber nur ausnahmsweise und nicht in hohem Grade vor. Das gurrende Geräusch in der Cöcalgegend, das früher als ein charakteristisches Typhussymptom bezeichnet wurde, ist als solches mit Recht in Misscredit gekommen, indem es sich bei jedem profusen Dünndarmcatarrh ebenfalls findet.

Der Meteorismus ist, der geringeren Geschwürsbildung entsprechend, gewöhnlich nicht sehr bedeutend, und seine Folgen: erschwertes Athmen durch Heranfrängung des Zwerchfelles, Lungenhypostase und Cyanose, kommen deshalb nur in geringerem Grade vor.

Die Darmanstercungen unterscheiden sich in nichts von denen der Erwachsenen. In den ersten Tagen haben die wenigsten Kranken Diarrhöe, bald aber treten fast regelmässig ohne Medicamente und trotz stogender Getränke Diarrhöen ein, die oft in grosser Menge 20–30 Male im Tage deficirt werden. Von einem Stuhlgang aller in 24 Stunden entleerten Stühle ist bei Kindern kaum die Rede, approximativ aber lässt sich angeben, dass dem Gewicht und Raum nach die typhösen Kinder 3–4 Mal mehr entleeren, als die gesunden. Die 24stündige Menge steht aber nicht immer im Verhältnisse zur Anzahl der Entleerungen, manches Kind entleert auf zwei oder drei Mal eine grössere Quantität typhöser Faeces als ein anderes auf 10 oder 12 Mal, was lediglich auf die Reizbarkeit des Sphincter an ankommt.

Sind die Stühle ganz dünnflüssig, so werden sie hellbraun von Farbe und scheiden sich bei ruhigem Stehenlassen in zwei Schichten, eine obere durchscheinende und eine untere aus feinen weissen und gelben Flocken bestehende. Durch starke, mehrmals nach einander gegebene Drastica lassen sich allerdings Stühle erzeugen, die in Farbe und Schichtenbildung von jenen typhösen nicht mehr zu unterscheiden sind; da solche Drastica aber im Typhus kaum jemals gegeben werden, so hat man nichtsdestoweniger an der Schichtenbildung einen wichtigen Anhaltspunkt für die Diagnose. Die Abwesenheit stärkerer Diarrhöen beweist noch lange nicht die Abwesenheit des Typhus, indem es genug typhöse Kinder gibt, besonders nach überstandener zweiter Dentition, die während der ganzen Krankheit hartnäckig obstipirt sind und durch

Cytmata entleert werden müssen. Die mikroskopische Untersuchung der gelblichen Flecken, aus denen die untere Schichte besteht, ergibt vor Allem 1) eine völlig formlose, gegen Reagentien wenig empfindliche Körnermasse, 2) intensiv gelb gefärbte Schollen, Fragmente von Epithelien (ganze Cylinderepithelien finden sich nur äusserst selten), 3) braune, fein granulirte Kugeln von verschiedener Grösse und ohne Hülle, was man durch vorsichtige Compression leicht ermitteln kann, 4) grosse braune, oft doppeltconturirte, runde, ovale, zuweilen deutlich rhombische, das Licht stark brechende Körper, 5) Tripelphosphate und 6) Infusorien, als ständige Begleiter einer jeden Verwesung. Laute Gerüche, die sich auch in diarrhöischen Stühlen finden und für den Typhus somit nicht charakteristisch sind.

Ebenso wenig als durch das Mikroskop, können durch die chemische Untersuchung eigenthümliche Typhusstoffe nachgewiesen werden. Die typhösen Stühle entwickeln mehr Schwefelwasserstoffgas als die diarrhöischen, was durch feuchtes Bleitrockenpapier sich nachweisen lässt, und haben einen grösseren Ammoniakgehalt, weshalb sie geröthetes Lackmuspapier intensiver bläuen.

Im Salzgehalt, dann in den verschiedenen Destillaten, die ich bei Gelegenheit einer früheren Arbeit ausführlich angestellt habe, ergibt sich kein Unterschied zwischen einem typhösen und einem diarrhöischen Stuhl.

Gewöhnlich dauern die profusen Diarrhöen 8—14 Tage, worauf Obstipation erfolgt; länger dauernde Diarrhöen sind bei Kindern verhältnissmässig seltener, weil die Zerstörungen der Darmschleimhaut weniger intensiv sind. So lange die Kinder fiebern, lassen sie unter sich gehen, wobei jedoch genau zu unterscheiden ist, ob sie bloss in Folge von Unachtsamkeit bei der Eingenommenheit des Sensoriums einige Male des Tages den Stuhl in das Bett gehen lassen, oder ob in Folge einer Lähmung der Sphincteren die flüssigen Faeces fortwährend zum Anus heraussickern und ihn unmittelbar nach vorgenommener Reinigung immer wieder beschmutzen. Die erstere Erscheinung ist sehr gewöhnlich, zeigt zwar einen ziemlich schweren Typhus an, gestattet aber dennoch eine günstige Prognose, die letztere hingegen ist ein Symptom tödtlicher Schwäche und tiefster Depression des Nervensystems und ist als ein ungünstiges Zeichen zu betrachten.

Typhöse Darmblutungen und Darmperforationen sind bei Kindern ausserordentlich selten, ihre Symptome und Consequenzen sind in nichts verschieden von jenen, die bei Erwachsenen vorkommen und als bekannt vorausgesetzt werden müssen.

In einzelnen bösartigen Epidemiën stellt sich in der dritten oder vierten Woche zum Typhus ein kruppöser Process des Dickdarms, wobei die Kinder röhrtartige Stühle entleeren, rasch collabiren und comatös oder unter Convulsionen zu Grunde gehen. Man findet dann bei der Section auf der Dickdarmschleimhaut ausgebildeten Krup mit Geschwürsbildung der verschiedenen Stadien, wie sie bei der Ruhr ausführlicher beschrieben worden sind.

Die Milch schwillt auch bei Kindern regelmässig an; der physikalische Nachweis der Mikroconturen aber ist viel schwieriger als gewöhnlich angenommen wird und unterliegt unvermeidlichen und zugleich unberechenbaren Schwankungen. Bei einem gesunden Kinde von

1–2 Jahren lässt sich zwischen der neunten und zehnten Rippe eine kleine Dämpfung von kaum einem Zoll Länge und $\frac{1}{4}$ Zoll Breite nachweisen, eine senkrechte Linie, von der Mitte der Achselhöhle zum grossen Trochanter gezogen, schneidet diese durch geringere Resonanz kenntlich gewordene Stelle. Die normale, nicht vergrösserte Milz liegt mit ihrer Längsaxe der des Körpers parallel, nur das untere Ende ragt ein wenig mehr nach vorn; vergrössert sie sich aber, so wird ihre Lage mehr und mehr horizontal, doch bleibt das untere Ende immer etwas tiefer als das obere. Bei zunehmender Vergrösserung wächst also der untere Rand nach vorne und unten, erreicht den knorpeligen Rippenrand und schiebt sich an der Bauchwand nach vorne, während sich das obere hintere Ende der Milz nach dem Verlaufe der neunten Rippe gegen die Fortsätze nach rückwärts vergrössert, so dass man bei Percussion des Rückens zwischen Wirbelende und Milz nur mehr einen schmalen sonoren Streifen findet. Je grösser die Milz wird, um so mehr geht sie wieder aus der horizontalen in die ursprüngliche senkrechte Lage über. Im Typhus kann sich die Milz um das 3–4fache ihres normalen Volumens vergrössern, die Vergrösserung im Längendurchmesser ist unverhältnissmässig beträchtlicher als die im Quer- und Dickendurchmesser.

Der typhöse Milztumor ist immer leicht beweglich und wird bei jeder tiefen Inspiration weiter nach abwärts gedrückt, was sich leichter durch Percussion als durch Eindrücken der Finger an den Rippenrand untersuchen lässt. Ueberhaupt ist es auffallend, wie schwer und unendlich man eine stark vergrösserte Typhus-Milz, die weit über den Rippenrand hervorragt, palpiren kann, was wohl durch die enorme Weichheit und grössere Beweglichkeit zu erklären ist. Die Hautanschwellung der Milz fällt in die erste und zweite Woche, mit der dritten Woche beginnt die Verkleinerung, die schon in der vierten gewöhnlich die normale Grösse wieder herstellt.

Der Meteorismus des Darmrohres, der natürlich bald grosser, bald geringer ist, je nachdem der Catarrh überhand nimmt und die peristaltischen Bewegungen verlangsamt werden, ist ein grosses Hinderniss bei Untersuchung der vergrösserten Milz. Die Raumvergrösserung des Darmes geht nicht bloss auf Kosten der Bauchwand, sondern auch aller übrigen Baucheingeweide vor sich. Die Leber hebt ihren scharfen Rand mehr und mehr nach oben und drängt das Zwerchfell nach aufwärts, die Milz aber wird nach hinten und oben geschoben und stülpt sich in den nachdrängenden Darm ein, so dass auch eine ganz bedeutend vergrösserte Milz kaum mehr zu percipiren ist. Man müsse die Diagnose häufig amittosen, wenn man den Nachweis des Milztumors für ein notwendiges Postulat des bestehenden Typhus betrachtet. Es geht hieraus keineswegs hervor, dass man die Percussion der Milz als unnöthig unterlassen soll, nur das muss beherzigt werden, dass eine grössere Dämpfung in der Milzgegend nicht constant ist.

Keilförmige Milzentzündung entsteht nur bei Pyämie, welche bei typhösen Kindern, die nicht in einem Spital liegen, fast niemals zur Beobachtung kommt.

Eben so constant, wie die Veränderungen der Digestions-, sind die der Respirationsorgane. Alle typhösen Kinder haben Bronchial-

catarrh und Husten, schlucken aber bis zum fünften, sechsten Jahre den ausgekneteten Schleim regelmäßig wieder hinunter. Je intensiver die Erkrankungen, um so unbedeutender und seltener ist der Husten, nicht als ob der Bronchialcatarrh hierbei geringer wäre, sondern weil die Reizbarkeit der Schleimhaut so abgestumpft ist, dass die secretirten Schleimmassen nicht mehr expectorirt werden. Bei der Auscultation der Lungen hört man allenthalben gross- und kleinflüssige Rasselgeräusche. Der liegen bleibende Schleim verursacht endlich Verstopfung kleinerer Bronchien und es kommt zu den bekannten hypostatischen Splenisationen. Dieselben finden sich nur in den hinteren Partien der unteren Lungenlappen und veranlassen wohl einen vermindert sonoren Percussionsschall, aber keine so exquisite Dämpfung wie eine pneumonische Lunge, wobei auch der feinere Nuancirung des Percussionsschalles der Umstand in den Weg tritt, dass hier meist in beiden Lungen Splenisation entsteht und somit der Vergleich des Percussionsschalles auf beiden Lungenflächen wegfällt. Zumeist hört man an den splenisirten Stellen deutliches Bronchialathmen, niemals aber weder zu Anfang, wenn die Splenisation sich bildet, noch zu Ende, wenn sie sich in seltenen Fällen lost, kann man charakteristisches Knisterrauschen entdecken, wie dieses in der Pneumonie so regelmäßig gehört wird. Mit zunehmender Splenisation beschleunigen sich die Athembzüge und die Nasenflügel heben sich bei jeder Inspiration, ein Symptom, das man bei der Schwierigkeit der physikalischen Untersuchung und den unzureichenden Resultaten, die bei der Unruhe der Kinder nur zu häufig erzielt werden, nicht aufmerksam genug beachten kann. Zuletzt tritt leichte Cyanose ein, die Hirnsymptome nehmen zu, die Pulsfrequenz steigt und die Kinder gehen nach einer ziemlich langen Agone zu Grunde. Kleinere Splenisationen scheinen sich lösen zu können, grössere bedingen fast immer ein lethales Ende. Die Convalescenz dauert, wenn einmal Splenisation eingetreten war, immer sehr lange und der Husten verschwindet erst nach Monaten gänzlich.

Lobäre Pneumonien finden sich häufig bei den Sectionen typhöser Kinder und kommen sowohl in splenisirten als in gesunden Stellen vor. Sie sind zu erkennen durch ihr starres Exsudat und das körnige Aussehen der Schnittfläche. Diagnostische Zeichen hierfür haben wir keine, denn die beschleunigte Respiration, das Heben der Nasenflügel und der ausserordentlich rasche Puls kommt ebenso der Splenisation und selbst schon einem ausgebreiteten typhösen Bronchialcatarrh ohne Splenisation als der lobären Pneumonie zu. Durch Percussion und Auscultation lassen sich umschriebene Verdichtungen des Lungengewebes niemals entdecken.

Lungenödem wird häufig bei Sectionen bemerkt und scheint die Wirkung einer länger dauernden Agone zu sein. Lungentuberculose kann sich bei Kindern mit hereditärer Tuberkelanlage nach überstandenen Typhus rasch entwickeln, ist übrigens nach Typhus viel seltener als nach Masern, in deren Folge bei einer grossen Menge von Kindern dieselbe sich einstellt. Neu auftretendes Fieber, zunehmender Husten und Auswurf lassen sie vermuthen, die physikalische Untersuchung gibt nur selten hierfür direkten Aufschluss. Die Bronchialdrüsen sind häufig vergrössert und vermehren die Athemnoth, ihre Vergrösserung lässt sich aber nicht diagnosticiren.

Zu manchen Zeiten sollen im Larynx Geschwüre vorkommen, in den letzteren Jahren sind mir bei keiner Section einfache Geschwüre im Larynx, wohl aber Perichondritis und Knorpelnekrose mehrfach begegnet. Gewöhnlich tritt die Erkrankung des Larynx erst in der dritten bis vierten Woche eines schweren Typhus auf und gehört zu den secundären Symptomen. Die Kinder werden plötzlich heiser, dann gänzlich aphorisch, bekommen einen bellenden Kruphusen und Fieber, bald gesellt sich die heftigste Athemnoth dazu und die Kinder sterben einen furchterlichen Erstickungstod. Bei der Section findet man eine mehr oder minder grosse Necrose der Larynxknorpel, die necrotischen Knorpelstücke sind von Jauche ausgefüllt und die Glottis ist oedematos geschwellen. Fälle von spontaner Heilung mit lebenslänglicher Heiserkeit und selbst Aphasie sollen vorgekommen sein, von den erfahrensten Aerzten aber wird die Kehlkopfnekrose für tödtlich gehalten. Die Laryngotomie liefert bei Erwachsenen mit typhöser Larynxnekrose ziemlich günstige Resultate, ich selbst habe schon mehrere Individuen gesehen, an denen sie mit Glück verrichtet wurde, und werde keinen Augenblick zögern, sie vorzunehmen, wenn ich wieder bei einem Kinde Larynxnekrose in Behandlung bekomme.

Wenn gleich auch im Typhus, wie in jeder anderen Krankheit, catarrhalische Laryngitis, die dann freilich auf jeden heftigen Hautreiz und auch von selbst wieder in einigen Tagen verschwindet, sich einstellen kann, so muss doch Heiserkeit bei einem typhösen Kinde immer die grösste Besorgnis erregen, und es ist rathsam, sich auf die Tracheotomie vorzubereiten, damit sie im Momente zunehmender Athemnoth sogleich angestellt werden kann.

Die Haut zeigt mannigfache Veränderungen. Ungefähr 5—10 Tage nach Beginn des Abdominaltyphus treten auf Brust und Unterleib, — an den übrigen Stellen nur höchst selten und spärlich — nicht auf einmal, sondern im Verlaufe mehrerer Tage, stecknadelkopfbis linsengrosse, nicht scharf begrenzte, in der Mitte dunkler, nach der Peripherie zu heller, rothe Flecken auf, welche auf Fingerdruck schwindend sich so gleichmässig wieder röthen, dass man nicht entscheiden kann, ob die Röthe vom Centrum nach der Peripherie oder umgekehrt wieder eintritt. *Rosola typhosa*, *taches lenticulaires*. Sie sind gewöhnlich im Niveau der Haut und erheben sich nur ausnahmsweise nach Art der Morbillen über dieselbe, mit den Haarfollikeln und Schweissdrüsen stehen sie in keinem Zusammenhang und werden von den Kindern nicht empfunden.

Der Unterschied zwischen *Rosola typhosa* und Pusteln ist nicht immer leicht zu bestimmen. Die Pusteln werden mit in die Krankheit gebracht und erblassen täglich mehr, ohne durch neue ersetzt zu werden, weil die Fieber alle Fieberkranken verlassen, während das typhöse Exanthem erst einige Tage, nachdem die Kinder schwer erkrankt sind, zum Vorschein kommt.

Der Ausbruch des typhösen Exanthems findet nicht auf einmal statt, der Verlauf ist durchaus nicht typisch, einzelne Flecken bleiben länger, andere kürzer stehen, während einzelne schon wieder erblassen, treten an anderen Stellen wieder neue auf, und wir haben hierin wesentliche Unterschiede von den acuten Exanthemen. Die typhöse *Rosola* steht immer mehrere Tage, in den Exacerbationen des Fiebers

wird sie dunkler, im den Remissionen blässer, endlich erblässt sie durch Braunroth und Gelbroth wieder zur normalen Hautfarbe. Fast alle schwer typhösen Kinder zeigen einzelne solcher Roselafflecken, in den leichteren Formen des Abdominaltyphus werden sie nicht beobachtet. In prognostischer Beziehung kommt es weniger auf die Zahl als auf die Farbe und Dauer der Flecken an, je bläulicher sie sind, um so gefährlicher ist der Zustand.

Schweisse sind im Typhus selten kritisch. Einzelne Kinder schwitzen von Anfang an trotz Zunahme der typhösen Symptome, andere gehen mit kaum feuchter Haut in eine vollkommene *Reconvalescenz* über.

Miliarien stellen sich bei den meisten typhösen Kindern in grösster Menge ein. Auch hier haben sie keine kritische und noch viel weniger eine ungünstige Bedeutung, und es ist geradezu unerklärlich, wodurch unter den Laien aller Klassen eine so gewaltige Furcht vor diesen unschuldigen Schweissbläschen entstanden ist. Ihre Entstehungsweise ist eine höchst einfache. Durch die Sistirung der Schweisssecretion am Anfange des Typhus vertrocknen die den Ausführungsgang der Schweissdrüse auskleidenden Epithelien, werden nicht weggeschwemmt und bilden gegen den nun plötzlich nach längerer Unterbrechung wieder reichlich secretirten Schweiss einen Damm, den er nicht durchbrechen kann, weshalb er die verschlossene Mündung und die sie umgebende, ebenfalls vertrocknete Epidermischichte in der Grösse eines Stecknadelkopfes und grösser emporhebt. Nach zwei, längstens drei Tagen platzt diese Epidermiskappe, und der Schweiss sickert nun ungehindert durch die wiedergeöffnete, gereinigte Passage. Die micro-chemische Untersuchung weist zur Evidenz nach, dass der Inhalt der Miliarien kein reines Cutisexsudat, sondern reiner Schweiss ist, und bringt man die Kappe eines Miliarienbläschens unter das Mikroskop, so kann man sich leicht überzeugen, dass in ihrer Mitte sich die Mündung einer Schweissdrüse befindet, welche sich durch concentrische Lage der Epidermiszellen zu erkennen gibt und niemals geöffnet, sondern durch grössere und kleinere Kerne verschlossen erscheint.

Am grössten und zahlreichsten entstehen die Miliarien an den Stellen, wo Hautreize, z. B. Senfteige oder Ung. cinereum, angewandt wurden. Sie erreichen dort oft die Grösse von Linsen, nach dem Bersten derselben schält sich die Epidermis in grösseren Fetzen fort wie bei Scharlach, und die neue Cutischichte zeigt längere Zeit eine höhere Röthe als die Umgebung. Es ist diese Erscheinung auch sehr erklärlich, indem durch Salben die Schweissdrüsenausführungsgänge noch fester verstopft werden und durch Rubefacientien eine Congestion der Cutis entsteht, wobei die Drüsenkanäle jedenfalls comprimirt werden müssen. Kritisch kann man die Miliarien nur insoweit nennen, als sie eben anzeigen, dass die länger unterbrochene Schweisssecretion sich wieder eingestellt hat, was immer als ein erwünschtes, beruhigendes Symptom zu betrachten ist.

Ganz andere Bedeutung haben die Furunkel, die Zellgewebshabscesso und Decubitus. In der *Reconvalescenz* stellt sich zuweilen eine höchst schmerzhaft Furunkulosis hauptsächlich am Kopf und im Nacken ein, wodurch die Kinder viele Wochen gequält und in

ihrer vollständigen Genesung aufgehalten werden, ein gleiches gilt von den mehrfachen subcutanen Abscessen, die oft sehr träge in Eiterung übergehen und lange auf die zum Einstich erwünschte Fluktuation warten lassen.

Reinlich gehaltene Kinder bekommen Decubitus viel später und in geringerer Ausdehnung als dies bei Erwachsenen beobachtet wird. Es stösst sich gewöhnlich an einigen kleinen Stellen am Kreuzbein, den Nates oder den Trochanteren die Epithelmis ab und bedingt oberflächliche Cutisgeschwüre, die gewöhnlich auf einfache Bestreichung mit adstringirenden Salben wieder heilen. Grössere Hautnecrosen, so thalergrosse Partien der Haut über dem Kreuzbein plötzlich blau und leuchtig werden und sich in wenigen Tagen abstossen, entstehen zuweilen in schlecht ventilirten Spitalern, in der Privatpraxis sind sie mir bei Kindern noch nie vorgekommen.

Petechien an den unteren Extremitäten bemerkt man zuweilen bei typhösen Kindern, die in ganz feuchten, armseligen Localen liegen und scorbutisch erkranken, sie unterscheiden sich in nichts von jenen des gewöhnlichen Scaletus. Erysipela des Gesichts, wie sie bei Erwachsenen zuweilen als Theilerscheinung einer pyämischen Entzündung der Oberkieferhöhle sich finden, habe ich bei Kindern noch nicht beobachtet.

Die Kopf- und Nervensymptome sind bei den typhösen Kindern nicht so sehr markirt, als man bei der allgemeinen Irritabilität annehmen sollte. Die meisten leichteren Fälle verlaufen nur mit geistiger Trägheit und allgemeiner gemüthlicher Verstimmung, in schweren Fällen stellen sich zuerst Nachts, später auch am Tage Delirien des verschiedensten Inhaltes ein, worauf dann wieder Stunden des tiefsten Sopors folgen. Die Einklebung der *folia nervosa* in eine versatilis und stupida lässt sich also, wie bei den Erwachsenen, auch bei den Kindern nicht aufrecht erhalten, und nur wenn der eine oder andere Zustand mehrere Tage lang ein continuirlicher geworden, kann möglicher Weise die therapeutische Indication darnach sich ändern. Die Delirien dauern zuweilen nur einen oder wenige Tage, gewöhnlich aber 2—3 Wochen, hören nicht mit einem Male, sondern nach und nach auf und lassen eine grosse Reizbarkeit und Gedächtnisschwäche zurück, die bei manchen Kindern eine bleibende Lebelängliche werden kann. Zuweilen tritt auf starkes Nasenbluten, auf eine Darmblutung oder auf eine profusere Diarrhöe ein plötzliches Freiwerden des Sensoriums ein.

Die Muskelschwäche der typhösen Kinder ist eine ausserordentlich grosse, sie liegen meist ganz ruhig auf dem Rücken und können sich kaum aufsetzen. Der fast nie fehlende Meteorismus ist zum Theil auch einer Parese der Darmmuskularis zuzuschreiben, die Schwerhörigkeit lässt sich einfacher durch mechanische Störung der Schallleitung, als in Folge eines Catarrhes der Eustachischen Röhren eintreten, als durch die toxische Wirkung des typhösen Blutes erklären. Von der dem Typhus eigenthümlichen Muskelschwäche ist zu scheiden eine Parese der unteren Extremitäten, die sich unverhältnissmässig lange in die Recrudescenz hinauszieht, endlich aber doch sich wieder spontan hebt, gleichviel ob die jetzt so hoch gepriesene Electricität in Anwendung gekommen ist oder nicht.

Ueber den Urin typhöser Kinder und das urepöische System sowie über die Genitalien ist wegen der Unmöglichkeit dem Harn gehörig aufzufangen und wegen der untergeordneten Bedeutung der kindlichen Genitalien überhaupt wenig zu berichten. Einmal sah ich bei einem ganz gut gepflegten zweijährigen Mädchen aus einer wohlhabenden Familie Dyschtheritis der Vagina und sofortige Gangrän der kleinen und grossen Labien eintreten, worauf trotz der energischsten, örtlichen Aetzmittel und allgemein robörenden Behandlung der Tod nach wenigen Tagen eintrat.

Metastasen im Sinne der älteren Schule kommen im Typhus nicht vor. Man hat hiezu die Phlebitis, die Furunkel, die Hautabscess, die keilförmigen Entzündungen parenchymatöser Organe und die Gangrän gerechnet. Seitdem man aber die Verschleppung der Gerinnel und die Bedingungen der Pflöpföhlung hauptsächlich durch Virchow's Bemühungen genauer hat kennen lernen, und seitdem der pyämische Process und sein Auftreten in den verschiedenen Höhlen und Organen besser erforscht werden ist, haben diese Anschauungsweisen sämmtlich sich sehr verändert. Wenn auch noch nicht alle Verhältnisse vollkommen aufgeklärt sind, so ist doch schon so viel erwirt, dass sie zum grössten Theil auf mechanischen Circulationsstörungen beruhen, und dass wir somit nicht nöthig haben, unsere Zuflucht zu den mysteriösen Metastasen zu nehmen.

Wirkliche Recidive kommen bei Kindern nur selten vor, hingegen geht fast kein typhöses Kind ohne längere oder kürzere Unterbrechung einer stetigen Genesung entgegen, weil sie bei erwachendem Heis hunger sich fast immer Nahrungsmittel zu verschaffen wissen und in Ermangelung derselben vollkommen unverdauliche Dinge, Papier etc. zu sich nehmen. Als häufigste Nachkrankheit stellt sich bei Kindern mit hereditärer Anlage die Tuberculose ein, an der sie erst nach vielen Monaten zu Grunde gehen, bei scrofulösen Individuen entstehen auch stark nässende Exantheme, Exem und Impetigo und hässliche Ovarien, wobei gewöhnlich das Trommelfell perforirt und die Gehörknöchelchen ausgestossen werden. Das Ende dieses ebenso schmerzhaften als langwierigen und wegen des üblen Geruches auch für die Umgebung höchst lästigen Uebels ist natürlich complete Taubheit.

Eine dem Typhus der Kinder ausschliesslich zukommende Complication ist die Noma, welche sich zuweilen in der Reconvalescentz einstellt und hauptsächlich Kinder in schlecht ventilirten fensterten Localen befällt. Das Nähere hierüber wurde schon pag. 80 besprochen.

Therapie.

Man kann einem typhösen Kinde durch Medicamente viel mehr schaden als nützen, und zwar wird ein wesentlicher Schaden zugefügt durch alle Brech- und Abführmittel drastischer Natur, obwohl die Anfangssymptome eines Typhus dazu oft ausserordentlich einladend sein können. Ich gestehe es offen, dass ich mich schon öfter habe hinreissen lassen, einem stark congestionirten obstipirten Kinde mit weissbelegter Zunge ein kleines Brechmittel aus Tartar. stibiat. 0.05, Jpecac. 1.20 zu reichen, und jedesmal bemerkte ich, dass der Typhus, der sich in der Folge entwickelte, zu den heftigsten Erscheinungen

sich steigerte. Bei dem jedesmaligen Zusammentreffen eines heftigen Typhus mit dem Brechmittel kann von einem Zufall nicht mehr die Rede sein und es muss deshalb dringend ermahnt werden, den Tartarus emeticus bei Seite zu lassen, wo irgend ein kleines Symptom den hegimenden Typhus verrathen hat.

Die in den Lehrbüchern ausführlich besprochenen prophylaktischen Maassregeln (Ventilation, gehörige Nahrung und Beschäftigung etc.) verdienen allerdings die grösste Beherzigung, lassen sich aber in den meisten Fällen viel leichter verschreiben als durchführen. Hat man doch schon genug zu kämpfen, bis man die typhösen Kinder aus einer kleinen von andern Kindern und Erwachsenen bewohnten Hinterstube, dem Kinderzimmer, in das sog. schöne Zimmer transportiren kann, wo gewöhnlich der schönste, freieste Raum nur von einigen Luxusmöbeln ausgefüllt ist. In grösseren Wohnungen muss man darauf dringen, dass zwei neben einander liegende Zimmer für das kranke Kind disponibel sind, nur auf diese Weise gelingt es, die Luft gründlich zu erneuern. Wenn auch die Ansteckung eine höchst problematische ist, so ist es doch rathsam, schon zur Aufrechterhaltung der nöthigen Ruhe, dass kein anderes Kind und nur eine, höchstens zwei erwachsene Personen in demselben Zimmer sich aufhalten. Die Temperatur des Zimmers gelte niemals über 15 Grad R. hinaus, Bettdecken müssen immer leicht, die Unterlagen ziemlich hart, von Seegras, Stroh oder Rosshaar sein. Wenn die typhösen Symptome einmal gehörig ausgesprochen sind, so ist es immer wünschenswerth, dass die Kopfhare kurz abgeschnitten werden, wodurch die grösste Abkühlung des congestionirten Kopfes erzielt wird. Die kalten Umschläge, die gewöhnlich von den Laien in der Weise applicirt werden, dass man ein Stück Leinwand in kaltes Wasser taucht und es dann durch ein anderes trocknes Tuch auf die Stirne bindet, wirken höchstens eine Minute kühlend, nehmen alsbald die Temperatur der Haut an und wirken dann mehr erhitzend als abkühlend, wie man sich durch den Anblick und die Berührung so behandelter Kinder leicht überzeugen kann. Ich glaube nicht, dass auf die Stirne gelegte kalte Compressen grosse Erleichterung verschaffen, indem sie zu bald warm werden und man doch nicht jede Minute wechseln kann, was überdies ein krankes Kind nur noch mehr aufregen würde. Wenn ein Kind noch zu unvernünftig ist, oder wenn es in Folge der Erkrankung in Delirien liegt, so muss man von dieser Art der Kaltapplication ganz absehen und sich darauf beschränken, den kurz geschorenen Kopf alle Stunden über eine Schüssel kaltes Wasser zu halten und eine tüchtige Waschung vorzunehmen, wobei man durch ein um den Hals gelegtes Tuch den übrigen Körper und die Kleider leicht vor Durchnässung schützen kann.

Die interne Behandlung muss in den ersten Tagen des Typhus schon deshalb eine expectative sein, weil die Diagnose nicht bestimmt gestellt werden kann, und man, wie schon bemerkt, durch alle eingreifenden Mittel, wozu auch die zur Bekämpfung der Congestion an die Schläfe gesetzten Blutegel gehören, nur schadet. Man beschränkt sich am besten darauf, bei Obstipation ein säuerliches Getränk, irgend eine wohlgeschmeckende Pflanzensäure oder auch einige Tropfen Acol. Halleri zu geben, während man bei schon eingetretener Diarrhoe passender die Mucilaginoso reicht. Vom Calomel ist zu rühmen, dass es, in Mittel-

dosen von 0,1 — 0,2 einige Male gereicht, sicher Stuhllockerung bewirkt, ohne dass deshalb so profuse Diarrhöen wie auf Tartarus selbst, oder Drastica folgten. Von einer coöperirenden Wirkung ist natürlich keine Rede. So führt man mit der sänerlichen oder schleimigen Behandlung 10—14 Tage fort, bis zu welcher Zeit sich gewöhnlich weder Besserung noch Verschlimmerung erkennen lässt, und fängt dann an die Kinder besser zu ernähren.

Die Diät der typhösen Kinder richtet sich nach ihrem Alter und der früheren Nahrungsweise. Die Bouillon und die Schleimsuppe, bei den Erwachsenen mit Recht als das passendste Nahrungsmittel betrachtet, schmecken viele Kinder, die in gesunden Tagen sich hauptsächlich von Milch und Milchspeisen genährt haben, gar nicht an, und es bleibt deshalb nichts übrig, als ihnen auch im Typhus kleinere Portionen Milch oder Milchkaffee mehrmals des Tages zu reichen, obwohl sich nicht leugnen lässt, dass die Diarrhöen dadurch etwas zunehmen und dass zuweilen grössere Coagula unvolanter Milch sich in den Stühlen finden. Durch dickschleimige Getränke, ein dickes Salepdekoch, Gummiwasser, Reisswasser etc. muss man trachten, den durch die Milchsäure der gemessenen Milch unfehlbar entstehenden Reiz zu bekämpfen. Schwertyphöse Kinder haben gar kein Bedürfniss als kaltes Wasser und verweigern Wochen lang alle Nahrung, selbst Milch und Suppe, ohne dass sie deshalb mehr abmagerten als andere, die täglich einige Male die Nahrungsmittel zu sich nehmen. Es fragt sich demnach sehr, ob die den typhösen Kindern beigebrachte Nahrung überhaupt assimiliert wird. Bei zunehmendem Collapsus, bei beginnender Spasmodie und kleiner werdendem Pulse ist eine excitirende, febrifugende Diät dringend indicirt.

Wie haben in dem Kaffee ein bequemes, leicht zu schaffendes Erregungsmittel, das wegen seines Wohlgeschmacks allen andern excitirenden Medicamenten, Campher, Moschus, Castoreum, Ammoniak etc. bei weitem vorzuziehen ist. Auf eine Tasse gezuckerten, starken Kaffees, der mit nicht zu viel Milch gemischt werden soll, heben sich oft plötzlich die Kräfte und die ausserst geschwächte Circulation bekommt neuen Tonus. Ausserdem muss Fleischbrühe mit Eigelb versucht werden, die auch per anum applicirt werden kann. Den Campher nehmen die Kinder sehr schwer und brechen gewöhnlich darauf, ähnlich verhält es sich mit dem Moschus, der ausserdem die Luft des ganzen Hauses verpestet. Kalte Begiessungen in trockener Wärme stellen gewöhnlich das Bewusstsein wieder her, kräftigen die Respirationsbewegungen und erzeugen eine zum Schwessen geneigte, äufsende Haut. Wenn die Kinder mehrmals im Tage unter sich gehen lassen, so sind zur Herstellung der Reinlichkeit lauwarme Bäder von 25° R., in welchem die Kinder 5—10 Minuten lang zu verweilen haben, dringend indicirt. Miliarien, Roseola typhosa und der nie fehlende Bronchialcatarrh dürfen nicht als Contraindication derselben angesehen werden.

Stellt sich nun in der 3.—4. Woche ein lebhafter Appetit ein, so ist die strengste Aufsicht nöthwendig. Es muss mit Schleimsuppe, Fleischsuppe, Milch, Kaffee und Milchbrei so lange fortgefahren werden, bis vollkommene Verstopfung, Fieberhaftigkeit und reine Zunge eintritt, worauf man etwas feingewiegtes Hühner- oder Kalbfleisch versuchen kann. Fette Speisen und Blättergemüse sind noch lange Zeit, an

besten Ma die Kinder schon ihren ersten Ausgang überstanden haben, zu vermeiden.

Mit dieser einfachen, expectativen Behandlung reicht man in der Mehrzahl der Fälle aus. Werden einzelne Symptome noch besonders gefährdend, so müssen sie natürlich speciell in Angriff genommen werden.

Gegen das Fieber und die Kopfcongestionen ist die Kälte das beste Remedium. Kalte erzeugende Mittel sind: kühle Temperatur des Zimmers von 12—14 Grad R. und leichte Bedeckung, kurz geschorene Haare, Kopfkissen von Rosshaar mit einem Ueberzug von weichem Edleder, eine mit Eisstückchen gefüllte Schweins- oder Gantschackblase, nur bei älteren nicht delirirenden Kindern anwendbar, stündlich kalte Waschungen des Kopfes, kalte Begiessungen des ganzen Körpers in trockner Wanne, ein, höchstens zwei mal im Tage. Von Senfteigen im Nacken oder auf den Waden habe ich noch wenig Erleichterung gesehen. Die mehrtägige Rölhe und grössere Empfindlichkeit der Haut, die regelmässig darauf erfolgen, machen die Kinder nur noch unruhiger und aufgeregter. Niemals aber lasse man sich verleiten, typhösen Kindern Vesication zu setzen, weil diese nur sehr langsam heilen, sich häufig mit diphtheritischen Membranen bedecken und sogar gangränös werden können.

Gegen grosse Aufregung, Schlaflosigkeit und furiöse Delirien haben wir in der Opiumfinktur das beste Mittel. Man gibt von derselben am sichersten immer einen Tropfen weniger als das Kind Jahre zählt, also einem dreijähr. Kinde *gtt. ij*, einem vierjähr. *gtt. iij* etc. und kann diese Dosis 2—3 Mal in 24 Stunden repetiren. Ich habe davon niemals die dem Opium nachgesagten Nachtheile: Collapse, tiefen Sopor, aussetzenden Puls, Cyanose etc. gesehen, sondern bemerkt nur, das die Kinder einige Stunden Ruhe, für sie und die Umgebung gleich erquickend, fanden, ohne dass sich im Verlaufe des Typhus sonst etwas geändert hätte.

Gegen grosse Schwäche, kleinen Puls, kühl-blauliche Haut und die dabei regelmässig sich einstellende Splenisation der hinteren Lungenparthien ist eine excitirende, roborirende Behandlung einzuschlagen, wobei ich starken Kaffee obenan stelle, beim Gebrauche des Weins, der im Typhus der Erwachsenen mit Recht eine so wichtige Rolle spielt, hingegen zur Vorsicht mahnen muss, weil die alkoholhaltigen Getränke auf manches Kinderlein einen nach betäubenden Einfluss haben oder auch furiöse Delirien erzeugen können. Interne gibt man am besten Valeriana, Campher oder einige Tropfen Essigäther. Von der roborirenden Wirkung des Chinin in diesen Fällen ist nicht viel rühmliches zu erzählen. Trockne Schöpfköpfe, mehrmals täglich auf die vorderen und seitlichen Parthien des Thorax gesetzt, sind nicht nur theoretisch rationell, sondern üben in der That einen ziemlich günstigen Einfluss auf die Splenisation aus.

Mühsiges Nasenathmen bringt immer Erleichterung und Ruhe. Man muss den Wärterinnen einschärfen, dass sie das Blut in ein leeres, nicht in ein mit Wasser gefülltes Gefäss laufen lassen, weil man sonst den Blutverlust gewöhnlich viel zu hoch anschlägt und sich zu früh weilt, die Blutung, die in den meisten Fällen von selbst wieder steht, zu stillen. Erst wenn mehr als 60—80 CC. Blut verloren gegangen

sind, ist die Tamponade indicirt, wobei es fast immer genügt, ein Stückchen Eis in das blutende Nasenloch zu schieben und dann mit einem Charpiepfropf die Mündung zu verstopfen. Die Tamponade von unten und hinten durch die Mundhöhle mittelst der Belloe'schen Röhre ist wohl niemals nöthig und würde die Kinder jedenfalls sehr belästigen und ängstigen. Um sich zu überzeugen, dass die Blutung wirklich steht, muss man nach der Tamponade die Kinder auf das Gesicht legen oder den Kopf nach vorwärts halten lassen, weil sonst die Blutung fortbesteht und das Blut nach hinten abfließen und verschluckt werden könnte.

Die typhöse Diarrhöe lässt sich durch kein Mittel gänzlich stoppen, nur das Opium vermindert sie etwas, die Adstringentien und Mucilagines sind gewöhnlich ganz ohne Wirkung. Im Allgemeinen aber ist die Diarrhöe bei Kindern überhaupt selten so profus und hartnäckig als bei Erwachsenen.

Verstopfung ist im Verlaufe des Typhus zuweilen ein unangenehmes Symptom, das zu gewissen Zeiten fast epidemisch auftreten kann. Sie darf niemals durch Purgantien, sondern nur durch Clystiere beseitigt werden. Gelingt es den letzteren nicht, eine Oeffnung zu erzielen, so ist Calomel das einzige Mittel, das man intern geben darf, indem Tinct. Rhei aquosa und Ricinusöl den Kindern nur sehr schwer beizubringen sind. Schließlich muss noch allen Ernstes gemahnt werden, unter allen Umständen die Kräfte des Kindes zu schonen und sich niemals zu einem strengeren, antiphlogistischen Verfahren verleiten zu lassen.

b) Cholera asiatica.

Die Geschichte, das epidemische Verhalten, die Verbreitungsweise und die Aetiologie der epidemischen Brechruhr sind in den letzten Jahren so mannigfaltig ventilirt worden, dass wir sie füglich hier übergehen können; zumal für die Cholera asiatica der Kinder in keiner Beziehung abweichende Verhältnisse sich ergeben haben. Die Symptome aber, unter welchen bei kleinen Kindern die asiatische Cholera auftritt, unterscheiden sich vielfach von denen der Erwachsenen, und diese Unterschiede sind es, welche hier eine speciellere Betrachtung finden sollen.

Da die Diarrhöe bei kleinen Kindern überhaupt ausserordentlich häufig ist und durch den Reiz ungesigelter Nahrungsmittel und die Dentition fortwährend neu veranlasst wird, so ist es bei ihnen noch schwerer zu entscheiden als bei Erwachsenen, ob eine Diarrhöe, die während einer herrschenden Choleraepidemie entsteht, dem Choleraagifte oder den oben bezeichneten gewöhnlichen Veranlassungen zugeschrieben werden muss. Thatsache ist, dass während einer Epidemie alle Kinder, auch die Säuglinge, viel mehr zu Diarrhöe geneigt sind und dass dieselbe schwieriger zu stillen ist, als diese zu einer anderen epidemiefreien Zeit beobachtet wird. Die so entstandenen Diarrhöen können entweder als solche fortbestehen und nach einigen Wochen wieder sistiren, ohne dass sich andere Symptome dazu gesellen, oder sie gehen alsbald in wirkliche Cholera über. In vielen Fällen geht aber überhaupt keine Diarrhöe voraus, sondern ganz gesunde Kinder bekommen plötzlich starke Diarrhöe und Erbrechen und zeigen in

wenigen Stunden das Bild der entwickeltesten Cholera, profuse, hellgelbe, selten reinwasserähnliche Aussonderungen, seltener Erbrechen, dann Krämpfe, Collapsus, Schwinden des Pulses, Algor, Cyanos und Aufhören der Urinsecretion.

Man kann auch bei Kindern zwei Stadien unterscheiden: 1) das Stadium des Anfalles und 2) das Stadium der Reaction, bis zu welchem jedoch nur sehr wenig Kinder gelangen, indem sie meist schon während des Anfalles zu Grunde gehen. An die Reactionserscheinungen reihen sich dann noch die secundären Processen und die Erschöpfungszustände an. Im Allgemeinen aber lassen sich drei Haupttreiben von Erscheinungen in der Cholera trennen: 1) die des Darmes, 2) die der Circulation und Respiration und 3) die der Nieren.

1) Die Störungen auf der Darmschleimhaut sind weitaus die wichtigsten, sie treten immer zuerst auf und sind wahrscheinlich die Veranlassungen zu den Veränderungen der Circulation, ganz gewiss aber zu denen der Nieren.

Eigenthümlich ist, dass bei Kindern die Stühle selten so weiss werden wie bei Erwachsenen, sondern fast immer einen Stich ins Gelbliche behalten, im Uebrigen bieten sie weder chemisch noch mikroskopisch bemerkenswerthe Abweichungen dar. Selten sind sie sehr copios, und 5—6 dünne Aussonderungen genügen schon bei einem kleinen Kinde, den gefährlichsten Collaps zu erzeugen. Bei vorher marastischen Kindern tritt derselbe sogar schon mit dem ersten dünneren Stuhl ein, worauf noch einige Convulsionen und nach wenigen Stunden der Tod erfolgt. Werden die Stühle rosenroth, was von einer kleinen Beimischung von Blut herrührt, so ist die Prognose lethale zu stellen.

Länger als 48, höchstens 60 Stunden hält ein Kind unter einem Jahre profusen Choleradurchfall nicht aus, entweder stirbt derselbe oder es tritt der Tod in Folge des enormen Verlustes an Säften ein. Im ersten Falle werden die Ausleerungen seltener, dann gelber gefärbt, weniger dünnflüssig und nehmen einen intensiven, aber nicht gerade fauligen Geruch an.

Mit dem Erbrechen verhält es sich bei Kindern anders als bei Erwachsenen. Während an dem letzteren in $\frac{1}{10}$ der Fälle dasselbe beobachtet wird, bricht die Mehrzahl der Cholerakinder gar nicht oder nur höchstens ein- bis zweimal und das profuse Erbrechen alles Genossenen, kurz nachdem es in den Magen gelangt, kommt fast niemals vor, was um so auffälliger ist, als die Kinder in gesunden Tagen bekanntlich viel häufiger und leichter erbrechen als die Erwachsenen. Der Akt des Erbrechens ist nur von ganz geringer Anstrengung begleitet, am Anfänge kommen die zuletzt genossenen Nahrungsmittel wieder zum Vorschein, alsdann aber wirkliches Magenschleimhauttranssudat, gemischt mit den zuletzt genossenen Getränken, die wegen des quälenden Durstes fortwährend in grosser Menge zugeführt werden. Ueber die chemischen Eigenschaften des Erbrochenen der Cholerakinder ist meines Wissens wenig bekannt, weil es immer gleich in das Bett und die Kleidung geht, und die Chemiker zu einer genaueren Untersuchung sehr grosse Quantitäten des zu bestimmenden Materials verlangen.

Die Resorption der Magen- und Darmschleimhaut ist während des Anfalles sehr beschränkt und man kann desshalb den Kindern grössere

Mengen toxischer Substanzen, z. B. Morphinum, Strychnin, Belladonna etc. reichen, ohne dass Reaction hierauf einträte; zuweilen aber, wenn die Transsudation gerade schon in spontaner Abnahme begriffen war, tritt plötzlich gefährliche Resorption ein, worauf hier nur deshalb aufmerksam gemacht werden soll, weil die besagten Substanzen immer wieder von Neuem zum therapeutischen Versuche, als besonders einleitend, gewählt werden, und der Experimentator, durch die ersten erfolglosen Gählen zu grösseren Dosen verleitet, plötzlich eine Vergiftung veranlasst, zu deren Folgen das sonst gesunde Kind zu Grunde gehen kann.

Der Unterleib fällt nach Beginn der Cholera schnell ein, wird weich schwappend, und lässt die Darmwindungen erkennen. Die Percussion zeigt, dass der Magen ziemlich viel Luft enthält, während das ganze Darmlrohr mit Transsudat angefüllt ist und demnach einen vollkommen leeren Percussionsschall gibt. Wirkliche Colik scheinen die Kinder weniger zu haben als das Gefühl einer fortwährenden Ueblichkeit, das sie durch häufiges Öffnen des Mundes, eigenthümliches Hervorstrecken der spitzen Zunge und einen ängstlichen Blick zu erkennen geben.

Es ist auffallend, dass die profusenstesten Diarrhöen bei Cholera asiatica den Anus nicht röthen, während er bei Enteritis folliculosa z. B. in Folge von Scor nach wenigen Stühlen sich röthet und erodirt wird. —

Die nächste Folge dieser Transsudation ist bei der vollkommensten anstretenden Resorption natürlich eine beträchtliche Verminderung der ganzen Blutmenge und eine Ansaugung des Wassers aus den parenchymatösen Organen und serösen Säcken. Ob sich alle weiteren Symptome aus dieser Blutleere und Vertrocknung allein herleiten lassen, oder ob das Choleragift auch anderwärts als im Darmkanal eine spec. Wirkung zeigt, ist noch immer Gegenstand der Controversen. Bei Kindern ist der Verlauf so wassersedentisch schnell, dass eine directe Wirkung des Choleragiftes auch auf die Herzbewegung und den Puls hier ziemlich wahrscheinlich wird, denn schon mit dem ersten flüssigen Stuhle schwindet zuweilen der Puls und der Diastolen.

2) Die Circulation soll in den ersten Stunden des Choleranfalles zuweilen eine erhöhte Thätigkeit, heftige Herzpalpitationen und kräftiges Klopfen der Arterien zeigen, gewöhnlich aber wird Herzsschlag und Radialpuls vom Beginne des Anfalles an stündlich schwächer und der letztere verschwindet bald ganz, während die Herzöne immer dumpfer und schwächer werden und der Diastolen nur mehr schwach über den grossen Gefässen, an der Herzs Spitze selbst aber gar nicht mehr gehört wird.

Der Puls behält eine normale Frequenz, bei Kindern unter einem Jahre gewöhnlich circa 100 in der Minute, wird aber alsbald fadenförmig und verschwindet dann gänzlich. Die Beobachtung von J. Meyer, an Erwachsenen angestellt, dass bei der spontanen Reaktion der Puls lange ausbleibe, aber nachdem er einmal wiedergekehrt, nicht leicht mehr verschwinde, dass dagegen bei der künstlich durch Reizmittel hervorgerufenen Reaktion es sich umgekehrt verhalte, findet auch ihre vollkommene Geltung in der Cholera der Kinder. Es gelingt sehr häufig, durch hohe Temperatur, ein Senfblad oder Campherpulver den verschwundenen Puls wieder fühlbar zu machen, sehr selten aber ist es möglich, ihn zu conserviren; gewöhnlich verschwindet er bald wieder,

um niemals wiederzukehren. Uebrigens muss bemerkt werden, dass pulslose Kinder, wenn diese Pulslosigkeit einmal einige Stunden gedauert hat, gewöhnlich verloren sind, während es genug Beispiele gibt, dass Erwachsene 12–24 Stunden und noch länger pulslös waren und doch wieder vollkommen genesen. Im Cholera-typus können verschiedene Pulsanomalien, Intermittiren und enorme Beschleunigung vorbedeutende Verlangsamung bis auf 40–50, die erst nur bei hydrocephalischen Kindern eintritt, ist hier kein ungünstiges Symptom, sondern lässt baldige Genesung voraussetzen.

Die Venen sind mit dickflüssigem Blute überfüllt, indem theils die *via a tergo*, theils auch die saugende Kraft des rechten Herzens geschwächt ist, und in Folge dieser venösen Stauung tritt auch eine Stase der Capillaren an den Lippen, den Fingern, den Augenlidern, die sich als Cyanose aussert, ein. Bloss gut genährte Kinder werden in der Cholera cyanotisch, abgemagerte, marastische bringen es an den genannten Stellen nur zu einer graugelben Färbung.

Die Respiration kann bei so gewaltigen und rasch eintretenden Störungen im Kreislauf natürlich nicht intakt bleiben. Physikalisch ist zwar nichts abnormes an den Lungen nachweisbar, in der Funktion des Athmungsaktes bemerkt man aber bald Veränderungen. Die Kinder athmen unregelmässig, seufzen tief und oft und zeigen einen entschiedenem Lufthunger. Am auffallendsten aber ist das Kühlwerden des Athems, das man durch die an den Mund gehaltene Hand, besonders an deren Dorsalfäche, deutlich unterscheiden kann. Prognostisch ist dieses Kühlwerden des Athems von grösster Wichtigkeit und offenbar das deutlichste Zeichen des unterbrochenen Stoffwechsels. Mit demselben steht immer im geraden Verhältnisse das Kühlwerden der Prominenten. Mit warmer Hand eine Betastung der Nase und Stirne, der Hände und Füsse, sowie eine Untersuchung der Temperatur der ausgeathmeten Luft genügt dem geübten Arzte, sich ein Urtheil zu bilden über die Schwere der Erkrankung und ihren wahrscheinlichen Ausgang.

3) Die Veränderungen in den Nieren sind bei den Kindern ebenso constant als bei Erwachsenen. Es finden sich in den Leichen alle Zeichen der Stase und eines acuten Morb. Brightii, nur ist der klinische Nachweis derselben durch eine Untersuchung des Harnes meistens unmöglich, weil die Kinder entweder gar keinen Urin entleeren oder nur wenige Tropfen in die Windeln laufen lassen. Wenn in Ausnahmefällen Kinder von einem schweren Choleraanfalle genesen, so finden sich in ihrem Urine Eiweiss und Cylinder. Wie lange die Urinsecretion unterbrochen bleiben und doch Genesung wieder eintreten kann, ist schwer zu entscheiden, indem die Windeln von den profusen Stühlen beständig durchflüsset sind und man eine Urinermischung nicht wohl erkennen kann.

Durch die Aufhebung der Urinsecretion tritt natürlich eine gewaltige Umwälzung im ganzen Stoffwechsel ein, als deren Hauptmoment die Zurückhaltung des Harnstoffs zu betrachten ist. Höchst wahrscheinlich sind hierauf auch die tonischen und clonischen Krämpfe zurückzuführen, von denen alle Cholera-kinder wenigstens an den Muskeln des Gesichtes befallen werden, während die grosse Schwäche, der rasche Collapse und der Verlust der Stimme mehr dem raschen Serumverluste zuzuschreiben sind.

Überstehen die Kinder ausnahmsweise den Choleraanfall, so ist der erste Urin, der wieder gelassen wird, immer eiweißhaltig und von harnsauren Salzen getrübt, und es entwickelt sich ein Cholera-typhoid, in welchem die Haut heiss und trocken, der Puls hart und ausserordentlich frequent, die Zunge zur Trockenheit geneigt ist und die Symptome der Gehirncongestion zum Vorschein kommen. In vielen Fällen tritt dann noch der Tod unter Convulsionen ein oder entwickelt sich ein Marasmus, von dem nur sehr wenig Kinder sich mehr erholen können.

Fassen wir die Symptome der Cholera der Kinder zusammen, so ergeben sich folgende Verschiedenheiten von denen der Erwachsenen:

1) Die Stühle bleiben länger gelb gefärbt. 2) Der Collapsus ist ausserordentlich rasch, bei schwächlichen atrophischen Kindern tritt der Tod schon nach wenigen serösen Stühlen ein. 3) Das Erbrechen ist selten und fehlt in vielen Fällen gänzlich. 4) Das Mortalitätsverhältniss ist viel ungünstiger, indem von den wirklich kühn gewordenen pulssenden Kindern wenigstens 80 Proc. zu Grunde gehen.

Die pathologische Anatomie, die in der Cholera überhaupt bis jetzt von untergeordneter Bedeutung ist, lässt keine Unterschiede zwischen den Leichen der Kinder und der Erwachsenen entdecken. Man findet bei Kindern, die bald nach dem ersten Anfall gestorben sind, eine eigenthümliche Klebrigkeit der serösen Häute, Trockenheit aller parenchymatösen Organe, Cyanose der Haut, klebrige schwarze Blutklumpen in den Venen und im Herzen, den Dünndarm mit weisslichem Fluidum angefüllt, die Schleimhaut desselben rosenroth, ihres Epithels vollständig beraubt, die Nerven infiltrirt, in den Hartknochchen ausgebreiteten desquamativen Catarrh, die Harnblase leer.

Sind hingegen die Kinder an Cholera-typhoid gestorben, so ist die Cyanose der Haut weniger auffallend, die serösen Häute sind wieder schlipfrig, das Gehirn ist ödematös, in den Lungen kommen häufig lobuläre Infarcte vor, im Dünndarm ist zäher, grüner Schleim enthalten, seine Schleimhaut ist weniger infiltrirt und geröthet, die Salivdrüsen des Dickdarmes geschwollen oder exuberant. Die Harnblase enthält meistens wieder etwas trüben Urin, in welchem sich gewöhnlich noch Eiweiss nachweisen lässt.

Behandlung.

Die Therapie der Cholera der Kinder ist, wie sich schon aus den Mortalitätsverhältnissen ergibt, eine höchst undankbare, obwohl der wesentlichste Theil der Behandlung, die künstliche Hebung der gesunkenen Hauttemperatur, hier leichter zu effectuiren ist als bei Erwachsenen. Ueber die allgemeinen, öffentlichen Massregeln und über die individuelle Prophylaxis kann ich füglich hinweggehen, indem dieselben ausführlich in den neueren Handbüchern, z. B. Griesinger's Infektionskrankheiten beschrieben sind. Die Behandlung der Cholera-diarrhöe und des Choleraanfalles der Kinder unterscheidet sich wenig von der der Erwachsenen. Das Bestreben, den Durchfall zum Stillstand zu bringen, gelingt eben hier auch auf keine Weise, sobald einmal die Stühle ganz wässrig, hellgelb oder gar weisswasserartig geworden sind. Gegen einfache Diarrhöe, z. B. der salzenden Kinder, die während einer herrschenden Epidemie natürlich auch die grösste

Resorption erzeugen muss, ist Opiumtinktur das sicherste Mittel, gegen die wirkliche Cholera habe ich durchaus noch keinen Nutzen von ihr gesehen. Man kann das Opium in 4—5 Mal höherer Dosis geben als gewöhnlich, die Diarrhöe besteht unverändert fort, zuweilen aber, wenn sie vor der Application desselben schon 1—2 Tage gedauert hatte, steht sie plötzlich und es treten dann die heftigsten Opiumerschütterungen auf.

Gleich nutzlos sind die Adstringentia und überhaupt alle Mittel, denen man nur jemals stopfende Wirkung zugeschrieben hat.

Es ist hierbei zu berücksichtigen, dass bei der profusen exosmotischen Strömung, die auf der Schleimhaut des Magens und des ganzen Darmes stattfindet, höchst wahrscheinlich keine Resorption mehr zu Stande kommt. Ich werde deshalb bei der nächsten Epidemie mit andern Stellen wählen, die zur Resorption geeigneter erscheinen, z. B. die Harnblase, die Harnröhre, Vagina, das subcutane Zellgewebe und hier verschiedene Mittel namentlich aus der Klasse der Narcotica versuchen. Die Injektionen in die Venen sind sehr unständlich und dürfen bei Kindern wegen Kleinheit der Venen und der Gefahr des Luft Eintritts kaum gelingen.

Was das diätetische Regime betrifft, so ist besonders hervorzuheben, dass die Entziehung des Getränkes, wodurch man den profusen Diarrhöen Einhalt thun möchte, entschieden nutzlos und grausamer ist, man lasse die Kinder nicht zu viel auf einmal trinken, gebe ihnen aber so oft sie Durst haben. Auf grosse rasch verschluckte Quantitäten Flüssigkeit tritt gewöhnlich alsbald Erbrechen. Am liebsten trinken die Kinder kaltes Wasser, Säuglinge saugen, so lange es ihre Kräfte erlauben, gehörig an den Brüsten und verschlucken, wenn sie auch schwach geworden, die ausgepumpte Muttermilch noch sehr begierig. Von Darreichung anderer Nahrung, ausgenommen laue Schleimsuppe oder lauwarme Milch kann keine Rede sein, warmen Chamillen-, Wollblumen-, Minzenthée etc. verschmähen viele Kinder gänzlich.

Die Harnindication ist offenbar eine künstliche, anhaltende Erwärmung der kalt gewordenen Körperoberfläche, welche am besten dadurch gelingt, dass man die Kinder in ein heisses Bad von 30° R. setzt, worin ausserdem noch 30,0—50,0 Senfmehl suspendirt sind. Man trocknet die dadurch ziemlich geröthete Haut rasch ab, umgibt nun die Kinder in ihrem Bettchen ganz mit heissen Flachsen, Krügen und Steinen und wechselt die Windeln nicht öfter als alle zwei Stunden. Unter Erhaltung einer hohen Temperatur wird der spurlos verschwundene Puls zuweilen wieder fühlbar, die Diarrhöen mindern sich, die Nasenspitze, die Ohren, der Hanch werden wieder warm und es stellt sich eine Reaction ein, die freilich oft genug noch in ein tödtlich endendes Typhoid übergeht.

In Typhoid ist die häufige Darreichung von Getränken das wichtigste, um die gehemmte Passage in die Nieren so schnell als möglich wieder wegsam zu machen. Die Nervina, Campher, Moschus, Kaffee etc., dass das so mannigfach gepriesene Chinin scheint mit keinem günstigen Einfluss auf den Verlauf zu haben. In der Convalescent ist die grösste Vorsicht so lange nothwendig, als noch irgend Veränderungen an den Stühlen vorkommen. Brustkinder müssen wenigstens noch 6—8 Wochen nach einem Choleraanfalle die Amme behalten,

und dürfen uns ganz langsam abgewöhnt werden: bei künstlich aufgefütterten Kindern muss man noch lange Zeit Schleimsuppen reichen und kann sie erst nach und nach wieder zu Mädlkost gewöhnen.

So gross und beruhigend die Wirksamkeit des Arztes durch sein bestimmtes Auftreten sein kann, so profanistisch ist der Nutzen, den er durch sein therapeutisches Verfahren einem cholerakranken Kinde zu verschaffen mag.

16) Die Entozoen. Euthelminthen, Helminthiasis, Wurmkrankheit.

Bevor wir auf die Wirkung der einzelnen Helminthen uns einzulassen, erscheint es nothwendig, zuerst eine einfache zoologische Betrachtung derselben zu geben, wobei wir zum Theil Bamberger's vortrefflichen Aufsatz über die Entozoen in seinem Lehrbuch der Unterleibskrankheiten zu Grunde legen. Im Darmkanal der Kinder finden sich 1) die *Taenia solium*, 2) die *Taenia mediocanellata*, 3) der *Bothriocephalus latus*, 4) die *Ascaris lumbricoides*, 5) die *Oxyuris vermicularis* und 6) vielleicht auch der *Trichocephalus dispar*. Die in neuester Zeit so grossen Schrecken bereitenden Trichinen kommen bei grösseren Kindern natürlich eben so gut als bei Erwachsenen vor. Kleine Kinder kennen meines Wissens bisher von *Trichina spiralis* verschont aus dem einfachen Grunde, weil sie eben von dem die Trichinen bereitenden Schweinefleisch, als einem für Kinder nicht geeigneten Nahrungsmittel, nichts bekamen. Da die Trichinose der Kinder sich in keiner Weise von der der Erwachsenen unterscheidet, so kann deren Schilderung um so mehr unterlassen werden, als die vortrefflichen zahlreichen Monographien über diesen Gegenstand die ausgedehnteste Verbreitung gefunden haben.

1) *Taenia solium*, 2) *Taenia mediocanellata* und 3) *Bothriocephalus latus* (Cestoden).

1) Die *Taenia solium* (*T. encyrtus*, *armata*, Kettenwurm) Tab. IV, Fig. 4, 5, 6 und 7 ist ein weissgelber, bandartiger, gegliederter Wurm, 15–30 Schuh lang, und 3–5 Linien breit. Sie hat, wie alle Taeniaarten, die männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane in jedem ihrer entwickelten Glieder vereint und pflanzt sich durch Eier, die aber niemals im Darmkanal selbst zur Entwicklung kommen, fort. Der Kopf erscheint dem unbewaffneten Auge als ein weisses Pünktchen, an dem sich mit der Lupe vier, zweifeln schwärzlich pigmentirte Saugnapfe erkennen lassen. Zwischen denselben findet sich ein conischer, von einem doppelten Hakenkranz umgebener Büschel, die einzelnen Haken sind aber so klein, dass man zu ihrer deutlichen Ansicht einer 200maligen Vergrösserung bedarf. Der Hals ist mehrere Zoll lang, ungegliedert, einem plattgedrückten Fischen ähnlich und geht allmählig in den Körper über, der dann deutliche Gliederung zeigt. Die jungen Glieder sind breiter als lang, werden weiter nach hinten ganz und am Schlusse langlich viereckig mit stumpfen Ecken. An den letzteren sieht man die Genitalien deutlich, indem sich am Rande eine Hervorragung mit den Mündungen für die Scheide und den Penis findet und im Inneren die Fruchtkübel durchschimmern. Diese Her-

vorrangig sitzt meist abwechselnd am rechten und linken Rande der Glieder.

Am Kopf findet eine beständige Neubildung von jungen, am Ende eine Abstoßung von reifen Gliedern statt, die von Laien oft mit Körnchen verglichen werden, und deshalb zur Bezeichnung *T. cucurbitina* Veranlassung gegeben haben.

2) Die *Taenia mediocanellata* ist der *Solium* sehr ähnlich und wurde erst von Küchenmeister als eine besondere Species von letzterem getrennt. Sie übertrifft nach Leuckart die *T. Solium* nicht bloss an Länge, sondern noch constant auch an Breite und Dicke. Besonders auffallend erscheint die Breite der unreifen Glieder. Der anscheinliche Kopf ist ohne Hakenkranz und Rostellum und mit vier grossen, äusserst kräftigen Saugnapfen, die gewöhnlich von einem schwarzen Pigmentstain umfasst werden, versehen. Der Uterus der reifen Glieder charakterisirt sich durch die bedeutende Menge seiner Seitenzweige, welche dicht nebeneinander hinlaufen und statt dendritischer Verbindungen höchstens dichotomische Spaltungen erkennen lassen. Im Uebrigen verhält sie sich genau wie *T. Solium*.

Leuckart fütterte ein Kalb mit einer vier Fuss langen Gliederstrecke der *T. mediocanellata* und fand nach drei Wochen sämtliche Muskeln, das Herz, die Nierentapeltn, das Gehirn etc. mit unzähligen, kleinen Cysten durchsetzt, die sich sämtlich als junge *Cysticercus* zu erkennen gaben. Es kann demnach mit Bestimmtheit das Rind als die Wohnstätte dieser Finne bezeichnet werden.

3) Der *Bothriocephalus latus* Tafel IV, Fig. 1, 2, 3 (*Taenia lata* der breite Bandwurm, Grabenkopf), ist den vorigen sehr ähnlich; unterscheidet sich aber folgendermassen davon: Er hat eine mehr graue Farbe, der Kopf ist länglich, zeigt nur zwei längliche Vertiefungen ohne Büchel und ohne Hakenkranz. Der Hals ist viel kürzer, die Glieder sind alle breiter als lang, liegen dachziegelförmig übereinander und, das charakteristischste, an jedem Gliede zu bemerkende Kennzeichen, die Geschlechtsöffnungen sind nicht am Rande, sondern in der Mitte der Glieder.

Die Eier haben eine bräunliche Färbung und schwimmen als braungelbe Kometen in der Mitte eines jeden Gliedes durch. Der *Bothriocephalus* hat ausserdem noch die Eigenthümlichkeit, dass er nicht leicht einzelne reife Glieder, sondern immer ganze Gliederreihen abstösst, was die Diagnose, die nur auf Ernährung der Kranken gestellt werden soll, wesentlich erleichtert.

Diese drei Wurmarten zeigen ein wechselndes, gegenseitiges Ausschiessen. Der *Bothriocephalus* findet sich nur in Russland, Polen und Ostpreussen bis zur Weichsel, während die *Taenia solium* und *mediocanellata* in sämtlichen andern Ländern Europa's vorkommt, nur in der Schweiz sollen nach Mayer-Alrens alle drei beobachtet werden.

Diese Wurmarten kommen bei Kindern vor. Ausserordentlich selten bei Kindern unter einem Jahre, bei Säuglingen wahrscheinlich niemals. Nach Küchenmeister's Forschungen entsteht die *Taenia solium* aus dem *Cysticercus cellulosus* des Schweines, und könnte demnach nur bei Kindern vorkommen, die schon Schweinefleisch gegessen haben.

4) *Ascaris lumbricoides* (Classe der Nematoden) Spulwurm-

Der Spulwurm Taf. IV, Fig. 8 und 9 ist ein runder, dem Regenwurm ähnlicher, gefärblicher oder röthlicher Wurm von 5–10 Zoll Länge und 1–3 Linien Durchmesser. Er wird nach vorne und hinten schmaler, hat einen Mund und einen Darmkanal mit After, der Kopf ist vom Körper abgeschnürt und aus drei Papillen zusammengesetzt, die im Momente des Saugens sich in einen breiten Saugnapf ausbreiten können. Männchen und Weibchen sind leicht zu unterscheiden. Das Männchen ist kleiner als das Weibchen und hat ein gekrümmtes Schwanzende, zuweilen stehen kurz vor dem Schwanz ein Paar weisse, zarte Härchen hervor, die hervorstehenden Penes. Drückt man nach Küchenmeister die Weibchen auf den Leib, so entsteht ein Prolapsus dünner Schläuche (Ovarien) und ein Auslauf eines milchigten Gemenges (Eier) in der vorderen Hälfte des Thieres aus der Scheideöffnung. Drückt man ein Männchen, so floss ein Milchsaft (der Samen) in der Nähe des After hervor, ohne dass eine Ruptur oder ein Prolapsus einträte. Die äussere Haut besteht nach Oerter aus sechs Schichten und ist aus lederartigen Querringen gebildet, die nicht in sich zurücklaufen, sondern sich manchmal diebionisch spalten und meist an den Seitenlinien des Thieres plötzlich unterbrochen werden. Wenn man frisch entleerte Spulwürmer mehrmals mit Wasser schüttelt und sie nach gründlicher Abgütung auf einen reinen Teller bringt, so bemerkt man an denselben doch noch einen eigenthümlichen, Fettsäuren ähnlichen Geruch, der sich deutlich von dem Geruche der sie bergenden Filces unterscheiden lässt.

Die Spulwürmer bewohnen mit Vorliebe den Dünnarm, sind selten vereinzelt, sondern kommen meistens von 5–10, zuweilen aber auch zu 200–300 vor, und finden sich viel häufiger im Darmkanal der Kinder als in dem der Erwachsenen.

Bei Säuglingen kommen sie nicht vor, wohl aber, wenn auch nur selten, bei ganz kleinen Kindern, die mit Mehl oder Semmelbrei künstlich aufgefüttert werden. Ihre Eier gelangen ohne Zweifel mit den Nahrungsmitteln in den Darmkanal, wenigstens bleibt nicht anderes anzunehmen übrig, da nach v. Siebold die Ascaridenweibchen niemals lebendige Junge gebären und ihre Brut auch niemals im menschlichen Darm anzufinden ist. Sie scheinen sich vorzugsweise von Amylaceen zu nähren, womit jedoch nicht behauptet werden soll, dass alle Kinder, die gerne Brod essen, Ascariden beherbergen. In diesem Falle gäbe es wohl kein gesundes Kind, das nicht an solchen lide.

5) *Oxyuris vermicularis*. (*Ascaris vermicularis*, Springwurm, Friesenenschwanz, Darmesche, Madenwurm.) (Classe der Nematoden.) Tafel IV, Fig. 10, 11, 12 und 13.

Der Name *Oxyuris*, Spitzschwanz (von *ὄξυς* und *οὐρά*), passt nur auf das Weibchen, nicht auf das Männchen. Das Weibchen ist ein 2–5 Linien langer, dünner, weissgelber Wurm mit geradem, fadenförmig zugespitztem Schwanz. Das Männchen ist kaum eine Linie lang und hat ein stark gekrümmtes Schwanzende. Beide haben einen kolligen Kopf mit zwei seitlichen blasenartigen Membranen. Die Weibchen finden sich unendlich viel zahlreicher als die Männchen, die in den Stühlen selbst nie gefunden werden, indem sie fester an der Darmschleimhaut haften, von welcher sie nach Zenker in der Leiche leicht mit dem Darmschleim abgelöst werden können. Es

gelingt die Sammlung der Männchen besonders dann gut, wenn der Dickdarmkoth durch Natrium weggespült worden ist.

Der gewöhnliche Aufenthalt der *Oxyuris* ist der Mastdarm, im Dickdarm kommt sie schon in viel geringerer Menge und im Dünndarm so gut wie gar nicht vor. Sie verlässt auch den Mastdarm, besonders wenn die Kinder in warmen Betten liegen, und wandert bei Mädchen in die Vagina. Küchenmeister sagt, es sei ein „Aberglaube“, sie nur und hauptsächlich dem Kindesalter zuzuschreiben und führt als Beleg an, dass er sie zweimal bei Erwachsenen gefunden habe. Jeder erfahrene Praktiker aber, der in einer Gegend wohnt, wo der *Oxyuris* überhaupt häufig vorkommt, wird seinen zwei Fällen von Erwachsenen Hunderte von Kindern entgegenzusetzen können, so dass ich keinen Grund einsehe, von diesem „Aberglauben“ abzustehen.

6) *Trichocephalus dispar*. (Nematoden.) Peitschenwurm. Taf. IV, Fig. 14 und 15.

Der *Trichocephalus*, ein weisser, 1—2 Zell langer Wurm, ist am Kopfe so dünn wie ein Haar und geht nach hinten in ein dickeres Ende über, so dass er im ganzen eine Aehnlichkeit mit einer Peitsche bietet. An der Spitze des dünnen Theiles findet sich ein unbewaffneter Mund, in den der Oesophagus mündet. Der Hintertheil ist bei den Weibchen gerade und zeigt eine einfache Scheide, bei den Männchen aber spiralig gewunden, am Ende mit einem kleinen Präpetium und einem nicht unbeträchtlichen Penis versehen.

Es hält sich dieser Wurm fast ausschliesslich im Blinddarm und dem Colon ascendens auf und findet sich fast nie in den Faeces, weil er den Darm, wie es scheint, nur ungern verlässt. Ich fand einmal in der Leiche eines 15jährigen Mädchens, das am vierten Tage der Cholera verstorben war und die profusensten Aenderungen gelitten hatte, eine ganz beträchtliche Menge dieser Thiere, wenigstens 30—40 Exemplare, im Caecum, so dass alle der Section beivohnenden Aerzte ihre Verwunderung ausserten, wie sich die Thiere bei so flüssigem und reichlich ausgeschiedenem Darminhalt vier Tage hindurch halten konnten. Er kommt bei Kindern ausserordentlich selten vor und wird eigentlich mehr der Vollständigkeit halber abgehandelt. —

Symptome.

Ueber die Symptome, die durch Entozoen verursacht werden, hat man schon viel geschrieben und getritten. Unsere Vorfahren legten den Eingeweidewürmern gewiss eine zu grosse Bedeutung bei und glaubten von vielen schweren Krankheiten, während welcher zufälliger Weise solche abgingen, dass sie hiernach hervorgehoben und durch den Abgang der Würmer auch glücklich wieder beseitigt werden seien. Die so entstandenen Symptome wurden immer mannigfacher und die Verwirrung immer grösser, bis endlich die Sache klar schenken Aerzten zu bunt wurde und man anfing, alle Wurmsymptome zu leugnen, was noch heut zu Tage von mehreren, besonders Wiener Aerzten fortgesetzt wird. Wie alles Neue, so fand auch diese Negirung vielfache Anhänger, und es gehörte einige Zeit zum guten Ton, von den Helminthen gar nichts zu wissen. Einzelne Symptome aber liessen sich nicht ablegen, und ich will, um sicher zu gehen, nur die anführen, die ich selbst zu wiederholten Malen beobachtet habe.

Sie lassen sich in örtliche und allgemeine, reflectirte, scheiden, von dem eingebildeten Symptomen, welche bei Erwachsenen, besonders Baudeurkrankten so häufig auftreten, können wir in der Pädiatrik glücklicher Weise ganz absehen.

A. Oertliche Symptome.

Unter den Symptomen, welche durch directe Reizung der Entozoen erklärt werden müssen, ist vor allen der Schmerz zu nennen. Derselbe wird sehr häufig beobachtet, ist bald knispend, stechend, sagend, bohrend etc. und intermittirt ohne Ausnahme. Verschiedene Nahrungsmittel, besonders die stark gesalzenen, aromatischen oder sauren, daher auch alle Oelarten, vermehren denselben, während Milch, ölige und fette Nahrungsmittel ihn meistens mindern. Der Appetit ist bei Wurmkranke gewöhnlich normal, zuweilen aber vermindert, von einer Verminderung desselben durch Würmer lässt sich bei Kindern nur schwer sprechen, weil bekanntlich zu verschiedenen Zeiten bei einem jeden Kinde abnorme Zunahme des Appetits vorkommt. Gerechtlich ist der Grund des vermehrten Appetits in rascherer Entwicklung und stärkerer Bewegung oder körperlicher Anstrengung, nicht aber in der Gegenwart von Würmern zu suchen. Erbrechen kann sich einstellen entweder in Folge des Eindringens eines Wurmes in den Magen oder als Reflexerscheinung von der gereizten Darmschleimhaut ausgehend. *Ascaris lumbricoidea* kommt häufig in den Magen, scheint dort durch seine Bewegungen Brechreiz zu veranlassen und wird dann auch zum grossen Schrecken der Angehörigen zuweilen erbrechen. Das kleinste Kind, das ich einen Spulwurm von drei Zoll Länge erbrechen sah, war $\frac{1}{4}$ Jahre alt und genoss erst seit $\frac{1}{4}$ Jahre neben der Mutterbrust etwas Milchlei. Die Stühle sind hierbei meist unregelmässig, bald ist Verstopfung, bald Diarrhöe vorhanden, mit letzterer geht in der Regel eine grosse Anzahl der Entozoen ab. Die grossen Schleimmassen (s. g. Wurmwormer), welche bei Baudeurkrankten zuweilen abgehen, werden bei Kindern selten beobachtet.

Die Oxyuren gehen aus dem Mastdarm, in welchem sie ein fortwährendes Zucken veranlassen, bei Mädchen in die Vagina, röthen deren Schleimhaut und bedingen Leukorrhöe. Der schaltende, hiedurch erzeugte Kitzel giebt häufige den ersten Anstoss zu Onanie, von der die Kinder selten mehr abzulassen sind, wenn auch die Oxyuren längst verschwunden sind. Bei Knaben kriechen sie zuweilen unter das Präputium, worauf Balanitis, Erectionen und ebenfalls Neigung zur Onanie sich entwickeln kann.

Die Spulwürmer dehnen ihre Wanderung noch weiter aus, als die Oxyuren. Sie gelangen zuweilen ohne Erbrechen in den Oesophagus, die Mund- und Nasenhöhle und sollen sogar schon in den Larynx gekommen sein und Erstickungsanfälle bewirkt haben. Man hat auch bei Sectionen schon Leberabscesse gefunden, die einen und selbst mehrere Spulwürmer heherbergten. Derselben sind jedenfalls durch den *ductus cholecysticus* in die Gallengänge gelangt und verursacht dann Entzündung, Leberabscesse und den Tod; auch im *ductus pancreaticus* und im Wurmfortsatz hat man sie schon beobachtet, wo sie Reaction und Eiterung erzeugten. Die ausserordentlich seltenen Fälle, in denen encystirte Ascariden im Peritonäalack gefunden wurden

(die sog. Wurmalwresse), hat man in neuerer Zeit ganz bezweifelt wollen, weil sich an keinem Körpertheile der Würmer Organe finden, die zur Durchbohrung des Darmes fähig erscheinen. Ich selbst habe keinen derartigen Fall gesehen und kann deshalb nicht entscheiden, v. Siebold aber, einer der ersten Helminthologen, und bekannt durch seine gewissenhaften Beobachtungen, behauptet, dass die Ascariden mit ihrem härteren Kopfe die Schichten des Darmes auseinanderdrücken und in die Bauchhöhle gelangen können, ohne dass nachträglich Spuren ihres Durchtritts am Darne zu bemerken wären. Leuckart hält die Lappenränder der Spulwürmer für scharf genug, dass sie, wenn sie auch nicht geradezu als Bohrerapparate bezeichnet werden können, doch immerhin reizend und corrodirend auf die Darmschleimhaut einwirken im Stande sind.

B. Allgemeine und Reflexerscheinungen.

Ein sehr gewöhnliches Symptom ist das Jucken an der Nase, doch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass fast alle Kinder gern mit den Fingern in den Nasenlöchern bohren, und dass dieses Symptom somit keinen besonders hohen Werth hat. Erweiterung der Pupillen sah ich öfter auf Abgang von Ascariden verschwinden und halte sie zwar für kein constantes, jedoch faktisch bestehendes Symptom. Krämpfe verschiedener Art, besonders die Chorea und Epilepsie, wurden mit Entozoen in Zusammenhang gebracht. Da diese Anschauung auch unter den Laien bekannt ist, so wurde ich schon in mehreren Fällen gebeten, die Würmer abzutreiben, in keinem aber sah ich trotz der energichsten Mittel einen Abgang von Würmern, noch überhaupt eine Veränderung der Krämpfe eintreten. Es scheint demnach das Vorkommen von Würmern bei Chorea-kranken und Epileptischen ein zufälliges zu sein.

Dass Würmer schwere, hydrocephalusähnliche Symptome bedingen könnten, bezweifelte ich so lang, bis ich mich persönlich davon überzeugte. Es wurde vor mehreren Jahren ein Kind, das erst vor ein paar Tagen von Krämpfen befallen worden sein sollte, sterbend in das kaiserliche Kinderspital gebracht. Es bot alle Zeichen eines in Agone begriffenen Hydrocephalus acutus und starb nach wenigen Stunden.

Zu unserem grossen Erstaunen fanden wir bei der Section das Gehirn und seine Hülle vollkommen normal, ebenso Herz und Lungen, desgleichen Leber, Milz und Nieren, im Darmkanal aber über hundert Spulwürmer, welche in grosseren und kleineren Kütteln zusammengeballt, an einzelnen Stellen das Darmlumen vollständig ausfüllten und die Schleimhaut dasselbst intensiv geröthet hatten; Leuckart erzählt diesen analogen Falle. Huber beobachtete, nachdem er sich eine Stunde lang mit Untersuchung von Spulwürmern beschäftigt hatte, an sich selbst Jucken der Hände, partiellen Ausbruch einer Urticaria und Conjunctivitis und leitete diese Symptome von dem eigenthümlich scharfen Geruch, den diese Thiere verbreiten, her. Es kann demnach auch ein Theil der Wurm Symptome als die Folge einer chemischen, nicht bloss mechanischen Reizung angesehen werden.

Diagnose.

Aus diesen örtlichen und allgemeinen Symptomen lässt sich allerdings eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose stellen, Gewissheit aber gibt nur das Abgehen von ganzen Heilmitteln oder wenigstens einzelnen Stücken (Bandwürmer) oder endlich das Auffinden der verschiedenen Würmer in den Stühlen mittelst des Mikroskopes. Die genauere Anleitung zu dieser höchst zweckmässigen Untersuchung findet sich bei Frey, das Mikroskop. Da die gewöhnlichen Abtreibungsmittel bei sonst gesunden, nicht an Darmkatarrh leidenden Kindern durchaus keine üblen Folgen haben, so genügen schon die oben angeführten Symptome zum Versuche, die Würmer aus dem Darne zu entfernen.

Behandlung.

1) Der Bandwurm darf nur abgetrieben werden bei Kindern, die über ein Jahr alt sind, sich vollkommen wohl befinden und keine grosse Neigung zu Diarrhöen haben. Ganz kleine oder zahrende Kinder vertragen selbst die mildesten Bandwurmmittel schlecht. Das einfachste und sicherste Mittel ist die *Cortex rad. Panic. gramin.*, nur muss dafür Sorge getragen werden, dass sie frisch ist und lange macerirt wird. Für Kinder von 2—5 Jahren kann man sich folgender Formel bedienen: Rp. Cort. rad. Panic. Gramin. rec. 30,0 Macera u. Aq. Santal. 300,0 per horas 24 dein coq. per hor. 12 ad remanent. 180,0. Man lässt dieses Decoct. Morgens nüchtern in drei Portionen getheilt in $\frac{1}{2}$ stündigen Intervallen reichen, nachdem man Tags vorher durch gekochte, getrocknete Zwetschgen 1—3 bedigte Stühle erzielt hat. Es ist rathlich das doppelte Quantum des Gratzatrindecocotes bereiten zu lassen, weil zuweilen die eine oder andere Portion erbrechen wird, worauf nach einer halben Stunde das Mittel wieder resorbt werden muss. Nach 1—2 Stunden geht gewöhnlich der Wurm ab. Erfolgt der Abgang nicht oder findet sich kein Kopf des Bandwurms, so kann man unbeschadet der Gesundheit dieselbe Procedur in einigen Tagen repetiren. Anhaltende Diarrhöe oder länger dauernde Lebeschmerzen entstehen gewöhnlich nicht auf dieses Mittel und können durch Emulsionen bald beseitigt werden.

Wo frische Gratzatrinrinde nicht zu haben ist oder wenn die Kinder nicht dazu gebracht werden können, sie zu nehmen, so können die übrigen Bandwurmmittel, vor allem das Extr. flic. mar. aether. 0,00 oder die Blüthen der *Brayera anthelmintica*, von denen man 30,0 mit Honig zu einer Latwerge machen lässt, in Anwendung kommen. Starke Drastica, wie das Gummi gatti, die Calocintiden und das Crotonöl, sind in allen Fällen zu meiden. Bei schwächlichen, kränklichen Kindern sind diese Kuren niemals indicirt, und es sind mir selbst Beispiele bekannt, dass sich dieselben trotz ihres Bandwurmes nach und nach erholten, der Bandwurm also die Entwicklung nicht aufzuhalten hat.

2) Die *Ascaris lumbricoides* machen nur selten eigentliche Beschwerden und gehen häufig in grosser Menge bei ganz gesunden Kindern ab, bei denen weder subjective noch objective Symptome vorausgegangen sind. Die gewöhnliche Methode der Abtreibung besteht darin, dass man Pulv. Semin. Cacao 4,0 und Pulv. rad. Jalap. 2,0 auf 4—5 Portionen vertheilt, in zwei Stunden nehmen lässt. In der Regel sind den Kindern mit Wasser vermischte Pulver leichter als Latwergen

beizubringen. In neuerer Zeit hat man sich daran gewöhnt, in den Alcabuben, die aus einem Mittel dargestellt werden können, die Quin-essenz der Wirkung desselben zu suchen und gäbe deshalb statt 4,0 Cinnamon einige Centigramm Santonin. Der Erfolg des Santonin ist aber durchaus nicht so brilliant, als er von mancher Seite geschildert wird, im Gegentheil sehr problematisch und steht weit hinter dem des gewöhnlichen Cimpulvers zurück, das durch die jetzt so verbreiteten Santoninzeltchen gewiss nicht verdrängt werden wird. Wenn auch die Furcht vor dem Calomel, in welcher manche Therapeuten befangen sind, durchaus keine begründete ist, so ist dessen Anwendung gegen Würmer doch eine sehr überflüssige, zumal die Kinder die Orlaten, in die man die Pulver hält, im Munde zu zerdrücken pflegen und dann gewöhnlich eine Stomatitis davontragen. In allen pädiatrischen Lechbüchern spielt das Ol Ricin eine vielfache Rolle, und einzelne Autoren versäumen fast keine Gelegenheit, die Kinder mit ein Paar Kaffeelöffel Ricinöl zu beglücken. Ich habe mich schon oft bemüht, dasselbe zu geben, habe es aber nur den wenigsten Kindern beigebracht, die meisten spuckten es sofort wieder heraus, so dass ich von dessen Anwendung jetzt vollkommen abgestanden bin.

3) Gegen die *Oxyuris vermicularis* müssen interne Mittel sehr wenig, hingegen kann man ihnen, da sie sich fast nur im Mastdarm aufhalten, leicht mit Clystieren beikommen. Man hat diesen Clystieren schon verschiedene warntreibende Medicamente, als Abkochung von Knoblauch, Zwiebeln, *Ama foetida*, *Valeriana*, *Tanacetum* oder einige Tropfen Terpentinöl, Campher, Salzwasser, selbst eine schwache Sublimation beigemischt. Die Hauptsache bleibt aber immer, dass der Mastdarminhalt wenigstens einmal täglich verflüssigt und entleert wird, wenn das kalte Wasser dieselben Dienste zu leisten scheint. Täglich zwei Kaltwasserklystiere, vier Wochen lang fortgesetzt, besorgen mit Bestimmtheit alle *Oxyuris*. Ist gleichzeitig Leucorrhoe der Vagina vorhanden, so sind auch hingegen die Injectionen mit kaltem Wasser von grösstem Nutzen. In den grossen heftigen Ausleerungen, die auf die ersten Kaltwasserklystiere erfolgen, findet sich zuweilen eine solche Unmasse von *Oxyuris*, dass durch das Gewimmel der unzähligen Thiere der Kotbrei in fortwährender Bewegung ist.

4) Der *Trichocephalus dispar* macht niemals Symptome und wird auch fast niemals in den Ausleerungen entdeckt, sondern immer nur zufällig bei Sectionen gefunden, weshalb von einer Abtreibung desselben auch unmöglich die Rede sein kann.

E. Leber.

Die Leber ist bei einem Neugeborenen verhältnissmässig viel grösser als bei einem einjährigen Kinde. Die Angaben von Portal und Meckel aber, nach denen die Leber bei Neugeborenen um $\frac{1}{4}$ schwerer sein soll als bei 8–10 monatlichen Kindern, kann Frerichs nicht bestätigen. Derselbe Autor fand, dass das Gewicht der Leber sich verhält zu dem des ganzen Körpers, wie 1 : 17 bei einem 7 monatl. Fetus,

wie 1 : 28 bei einem Neugeborenen,

wie 1 : 24 „ „ „

wie 1 : 20 „ „ „

wie 1 : 33 bei einem $1\frac{1}{2}$ jährigen Kinde.

Die Leber eines Neugeborenen wiegt durchschnittlich 100 gramm, die eines 1½-jährigen Kindes aber 250 gramm, so dass von einer wirklichen Gewichtszunahme dieses Organes nicht die Rede sein kann.

Die physikalische Untersuchung der Leber wird bei Kindern ganz nach denselben Principien angestellt, wie bei Erwachsenen. Man percutirt zuerst in der Axillarlinie (eine senkrechte von der Achselhöhle nach abwärts), dann in der Mammillarlilie (eine senkrechte von der Brustwarze nach abwärts) und endlich in der Sternallinie (eine senkrechte vom Sternum ausgehend). Durch die ersten beiden Linien wird der Durchmesser des rechten, durch die letzte der des linken Leberlappens bestimmt.

Durch die Unruhe der kleinen Kinder wird diese Percussion sehr erschwert und namentlich muss man darauf verzichten den so wichtigen Einfluss der Athembewegung auf die Stellung der Leber erforschen zu wollen. Ältere Kinder vom vierten Lebensjahre an kann man durch freundliches Zureden gewöhnlich dazu bringen, dass sie sich so gut untersuchen lassen, wie die Erwachsenen.

Die Leberkrankheiten sind bei kleinen Kindern ausserordentlich selten. Nachdem wir den Icterus neonatorum schon im Kapitel von den Krankheiten, die unmittelbar nach der Geburt entstehen, betrachtet haben, restiren uns nur mehr die syphilitische Leber, die Fettleber und die angeborenen Anomalien. Die anderen Leberkrankheiten, die Cirrhose, der Leberkrebs und die Echinococcus kommen bei Kindern fast niemals vor und unterscheiden sich, was ihre Symptome und den Verlauf betrifft, dann in nichts von denen der Erwachsenen. Die acute Leberatropie wurde meines Wissens noch niemals bei Kindern beobachtet. —

1) Die syphilitische Leberentzündung.

Der Zusammenhang zwischen einer eigenthümlichen Veränderung der Leber und der sec. Syphilis wurde von Bayle und Ricord angegeben, von Dittreich aber durch eine Reihe genauer Untersuchungen zur Evidenz erwiesen. Im Allgemeinen ist die Erkrankung jedoch eine seltene. Ich habe schon viele Kinder mit hereditärer Syphilis (vielleicht 10—15) secirt und immer genau die Leber untersucht, habe aber erst einmal diese Veränderung gefunden.

Pathologische Anatomie.

Bei der Section von Kindern mit angeborener Syphilis die bekanntlich fast alle zu Grunde gehen, findet man zuweilen in der Leber eine besondere Art von Entzündung, welche die Deutschesubstanz selbst ergreift. Das Exsudat dieses entzündlichen Processes ist theils plastisch und verwandelt sich in späterer Zeit in eine schwielige Narbe, wozu es aber bei Kindern wegen des zu bald erfolgenden Todes nur sehr selten kommt, theils serös und demnach resorbirbar, theils endlich weder plastisch noch resorbirbar, und besteht in letzterem Falle aus einer grauen oder gelblichen Masse, die mikroskopisch Elementarkörnchen, Fetttropfchen und nur wenige Leberzellen erkennen lässt. Diese grau-gelbe Masse ist, wenn der Process lange genug gedauert hat, im Umfang eines Hanfkornes oder einer Erbse von dem plastischen, später

schwierig gewordenen Theile eingeschlossen. Wenn diese Veränderungen an vielen Stellen der Leber vorkommen, so erhält dieselbe dadurch eine höckerige, unebene Form, und ihr Bauchfellüberzug wird schwierig verdickt, wenn die Veränderung an ihrer Oberfläche vor sich geht. Die freien Stellen der Leber sind bei Kindern in der Regel normal, bei Erwachsenen können nebenbei Cirrhose, Krebs, Malignom, Fettleber vorkommen.

Bei kleinen Kindern kommt es kaum jemals zu grösseren Formveränderungen der Leber, man findet gewöhnlich nichts als einige Stellen, welche sich beim Durchschnitte härter zeigen, eine blassere Farbe haben und aus den obengenannten mikroskopischen Elementen, Körnchen, Fetttröpfchen und nur wenig Leberzellen, bestehen.

Symptome und Therapie.

Die speziell auf die Leber bezüglichen Symptome sind sehr geringfügig und kaum zu erkennen. Die gewöhnlich 2—3 Monate alten Kinder haben die Zeichen hereditärer Syphilis an sich, bestehend in condylomatösen Wucherungen am Anus und den Mundwinkeln, in Geschwüren um den Mund herum, in Oozena und einem syphilitischen Exanthem. Die Ernährung ist eine sehr unvollkommene und die Fettpolster sind gänzlich geschwunden. Die Oberfläche der Leber findet man möglicher Weise höckerig, von ungleicher Härte, den scharfen Lebertrand an einzelnen Stellen etwas stumpf.

Die kleineren Veränderungen der Leber sind natürlich gar nicht diagnosticirbar. Als Complication ist eine faserstoffige Degeneration der Nieren zu erwähnen, wodurch einige Tage vor dem Tode Anämie sich einstellt. Das merkwürdigste bei dieser Leberkrankheit ist, dass niemals Icterus eintritt, sondern bloss bei heranahendem Ende eine graue, erdfarbene Hautfarbe.

Eine spezielle Behandlung dieses Zustandes ist nicht anzugeben. Die Kinder, die nicht an der Brust ihrer eigenen Mutter trinken können und also künstlich aufgefüttert werden müssen — weil sie ja gesunde Ammen anstecken würden — gehen fast ohne Ausnahme zu Grunde, gleichviel ob ihre Leber mit erkrankt ist oder nicht. Die Schmierkur bietet, wo der Zustand der Haut es erlaubt, noch die meiste Garantie für Genußung. Das Nähere hierüber findet sich bei der Therapie der Syphilis.

2) Die Fettleber. *Hepar adiposum.*

Wir verstehen unter Fettleber einen grösseren Fettgehalt der Leberzellen und zwar in so ausgebreitetem Maasse, dass deutliche Farbenveränderungen des Parenchyms vorkommen. Es ist an dieser Farbenveränderung festzuhalten, weil im entgegengesetzten Falle das Auffinden einiger fetthaltiger Leberzellen schon zu dieser Diagnose genügt, und man dann bei einer jeden Sektion eine Fettleber finden würde. Die Fettleber ist im kindlichen Organismus eine ziemlich constante Begleiterin der Consumptionskrankheiten, namentlich der Lungentuberculose und der länger bestehenden Darmstarrheit.

Ihre Entstehung bei Tuberculose hat man schon mehrfach zu erklären versucht, und die meisten Autoren neigen sich der Ansicht zu,

dass sie in diesem Falle bedingt werde durch die mangelhafte Respiration, in deren Folge die Oxydation der Kohlenhydrate und Fette nicht gehörig von Statten gehen könne. Frerichs hebt aber mit Recht hervor, dass mehrere beträchtliche Respirationstörungen, z. B. Lungenemphysem, keine Fettleber hervorrufen und dass andererseits die Fettleber auch bei anderen tuberculösen Processen, z. B. Knochentuberculose, wobei die Lungen vollkommen intakt sein können, häufig gefunden wird.

Er glaubt deshalb hier die Ursache in der Blutveränderung suchen zu müssen, welche während des Abmagerungsprocesses sich herstellt und darin besteht, dass das Blut mit dem Fett überladen wird, das bei fortschreitender Abmagerung zur Resorption kommt. Die Fettleber ist bei Lungentuberculose deshalb ausgesprochener als bei andern Consumptionskrankheiten, weil bei unveränderten Lungen eine grössere Sauerstoffaufnahme und hiermit raschere Umsetzung des Fettüberschusses ins Blut stattfindet.

Pathologische Anatomie.

Eine exquisite Fettleber ist nach der Fläche vergrössert, abgeplattet und hat keine scharfen, sondern mehr abgerundeten Ränder. Ihre Oberfläche ist glatt, glänzend, durchsichtig und fühlt sich teigig an, so dass ein Eindruck mit dem Finger eine bleibende Vertiefung hinterlässt. Die Farbe ist rötlich gelb oder blass gelb, und eine trockene, etwas erwärmte Messerklinge nimmt einen Fettbeschlag an, wenn sie durch fettig degeneriertes Leberparenchym gezogen wird. Die Menge des Fettes ergibt sich bei der chemischen Untersuchung als sehr beträchtlich. Frerichs fand in einem Falle 78 % Fett in der wasserfreien Lebersubstanz; im frischen Zustand enthält dieselbe Leber 43,84 Fett, 43,84 Wasser, 12,32 Gewebe, Zellen, Gefässe etc. Gleichzeitig vermindert sich der Wassergehalt des fettig degenerierten Parenchyms, der von 76 % auf 50—43 % sinken kann. Das Fett besteht aus Olein, Margarin und Spuren von Cholesterin.

In weniger exquisiten Fällen sind diese anatomischen Merkmale auch weniger deutlich. Da die Leberlappchen immer in der Weise erkranken, dass zuerst die peripherisch gelegenen Zellen eines jeden Lappchens fettig degeneriren, während das Centrum des Lobulus, das Gebiet der Lebervenen, noch frei und von normaler Farbe bleibt, so entsteht ein reticulirtes Aussehen des Parenchymdurchschnittes, die sog. Mosaikleber.

Es wechselt hier bräunlichrothe und blassgelbe Substanz in der Weise mit einander ab, dass die erstere kleine Inseln bildet, welche von letzterer, als einem hellgelben Hofe umgeben werden. Die Form der braunen Inseln hängt von der Richtung ab, in welcher die Lappchen durchgeschnitten worden sind; wo die Centralvenen quer durchgeschnitten worden, sind sie rund, wo der Schnitt den Centralvenen parallel fällt, stellen sie längliche, zuweilen blattähnliche Figuren dar.

Die Fettablagerung kommt nicht immer in allen Theilen der Leber gleichmässig vor, es entstehen dann grössere oder kleinere blassere Inseln, besonders an der Oberfläche der Leber, die in die normale Parenchymlfarbe übergehen.

Der mikroskopische Befund ist sehr charakteristisch. Die Veränderung beschränkt sich bloss auf die Leberzellen und niemals findet

man freies Fett in den Interzellularräumen des Parenchyms. Die im Normalzustand nur wenig granulirten Leberzellen zeigen anfangs keine Fetttropfchen in ihrem Innern, die bald an Zahl und Umfang zunehmen, coaguliren und den ursprünglichen Zellkern unsichtbar machen. Zuletzt vereinigen sich alle Fetttropfchen einer Zelle zu einem einzigen. Die früheren Bestandtheile derselben sind ganz zur Seite gedrängt und werden erst wieder gehörig sichtbar, wenn man durch Zusatz von Terpentinöl das neu entstandene Fett entfernt hat. Die Form der fettig degenerirten Zellen wird meist eine rundliche, und ihre eckigen Conturen verlieren sich.

Was die übrigen physiologischen Verhältnisse der Fettleber betrifft, so sind dieselben auffallender Weise nur wenig alterirt. Der mit in neuerer Zeit entdeckte und gewürdige Zuckergehalt des Leber verändert sich hierbei nicht, und auch die von einer solchen Leber producirte Galle weicht weder qualitativ noch quantitativ von der Beschaffenheit der normalen ab.

Es ist sehr schwer, die Grenze zwischen der physiologischen und pathologischen Fettleber zu bestimmen, indem sie fast bei allen Säuglingen, an was immer für einer Krankheit sie zu Grunde gegangen sein mögen, gefunden wird. Auch junge, noch saugende Thiere zeigen dieselbe gewöhnlich.

Das Verschwinden der Fettleber bei zunehmendem Alter der Thiere ist ein sicherer Beweis, dass die fettinfiltrirten Zellen nicht zu Grunde gehen, sondern dass die Leber wieder vollkommen normal werden und dass also die Fettleber unter gewissen Verhältnissen auch heilbar sein kann. Unter den pathologischen Zuständen, zu denen sich Fettleber gewellt, ist der häufigste die Tuberculose, dann Rheumatis, hereditäre Syphilis, endlich alle zur Atrophie führenden Krankheiten, als Enteritis folliculosa, Diphtheritis, acute Exantheme, Typhus.

Symptome und Behandlung.

Dass die Symptome dieses Zustandes sehr unbestimmt sind, ergibt schon aus dem bisher Gesagten zur Genüge. Der beste Anhaltspunkt ist immer eine Vergrößerung der Dämpfung in der Lebergegend, obwohl das Fehlen dieses Symptoms durchaus keine exclusive Bedeutung hat; denn in vielen Fällen findet man vollkommene Fettleber ohne irgend eine Volumenzunahme. Allerdings aber vergrößert und verflacht sich die Fettleber häufig und hat eine Neigung, sich an der Bauchwand nach vorne zu senken, wo sie dann durch eine beträchtliche Dämpfung erkannt wird. Außerdem findet man bei solchen Kindern die sog. Abdominalphthora, die sich durch stärkere Gasentwicklung, Flatulenz und Neigung zu Diarrhöen zu erkennen gibt. Am wahrscheinlichsten wird die Diagnose, wenn die oben bezeichneten Krankheiten, Tuberculose etc. bestanden haben oder noch bestehen.

Die Fettleber der Kinder wird kaum jemals der Gegenstand direkter Behandlung werden können. Wenn es möglich ist, die sie bedingenden Zustände zu heben, so wird sie von selbst vergehen, wenn nicht, so gibt es kein Mittel, direkt auf den Schwund des Leberfettes einzuwirken.

9) Angeborene Anomalien.

Die Bildungsfelder der Leber sind entweder ganz unbedeutende, die Form betreffende, oder gleich so enorm, dass sie Lebensunfähigkeit bedingen. Was die Abweichungen von der normalen Form betrifft, so haben wir eine viereckige, dreieckige, platte, breite oder runde Form, die Theilung in Lappen kann entweder ganz fehlen oder kann mehrfach vorhanden sein. Bezüglich der grossen Anomalien ist vorerst das *vollkommene Fehlen der Leber* bei Missgeburten, besonders Acephalen, zu erwähnen. Bei doppelköpfigen Missgeburten kommt auch *Duplicität derselben* vor. Ähnliche Bildungsfelder wie an der Leber beobachtet man auch an der Gallenblase und dem ductus choledochus, nämlich *Duplicität, Fehlen und Anomalien der Form*. Bei einer angeborenen *Zwerchfellsaphte*, die übrigens sehr selten auf der rechten Seite auftritt, kann die Leber in den rechten Pleurasack aufsteigen und bei angeborenem *Nahschneurlbruch* (vide pag. 57) durch die Bauchapalte frei zu Tage liegen.

Bei angeborener *Transposition der Eingeweide* liegt die Leber im linken Hypochondrium, und hiemit ist immer eine *vollkommene oder theilweise Transposition der übrigen Bauch- und Brusteingeweide* verbunden. Die Milz, in der Regel in kleinere Milchen zerfallen, liegt im rechten Hypochondrium, die Cardia auf der rechten, der Pylorus auf der linken Seite, das Herz im rechten Thorax.

Hyrtl hat diese Transposition der Leber und der übrigen Eingeweide erst vier Mal gesehen, nie ist sie noch niemals vorgekommen. Bei einipernassen aufmerksamer Untersuchung kann die Diagnose unmöglich schwierig sein.

F. Milz.

Idiopathische, primäre Milzkrankungen kommen bei Kindern wohl niemals vor, bei einzelnen acuten Krankheiten aber erregt sich eine *secundäre Anschwellung dieses Organes*, wie wir sie beim Typhus abdominalis schon ausführlicher beschrieben haben. Die Constatacion einer vergrösserten Milz ist in der Kinderpraxis nicht so leicht wie bei Erwachsenen, weil sich die Kinder bis zum dritten Lebensjahr regelmässig gegen eine längere Untersuchung der Milzgegend sträuben. Man untersucht die Kinder in der Rücken- oder in der rechten Seitenlage. Eine normale Milz ist niemals durch Palpation zu entdecken, aber auch die bedeutend vergrösserten sind oft so beweglich oder, besonders bei Typhus, so weich, dass sie der Palpation häufig entgehen, nur der harte Milztumor bei hochgradiger Rachitis und bei chronischer Intermittens ist leicht zu fühlen und bei abgemagerten und erschöpften Binslecken sogar zu sehen. Er hegt sich bei jeder Inspiration etwas nach ab, und bei der Expiration wieder nach aufwärts.

Bei mässiger Vergrösserung behält die Milz ihre schräge Richtung von hinten und oben nach vorne und unten, bei chronischer bedeutender Schwellung aber lagert sie sich vertical, ihre Längsachse wird der des Körpers parallel, indem das lig. phrenosplenum, das die schräge Richtung im Normalzustand bedingt, nach und nach sich ausdehnt. Die Form der Milz ist, so sie gefühlt werden kann, sehr

charakteristisch, ein kugliges Oral, mit stumpfen Karten und einer Einkerbung am inneren Rande ungefähr in der Mitte der Geschwulst.

Soll die Milz durch Percussion ermittelt werden, so ist eine sehr sanfte schwache Percussion, besonders bei tympanitisch aufgetriebenem Darne, dringend anzurathen, weil durch starkes Anklepfen der tympanitische Magen und Darm mitschallt; auch darf man nie vergessen, die Kranken immer in derselben Lage zu untersuchen, weil Verschiedenheit der Lagerung allein schon beträchtliche Veränderungen der Dämpfung verursacht. Im Allgemeinen sind bei Kindern unter einem Jahre alle jene Dämpfungen der Milzgegend als abnorme zu bezeichnen, die die Ausdehnung eines gewöhnlichen Pleissimeters überschreiten. Bei beträchtlichem Auswurf und bei grösserm Erguss im linken Pleuraraum ist die Milzdämpfung nicht isolirt zu percutiren, bei bedeutendem Metastasis verschwindet sie gänzlich, so dass auch bei Vergrösserung der Milz an der entsprechenden Stelle ein ganz sonst tympanitischer Percussionsschall gehört werden kann.

Ausser bei Typhus kommt Milztumor vorzugsweise bei Wechselieber vor, und es lässt sich eine Beschreibung dieser Infektionskrankheit hier ebenfalls anreihen, wie wir es im Kapitel von den Darmkrankheiten mit dem Abdominaltyphus und der Cholera unternommen haben.

Wechselieber. Febris intermittens.

Bei kleinen Kindern kommt Wechselieber eben so häufig vor, als bei Erwachsenen. Es finden sich in der Literatur sogar Fälle beschrieben, wo Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft an Intermittens litten, mit Milztumor auf die Welt kamen und zu derselben Stunde, an der die Mutter ihren Fieberanfall bekam, ebenfalls davon befallen wurden. Mir ist dergleichen noch nicht begegnet; das jüngste Kind, das ich zu Intermittens zu behandeln hatte, war sehr Weichen alt. Die im folgenden zu beschreibenden Symptome beziehen sich nur auf Kinder unter zwei Jahren, bei älteren Kindern ist der ganze Verlauf so charakteristisch, dass jeder, der nur einmal bei einem Erwachsenen einen Wechselfieberanfall gesehen hat, ihn sogleich wieder erkennt.

Die Aetiologie der Kinderintermittens stimmt natürlich mit der allgemein bekannten überein. Die Intermittens ist an einzelne Gegenden gebunden und wird niemals bei einem Kinde beobachtet, das nicht in einer Fiebergegend lebt oder wenigstens einige Zeit in einer solchen sich aufgehalten hat. Die erschöpfendste Besprechung der Aetiologie der Malariakrankheit findet sich in Grönzinger's Infektionskrankheiten (Virchow's Handbuch der spec. Pathologie), wo die Verhältnisse der Wassermenge des Bodens, der Temperatur, des Klima's etc. auf das ausführlichste erörtert werden.

Symptome.

Der quotidiane Typus ist bei Kindern der häufigste, doch kommt auch Tertiana und selbst Quartana vor. Die Stunde, in welcher der Anfall eintritt, ist nicht immer dieselbe, es findet sich aber der Anfall zu einer bestimmten Tageszeit, er tritt immer entweder in einer Morgenstunde oder Nachmittags oder Abends ein. Was den Anfall selbst

betrifft, so ist er gewöhnlich nicht vollkommen ausgebildet, sondern in dem einen oder anderen Stadium rudimentär. Es kommen wohl wirkliche Froststöße vor, wobei die Kinder zittern, zittern, collabieren, blaue Lippen und Nägel bekommen, darauf auch bedeutende Hitze, trockene heisse Haut, löslicher Durst, Unruhe, und endlich ein allgemeiner Schweiß eintreten, so dass der ganze Vorgang das Bild eines vollendeten Fieberparoxysmus bietet, in der Regel aber sind die Symptome nicht so prägnant und lassen oft nur durch ihr täglich zur selben Zeit wiederkehrendes Auftreten den Malarieprocess vermuthen. Die Schüttelfröste selbst sind oft gänzlich und man bemerkt nur auffallende Blässe der Haut, bläuliche Nägel, Lippen und Augerringe, Kaltwerden der Extremitäten, laues Wimmern oder leichte convulsorische Zuckungen der Gesichtsmuskeln. Der Puls wird hierbei nicht besonders beschleunigt, aber sehr klein. Die Respirationsbewegungen behalten ihre normale Frequenz, der Athem wird nicht kühl, sowie auch die Temperatur der Mundhöhle überhitzt nicht sinkt. Während dieses des Froststadium darstellenden Symptomencomplexes lassen die Kinder fast niemals Urin, haben sie aber kurz vorher viel Milch genossen, so wird sie gewöhnlich wieder erbrochen. Länger wie eine, höchstens $1\frac{1}{2}$ Stunden dauert dieses Stadium niemals an. Die Kinder bieten während desselben ein höchst bedenkliches Aussehen, und man kann sich gewaltige Blößen bezüglich der Prognose geben, wenn man sogleich nach der ersten Beobachtung sein Urtheil fällen will. Mir selbst ist einmal am Anfange meiner medicinischen Laufbahn dieses prognostische Missgeschick begegnet.

Im zweiten Stadium werden die Kinder turgescirend, das Gesicht röthet sich, der Puls wird hart und beschleunigter als im Frost, der Herzstoss wird stärker und ausgebreiteter. Die Kinder werden sehr unruhig, schreien laut und viel und bekommen häufig Convulsionen, wobei die Pupillen sich auffallend erweitern. Urin und Stuhl sind angehalten.

Dieser Zustand kann 2—4 Stunden dauern und wird von den Müttern viel leichter bemerkt und besser beschrieben als das Froststadium. Oft ist er aber auch vorübergehend, dauert kaum $\frac{1}{2}$ Stunde und macht einem leichten Schweiß, dem dritten Stadium Platz.

Der Schweiß ist bei Kindern, so lange sie wachsen, nicht bedenklich, die Haut fühlt sich wohl feucht an, selten aber steht der Schweiß in grösseren Tropfen auf ihr, was nur bei eintretendem Schlafe beobachtet wird. Die Hitze und Röthe des Gesichts nimmt hierbei ab, der Durst mindert sich, der Urin wird entleert und ist ziemlich dunkel pigmentirt, der Puls nimmt seine normale Beschaffenheit wieder an und die Kinder geben überhaupt wieder die Zeichen allgemeinen Wohlbefindens zu erkennen. In der Fieberfreien Zeit sind die Kinder aber selten vollkommen wohl, sie sind meist sehr unruhig, haben weniger Appetit und eine verlangsamte, unregelmässige Verdauung. Die Fieberanfälle sind häufig so wenig ausgesprochen, dass eine mehrtägige Beobachtung zur Constatirung der Diagnose notwendig ist.

Die Intermittensschelexie stellt sich bei kleinen Kindern sehr bald, schon nach 1—2 Wochen ein und ist durch folgende Symptome charakterisirt.

Selb noch entwickelt sich bei Kindern Anämie, die Hautfarbe

wird ganz weiss oder spiegt selbst in das Graue über, die Lappen und Schleimhäute werden blass, die Abmagerung wird täglich bemerkbarer, an den unteren Augenlidern bilden sich kleine, ödematöse Anschwellungen aus, der Milztumor ist deutlich zu fühlen und bei zunehmender Abmagerung sogar zu sehen, auch die Leber schwillt an und verhärtet sich in ihrem Parenchym (Speckleber). Der Darm ist meteoristisch aufgetrieben, die Stühle sind meist diarrhoisch, in den letzten Tagen des Lebens zuweilen mit Blut vermischt. Die wichtige Entdeckung des körnigen, braunen oder schwarzen Pigmentes im Blute der Intermitteuskranken ist eine Errungenschaft der pathologischen Mikroskopie, die wir Virchow und Meckel verdanken (Mekumia). Im Rime, das man durch einen Nadelstich aus einer comprimierten Fingerspitze entleeren kann, findet man bei Kindern diese Pigment nur sehr selten, wohl hierzu schon ein hoher Grad von Cachexie gehört, welchen die Kinder gewöhnlich nicht erleben. Auch ist die Erkennung der Intermitteus jetzt so allgemein und die Therapie hingegen von so gutem, raschem Erfolge, dass, wo Aerzte consultirt werden, es selten mehr zur entwickelten Cachexie kommen wird.

Pathologische Anatomie.

Bei uns zu Lande stirbt nicht leicht ein Kind während des Anfalles, in Gegenden aber, wo bösartige, perniciose Fieber herrschen, kann auch bei Kindern der Tod schon auf den ersten Anfall folgen. Der pathologisch anatomische Befund ist dann ein rein negativer und eine geringe Schwellung der Milz mit Blatüberfüllung des ganzen venösen Gefässsystems das einzige Abnorme. Bei Kinderkrichen aber, die an Wechselstiebercachexie zu Grunde gegangen sind, kommen mannigfache Veränderungen vor.

Es findet sich Anasarka und Ergos in den serösen Säcken, Speckleber, grosse Speckmilz und braunes oder schwarzes Pigment am reichlichsten angelagert in der Milz, ausserdem aber auch in der Leber, im Gehirne, auf der Darm Schleimhaut, und in den Nieren, welche ausserdem häufig brennlich erkrankt sind. Der in der Blase sich findende Urin ist in solchen Fällen immer eitrastallig und in seinem Bodensatz lassen sich Cylinder mikroskopisch nachweisen.

Behandlung.

Der Anfall selbst erfordert bei unseren milderer Formen von Wechselstiebern keine direct eingreifende, sondern nur eine expectative Behandlung. Hohe Temperatur und leichte Hautreize, wie Reibungen mit wollenen Lappen, mit Campherspiritus oder andern Excitantien genügen für das Proctostadium, kühle Bedeckungen, kalte Waschungen des Kopfes, Darreichung von vielem, kaltem Wasser und bei Convulsionen 1–2 Tropfen Opiumtinctur für das Hysterostadium. Der hierauf folgende Schweiss ist möglichst zu befördern. Während der Apyrexie müssen die Kinder sehr diät und in gleicher Temperatur gehalten werden. Die Wiederkehr der Anfälle aber zu verhüten haben wir im schwefelsauren Chinin ein ganz exakt wirkendes Mittel. Bei Kindern unter einem Jahre genügt gewöhnlich schon 0,05 Chinin auf einmal gerichtet zur vollkommenen Sistirung des Anfalls. Grösseren Kindern gibt man 0,1–0,2. Da das schwefelsaure Chinin ziemlich voluminös

ist, so ist es durchaus unpraktisch, eine solche Dosis noch durch Zuckerpulver zu vergrößern, zumal der Geschmack dadurch keineswegs verbessert wird. Bei kleinen Kindern gelingt es sehr leicht, dieses Mittel beizubringen. Größere mehrjährige Kinder aber, die doch noch zu ungeschickt sind, das Pulver in Oblaten eingehüllt zu verschlucken, bringen es in vielen Fällen mit dem besten Willen nicht hinunter und weigern sich entschieden gegen jeden ferneren Versuch. Für diese Fälle eignet sich die Application in Form eines Clysters vortreflich.

Es brachte einmal ein Bauer aus einem Torfmoore seinen fünfjährigen Jungen zu mir und gab an, dass er schon seit sechs Wochen täglich das Fieber habe, welches ihm der dortige Landarzt nicht vertreiben könne, da dem Kinde durchaus kein Chinin beizubringen sei. Der Knabe war ganz anämisch, hatte eine sehr grosse Milz, einen harten Lebertrand, deutliches Ascites, Spuren von Erweis im Urin und leichtes Oedem an den unteren Augenhöhlen. Ich verordnete ihm eine Chininkösong (0,6 auf 40,0) und liess diese vor meinen Augen als Clyster reiben, was sich das Kind ganz gerne gefallen liess. Der Mann nahm es wieder mit nach Hause in sein Moor und obwohl es also dort der Malariaeinfö auch ferner ausgesetzt blieb, so trat kein Anfall mehr ein und das Kind erhobte sich unter reichlicher Behandlung mit Tinct. mart. ponat., Fleischkost und Bier vollständig.

Wenn eine Dosis Chinin nicht genügt, so wiederholt man dieselbe in der nächsten fieberfreien Zeit. Die Bestimmung der Stunde der Darreichung, auf welche von manchen Aerzten viel Gewicht gelegt wird, scheint weniger relevant zu sein. Die Hauptsache ist immer, dass das Chinin gut und vollständig resorbirt wird, und es ist deshalb rathsam, es nicht unmittelbar vor oder nach einer Mahlzeit zu geben und jedenfalls nicht kurz vor Eintritt des Frostes, weil während desselben die Verdauung unterbrochen ist.

Mir hat das Chinin noch niemals bei unseren Wechselnfebern den Dienst versagt und ich habe deshalb auch niemals Arsenik dagegen versucht, würde aber in einem solchen Falle keinen Augenblick ansetzen, letzteres Mittel in Anwendung zu bringen, da die Fowler'sche Arseniklösung von Kindern vortreflich vertragen wird. Ist schon Cachexie eingetreten, so ist eine Nachbehandlung nöthwendig. Die beste Nachbehandlung ist die Entfernung des Kindes aus der Fiebergegend nach einem biler gelegenen trockenen Wohnort. Wo dies nicht thöulich, muss man sich auf Eisen, Fleischkost und bei älteren Kindern auf kleine Gaben Bier beschränken.

6. Bauchfell.

1) Peritonitis acuta und chronica.

Die Peritonitis mit serösfaserstoffigem Exsudat kommt bei Neugeborenen und selbst schon im Fötus nicht selten vor, bei älteren Kindern hingegen findet man ausser der traumatischen und tuberculösen Form dieselbe fast niemals, weil eben bei diesen die hauptsächlichsten Veranlassungen der Peritonitis Erwachsener, die Darmperforationen und die Erkrankungen der weiblichen Genitalien, so gut wie gar nicht vorkommen.

Aetiologie.

Sämmtliche drei Arten von Peritonitis, die man in der speciellen Pathologie anzunehmen pflegt, werden auch beim Neugeborenen beobachtet. Die idiopathische ist die seltenste Form und kommt fast nur im Fötus vor, die secundäre ist die häufigste, die metastatische tritt in Gehirnläsionen auf, in denen das Puerperalfieber herrscht. Die beiden letzteren Formen lassen sich nicht immer streng scheiden, in beiden geht eben der Process von den jucheführenden Nabelgefässen aus; ob sich nun aber die Entzündung einfach auf das unmittelbar gelegene Bauchfell fortpflanzt oder ob dasselbe, wie andere seröse Häute, von dem pyämischen Processen ergriffen wird, ist oft nicht mehr zu unterscheiden. Diese Art von Peritonitis, abhängig vom juchigen Nabel, kommt nur so lange vor, als der letztere bestehen kann, sechs bis stets acht Wochen nach der Geburt. Von dieser Zeit an findet sich bloss noch die traumatische, wozu auch die in Folge von Verletzungen und Perforationen des Darmes oder Magens, dann in Folge von Einklemmung einer Hernie oder von Intussusception zu rechnen ist, und die tuberculöse Form.

Symptome.

Bei der Peritonitis der Neugeborenen ist ein Druck auf das Abdomen immer schmerzhaft, und zwar in einem so hohen Grade, dass die Kinder bei leisester Berührung laute aber abgebrochene Schreie ausstossen. Anhaltend zu schreien sind sie nicht im Stande, weil der ihnen nöthwendige Gebrauch der Bauchpresse neue Schmerzen verursacht. Sie sind am ruhigsten, wenn man sie ganz abdeckt, so dass der Unterleib von allen Seiten frei bleibt, die Beine sind gewöhnlich gestreckt und die Oberschenkel nicht so, wie dies regelässig bei Colik der Fall ist, an den Leib angezogen, weil auch durch die Berührung der eigenen Oberschenkel der Schmerz vermehrt zu werden scheint. Wenn ältere Kinder an Peritonitis leiden, so halten sie constant die Rückenlage ein und sind nicht zu bewegen, sich auf die eine oder andere Seite zu legen. In allen Fällen besteht ein peritonischer Zustand der Bauchmuskulatur und in Folge dessen bedeutender Meteorismus. Fluktuation ist bei Neugeborenen wohl niemals zu fühlen, weil 1) das Exsudat ein plastisches, mehrbräunliches ist und 2) der meteoristisch aufgetriebene Darm gegen die Bauchdecken dermassen angedrängt, dass allenfalls vorhandenes flüssiges Exsudat nach hinten und unten zu liegen käme.

Erbrechen wird bei Peritonitis der Kinder viel weniger regelmässig beobachtet, als bei Erwachsenen. Auch ist häufiger Diarrhöe vorhanden als Verstopfung. Der Appetit ist natürlich ganz verschwunden, der Durst aber gross. Wenn die Peritonitis sich auf den Peritonialüberzug der Blase erstreckt, so tritt Urinverhaltung ein oder es entleeren sich unter deutlichen Schmerzäusserungen nur wenige Tropfen Urin auf einmal. Die Zeichen des Fiebers sind immer sehr deutlich ausgesprochen, die Haut ist trocken, heiss, der Puls frequent und klein, die Athemzüge sind häufig und oberflächlich. Die Respirationsbewegungen unterscheiden sich dadurch von jenen im physiologischen Zustand, dass das Zwerchfell sich gar nicht oder nur wenig bewegt, während die Brustmuskeln eine möglichste Erweiterung des Thorax zu erzielen

trachten. Da jedoch durch diese Art der Respirationsbewegung nicht die gehörige Ausdehnung der Lungen zu Stande kommt, so sind die Kinder gezwungen nach 10—15 solchen oberflächlichen Inspirationen immer eine tiefe Zwerchfellinspiration folgen zu lassen, die von einer schmerzhaften Verwerrung der Gesichtszüge und häufig von einem schmerzhaften Schrei begleitet ist. Die Gesichtsfarbe ist öfter blaß als geröthet; Convulsionen kommen hier seltener vor als z. B. bei Pneumonie.

Die Peritonitis der Säuglinge führt in der Regel schon nach 4—3 Tagen zum Tode. Die tuberculöse Bauchfellentzündung älterer Kinder verläuft langsamer und kann sogar mehrere Monate bestehen. Abweichend von der tuberculösen Peritonitis Erwachsener kommt es hier zuweilen zu einem Durchbruch des Eiters nach aussen und zwar durch den Nabel, wo sich zunächst eine schmerzhaft-rotte Geschwulst bildet, die nach einigen Wochen aufbricht und bis zum endlichen Tode des Kindes täglich grosse Mengen ansaßig riechenden Eiters entleert. Der lethale Ausgang ist bei dieser Form fast unvermeidlich. Nur ein einziges Mal sah ich nach Durchbruch einer eitrigen Peritonitis nach aussen durch den Nabel Genesung eintreten. Doch war es nicht entscheidend, ob in diesem Falle nicht einfache idiopathische Peritonitis vorlag. Der Eiter entleerte sich bei diesem vierjährigen Kinde mehrere Wochen hindurch massenhaft. Erst nach mehreren Monaten schloss sich die Nabelfistel und seit dieser Zeit befindet sich das Kind schon mehrere Jahre lang vollkommen wohl.

Pathologische Anatomie.

Das Bauchfell zeigt an verschiedenen Stellen, namentlich an der Berührungsfäche zweier Darmschlingen, capilläre Injection und plastische Anschwellung, wodurch mannigfache Verwachsungen bedingt sind. Bei der Peritonitis der Neugeborenen, die fast regelmässig ihren Grund in Phlebitis umbilicalis hat, finden sich die Hauptveränderungen am Nabelring und der concaven Fläche der Leber, die durch plastisches Exsudat mit den benachbarten Organen, Magen, Dünn- und Dickdarm verklebt ist. Im kleinen Becken zeigt sich gewöhnlich noch eine eitrige, jauchige oder bläuliche Flüssigkeit in einer Menge von 300 bis 1800. Bei den zwei von Billard beschriebenen Fällen von fötaler Peritonitis waren in dem Leichen der todtgeborenen Kinder zahlreiche straffe Bänder und ältere Verwachsungen zugegen. — Als Complication findet man häufig lobuläre Pneumonie.

Die Behandlung der Peritonitis ist, wie aus dem bisher Gesagten schon hervorgeht, eine höchst missliche. Die der Neugeborenen in Folge von Phlebitis umbilicalis scheint fast immer tödtlich zu sein, und es ist daher nur eine symptomatische Bekämpfung, Herstellung der Ruhe, Reinigung des Nabels und möglicste Ernährung angezeigt. Bei der tuberculösen Peritonitis ist in der Regel schon Fieber heftiger zugegen, und es kann auch hier von einer wirklichen Bekämpfung derselben keine Rede sein, sondern man muss sich begnügen, durch kleine Gaben Chinin und Morphium die Fiebersymptome möglichst zu besänftigen. Gegen die peritonitischen Schmerzen gebrauche ich frische, warme Compressen, die mit Guttapercha und dann mit einem trockenen Tuche bedeckt werden. Sie sind viel realischer und bequemer zu appliciren, als die Cataplasmen, die namentlich des Nachts häufig kalt und

hört werden, und stehen in ihrer schmerzstillenden Wirkung keiner Art von Cataplasmen nach. Die traumatische Peritonitis endlich verträgt allerdings eine antiphlogistische Behandlung, bestehend in 3–12 Blasen, und im Falle keine Diarrhöe zugegen ist, in Darreichung von Calomel 0.03–0.06 täglich mehrere Dosen bis grüne Diarrhöe eintritt. Auch hier schaffen feuchte, warme, mit Guttapercha bedeckte Compressen, Tag und Nacht über den Leib gelegt, die grösste Erleichterung. Bei Fortdauern der Schmerzen ist das Opium, wie fast überall so auch hier, vollkommen an seinem Platze.

2) Ascites. Hydropischer Erguss in den Peritonealsack.

Der Ascites ist niemals eine primäre für sich allein bestehende Erkrankung, sondern immer nur ein Symptom irgend einer andern, constitutionellen oder Circulationsstörung. Bei kleinen Kindern ist er nicht besessend, einige Eosinophil Serum finden sich aber häufig im Peritoneum bei Section derselben. So haben die Kinder, die an hereditärer Syphilis, an Tuberculosis, an Marasmus in Folge von Enteritis, an angeborenem Herzfehler oder an Zellgewebsverhärtung zu Grunde gehen, gewöhnlich einen kleinen serösen Erguss im Abdomen. Betrachtlicher, leicht nachweisbarer Erguss kommt nur bei Kindern, die über ein Jahr alt sind, vor und zwar in Folge von Scharlach, von Intermitteus und, was noch weniger genau beachtet worden ist, von Abdominaltyphus.

Pathologische Anatomie.

Bei grösseren Kindern kann die Quantität der Ascitesflüssigkeit bis zu mehreren Pfunden steigen. Die Farbe des Serums ist ein wässriggelbes, zuweilen ist auch etwas Blutfarbstoff beigeineengt; die so entstehende rötliche Färbung kann aber auch dadurch sich gebildet haben, dass bei Öffnung des Abdomens eine oder die andere Hautvene eingeschnitten worden ist, die dann ihren Inhalt in das Bauchschack ergiesst. Die chemische Untersuchung ergibt einige Procente Eiweiss und die Salze, wie sie im Blutsrum enthalten sind. Das Peritoneum ist entweder ganz normal oder zeigt an einzelnen Stellen weisse Trübungen, was hauptsächlich bei lange bestehendem Ascites beobachtet wird. Zuweilen sind einzelne Darmabschnitte oder die Leber mit einer leichten Exsudatschicht beschlagen, so dass wir es hier mit einem Uebergang zur wirklichen Peritonitis zu thun haben. Bei keiner Section darf man sich mit dem einfachen Auffinden des Ascites begnügen, sondern man muss immer auch der Ursache desselben, nach einer der Eingangs erwähnten Krankheiten suchen, wobei besonders das Herz und die Nieren einer sorgfältigen Untersuchung zu unterwerfen sind.

Symptome.

Die Gegenwart des Ascites kann nur durch deutliche Fluktuation bewiesen werden. Kleine Ergüsse sind in der Rückenlage niemals zu erkennen, zuweilen können sie noch entdeckt werden, wenn man die Kinder auf die rechte Seite lagert und das Becken etwas erhebt, wobei sich dann alles Serum im rechten Hypochondrium sammelt. Die klein-

sten Quantitäten können dadurch noch nachgewiesen werden, dass man die Kinder auf den Bauch legen und sie dann so aufheben lässt, dass der Nabel die tiefste Stelle des ganzen Abdomens einnimmt. Es muss sich nur nach dem Gesetz der Schwere alles Serum um den Nabel herum sammeln und kann durch Percussion von unten nach oben leicht gefunden werden. Die Fluktuation wird auf diese Weise untersucht, dass man mit den Fingern der einen Hand flach gegen die Bauchwand drückt, während man mit den Fingerspitzen der anderen Hand auf der entgegengesetzten Seite oder wenigstens einige Zoll von der angestrichenen Hand entfernt rasch und elastisch an die Bauchwand anschlägt. Die hierdurch entstehende Welle wird, im Falle zwischen beiden Händen Serum sich befand, von der zufühlenden Hand als leichte Berührung empfunden. Ausser durch diesen freien Ascites entsteht noch Fluktuation durch diarrhoischen Darminhalt durch eine gefüllte, über die Symphyse emporgestiegene Harnblase und durch Oedem der Bauchdecken selbst, das namentlich bei Nephritis nach Scharlach sehr bedeutend zu sein pflegt. Letzteres unterscheidet sich aber leicht vom wahren Ascites durch den Eindruck, den der untersuchende Finger hinterlässt, und durch die Oberflächlichkeit der Schwellung. Die gefüllte Blase ist leicht zu entleeren und der Darmskarrich durch schleimige Kost und kleine Dosen Opium zu stillen, worauf sich dann der wahre Sachverhalt deutlich ergeben muss.

Bei geringeren Graden von Ascites ist äusserlich nichts zu entdecken und der Umfang des Abdomens hat nicht beträchtlich zugenommen, bei höheren Graden fällt aber schon bei der einfachen Besichtigung die Grösse des Leibes auf, die Haut ist glänzend und gespannt, die Percussion ist an den unteren Parthien des Abdomens in grosser Ausdehnung gedämpft, der Nabelring ist ausgehöhlt und der Nabel prominirt. Der Druck des Serums auf die Harnblase bedingt häufigen Harndrang, wobei nur kleine Quantitäten Urin auf einmal entleert werden.

Die allgemeinen Erscheinungen, Appetitmangel, Fieber, Respirationsstörungen etc. richten sich nach den dem Ascites vorausgehenden Zuständen. In der Regel transpiren die Kinder nur sehr wenig und lassen wenig Urin. Derselbe ist meist stark pigmentirt und enthält bei Nephritis Eiweiss und Fibrincylinder. Der Stuhl ist häufig diarrhoisch.

Die Prognose richtet sich nicht nach der Grösse des Ascites, sondern nach den ätiologischen Momenten. Fast bei allen Arten ist die Prognose ungünstig zu stellen, nur der Ascites nach Scharlach und Typhus und der in Folge von Milztause nach Fieber intermittens lassen bei geeigneter Behandlung einen günstigen Ausgang erwarten.

Behandlung.

Dieselbe ist je nach den Ursachen natürlich eine verschiedene. Die Zustände, welche den Ascites bedingen, sind so tröstlicher Natur, dass ausser einem roboreirenden Regime kaum eine specielle Behandlung indicirt sein wird. Gegen die Nephritis nach Scharlach ist der *Rhab. Juniperi*, den die Kinder unvermischt und unverdünnt gewöhnlich gerne nehmen, ein ausgezeichnetes diuretisches Mittel, von dem ich einen halben bis ganzen Kaffeesöffel täglich nehmen liess. Dasselbe

gilt auch für den Ascites nach Intermittens und Typhus, nur ist hierbei noch eine roboreirende Behandlung mit Fleischkost, Bier, Wein und kleinen Dosen Eisenextrakt zu befolgen; in allen Fällen geht die Abnahme des Ascites langsamer vorwärts, als in dem nach Scharlach entstandenen.

3) Krankhafte Veränderungen der Mesenterialdrüsen.

Die Drüsen des Mesenteriums vergrössern und verkärten sich in allen Fällen von Enteritis folliculosa, und ihre Unwegsamkeit bewirkt höchst wahrscheinlich die darauf so regelmässig folgende Atrophie, worüber das Ausführlichere schon bei jener Krankheit erwähnt wurde (pag. 144). Ausserdem kommen bei älteren Kindern käsige Tuberkel in denselben vor, und bei Kindern, die an Typhus zu Grunde gegangen sind, finden sich zuweilen Hypertrophien oder kleine Abscesse in einzelnen Drüsen.

Symptome scheinen die Krankheiten der Mesenterialdrüsen nicht zu machen, nur die Ernährung leidet sehr rasch, wenn sie in grösserer Zahl hypertrophiren. Sie sind übrigens viel zu klein, und der Darm ist immer zu meteoristisch, als dass sie jemals gefühlt werden könnten, ein Irrthum, in welchem viele unserer älteren Aerzte befangen sind.

11. Capitel.

Krankheiten der Respirationsorgane.

A. Nasenhöhlen.

Nachdem die Krankheiten der Mundhöhle schon bei denen des Digestionsapparates besprochen worden sind, erübrigt nur mehr die Betrachtung der Nasenhöhle. Die Untersuchungsmethode ist einfach und bietet wenig Schwierigkeiten, indem sie sich lediglich auf Inspection und Betastung mittels Sonden oder Katheter beschränkt. Wintrick hat gefunden, dass man durch Percussion des Larynx die Durchgängigkeit der Nasenhöhlen constatiren kann. Wenn man nämlich bei geschlossenem Munde den Larynx percutirt, so wird der dadurch entstehende tympanitische Percussionsschall sogleich tiefer, wenn man ein Nasenloch schliesst und noch deutlicher tief, wenn beide Nasenlöcher zug gehalten werden. Ändert sich nun beim Verschiessen und Wiederöffnen von einem oder beiden Nasenlöchern der tympanitische Schall in seiner Höhe nicht, so ist dass ein Beweis, dass die betreffende Nasenhöhle weiter oben verstopft ist. Zu dieser Untersuchung gehören schon grössere Kinder, die auf Geheiss den Mund schliessen, sich gutwillig die Nasenlöcher zuhalten und den Larynx percutiren lassen. Kinder aber, die zu dieser Einsicht gelangt sind, schmecken nach auf Geheiss aus und ein, und es kann auf diese Weise die Durchgängigkeit

der Nasenhöhlen viel besser untersucht werden, als durch die Percussion des Larynx.

1) Epistaxis, Nasenbluten.

Die Epistaxis beruht, wie überhaupt alle Blutungen, auf einer Zerrissung von Gefässen, in diesem Falle der Capillaren der Nasenschleimhaut.

Aetiologie.

Die Ursachen theilen sich in lokale und allgemeine. Die lokalen sind die Traumen aller Art, Schlag, Stoss, Quetschung, Zerrung etc. Doch ist auch hier die individuelle Disposition nicht außer Acht zu lassen, indem die verschiedenen Traumen je nach der bestehenden Neigung zum Nasenbluten überhaupt, auch verschiedene Wirkungen aussern. Eine lokale Bedingung findet sich auch in den verschiedenen Geschwürsformen der Schleimhaut. Zu den allgemeinen Ursachen gehören alle Zustände, die mit Störungen des venösen Kreislaufes verbunden sind, als Herzfehler, Emphyseme, Kröpfe, die sogenannte allgemeine Pletheca, Pneumonie und Typhus; ferner die Krankheiten, bei welchen wirkliche Störungen im Capillargefässsystem vor sich gehen, Scurbut und Morbus maculosus, und ausserdem eine Blutkrankheit, die Chlorose. Endlich kommen noch vicariirende Nasenblutungen vor bei Mädchen zur Zeit, wo die Menstruation sich einstellen soll.

Symptome.

Das Blut kommt entweder tropfenweise als Stilllicidium sanguinis zum Vorschein, gewöhnliche Form, oder es strömt in einem zusammenhängenden Strahle, Rhinorrhagia, hervor, was als seltener Ausnahmefall zu betrachten ist. Bezüglich der Menge des verlorenen Blutes wird man vor den Angehörigen oft unwillkürlich getäuscht, indem sie vergessen, dass die Kinder in eine mit Wasser gefüllte Schüssel geblutet haben und nun, wenn sie das dunkelroth gefärbte Wasser erblicken, das ganze für reines Blut halten. Ich fing einmal bei einem neun-jährigen Knaben, von dem mir berichtet wurde, dass er täglich „enorme Mengen“ Blut verliere, binnen 35 Minuten, nach welcher Zeit die Blutung spontan aufhörte, nicht ganz 30 Grm. Blut auf, eine Quantität, die gewiss keine Besorgniss erregen darf.

Kleine Kinder unter 3—4 Jahren haben fast niemals Nasenbluten aus allgemeinen Ursachen, sondern nur in Folge von Traumen oder Geschwüren, wobei die Blutungen niemals bedeutend sind. Bei älteren Kindern sind alle die oben genannten Causalmomente in Betracht zu ziehen. Bei fieberkranken Kindern kommt es vor, dass Blut in den Pharynx hinunterfließt und verschluckt wird, worauf dann Röhrenbrechen oder schwarze zum Theil noch blutige Stühle eintreten. Die Blutungen dauern gewöhnlich keine ganze Stunde, können aber in Ausnahmefällen auch halbe Tage währen.

Ihre pathologische Bedeutung ist natürlich je nach der Stärke und der Aetiologie sehr verschieden. Als günstige Erscheinung sind sie zu betrachten bei allen fieberhaften Krankheiten, bei venöser Congestion und bei zu erwartender Menstruation, als ungünstig und

den Zustand verschlimmernad müssen sie bei Chlorose und Scorbut angesehen werden.

Behandlung.

Aus den eben erörterten Erfahrungen geht hervor, dass die Behandlung eine mannigfach verschiedene ist. Rasch zu stillen ist die Blüthung nur bei Chlorose und Scorbut, bei den übrigen Veranlassungen richtet sich das Verfahren nach der Stärke derselben, nach der häufigen Wiederholung und nach dem mehr oder weniger anämischen Aussehen des Kindes. Die beste Methode der Stillung ist, einige Stückchen Eis von der Grösse einer Erbse in das Nasenhoch zu bringen und dann mit einem tüchtigen Charpiétampon dasselbe zu verstopfen. Die Tamponade durch die Mundhöhle mittels der Belloz'schen Böhre belästigt die Kinder sehr und darf nur in den äussersten Fällen von Chlorose oder Scorbut in Anwendung kommen. Wo kein Eis zu haben, befeuchtet man den Tampon sehr zweckmässig mit Liquor ferri squillibrati. Ein bekanntes altes Mittel ist auch das Festzuschütren der oberen oder unteren Extremität und das Emporhalten der Arme.

Dass die Grundleidsache immer einer speciellen, therapeutischen Berücksichtigung bedarf, versteht sich von selbst. Um Wiederholungen zu vermeiden, muss bezüglich deren Behandlung auf die betreffenden Abschnitte verwiesen werden.

2) Coryza, Rhinitis, Schnupfen.

Unter Coryza versteht man einen Catarrh der Nasenschleimhaut einer oder beider Nasenhöhlen, wobei die Schleimhaut immer geröthet und geschwellen erscheint.

Symptome.

Das gefärbte Secret ist anfangs klar und flüssig, wird aber nach einigen Tagen glasig und trübe, bis es endlich wieder die Eigenschaften des normalen Nasenschleimes annimmt. Die Reaction ist immer entschieden alkalisch und der Natrongehalt kann so zunehmen, dass eine leicht ätzende Wirkung auf die Oberlippe und die Nasenflügel eintritt. Diese Theile erscheinen geröthet und erodirt, und die Entzündung wird durch das fortwährende Abwischen, das die Kindenägeln nicht gerade immer auf schonende Weise ausführen, beträchtlich gesteigert. So lange der Catarrh auf die Nasenschleimhaut beschränkt bleibt, ist er gewöhnlich fieberlos, wenn er aber, was nur bei älteren Kindern durch Aufsteigen zu erörtern ist, übergeht auf die Stirnhöhlen oder die Oberkieferhöhlen, so wird er fieberhaft und verursacht heftige Schmerzen in diesen Höhlen. Plant sich die catarrhalische Entzündung der Schneider'schen Membran durch die Thränenkanäle auf die Conjunctiva fort, so tritt Rötzung, Schmerz, Thränen, Lichtscheu, kurz, Conjunctivitis catarrhalis ein, und setzt sie sich endlich durch die Tube Eustachii bis in die Paukenhöhle fort, so entsteht Otitis media, Ohrschmerz und Schwerhörigkeit. Wieder in anderen Fällen wandert die catarrhalische Entzündung nach abwärts in den Larynx, macht Heiserkeit und Schmerz, und von da in die Bronchien, wo sie in den Abscessen mit Bronchitis capillaris endigt, oder endlich es participirt der Magen

und Darmkanal, wobei Appetitmangel und Erbrechen von grösseren Mengen Schleims oder schleimige Diarrhoe sich einstellt.

Bei älteren Kindern sind diese Zustände, wenn auch alle genannten Complicationen dazu treten, immer gefahrlos, bei Neugeborenen und Säuglingen aber entsteht durch die Schleimhautschwellung und die Anhäufung des Secretes rasch eine complete Verstopfung der noch engen kleinen Nasenhöhlen. Der für gewöhnlich geschlossene Mund muss nun immer geöffnet bleiben, die Mundhöhle wird trocken und die Respiration laut und schnarchend. Versuchen nun aber diese Kinder an der Brust zu saugen oder sollen sie gefüttert werden, so geht ihnen gleich der Athem aus, sie müssen die Brust wieder fahren lassen, die Ernährung leidet dabei rasch und es tritt Abmagerung ein.

Ausserdem kommt bei kleinen Kindern, die an Seite der Mundhöhle leiden, auch Verstopfung der Choanen mit Seerpulzen vor, wobei ebenfalls grosse Athemnoth sich einstellt.

Neben dieser einfachen catarrhalischen Coryza manifestiren sich noch verschiedene Dyskrasien in den Nasenhöhlen. So gibt es eine chronische, scrofulöse, eine syphilitische und in ganz seltenen Fällen auch eine durch Rotakontagium erzeugte Coryza, wobei der Ausfluss ganz anderer Beschaffenheit ist und einzelne Knochen nekrotisch zu Grunde gehen (Osteum). Das Nähere hierüber bei den betreffenden Dyskrasien.

Aetiologie.

Der einfache Nasencatarrh kommt epidemisch und sporadisch vor; das epidemische Auftreten ist durch grösseren Osmongehalt der Luft, oder durch mechanische und chemische Verunreinigung desselben, z. B. durch Staub, Einleiten in einem längere Zeit nicht benutzten Ofen etc. bedingt. Auch ist die Ansteckungsfähigkeit durch Anhauchen nicht zu verkennen. Die sporadischen und ganz chronischen Fälle sind in der Regel dyskrasischer Natur.

Behandlung.

Bei der gewöhnlichen catarrhalischen Form gibt es keine strengen Indicationen. Jedenfalls gebietet die Vorsicht, die Kinder in gleicher Temperatur zu halten und starke Abkühlungen der Haut, das kalte Waschen und Baden auszusparen. Die in neuerer Zeit vielfach versuchte Aëstirbehandlung mit Einspritzungen von Zink-, Alumn-, Tannin- und Morphinlösung ist bei Kindern, die noch so ungeschickt sind, die in die Nasenhöhle injicirte Flüssigkeit durch Ausathmen wieder zu entfernen und also grössere Quantitäten derselben verschlucken, durchaus unzulässig. Die geschwellenen und durch Secret verstopften Nasenhöhlen der Säuglinge müssen 3–4 Mal täglich mit einem in Olivenöl getauchten Pinsel, den man wenigstens einen Zoll tief einbringen muss, wieder weggemacht werden, was um so sicherer gelingt, wenn die Kinder auf diesen Reiz einige Male niesen und dadurch die verhärteten Schleimkrusten herausbefördern. Die dyskrasischen Coryzen weichen einer örtlichen Therapie natürlich nicht, sondern müssen intern antidyskrasisch behandelt werden. Gegen die scrofulöse Form ist das wirksamste Mittel der Leberthraa, gegen die syphilitische das Quersilber.

3) Neubildungen in der Nase.

Die Polypen sind die einzige Neubildung, die bei grösseren Kindern vorkommt, jedoch immer noch viel seltener als bei Erwachsenen vorkommt. Das jüngste Kind, dem ich einen fibrösen Polypen abtrahte, war vier Jahre alt. Unter Polypen versteht man zweierlei, von einander ziemlich verschiedene Geschwülste. Die weichen Polypen sind blasse gallertige Excrescenzen auf der Schleimhaut, die gewöhnlich von der äusseren Wandung der Nasenhöhle ausgehen und wegen ihrer geringen Consistenz Blasen- oder Schleimpolypen genannt werden. Die harten Polypen gehen nicht von der Schleimhaut, sondern vom submucösen Gewebe oder dem Perichondrium aus, sie bestehen aus Bindegewebe und haben eine rosenrothe Farbe, wegen ihrer Härte hat man sie fibrose oder Fleischpolypen genannt. Beide Arten sind gestielt und vergrössern sich nach der Form der Nasenhöhle zu länglichen Geschwülsten; die Faserpolypen können eine so beträchtliche Grösse, besonders nach rückwärts erreichen, dass sie in den Pharynx hinabhängen, die Deglutition und selbst die Respiration erschweren.

Die Aetiology der Lechrücker, nach welchen die Polypen durch chronische Katarrhe bedingt sein sollen, steht auf schwachen Füßen und erfährt sehr viele Ausnahmen. Auch das seltene Vorkommen derselben bei Kindern spricht dagegen; denn gerade bei diesen ist die Schleimsecretion schon im physiologischen Zustande viel beträchtlicher als bei Erwachsenen. Bei den wenigen Fällen, die ich bei Kindern zu beobachten Gelegenheit hatte, war kein chronischer Katarrh vorausgegangen und überhaupt kein eigenthümliches ätiologisches Moment zu entdecken.

Symptome.

So lange die Polypen noch klein sind und die Nasenhöhle nicht verstopfen, scheinen sie nur wenig oder gar keine Beschwerden zu machen. Wenn aber Unwegsamkeit der Höhle eingetreten ist, so verlieren die Kranken den Geruch, bekommen eine nasale Stimme, halten den Mund stets offen, was ihnen ein blödes Aussehen gibt und suchen vergebens durch Schnutzen die Passage wieder frei zu machen. Durch heftiges Schnutzen und Pressen platzt wohl hier und da ein Blasenpolyp, sein Inhalt entleert sich und die Luft kann wieder durch dieses Nasenloch eindringen. Da aber diese Blasenpolypen gewöhnlich mehrfach sind, so wechseln die kleineren rasch wieder rasch, verstopfen die Höhle von neuem und der alte Zustand kehrt wieder. Feste Fleischpolypen sind auch im Stande, den Thränenkanal und die Tuba Eustachii zu verlagern und so Thränenstauung und Schwerhörigkeit zu bedingen, bei Blasenpolypen wird dies nicht beobachtet. Bei beiden Formen entsteht eine schleimige oder eitrige Coryza und sogar Geschwürsbildung auf der Schleimhaut, in deren Folge häufig auch kleine Blutungen eintreten. Die Diagnose ist sehr leicht, gewöhnlich reichen die Polypen bis zum Nasenloch oder ragen selbst aus demselben heraus. Ist diese nicht der Fall, so kann man die Undurchgängigkeit der fraglichen Höhle durch Zuhalten des entgegengesetzten Nasenloches und Schnutzenlassen leicht entdecken. Von der Gegenwart fremder Körper unterscheiden sich die Polypen durch ihre langsame Entstehung, ihre

geringe Schmerzhaftigkeit und ihren chronischen Verlauf. Die Blasenpolypen recidiviren sehr häufig, die Faserpolypen bei gründlicher Abdröhung nicht leicht.

Behandlung.

Innere Mittel, sowie die betliche Anwendung der Adstringentien erweisen sich als vollkommen fruchtlos, die einzige wirksame Behandlung besteht in Abdröhen und Ausreissen der Polypen, wobei man hauptsächlich Sorge zu tragen hat, dass der Polyp nahe an seinem Ursprunge an der Schleimhaut gefasst wird. Bei Kindern bedient man sich hierzu am besten schlanker Kommaugen.

Zur Entfernung fibröser Polypen mit breiterem Stiele eignet sich Middeldorpf's Galvanocaustik vortreflich. Die durch das Ausreissen erzeugte Blutung steht auf Injectionen von kaltem Wasser und Einbringung von Eisstückchen. Nach Entfernung der Blasenpolypen ist es zur Verhütung von Recidiven indicirt, mehrere Wochen hindurch Charpéoudannet's, bestrichen mit rother Präcipitatsalbe, in die Nasenhöhle einzuführen. Von grossem Werthe ist in diesem Falle auch der tägliche Gebrauch der Weber'schen Nasendouche, durch welchen sinnigen Apparat gleichzeitig beide Nasenlöcher ausgespült werden. Kinder unter fünf Jahren überwinden den Anfangs dadurch entstehenden Kitzel nur schwer. Bei älteren Kindern konnte ich schon mehrmals durch Jahre langen Gebrauch dieser Douche die Wiederkehr der Polypen vollständig und bleibend verhüten.

4) Fremde Körper in der Nase.

Kinder von 2—8 Jahren bringen ziemlich häufig bei ihren Spielen fremde Körper in die Nase. Die gewöhnlichsten sind: Kürschkerne, runde Steinchen oder Glasperlen, Erbsen, Bohnen und Papierkugeln. Ausserdem gelangen aber auch Insekten, z. B. Fliegen und Wanzen, im Schlafe in die Nase, oder es verirrt sich wohl auch ein Spulwurm, wahrscheinlich während des Brockaktes in dieselbe. Sobald ein rauher Körper in das Nasenloch gebracht ist, so bemühen sich die Kinder, ihn mit dem bohrenden Finger zu entfernen und schieben ihn am bis in die Choanen, wo er liegen bleibt. Die Reaction, die die fremden Körper verursachen, ist sehr verschieden nach ihrer Beschaffenheit. Ist die Oberfläche an einzelnen Stellen rauh, so entsteht alldah Schmerzhaftigkeit Anschwellung und Coryza, am stärksten ist die Reaction bei trocknen Erbsen und Bohnen, welche in der feuchten, warmen Nasenhöhle alldah aufquellen und sogar kranken können. Berühmt ist der von Boyer erzählte Fall, in welchem eine Erbsen in der Nase eines Kindes krünte und 10—12 Wurm trieb, wovon eine 3 1/2 Zoll lang wurde.

Die Nase wird hierbei sehr schmerzhaft, und es ist ohne Othinosforminarkose keine gründliche Untersuchung möglich. Von den sog. Rhinolithen, successiven Ablagerungen anorganischer Salze um den fremden Körper, die bei Erwachsenen zuweilen gefunden werden, ist meines Wissens in der Pädiatrik nichts bekannt. Am günstigsten ist der Verlauf bei Papierkugeln, die bald gewaschen und in Stücke wieder zum Vorschein kommen. Es sollen übrigens auch schon Fälle

vorgekommen sein, wo fremde Körper heftige Reaktionen, Delirien, Meningitis und den Tod verursacht haben.

Behandlung.

Ein schmerzloses und doch in vielen Fällen wirksames Mittel ist die Erregung von Niesbewegungen, wozu bei Kindern eine Pinse Schnupftuch, in das gesunde Nasenloch gebracht, vollkommen ausreicht. Wird der Körper hierdurch auch nicht ganz ausgestossen, so bewegt er sich doch immer nach vorwärts und wird gelockert. Ist er einmal sichtbar geworden, so kann er leicht mit einer feinen gestülpten Pinzette oder mit dem Daviel'schen Löffel entfernt werden. Weichere Körper kann man auch mit einer stärkeren Kornzange zerdrücken, worauf dann die einzelnen Stücke rasch abgehen. Die Extraktionsversuche dürfen nie lange fortgesetzt werden, weil dadurch eine zu bedeutende Schwellung der Schleimhaut entsteht. Sie sind dann erst nach einigen Tagen wieder aufzunehmen. Keinesfalls darf man vorsichtig sein mit der Spaltung der Nase, wie Dieffenbach empfiehlt, sondern muss diese Operation versparen, bis bedenkliche Gehirnsymptome, die übrigens nur sehr selten sich einstellen, dazu drängen.

B. Larynx und Trachea.

1) Der Krup. Laryngitis und Tracheitis maligna.

Nicht leicht findet man für ein- und dieselbe Krankheit so mannigfache Bezeichnungen als für den Krup. Die gangbarsten sind: *Cynanche trachealis*; *Angina laryngea exsudatoria*, sive *polyposa*, sive *membranacea*, sive *streptitosa-perfidia mortalis*; *Laryngotracheitis exsudativa*, *Pharyngolaryngitis pseudomembranacea*; *Morbus strangulatorius*; *Suffocatio stridula*; hässliche Bräune. Der kürzeste Name hat die Oberhand unter allen diesen Bezeichnungen behalten und bezeichnet eigentlich in der Schottischen Volkssprache jenes weisse Häutchen (Croup), das bei dem sog. Pipa die Zunge der kranken Hühner überzieht.

Der Krup scheint im Alterthum wenig vorgekommen zu sein; denn in den Schriften der alten Aerzte, denen man scharfsichtige Beobachtungsgabe keineswegs absprechen kann, findet sich keine einzige charakteristische Beschreibung. Nach Friedrich ist Baillon der erste, der einer im Jahre 1576 vorgenommenen Krupsektion gedenkt. Einen grossen Zuwachs erhält die Kruplitteratur durch den von Napoleon I. ausgeschriebenen Conkurs, verursacht durch den raschen Tod in Folge von Krup, dem dessen Neffe, der Sohn des damaligen Königs von Holland, im Jahre 1807 erlegen ist. Dreissendachtzig Arbeiten wurden eingereicht, Preise erhielten Jurine aus Gent und Albers aus Bremen, mehrere andere wurden rühmlich erwähnt, keiner aber wusste eine Therapie, durch welche die Sterblichkeit nur einigermaßen gemindert worden wäre. Da es Napoleon dem I. vorzugsweise um die letztere und nicht um eine Bereicherung der Symptomatologie oder der pathologischen Anatomie zu thun war, so muss nothwendiger Weise die ganze Concursausarbeitung als eine resultatlose bezeichnet werden.

Pathologische Anatomie.

Der Krup ist ein gewisser Complex von Symptomen, die bei verschiedenen Individuen immer in derselben Weise wiederkehren. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass diesen Symptomen, die sich kurz als Laryngostenose zusammenfassen lassen, auch immer dieselben pathologisch anatomischen Veränderungen zu Grunde liegen, für den Krup hat sich vielmehr zur Evidenz erwiesen, dass dreierlei verschiedene Processes auf der Larynxschleimhaut ihn bedingen können. Das von der entzündeten Schleimhaut gesetzte Exsudat kann entweder a) schleimig eitrig oder b) einfach fibrinös oder c) diphtheritisch sein.

ad a) Die bei Lebzeiten hochrothe und stark injicirte Larynxschleimhaut behält ihre Farbe im Tod gewöhnlich nicht bei, sondern ist nur wenig mehr geröthet, ihre entzündliche Schwellung aber besteht fort und lässt sich deutlich durch senkrechte Einschnitte nachweisen. Die entzündliche Verdickung findet sich auch an der Stimmritze. Der ganze Larynx und die Trachea sind mit einem zähen, gelblichen Schleim, der sich nur schwer abwischen lässt, überzogen. An einzelnen Stellen zeigt die entzündete Schleimhaut kleine, katarthalsche Erosionen und ihre Follikel sind vergrößert, so dass wenn man durch Umbiegung der Trachea die Schleimhaut stark spannt, aus jedem Follikel ein kleiner perlartiger Tropfen grauweißen Schleimes hervorquillt. Diese schleimig eitrige Anschwellung kann sich bis in die kleinsten Bronchien erstrecken.

ad b) Zu dem eben beschriebenen Befunde, der sich überhaupt bei jeder Krupaction vorfinden muss, gesellt sich gewöhnlich noch eine fibrinöse Anschwellung, die sich ziemlich leicht von der entzündeten Schleimhaut in Form dickerer oder dünnerer Häutchen abheben lässt und keine wirklichen Substanzverluste derselben verursacht. Diese Häutchen bestehen mikroskopisch aus handartigen Fibrinsträngen, zwischen welchen massenhaft Eiterzellen eingelagert sind. Die letzteren sind nicht in dem Fibrin entstanden, sondern waren schon vorher auf der Schleimhaut, wurden von dem fibrinhaltigen Exsudate nachträglich umgeben und nach stattgehabter Gerinnung eingeschlossen. Die Ausdehnung der Membranen ist sehr verschieden. Man findet zuweilen ganz dünne, spannhautartige, kleine Fetzen nur an einer oder einigen Stellen des Larynx, in anderen Fällen sind die Membranen messer rückendick, gelblich weiss, an der Oberfläche mit einem rahmartigen Belege bedeckt und kleben den ganzen Larynx, die Trachea und die Bronchien höherer Ordnung so vollkommen an, dass sie als ein zusammenhängendes, dentritisches Rohrsystem abpräparirt und herausgezogen werden können. Man hat diesen Zustand den absteigenden Krup genannt. Zuweilen sind auch die Mandeln und der Pharynx mit solchen weissen Membranen bedeckt.

ad c) Unter diphtheritischer Laryngitis versteht man eine grauweiße Exsudation in, nicht auf einzelnen Stellen der Schleimhaut. Diese graue Exsudatmasse, über welcher die darauf befindlichen Schleimhautreste nebst dem Epithel bald zu Grunde gehen, besteht aus einem amorphen Detritus, in welchem sich keine Fibrinhäuter und fast gar keine Eiterzellen finden. Sie lässt sich nicht so leicht von der Schleimhaut abheben, wie die einfache fibrinöse Membran und bedeckt gewöhnlich ausser der Larynxschleimhaut auch das Gaumensegel, die

Tonsillen und den Pharynx. Der Unterschied zwischen rein fibrinösem und diphtheritischem Krup ist lediglich ein mikroskopischer.

Wenn sich noch bei Lebzeiten der diphtheritische Belag list, so bleibt darunter ein oberflächliches Geschwür zurück, das sich alsbald an den Rändern und der Basis mit einem neuen grauen Belege bedeckt. Die Diphtheritis ist nach Virchow's Anschauung als eine theilweiser Zerstörung und Necrobildung der Schleimhaut eintretende Entzündung zu betrachten. Die diphtheritische Laryngitis kommt epidemisch vor und entwickelt sich häufig nach Morbilen und Scharlach.

Das Lungenparenchym findet sich bei allen drei Formen verändert. Die Lungen collabiren bei Oeffnung des Thorax gewöhnlich nicht, weil die Luft in den Bronchien von der Mundhöhle durch das massenhafte Secret abgesperrt ist, häufig findet sich ausgedehntes Lungenödem, sehr gewöhnlich lobuläre, zuweilen auch lobäre Pneumonie oder Tuberculose.

Die benachbarten Lymphdrüsen am Halse und Nacken, sowie auch die Bronchiadrüsen sind bei Diphtherie regelmässig geschwollen und hyperämisch.

Die übrigen Organe zeigen mit Ausnahme der ventralen Stase keine charakteristischen Veränderungen.

Symptome.

Die Vorboten des Krups sind selten besonders prägnant. Die Kinder haben einige Tage Husten, Niesen, geringen Appetit und sind zuweilen weniger lebhaft als gewöhnlich, doch kommt es auch vor, dass sie sich vollkommen wohl und munter zur Ruhe begeben, die ersten Stunden der Nacht noch schlafen und dann plötzlich mit Kruphusten erwachen, worauf sich die Symptome bis zum nächsten Morgen mit so rapider Schmeligkeit entwickeln können, dass der herbeigerufene Arzt einen vollständigen exquisiten Krup vorfindet. Dieses erste Stadium, das Stadium prodromorum, ist also schon deshalb nicht anzuerkennen, weil es in vielen Fällen gar nicht vorkommt, und in noch mehreren keine charakteristischen Merkmale bietet.

Den Anfang des Krups datirt man mit Recht von jenem Moment, in welchem die ersten Veränderungen des Larynx durch Stimme und Husten sich kund geben. Die Stimme wird heiser und belegt, immer leiser und leiser, bis sie endlich so vollständig verschwindet, dass man die Kinder, wenn sie überhaupt noch zu sprechen Lust haben, nur mehr in der nächsten Nähe versteht. Selbst im empfindlichen Schmerz oder äussersten Zorne vermögen die Kinder keinen lauten Ton hervorbringen. Sobald die Stimme rauh und heiser wird, stellt sich eine durch das ganze Zimmer hörbare Respiration ein. Am besten lässt sich das die Athemzüge begleitende Geräusch nachahmen, wenn man die Lippen spitzt, als ob man pfeifen wolle, dann aber nicht pfeift, sondern einfach durch die zugespitzten Lippen aus- und einathmet. Es entsteht hiedurch ein Geräusch, das die Mitte hält zwischen Hauchen und Pfeifen. Im Krup ist es dem Hauche näher als dem pfeifenden Tone. Die Inspirationen werden immer häufiger und es kann sich endlich die Zahl der Athemzüge bis auf sechzig und mehr in der Minute steigern. Dabei werden sie ungleich, bald tief bald oberfläch-

lich und es betheiligen sich immer mehr und mehr Hilfmuskeln des respiratorischen Muskelapparates.

Zugleich mit der Heiserkeit und dem lauten Athem tritt Husten ein, dessen Ton ein so charakteristischer ist, dass man ihn kurzweg „Kruphusten“ genannt hat. Er ist bellend, klanglos, trocken, und man hat ihn nicht ganz misspassend mit den ersten Kechversuchen eines jungen Hahnes verglichen; am Anfange ist er ziemlich kurz abgebrochen und endet mit einer einzigen Expiration, bald aber steigert er sich zu Hustenparoxysmen, die eine und später selbst mehrere Minuten dauern. Am ersten Tage des Krups sind diese starken Hustenanfälle selten und kehren nur alle vier bis sechs Stunden wieder. Bald aber nehmen sie sowohl an Heftigkeit wie an Häufigkeit zu, und lassen sich durch unsere kleine Reize, durch Trinken oder einen Druck auf die Zunge zum Behufe einer Inspection der Mundhöhle sogleich hervorrufen. Erst gegen das letzte Ende hin nehmen sie ab und verschwinden wohl auch gänzlich. Die Kinder werden hierbei im Gesichte blauroth, die Augen treten starr und congestionirt aus ihren Höhlen hervor, die Venen des Kopfes und des Halses schwellen zu dicken, prallen Strängen an, die Stirne wird mit Schweiß bedeckt, trotz der heftigsten Anstrengungen aber bleibt der Husten ganz aphonisch und fördert nur kleine Mengen schaumigen Schleimes zu Tage. Die Krupparoxysmen unterscheiden sich von den Keuchhustenparoxysmen, die auch von pfeifenden Inspirationen unterbrochen werden, durch ihren ersticken, aphonischen Ton, durch den Mangel der Expektoration und des Erbrechens. Ausserdem sind die Keuchhustenkinder nach besetzten Anfällen gleich wieder bei guter Stimme, während die Krupkranken vor wie nach aphonisch bleiben.

Man irrt, wenn man den Kruphusten und die laute Respiration dem wahren Krup allein zuschreibt und alle Larynxerkrankungen, bei denen dieser Hustenton gehört wird, zum wahren Krup rechnet. Auf diesem Irrthume beruht gewiss eine grosse Menge von geheilten Krupanfällen, bei denen ein paar Blutegel oder irgend ein anderes therapeutisches Verfahren so „ausgezeichnete Dienste“ geleistet haben. Es kommen häufig ganz einfache, leichte Laryngitiden vor, bei denen die Kinder gar kein Fieber haben und ihren Appetit behalten, die aber dennoch von derselben Heiserkeit, demselben Hustenton und derselben lauten Respiration mehrere Tage hindurch begleitet werden. Dieser Zustand kann sogar chronisch werden, auch kann er durch eine um die Trachea herumwachsende Kropfdrüse bedingt sein und dann selbst Jahre lang bestehen.

Bei leichtem Krup ist immer schon von Anfang an eine Erhöhung der Hauttemperatur zugegen, wodurch sich eben die Allgemeinerkrankung zu erkennen gibt. Die Beschleunigung des Pulses ist auch hier, wie in den meisten Kinderkrankheiten überhaupt, von geringstem Werthe, da auch schon unbedeutende Katarthe dieselbe veranlassen. Kruphusten, Heiserkeit und lautes Athmen genügen zur Diagnose des Krups nicht, es müssen die Symptome des anhaltenden Fiebers vorhanden sein. Dieselben bestehen vor allem in deutlich fühlbarer und messbarer Erhöhung der Hauttemperatur, in Appetitmangel, in vermehrtem Durst und in Beschleunigung des Pulses.

Bezüglich der Untersuchung der Mundhöhle stimmen die Auctoren

je nach dem Lande, in welchem sie ihre Beobachtungen anstellen, wenig mit einander überein. In den russischen Onosceprovinzen, in Frankreich, besonders in Paris, wo fast nur der diphtheritische Krup vorkommen scheint, ist es eine seltene Ausnahme, dass bei einem Krupkinde nicht die hintere Pharynxwand, die Tonsillen und das Gaumensegel dunkel geröthet, mit zähem Schleim und selbst mit diphtheritischem Exsudat bedeckt gefunden würden. Bei den vielen Krupkranken, die ich in München schon zu behandeln hatte, sah ich fast nie Membranen, gewöhnlich auch keinen dicken Schleimbeleg, sondern nur eine leichte durchaus nicht frappante Röthung der hinteren Partien der Mundhöhle. Anders verhält es sich wieder in Mittel- und Norddeutschland, wo die Membranen häufig auf den Tonsillen sich finden und stärkere Pharyngitis beobachtet wird, während die englischen Autoren die krapöse Angina zu den Ausnahmefällen zählen. Der Grund dieser verschiedenen Angaben liegt wohl in der Verschiedenheit der pathologisch-anatomischen Prozesse. Das eine Mal wird der Krup bedingt durch einfache plastische Exsudation im Larynx, die gewöhnlich nicht über den Kehlkopf hinausreicht, das andere Mal durch Diphtheritis, die fast immer auch auf den Tonsillen zugleich auftritt.

Die Auskultation der Lungen ergibt immer weit verbreitete Basalgeräusche, das pfeifende Larynxathmen ist so intensiv, dass es das Vesiculärathmen ganz verdeckt. Hat der Krup ein bis zwei Tage bestanden, so findet sich wohl auch uncharakteristische oder ausgeblühtere Dämpfung und Bronchialathmen vorzüglich an der Rückenfläche, herrührend von lokaler und lobärer Pneumonie. Bei rachitischen Kindern nehmen auch die erweiterten Atelektasen, die rachitischen Carnificationen der Lungen nach an Umfang zu und umgeben sich mit pneumonisch infiltrirtem Gewebe. Der Auswurf ist, wie schon erwähnt, meist sehr gering, schaumig weiss, zuweilen aber werden in heftigen Paroxysmen Krupmembranen ausgehustet, die bald einzelne Fetzen mit gezackten Rändern, bald ganze, geschlossene Röhren von engem oder weitem Caliber, je nach der Grösse des Luftstos, von dem sie sich abgelöst haben, darstellen. Mit dem Aus husten solcher Membranen tritt entweder gar keine oder eine nur vorübergehende Erleichterung ein und die Prognose gestaltet sich deshalb nicht viel besser. Es ist dies eine allgemein bekannte Thatsache, und doch hören die Aerzte nicht auf, die armen Krupkiner mit Berechnütteln zu quälen und ziehen dann triumphirend irgend ein häutiges Stückchen aus dem Erbrochenen hervor. Wenn der Tod wie gewöhnlich doch erfolgt, „so hat der Therapeut doch seine Schuldigkeit gethan.“

Leichtes Zusammendrücken des Larynx verursacht gewöhnlich deutlichen Schmerz, während das Schlucken nur erschwert und schmerzhaft ist, wenn die Tonsillen und die hintere Pharynxwand mit ergriffen sind. Der Stuhl ist meistens angehalten, die Urinsecretion normal oder vermindert.

Haben nun die bisher angegebenen Symptome einen oder längstens zwei Tage angehalten, so treten die Folgen der gehemmten Respiration deutlicher hervor. Die Lippen, Wangen und Fingerspitzen werden cyanotisch, der Luft hunger wird enorm, die Kinder sitzen, so lange es ihre Kräfte erlauben, aufrecht im Bett und halten den Kopf nach rückwärts. Alle respiratorischen Hilfmuskeln sind in höchster

Thätigkeit, so dass bei jeder Inspiration der Kopf der Brust gerührt wird. Sie reissen mit verzweifelter Todesangst sich die Kleider von der Brust und greifen an den Hals, als ob sie versuchen wollten, die Veranlassung ihrer Athemnoth zu entfernen. Die Händchen klammern sich an die Bettstelle oder irgend einen feststehenden Gegenstand ihrer Umgebung an, damit die Mm. pectorales besser als Respirationsmuskeln dienen können. Sie bleiben nie lange in einer Stellung und versuchen durch Hin- und Herwenden eine erträglichere Position sich zu verschaffen. Der Puls wird fast unzahlbar, unrythmisch und ungleich. Einige Stunden vor dem Tode tritt gewöhnlich ein Nachlass sämtlicher laryngealer Symptome ein, die Athemnoth nimmt ab, doch bleibt die Respiration fortwährend accelerirt, die Kinder legen sich wieder zurück auf ihr Kopfkissen, sie haben nicht mehr den Ausdruck der höchsten Angst, sondern den der Gleichgültigkeit oder der Geistesabwesenheit. Die unerfahrenen Angehörigen halten diesen Zustand gewöhnlich für den Beginn der Besserung, dem Arzte genügt aber der klebrige kalte Schweiß, die zunehmende Cyanose, der ungleiche, unzahlbare Puls hinlänglich, sich keiner solchen Illusion hinzugeben, sondern ein baldiges Ende zu prognosticiren.

Was die Erklärung der Athemnoth und der Hustenparoxysmen betrifft, so nimmt man für die erstere gewöhnlich die Krupenmembranen, für die letzteren einen Krampf der Stimmritze an. Es lassen sich aber gegen diese Annahmen gewichtige Einwürfe geltend machen. Jedem beschäftigten Arzte, der die an Krup verstorbenen Kinder zu revidiren nicht verschmäht, ist es bekannt, dass die Dicke und Ausdehnung der Krupenmembranen nicht im geraden Verhältnisse zu der bei Lebzeiten beobachteten Athemnoth steht. Wo man wegen der heftigsten Dyspnoë bedeutende Membranbildung erwartet, findet sich nur ein beschränkter, flüchtiger Belag, und umgekehrt, wo der Krup weniger schreckliche Symptome hervorrief, zeigen sich bei der Section oft der ganze Larynx, die Trachea und die Bronchien mit messerrückendicken, röhrenförmigen Membranen ausgekleidet. Es scheint demnach mehr auf den Grad der ödematösen Schwellung, die die Schleimhaut der Stimmritze befällt, als auf die übrige Membranbildung anzukommen. Die Glottisschwellung entgeht aber dem pathologischen Anatomen meistens wegen der unbedeutenden Veränderung der Form.

Gegen den Krampf der Stimmritze liefert Schläutmann triftige Einwürfe. Er nimmt an, dass bei einer derartigen Schleimhautentzündung eine Lähmung der darunter liegenden Muskeln durch collaterales Oedem stattfindet und vergleicht den Krup mit den Symptomen, die man bei Thieren nach Durchschneidung der Nn. vagi beobachtet. Auch hier tritt die ernsteste Athemnoth, Mitwirkung sämtlicher respiratorischer Hilfsmuskeln, lang gezogene, von einem Geräusche begleitete Inspiration und kurze Exspiration ein. Auch der tiefe, rauhe, heisere, oft überspringende Ton der Stimme und des Hustens spricht vielmehr für eine Lähmung als einen Krampf der Stimmritze; bei letzterem sind die Stimmbänder in höchster Spannung und es könnten somit nur hohe Töne entstehen und keine rauhen, tiefen. Die Glottisspalte erweitert sich bei jeder Inspiration durch Muskelcontraction; bei dieser aufgehoben, so flottirt sie wie ein loses Segel hin und her und Blosslegung der Glottis nach Durchschneidung der N. vagi hat ergeben,

dass sich die gelähmte Glottis bei jeder Inspiration verengt, und zwar um so mehr, je kräftiger diese ist. Die Dyspnoe ist daher bei Thieren nach Lähmung der Kehlkopfsmuskeln am grössten, wenn das Thier zu tiefen Inspirationen gereizt wird. Aehnlich verhält es sich mit der Respiration der Krupkinder. So lange das Kind ruhig athmen darf, ist sie nicht so sehr gehindert, beim Husten, Weinen und Erwachen aus dem Schlafe, wobei immer tiefe Inspirationen erfolgen, schliesst sich die gelähmte Glottis und es beginnen die Symptome der heftigsten Dyspnoe. — So wäre denn die ältere Ansicht vom Krampf der Stimmritze durch diese Schlautmann'schen Angaben ziemlich beseitigt und muss der Lähmung weichen, wenn nicht weitere physiologische Versuche dieser Entdeckung eine andere Deutung zu geben vermögen.

So frappant die Krupersymptome sind, so ist die Diagnose doch keineswegs leicht zu stellen und es kommen hier mehr als in irgend einer andern Krankheit wissenschaftliche und unwissenschaftliche Täuschungen vor. Zur Constatirung eines echten Krupes gehören 1) die Symptome des anhaltenden Fiebers, heisse, trockene Haut, schneller Puls, Appetitmangel und gemüthliche Verstimmung, 2) Kruphusten, 3) Heiserkeit, 4) lautes Krupathemen und 5) Stimmstille. Die hinteren Partlien der Mundhöhle brauchen hierbei nicht verändert zu sein, bei Diphtheritis sind sie aber gewöhnlich mit weissen inelförmigen Exsudaten bedeckt. Wenn eines dieser oben aufgezählten Symptome fehlt, namentlich wenn das Fieber nicht deutlich ausgesprochen ist, so haben wir keinen Krup, sondern eine einfache catarrhalische Laryngitis ohne gefährliche Schleimhautschwellung, einen sogen. Pseudokrup vor uns, von dem aus allerdings nach mehreren Tagen noch Uebergänge zu dem vollkommenen Krup eintreten und auch zum Tode führen können. Es ist das wahrscheinlich die Form, wo in der Leiche keine Membran, sondern nur dicker, süßer Schleim, Rötung und Schwellung der Larynxschleimhaut gefunden wird, bei Lebzeiten aber die Symptome nicht minder heftig waren, als bei der membranösen Form.

Aus dem Mangel an Uebereinstimmung zwischen den Symptomen und dem pathologisch-anatomischen Befunde scheint mir hervorzugehen, dass der Krup keine locale Larynxkrankheit, sondern eine allgemeine Erkrankung, vielleicht eine Intoxication, mit Localisation auf den Kehlkopf ist und dass sich die Larynxerscheinungen zum Gesamtbilde ungefähr verhalten müssen, wie das Typhusgeschwür zum Abdominaltyphus. Ein weiterer Beweis, dass die Diphtheritis wenigstens keine fötliche Erkrankung ist, lässt sich aus der Membranbildung auf Vocicaterenden am Sternum entnehmen. Setzt man nämlich einem solchen Krupkranken nach der Methode Luzzinsky's ein Vocicum, so bedeckt sich dasselbe ein- bis zweimal täglich mit einer Membran, die der grösste Aehnlichkeit mit jenen diphtheritischen Ablagerungen auf der Schleimhaut hat. Auch ist es nur bei dieser Anschauung erklärlich, wie eine frühzeitig und geschickt ausgeführte Tracheotomie so regelmässig ohne allen Erfolg sein kann, denn die geringen Folgen, welche dieser operative Eingriff in andern Larynxkrankheiten zu veranlassen pflegt, können unmöglich die Schuld an dieser Resultatlosigkeit im Krup tragen.

Vorkommen und Verlauf.

Was das Auftreten des Krups betrifft, so ist der diphtheritische, der sich besonders bei Massern einstellt, entschieden ansteckend und ergreift sehr häufig nach einander mehrere Kinder einer Familie; bei der einfachen fibrinösen Auflagerung wird diese Contagiosität nicht beobachtet. Bei scharfen, kalten Nard- und Ostwinden und im Winter kommt die letztere Form am häufigsten vor, ich habe sie übrigens schon zu allen Jahreszeiten und unter allen Witterungsverhältnissen gesehen.

Der Krup ist in Deutschland eine ziemlich seltene Krankheit und kommt den beschäftigten Aerzten höchstens einige Mal im Jahre vor, weshalb es auch ungenügend erscheint, wie von so vielen Aerzten von Kruperepidemien gesprochen werden kann. Zum Begriff „Epidemie“ gehört jedenfalls eine Massenerkrankung und diese wird bei uns niemals beobachtet. Die zum Krup disponirende Lebensperiode erstreckt sich vom 1.—12. Jahre, die Mehrzahl der Erkrankungen fällt zwischen das zweite und siebente Jahr. Im Säuglingsalter kommt er ausserordentlich selten vor und es verdienen die Krankengeschichten, denen kein Sectionsbericht beigelegt ist, deshalb weniger Vertrauen, weil eine Verwechslung mit der in diesem Alter so häufigen, spastischen Kehlkopfkrankung sehr leicht möglich ist.

Der Verlauf der Krankheit ist äusserst rasch. Die kürzeste Zeit vom Beginn derselben bis zum Tode, die ich bisher erlebt habe, war 21 Stunden, die längste acht Tage. Der Ausgang ist fast immer tödtlich. Von der reinen fibrinösen Form sah ich noch niemals ein Kind genesen, von der diphtheritischen drei Kinder unter ungefähr 20 bis 25 Kranken. In diesen Fällen erhoben sich die Kinder erst nach mehreren Wochen, am längsten blieb die heisere Stimme und der bellende Ton des Hustens zurück. Von ausgehasteten oder erbrochenen Membranen konnte trotz fortgesetzter Aufmerksamkeit nichts entdeckt werden. Die Symptome milderten sich nach und nach, die Kinder konnten 8—10 Tage nach Beginn der Erscheinungen wieder etwas lauwarme Milch geniessen, ohne Hustenparoxysmen zu bekommen, das Fieber liess nach, die Dyspnoe nahm soweit ab, dass sie sich wieder zurücklegen und einige Stunden der Nacht schlafen konnten. Urin wurde in grösserer Menge mit reichlichem Niederschlag von Uraten gelassen. Die Kinder blieben lange Zeit sehr Mass, abgemagert und läuflich.

Die Frage von den Kruprecidiven kann ich aus eigener Erfahrung nicht beantworten, indem meine drei Genesenen, von denen keines recidierte, natürlich keinen Schluss erlauben. Die erfahrensten Autoren wie Valleix und Guersant sprechen sich gegen die Möglichkeit der Recidive aus, nur Roast erzählt einen Fall, in welchem bei ein und demselben Kinde zwei Mal echter Krup auftrat und beide Male mit Anhaften von Membranen endigte. Wenn manche Mütter erzählen, ihr Kind habe fünf oder sechs Mal den Krup gehabt, so beruht dies jedenfalls auf einem wissenschaftlichen oder unwissenschaftlichen Irrthum des behandelnden Arztes. Ich behandelte die Kinder einer Familie, von denen das älteste in den ersten Lebensjahren sechs Mal den Krup gehabt haben soll. Es wurden von dem damaligen Hausarzte drei Anfälle mit Venasectionen, die anderen drei mit Blutegeln, deren Narben man

noch in grosser Menge am Halse sicht, behandelt und in allen Fällen bekam das Kind mehrere Brochpolver. Die Folge dieser eingreifenden, oft repetirten Behandlung war, dass der Knabe im Wachsthum sehr zurückgeblieben ist, fortwährend krankelt und sich auch geistig sehr langsam entwickelt. Als eines seiner jüngeren Geschwister nach der Meinung der Mutter ebenfalls an Krup erkrankte, wurde ich geholt, und aber nichts als febrile, catarrhalische Laryngitis mit Heiserkeit, Kruphusten und Krupathmen. Auf eine einfache Behandlung mit einer Solutio Kali carbon. 4,0—12,0, nämlich 1 Esslöfel, wichen sämtliche Symptome nach wenigen Tagen, und als im Verlauf von zwei Jahren sich dieses Krankheitsbild noch mehrere Male wiederholte, wurde immer dieselbe Behandlung mit demselben günstigen Erfolge eingeleitet, so dass das Kind in seiner Entwicklung durchaus nicht gehemmt worden ist. Die scharf beobachtende Mutter behauptet, die Krupanfalle ihres älteren Kindes hätten sich in nichts von denen des jüngeren unterschieden, nur habe der ältere immer viel länger gebraucht, bis er sich von seinem Anfalle erholt habe. Sie schirbt, wohl nicht mit Unrecht, diese Verzögerung der Genesung und überhaupt auch die mangelhafte Entwicklung desselben auf die frühere Behandlung.

Die Prognose ist bei einmal entwickeltem Krup fast lethal zu stellen. Am ungünstigsten ist sie beim reinen fibrinösen Krup bisher gesunder, gut genährter Kinder. Dieselben haben durch die kräftige Körperbeschaffenheit hier nur den Nachtheil, dass sie einen oder zwei Tage länger als die schwächlichen Kinder dem Uebel widerstehen, um dann eben so sicher zu Grunde zu gehen. Bei diphtheritischem Krup, namentlich nach Masern, ereignet sich hin und da einmal die Genesung, auf welche die Behandlung, wie wir weiter unten sehen werden, keinen sehr auffallenden Einfluss hat. Wo Collapsus, Cyanose und unzählbarer Puls eingetreten sind, da ist der sichere Tod in kürzester Zeit zu prognosticiren.

Behandlung.

Es gibt mit Ausnahme der Epilepsie wohl keine Krankheit, bei der schon so viele Mittel und Methoden anempfohlen worden wären, als beim Krup, aber nicht nur bezüglich der Mannigfaltigkeit, sondern auch bezüglich der Wirksamkeit findet sich eine merkwürdige Uebereinstimmung zwischen den Mitteln, die gegen diese beiden Krankheiten gegeben werden.

Die ältere Schule unseres Jahrhunderts, die jeden Entzündungskranken für verloren gab, dem nicht eine grössere Quantität Blut gelassen werden konnte, drang natürlich bei der acuten aller Entzündungen, dem Larynxkrup, auf Venesection und Blategel. Man gieng so weit, sogar die Jugularvenen zu öffnen, weil aus denselben nicht Blut zu bekommen sei, und nur die Schwierigkeit der Blastrilung bewirkte, dass diese Behandlung keine weitere Verbreitung fand. Bei dem Adelsaase rechnete man für jedes Lebensjahr 40,0 CC. Blut, die Blategel wurden immer in doppelt so grosser Menge gesetzt, als das Kind Jahre zählte und man zog die Gegend des Sternum der des Halses vor, weil an letzterer keine Compression stattfinden konnte und deshalb die Blutungen oft schwer zu beherrschen waren. Ueber die Wirkung der Venesectionen kann ich aus eigener Erfahrung nicht

sprechen, indem ich niemals ein Krupkind auf diese Weise habe behandelt sehen. Sie sind aber jetzt auch von den Anhängern der Blutentziehung als unsittlich verlassen. Die Wirkung der Blutegel hingegen habe ich schon oft beobachtet und muss offen gestehen, dass sie entschieden Schaden bringen. Die Kinder ängstigen sich sehr und sträuben sich nach Kräften gegen deren Application, die Athemnoth und die Stickenfälle werden durch diese Aufregung aber vermehrt als vermindert, und regelmässig tritt rascher Collapsus ein. Hat man sich aber in der Diagnose getäuscht, was leicht geschehen kann, da ein frühzeitiges Aussetzen ein Hauptbedingnis eines guten Erfolges sein soll, so verzögert man durch die Blutegel nur die Reconvalescentz. Die Laryngitis catarrhalis vergeht auch ohne sie.

Die Brechmittel gegen Krup haben bei der grössten Zahl der Aerzte fortwährend entschiedenen Beifall gefunden, obgleich die Deutung ihrer Wirkung und hiemit auch die Dosirung und Anwendungsweise vielfach verschieden waren. Während die Einen in den das Brechen erzeugenden Mitteln, also im Tartar. stib., im Cupr. sulfur. oder auch in der Ipecacuanha spezifische Wirkung suchten, sahen die Andern den dadurch erzeugten Brechakt als das Essentiellste der ganzen Behandlung an, gleichviel auf welche Weise derselbe zu Stande gekommen. Die Anhänger der ersteren Ansicht stritten sich lange herum, ob der Brechweinstein oder das schwefels. Kupferoxyd, der Acon oder endlich das schwefelsaure Zinkoxyd das beste Mittel wäre, ob man in ganzer oder in redacta dosi angreifen müsse etc. Es kamen hier mannigfache Extravaganzen und raffinierte, mühselige Qualereien der armen Krupkinder vor, die in ihren letzten Lebenstagen neben der fortwährenden Athemnoth noch mit einem ebenso unerträglichen Zustand, mit beständiger Ueblichkeit, mit einer künstlich erzeugten Seeskrankheit zu kämpfen hatten. Es lässt sich dagegen nichts einwenden, dass man bei der anerkannten Wirkungslosigkeit der früher versuchten Mittel auch diese Methoden an einer Reihe von Kindern versuche, Unrecht aber ist es, jetzt, nachdem die Nausea hinlänglich als unwirksam erkannt worden, sie in kleiner Dosis immer wieder fort zu rücken.

Man hat auch behauptet, dass die Krupkinder schwer erbrechen und dass sie hierzu grosser Dosen bedürften. Es bezieht sich diese Behauptung aber nur auf das der Agone kurz vorausgehende Stadium des Krupes, wo der Puls kaum mehr zu zählen und Collapsus eingetreten ist. Am Anfange der Krankheit erbrechen sie auf alle Brechmittel so gut wie die anderen Kinder und es genügt ein Infus. Ipecac. (4,0 — 30,0) vollkommen, dasselbe zu bewirken. Es kann nicht geleugnet werden, dass der Brechakt, 1—3 Mal wiederholt, oft einen sehr günstigen Einfluss auf die Athemnoth hat, indem dadurch jedenfalls die leicht löslichen Belege schleimiger und membranöser Natur aus dem Kehlkopf ausgestossen werden. Freilich ist hidurch noch keine Heilung gesichert, denn die Anschwellungen erheben sich gewöhnlich wieder und die frühere Athemnoth stellt sich mit allen sie begleitenden Symptomen von neuem ein. Auch wenn keine Membranen mit dem Brechen entfernt werden, bemerkt man doch in vielen Fällen momentan Verminderung der Dyspnoe, so dass der Brechakt auch einen günstigen Einfluss auf die entzündliche Schwellung der Stimmritze selbst zu haben scheint. Für 1—2malige Brecherregung genügt die Ipecacuanha

vollständig, die später nachgegebenen grossen Dosen von Brechstein oder Kupfervitriol bewirken wohl auch Erbrechen, schaffen aber selten mehr Erleichterung, sondern führen rasch zum Collapsus. Das Ipecacuanha-Pulver hat ausserdem, dass die Kinder es verdrüsselt ohne Sträuben nehmen, nach den Vortheil, dass es viel saltener Diarrhöe macht als jene Metallsalze. Ich gebe gewöhnlich, sobald ich zu einem entwickelten Krup komme, 1–2 Mal ein derartiges Brechmittel, halte es aber für eine unnütze Quälerei, den Kindern Tage lang hindurch Ueblichkeiten zu bereiten.

Die Kalischwefelleber galt eine Zeit lang als Specificum gegen Krup und scheint sich ihren Ruhm hauptsächlich dadurch erworben zu haben, dass einer der Napoleonischen Feldbewerber, der seine Arbeit anonym einschickte, sie als einziges Mittel bei allen Krupfällen anzuwenden rath. Die Unwirksamkeit dieses Mittels hat sich in so vielen Fällen herausgestellt, dass man jetzt wieder allgemein davon abgesehen ist. Die Dosis war stündlich 0,03 – 0,12. — Das Quecksilber ist nach den Brechmitteln das am spätesten angewendete Mittel. Die graue Salbe wird auf den Hals und grössere oder kleinere Flächen des Thorax geschmiert, das Calomel gibt man in grossen oder kleinen Dosen innerlich. Wenn man die eigenthümliche resecirnde Wirkung der Quecksilberpräparate auf die entzündete Larynxschleimhaut anzuwenden versucht, so ist dies jedenfalls eine ganz rationale, durch mannigfache Analogien gestützte Handlungsweise, wenn man aber das Calomel in grossen Dosen bloss gibt, um eine Ableitung auf den Darmkanal zu bewirken, so kann man diesen Zweck viel unschädlicher durch Mithelöl oder kleine Dosen drastischer Arzneikörper erreichen. Von den wenigen Fällen, die ich mit Quecksilber ausserlich und innerlich behandelte, gemasse zwei. Bei dem ersten Falle, einem 5jähr. Mädchen, wurde innerlich Calomel 0,6 in Dosen von 0,03 gegeben und der Hals mit grauer Salbe eingerieben. Ausserdem wurde das Kind aber mit Blutegeln und Brechmitteln mehrfach bedacht, so dass die Beobachtung keine reine genannt werden darf. Bei dem zweiten Kinde, einem 2jähr. Knaben, bei welchem die Larynxentzündung sehr hochgradig war und massenhafte, diphtherische Belege an den Mandeln sich zeigten, wurde ausser der internen Behandlung mit chloreaurem Kali nichts versucht als sehr reichliche Einreibungen mit grauer Salbe. Das Kind wurde stündlich am ganzen Leibe eingerieben, so dass täglich mehr als 30,0 vier Tage hindurch verschmiert wurden. Da fortwährend chloreaures Kali gereicht wurde, trat weder Speichelfluss noch Stomatitis ein, der Husten wurde lockerer, die Membranen an den Mandeln lösten sich ab und das Kind, das schliesslich enorm anämisch geworden war, ganz nach einigen Wochen vollständig.

Die kohlensauren Alkalien sind wegen ihrer lösenden Eigenschaft, die sie auf alle animalischen Stoffe, also auch auf die Krupmembranen ausüben, längst gegen Krup empfohlen. Wellweg, Voss, Dorfmueller, Egger, Hufeland und mehrere Aerzte haben sich schon zu Gunsten derselben erklärt und neuerdings ist Luxsinsky in Wien als specieller Vertheidiger des Kali carbonicum aufgetreten. Er gibt das kohlensaure Kali zu 2,5 bis 4,0 pro die in Lösung und schreibt ihm specielle Wirkung zu. Seine Therapie besteht darin: 1) der

krankhaften Blutmischung durch kohlensaures Kali entgegen zu wirken, 2) der Localisirung im Kehlkopf durch ein in Eiterung erhaltenes Vesicans am obersten Theile des Sternums vorbeugen, 3) die Athemnoth und die Hostenparoxysmen durch Opium zu mässigen und 4) die schon bestehenden Membranen mit Höllenstein zu ätzen oder durch Emetica heraus zu befördern.

Wenn ich nun auch die spezifische Wirkung des kohlensauren Kali's nicht bestätigen kann, indem ich von fünf ganz rein nach Luxsinsky's Methode behandelten Kindern nur eines retten konnte, so hat die Letztere vor der früheren Behandlungsweise mit Blutegele und Nauseos doch den Vorzug, dass die Kinder dabei wenig oder gar nicht gequält werden und dass jedenfalls ebenso viel, wahrscheinlich aber mehr Kinder dadurch erhalten werden.

Die übrigen Behandlungsweisen mit Chinin, mit grossen Dosen narkotischer Mittel, die hydropathische Methode etc., von denen jede ihre Lobredner und Schmäher in hinreichender Menge hat, habe ich nicht selbst versucht und enthalte mich deshalb eines bestimmten Urtheiles hierüber.

Die örtliche Behandlung hat auch schon mannigfache Variationen erfahren. Die einen binden den Hals mit trockner Wolle ein, Andere mit feuchten warmen Tüchern oder mit feuchten Waschwässern oder gar mit in Milch gekochten Schwalbennestern (ein berühmtes Volksmittel). Andere lassen den Hals beständig mit einer Schläuche Fett aus allen möglichen Thierklassen bedecken. Andere wenden verschiedene Hautreize an und wieder Andere behaupten, die Athemnoth sei am geringsten, wenn Hals und Brust ganz entblösst wären. Die französischen Aerzte legen auf Bretonneau's Aetzung des Larynx fortwährend grossen Werth. Man bedient sich hierzu eigener Fischbeinstäbchen, an welche vorne ein erbsengrosses Schwämmchen befestigt ist, dasselbe wird in eine Höllensteinlösung (1,0—4,0 auf 300 Wasser) getaucht und dann in den Pharynx gebracht, nachdem die Zunge mit einem Spatel möglichst tief niedergedrückt worden. Am längsten verweilt man auf dem Kehlkopf und sucht durch Andrücken des Schwämmchens auf denselben die Höllensteinlösung zu entleeren. Vor Aetzung des Larynx selbst und vor Eindringen zwischen die Stimmbänder braucht man nicht speciell zu warnen, denn es gehört hierzu eine spontane tiefe Inspiration, bei der sich der Kehlkopf hoch nach oben begibt, wozu sich die Kinder mit dem Höllensteinschwämmchen im Munde kaum jemals verstellen dürften. Die Höllensteinlösung hat einen entschieden günstigen Einfluss auf die von ihr berührte, entzündete Schleimhaut, die in 24 Stunden in der Regel ihre Membranen abstösst und oft sich nicht mehr mit neuen bedeckt. Bei wirklichem, fibrinösem Krop habe ich aber keinen Erfolg von der Cauterisation der meist intakten Pharynxschleimhaut gesehen. Ausser der Höllensteinlösung hat man Alumpulver, rothen Präcipitat (1 Theil auf 12 Theile Zucker), Cuprum sulfurium, ungereinigte Schwefelblumen und Calomel in den Pharynx eingeblasen. Alle diese örtlichen Methoden sind jetzt mit Recht von den Inhalationsapparaten verdrängt worden. Die Application der Medicamente auf die Kehlkopfschleimhaut geht hier in der schonendsten Weise von Statten. Unter allen zur Inhalation verwendeten Mitteln gebührt dem Kalkwasser weitaus der Vorzug, und

ich sah unter dieser lokalen Behandlung bei innerlicher Darreichung von chlorsaurem Kali einmal eine vollständige Genesung von einem schweren, diphtheritischen Krup eintreten. Wenn die Kinder nicht in Gase dahin gebracht werden, freiwillig alle Stunden fünf Minuten lang zu inhaliren, so darf man sich keinen Erfolg versprechen. Eine zwangweise ausgeführte Inhalation regt zu sehr auf und ist mit zu grossen Schwierigkeiten verbunden, als dass sie stündlich repetirt werden könnte.

Die Luft, in welcher ein Krupkind sich befindet, sei rein und feucht, was durch häufiges Lüften und durch öfteres Verdampfen von Wasser in flachen Gefässen am besten bewerkstelligt wird.

Als Resume des bisher Angeführten lasse ich die Kurmethoden der Hauptantrittsstellen folgen, ohne dabei mich für die Zweckmässigkeit der einzelnen Mittel zu verbürgen:

1) **Jurine.** Im ersten Stadium Blüthenziehung nach dem Grade des Uebels und dem Stande der Kräfte; nach der ersten Blüthenleerung leichte Brechmittel, mit diesen in gebrochenen Gaben während des zweiten Stadiums (bei Athemnoth und Stückenfällen) fortzuführen. Bei Zunahme des Uebels überdiess Senfteige und Blasenpflaster auf Hals, Brust u. s. w. Zur Unterstützung Einathmen erweichender Dämpfe. In dem zweiten Zeitraum auch Brechmittel in vollen Gaben und später stärkere Expektorationen, nach Umständen Antispasmodica.

2) **Gölis.** Bliesegel, Calmel in grossen Dosen, Einreibung von Ung. einer, auf Hals und Brust; in der Zwischenzeit Salpeter; frühzeitig Blasenpflaster, bei Athemnoth Brechmittel.

3) **Hufeland.** Zuerst dessen *Linctus emeticus*, (0,05 Brechweinstein, 1,20 Ipecacuanapulver auf 75,0 Lösung.) Warme Dämpfe, daneben Salpeter und Klystiere mit 1 Esslöffel Weissessig. Steigen gleichwohl die Athembeschwerden (was eben im wirklichen Krup regelmässig geschieht), *Cuprum sulfuricum* in brechenenerregender Gabe, dann stündlich zu 0,015. Sobald die Erstickungszufälle wieder zunehmen, in voller Gabe, jetzt auch Quecksilbereinreibungen auf den Hals und Hantreize.

4) **Luxsinsky.** Gleich nach gestellter Diagnose ein Blasenpflaster von wenigstens Thalergrösse auf das Manubrium sterni. Innerlich Solut. Kali carbon. 4,0—120,0 in 24 Stunden zu verbrauchen. Die Vesicatorwunde mit epispastischem Papier bedeckt und möglichst lang in Eiterung erhalten. Bei grosser Athemnoth kleine Dosen Morphinum; nach heftigen Stückenfällen ein Brechmittel. Cauterisation des Pharynx mit Höllensteinlösung.

Diese letztere Methode hat mit Ausnahme des Vesicatore den grossen Vorzug, dass den Kindern keine neuen Qualen bereitet werden.

5) **Forcirtе Schmerzcuren** mit Ung. einer, täglich 30,0. Stündlich eine Inhalation mit Kalkwasser, täglich 4,0 Kali chloric. In der Neuzeit die beliebteste und glücklichste Methode.

Schliesslich einige Worte über die Tracheotomie. Der Gedanke, bei Menschen, die in Folge einer Unwegsamkeit des Larynx am Erstickenden sind, der Luft durch eine Oeffnung in der Trachea Zugang zu verschaffen, ist sehr alt und, was den Krup betrifft, so alt fast als die Kenntnisse vom Krup selbst, indem schon Home 1765 diese Indication aufgestellt hat. Seit jener Zeit wurde die Operation von Zeit zu Zeit

ausgeführt, aber immer mit Unglück, so dass die Preishewerber 1807 erst einen einzigen günstigen Fall von Andren, wobei aber die Diagnose zweifelhaft gewesen sein soll, auführen konnten. Brotauneau brachte 1821 die Operation wieder in Schwung und seit jener Zeit wird sie von einzelnen französischen Aerzten fortwährend ausgeübt und verteidigt, wobei jedoch zu bemerken ist, dass die meisten Operationen in den Kinderspitälern, wo ansteckende Diphtheritis herrschte, gemacht wurden, dass also an Krup-Kranken operirt wurde, von denen überhaupt eine ziemliche Anzahl auch ohne Tracheotomie genest. Troussseau hat bis zum Jahre 1842 119 Mal operirt und darunter 25 Mal Genesung erzielt, dann wurde das Prinzip aufgestellt, man müsse sehr frühzeitig operiren, worauf das Verhältniss so günstig sich gestaltete, dass unter 24 Operationen 14 Heilungen vorkamen. Nach einer anderen Zusammenstellung von Ivambert genasen unter 216 operirten Krupkindern 47 oder 22%. Das Schlimme hierbei ist, dass die Chirurgen verlangen, die Operation müsse sehr frühzeitig vollführt werden, und dass die Pädiatriker und also noch viel weniger die Chirurgen am ersten und zweiten Tage der Erkrankung eine krupöse Laryngitis von einer catarrhalischen nicht unterscheiden können. In Deutschland erheben sich zwar vereinzelt Stimmen, z. B. von Roser und Paisavant, für die Operation, die deutschen erfahrenen Kinderärzte aber und selbst die meisten deutschen Chirurgen machen die Tracheotomie bei Krup nicht. In England ist man allgemein dagegen und auch in Frankreich beginnt, scheint es, eine Reaktion, indem Bouchut (*Gaz. médic.* 1858, Nr. 41) veröffentlicht hat, dass auf 1000 Einwohner von Paris die Zahl der Todesfälle durch Krup von Jahr zu Jahr zunehme und sie so gross war, als im letzten Decennium. 1853 starben zweimal so viel Kinder an Krup als 1837 und in einem Mittel aus den Jahren 1847—1858 fünfmal so viel als 1838, während nach einer approximativen Berechnung nicht fünfmal so viel Erkrankungen an Krup vorgekommen sind. Es gilt direkt der jetzigen örtlichen Behandlung, dem Aetzen und der Tracheotomie, die Schuld an dieser grösseren Mortalität. Der Grund, warum bei uns in Deutschland und dann in England die Operation so wenig Anklang findet, ist wohl der, dass wir eben wenig diphtheritische, sondern mehr ächte fibrinöse Krupkrankungen zu behandeln bekommen.

Die Operation selbst ist durchaus kein lebensgefährlicher Eingriff, und wird nach Troussseau auf folgende Weise ausgeführt:

Das Kind wird auf einen Tisch gelegt und unter die Schultern kommt ein zusammengeraltes Kissen, das nur bis zum Hals reicht, so dass der Kopf etwas nach hinten überhängt und die Luftröhre gehörig vorspringt. Man macht nun einen Längsschnitt von 4 Ctm. Länge, der am Ringknorpel beginnt und gerade nach abwärts geführt wird. Man setzt nun zu beiden Seiten feine, spitze Haken ein und zieht die Venen möglichst, indem man sie durch die Haken abziehen lässt. Liegt endlich die Trachea frei zu Tage, und zwar in einer Ausdehnung von wenigstens 3—4 Luftröhrenknorpeln, die an ihrer weissen Farbe und grösseren Resistenz zu erkennen sind, so nimmt man ein geknöpfes Bistouri, den Dilator und die doppelte Canüle, eigens für die Tracheotomie gefertigt, zur Hand. Man macht hierauf einen Einstich in die Trachea, erweitert die Öffnung mit dem ge-

knüpfen Bisturi und dem Dilatator und führt alsdann die Canüle ein, indem man sie zwischen den geöffneten Branchen des Dilatators durchschiebt. Hat man sich überzeugt, dass die Luft durch die Canüle geht, so zieht man den Dilatator zurück, befestigt die Canüle mittelst ihrer Schnüre und setzt das Kind, das man plötzlich frei athmet, wieder auf.

Als tödtliche Zufälle während der Operation bespricht *Trousseau* vor Allem die Blutung. Venenblutungen werden einfach mit dem Fingern comprimirt und stehen, sobald die Canüle eingebracht worden; arterielle Blutungen müssen natürlich durch Unterbindung gestillt werden. Die Angst vor dem Eindringen des Blutes in die Trachealwunde scheint übrigens etwas übertrieben zu sein, indem ja bei Hämoptyeekranken jedenfalls auch grössere Mengen Blut in der Trachea und den Bronchien bleiben, ohne besondere Erstickungsanfälle zu veranlassen.

Ohnmacht tritt sehr häufig nach der Operation ein und ist bedingt durch die plötzliche cerebrale Circulationsstörung in Folge der frei gewordenen Respiration. *Trousseau* sah sie einmal eine Stunde währen, aber noch nie tödtlich endigen.

Hebt sich die Respiration nach vollendeter Operation nicht, so ist die Canüle durch Blutcoagula oder Pseudomembranen verstopft und es müssen dieselben mittelst geeigneter Pinzetten entfernt werden.

Bei der Nachbehandlung ist das grösste Augenmerk auf die Canüle zu richten. Man bedeckt die Wunde mit Wachstafel, der in der Mitte ein Loch hat zur Aufnahme der Canüle, führt eine zweite Canüle in die erste ein, damit zum Behuf der Reinigung am ganzen Verbands nichts gestört zu werden braucht, und bindet ein leichtes Tuch um den Hals, wodurch die Luft nicht so direkt mit der Trachealschleimhaut in Berührung kommt, sondern erst, nachdem sie durch das Tuch von Staub gereinigt ist. Die innere Canüle muss alle 3—4 Stunden herausgenommen und gereinigt werden. Ein einziges Mal konnte *Trousseau* schon am vierten Tage die Canüle definitiv herausnehmen, einige Male am sechsten und achten, gewöhnlich zwischen dem zehnten und dreizehnten, einmal erst nach 42 und einmal nach 53 Tagen. Niemals blieb eine Luftröhrensonde zurück.

Unmittelbar nach der Operation trinken und essen die Kinder ohne Beschwerde. 4—5 Tage später aber stellt sich ein spasmodischer Husten ein, so oft die Kinder trinken, und es kommt ein Theil des Getränkes zur Canüle heraus, ein Beweis, dass die Epiglottis nicht mehr so exakt zu funktionieren vermag als in gesunden Tagen. Dieser Zustand dauert 1—2 Wochen und hebt sich dann von selbst. Bei stärkeren Stickenfällen verbietet *Trousseau* alle füssigen Nahrungsmittel.

So viel von der Ausführung dieser ungünstigsten aller Operationen, auf welche ich für meinen Theil niemals dringe, sondern mich lediglich nicht widersetze, wenn sie von andern Collegen, oder noch besser von den Eltern selbst, vorgeschlagen wird.

Nehmen wir an, dass alle Kinder, die operirt wurden, schon Krup hatten, so ist das Genesungsverhältniss von 22%, dennoch ein enorm ungünstiges, zumal die operirten Kinder grössten Theils an der leichteren diphtheritischen Form erkrankt waren. Bedenken wir ferner, dass die übergrösse Mehrzahl erfahrener Praktiker die Operation bei Krup gänzlich verwerft, dann, dass wir einigen Grund haben, den Krup

als eine Allgemeinerkrankung mit Localisirung auf den Kehlkopf anzusehen, so müssen wir von dieser Operation abrathen und schliessen mit folgenden Worten des alten Galis: *Ad tracheotomiam, omnium remedium incertissimum confugere res ardua est: parentes abhorrent, avertantur agnati et periclitatur medici fama, quem infamata si fuerit operatio ac votis illudens, lacrymis multis velut homicidam proles amatae detestantur parentes.*

2) Pseudokrup. Laryngitis catarrhalis.

Wenn ein Erwachsener sich einen Larynxcatarrh zuzieht, so wird er heiser, bekommt Kitzeln und Kratzen im Kehlkopf und hustet dabei, Athemnoth und Stickenfälle kommen aber in der Regel nicht vor. Erkrankt hingegen ein Kind an einer einfachen, catarrhalischen Schwellung der Larynxschleimhaut, so treten alsbald heftige Respirationstörungen ein, die ihren Grund in der Enge der kindlichen Stimmritze haben. Es scheint im Kehlkopf des Kindes zwischen Schleimhautschwellung und Weite der Stimmritze ein anderes Verhältniss zu bestehen als bei Erwachsenen. Während die Stimmritze der letzteren einen gewissen Grad von catarrhalischer Infiltration noch verträgt, ohne dass beträchtliche Athemnoth entsteht, so kommt es sehr häufig vor, dass Kinder, die kaum merklich heiser sind, plötzlich Stickenfälle bekommen und vorübergehend eine täuschende Ähnlichkeit mit wirklichem, fibrinösem Krup bieten.

Symptome.

Die Kinder haben einen ganz einfachen Catarrh der Nase oder der Bronchien oder beider zugleich, sind den ganzen Tag über heiter, essen mit dem gewöhnlichen Appetit und sind, einiges Niesen und Husten abgerechnet, in vollkommen physiologischem Zustand. Sie schlafen zu rechter Zeit ein, husten vielleicht etwas im Schlafe oder schnarchen ungewohnter Weise, plötzlich aber wachen sie mit einem completen Krupanfall auf. Es tritt sogleich Kruphusten, vollkommene Heiserkeit, Krupathemen und ein sehr heftiger Stickenfall ein, so dass kein Mensch im Stande ist, diese Erkrankung vom echten Krup zu unterscheiden. Es stellt sich auch dieselbe Angst und Beklemmung ein, die Kinder richten sich auf, das Gesicht wird geröthet und der Puls bedeutend beschleunigt. Nachdem dieses Bild eine, längstens zwei Stunden gedauert hat, lassen die Symptome nach, das Athmen und die Stimme verhalten sich zwar noch wie bei dem echten Krup, die Kinder legen sich aber wieder zurück, verlangen zu trinken und schlafen alsbald wieder ein, worauf ein allgemeiner Schweiß eintritt. Der gewöhnlich erst jetzt herbeieilende Arzt findet ein ganz gesundes, schlafendes Kind mit leicht schnarchender Respiration, das sehr ungeduldet über die neue Störung seiner Nachtruhe aufwacht. Selten erfolgen in einer Nacht zwei oder mehrere Anfälle, oft bleibt ein solcher Anfall ganz isolirt, gewöhnlich aber wiederholen sie sich in den folgenden Nächten und kehren auch noch wieder, nachdem sie mehrere Tage und selbst Wochen ausgeblieben waren. Nach dem Anfall bleibt gewöhnlich etwas Heiserkeit, ein heßender Husten und lautes Schnarchen im Schlafe zurück, die Hauttemperatur kann an Stirn und Händen wohl

etwas vermehrt sein, wirkliches Fieber mit allgemeinem Unbehagen und grössere Abgeschlagenheit kommt jedoch nicht vor. Die Kinder verlangen ausser Bett und geniessen ihre Mahlzeiten, wenn auch nicht mit vollem Appetit. Eigenthümlich ist, dass unter Tags niemals heftige Anfälle erfolgen, was seinen Grund in grösserer Empfindlichkeit des Larynx gegen sich ansammelnde Schleimmassen haben dürfte. Dieselben erzeugen, sobald sie in einiger Menge vorhanden sind, einen Hustenreiz und werden noch rechtzeitig aus dem Larynx in den Pharynx gehustet, während sie bei Nacht länger liegen bleiben und dann endlich heftige Reflexerecheinungen hervorrufen.

Die ganze Dauer der Krankheit ist 3—8 Tage. Der gewöhnliche, fast constante Ausgang ist der in Genesung, es können aber auch Fälle vor, in denen die Kinder mehrere Tage lang deutliche catarrhalische Laryngitis zeigen und doch endlich unter allmählicher Zunahme der Allgemeinerkrankung in den ächten Krup übergehen, der dann auch meistens mit dem Tode endigt. Bei der Section findet man in diesen Fällen gewöhnlich keine Membranen, sondern bloss eine beträchtliche Schwellung, zum Theil auch Röthung der Larynxschleimhaut und auf derselben so wie auf der Trachea und dem Pharynx einen dicken, zähen Schleimbeleg.

Zu Recidiven ist der Pseudokrup sehr geneigt, wie schon aus den vielfachen Erzählungen Erwachsener erhellt, die in ihrer Jugend sechs und sehr Mal den Krup gehabt haben wollen. Am häufigsten befällt er Kinder, die mit dem Durchbruch der letzten Backenzähne ungesund, versichert aber auch grössere nicht, während bei kleinen Kindern, die noch an den Schneidezähnen laboriren, die spasmodische Form der Larynxerkrankung ohne allen Catarrh die häufigere ist. Uebrigens gibt es auch Uebergangsformen, bei denen sehr schwer zu entscheiden ist, ob man es mit einem einfachen Glottiskrampf zu thun hat. Erst die Heiserkeit der Stimme und der Krupten des Hustens in den Intervallen lassen die Diagnose für diese oder jene Form feststellen, indem diese Symptome bei reinem Stimmritzenkrampf niemals vorkommen. Vom ächten Krup unterscheidet sich der Pseudokrup auch nur durch die Intervalle. Während bei letzterem am Tage die Stimme voll heiser und der Husten mit dem Krupten behaftet ist, so wird doch das Fieber und die Allgemeinerkrankung niemals Besorgniss erregend, die Kinder stehen auf, sind munter, gehen an ihr Spielzeug und nehmen auch einige Nahrung zu sich. Von alledem ist im ächten Krup aber das Gegentheil der Fall, und die Larynxsymptome sind bei diesem jederzeit viel ausgesprochener.

Behandlung.

Der Pseudokrup darf auch in seinen leichtesten Formen niemals leicht genommen werden; denn es können ganz allmähliche Uebergänge zum ächten Krup vor, nach dessen tödlichem Ende die kleinste Vernachlässigung der ersten Heiserkeit als Ursache desselben angeschuldigt wird. Man halte die Kinder in vollkommen gleicher Temperatur, binde den Hals ein und reducire sie auf Milchkost und einfache Suppen. Die feuchten Umschläge um den Hals wirken, wenn sie richtig und aufmerksam gemacht werden, sehr günstig. Es gehört aber dazu, dass die feuchte Cravatte sehr schnell ist, mit Guttapereba-Taffet über-

deckt und mit einem breiteren, trockenem Tuche so an den Hals angehängt ist, dass das Wasser des feuchten unteren Tuches nicht so schnell verdunstet und eine partielle Abkühlung des Halses erzeugt, wodurch gewöhnlich die Heiserkeit vermehrt wird. Diese Gefahr einerseits und andererseits die Ueberzeugung, dass die feuchte Cravatte nicht unbedingt notwendig ist, veranlassen mich, sie überall da wegzulassen, wo nicht eine specielle, erfahrene Waisfrau die Pflege des Kindes übernommen hat. Inaetlich gebe ich gewöhnlich die *Solutio Kali carbon.* (0,5—1,0 auf 100,0 Wasser) und lasse die Kinder möglichst viel trinken, weil erfahrungsgemäss eine Anregung der Diuresis und Diaphoresis eine Verminderung des catarrhalischen Secretes auf der Respirationsschleimhaut veranlasst. Zu Brechmitteln wird man sich nur selten gezwungen sehen.

3) Neurosen des Kehlkopfes.

Motilitätsstörungen der Kehlkopfmuskeln kommen im ersten Kindesalter ziemlich häufig und fast ausschliesslich nur in diesem vor. Beide Formen, der Krampf und die Lähmung, werden beobachtet, der erstere aber ist viel häufiger als die letztere. Im Allgemeinen muss gleich vorausgeschickt werden, dass alle jene Kehlkopffunctionen ausgeschlossen werden müssen, bei welchen irgend Symptome von materieller Veränderung der Schleimhaut nachweisbar sind, denn da hierbei immer die Kehlkopfmuskeln alterirt werden und Veränderungen in der Stimme, in der Art zu athmen und zu husten, sich einstellen, so müsste man alle Kehlkopfkrankheiten, die es überhaupt gibt, bei den Neurosen abhandeln. Bei den geringen Abweichungen von der normalen Beschaffenheit, welche in der Leiche eine pathologisch veränderte Schleimhaut bietet, ist es in manchen Fällen schwer zu entscheiden, ob der Tod in Folge einer reinen Neurose oder einer Schleimhautschwellung, eines Glottisödemes, eingetreten ist.

a) Spasmus glottidis.

Dass die Stimmritze sich krampfhaft contrahiren kann, unterliegt keinem Zweifel. Es kann dies durch Vivisektionen experimentell nachgewiesen und anatomisch durch die Ansatzpunkte der Glottismuskeln begründet werden. Die Muskeln, welche hierbei in Betracht kommen und vom *N. recurrens Vagi* abhängen, sind 1) die *Mm. thyroarytaenoides*, 2) die *Mm. cricoarytenoides laterales* und 3) der *M. arytaenoides transversus*.

Man kann eine acute und eine chronische Form unterscheiden. Es gibt Glottiskrämpfe, bei denen schon nach wenigen Anfällen der Tod durch Erstickung erfolgt, und wieder andere, die Monate lang dauern und nach längeren Pausen recidiviren können. Die Schriftsteller des vorigen und dieses Jahrhunderts, aus früheren Zeiten datiren keine präzisen Berichte hierüber, welchen in ihren Anschauungen dieses Zustandes auffallend von einander ab und haben deshalb eine Menge Namen erfunden, die, meist auf ätiologische Momente basirt, eine grosse Verwirrung in den Köpfen der nicht auf eigener Forschung fuessenden Aerzte veranlasst haben. So gab es ein *Asthma acutum et chronicum* Millari, dessen Symptome aber mehr auf anacutem Pseudokrup, als auf

einen reinen Spasmus glottidis passen, — ein Asthma thymicum Kopā, — ein Asthma dentientium — Asthma thymico-cyanoticum — eine Suffocatio stridula — eine Angina stridulosa — Apnoea infantum — Cataplexis pulmonum (Hufeland) — einen Laryngismus stridulus — Phrenoglossismus — Laryngospasmus infantilis — Tetanus apnoicus infantum — und endlich gar einen Cerebralkrup, wovon die Engländer, namentlich Clarke, einen Krup verstanden, bei dem man in der Section den Larynx frei fand und der auf eine freilich nicht nachgewiesene Gehirnerkrankung zurückgeführt wurde.

Symptome.

In allgemeinen Umrissen läßt sich folgendes Krankheitsbild entwerfen. Ganz gesunde, fette Kinder bekommen gewöhnlich während des Zahnungsprocesses einen plötzlichen Sticksanfall. Auf einmal wird das Gesicht stark injicirt, der Kopf nach rückwärts gebogen, der lautlose Mund öffnet sich leicht oder macht schimpfende Bewegungen, die Extremitäten sind steif oder hängen schlaff herab, nach graßen sich die Kinder an den Hals, als wollten sie die Einschränkung heben. Endlich nach einem höchst qualvollen Kampfe von $\frac{1}{2}$ —1 Minute erfolgen einige kurzabgesetzte, pfeifende Inspirationen, mit welchen keine Expirationen abwechseln, worauf dann entweder der ganze Anfall beendet ist und die normale Respiration sich wieder mit einem langgezogenen, laut pfeifenden Athemzuge einleitet, oder ein neuer Sticksanfall mit vollkommen unterbrochener Respiration beginnt. Dieser ganze Vorgang kann sich mehrmals nach einander in Continuo wiederholen, so dass die Kinder erst nach einigen Minuten wieder ganz zu sich kommen. Es ereignet sich derselbe ebenso häufig am Tage wie bei der Nacht, repetirt sich in 24 Stunden 2—40 Mal, und wird namentlich durch tiefe Inspirationen hervorgerufen. Hat das Uebel eine Zeit lang bestanden, so gesellen sich allgemeine Convulsionen zu den Glottiskrämpfen, was von einzelnen Autoren als zweites Stadium bezeichnet wird.

Analysiren wir die einzelnen Symptome genauer, so müssen sie zuerst in zwei Gruppen gebracht werden: 1) in Symptome während des Anfalles und 2) in Symptome in der Zwischenzeit zweier Anfälle.

ad 1) Das Charakteristische bleibt immer der Ton, der die ersten Inspirationen nach dem Sticksanfälle, dem sog. „Anshleiben“ der Volksprache begleitet. Es ist ein krählender, pfeifender Schrei (crowing inspiration der Engländer), der sich ziemlich genau dadurch imitiren läßt, dass man mit fast geschlossener Stimmritze eine schlürfende Inspiration ausführt und dabei den Vocal i hervorzuhringen sucht. Zuweilen wird auch das Anshleiben mit einigen solchen Inspirationen eingeleitet, in den meisten Fällen tritt aber der Anfall so plötzlich ein, dass den Kindern nicht mehr die Zeit laßen gelassen wird, sondern dass sie wie strangulirt lautlos nach Luft schnappen, wobei sie im Gesicht bläuroth werden und zur möglichsten Erweiterung ihrer Stimmritze den Kopf nach rückwärts biegen. Die Expiration ist unmittelbar nach dem Anfall oberflächlich und ängstlich, wird aber bald wieder ganz normal und ist von keinem pfeifenden Geräusche begleitet, wie dies beim Krupathmen gebbet wird.

Pronostisch wichtig ist das Hintertreten der allgemeinen Convul-

sionen zum Spasmus glottidis (2. Stadium). Es werden hierbei die Daumen eingeschlagen, die Vorderarme befinden sich in starker Pronation und sämtliche Adduktoren der oberen Extremitäten gerathen in krampfhafter Zusammensziehung. Die Füsse hingegen sind starr ausgestreckt, die grosse Fusszehen ist abducirt und nach aufwärts gezogen. Die Gesichtsmuskeln kommen in convulsivische Bewegung und der Rücken wird kohl. Die Temperatur der Extremitäten ist eher vermindert als vermehrt. Diese allgemeinen Krämpfe sind offenbar von jenen der Glottis abhängig; denn sie kommen und gehen mit diesen.

Das Gesicht wird während des Anfalles natürlich geröthet und selbst cyanotisch. Die congestionirten Augäpfel treten starr aus ihren Höhlen, die Zunge wird bläulichroth und die Halsvenen strotzen, im Gesichte prägt sich der Ausdruck der höchsten Angst aus. Während des Anfalles selbst ist es sehr schwer, den Puls zu fühlen oder das Herz zu auscultiren, es erscheint übrigens auch sehr theilnahmslos und deshalb angeeignet, wenn der Arzt im Moment der höchsten Lebensgefahr seine Zeit auf eine derartige Untersuchung verwendete. Einige Minuten nachher ist der Puls noch deutlich unrythmisch und ungleich zu fühlen. Häufig geht der Stuhl, seltener der Urin während des Anfalles ab.

ad 2) Die Symptome zwischen den Anfällen sind verschieden je nach der Heftigkeit und Dauer derselben. Die meisten Kinder sind in der freien Zeit matt und verdriesslich, nur in leichten Fällen kehrt der vollkommene Appetit und ruhige Schlaf wieder, in den meisten, und hauptsächlich dann, wenn die Spasmi intensiv und schnell auf einander folgen, magern die Kinder ab, febern und verlieren den Appetit.

Dauer, Verlauf und Prognose.

Die Dauer dieser Krankheit lässt sich nicht durch einfache Terminbestimmung schildern. Zuweilen tödtet schon der erste Anfall, so dass in wenigen Sekunden ein eben noch vollkommen gesundes Kind dem Tode verfallen ist. In anderen nicht so häufigen Fällen bekommen die Kinder viele Monate lang, so oft ein Zahn durchbricht, zeitweise eine kräufende, pfeifende Inspiration, es kommt aber nicht zu einem vollkommenen Stimmritzenverschluss, sondern es stellt sich nach einigen Sekunden das normale Athmen wieder ein. Meistens aber verläuft die Krankheit in einem gewissen Cyclus, wobei eine Zunahme, ein Höhestadium und eine Abnahme derselben zu erkennen ist. Am Anfange sind die Anfälle selten, wiederholen sich alle 8—14 Tage, mit der Zeit aber werden sie häufiger, sie treten endlich mehrmals täglich ein und nehmen an Intensität zu. Bis dieses Höhestadium erreicht ist, vergehen gewöhnlich 4—6 Wochen. Die Kinder gehen entweder in einem Anfall zu Grunde oder sie bekommen nach 8—14tägiger Dauer dieses Höhestadiums Fieber, magern ab, und es tritt wohl auch lobarische Pneumonie oder ein profunder Darmcatarrh hinzu, deren Folge ebenfalls der Tod ist. Die Genesung ist leider der seltene Ausgang und erignet sich nur sehr selten, wenn einmal die Krankheit einen gewissen Grad von Heftigkeit überschritten hat. In diesem günstigen Falle lassen die Anfälle an Frequenz nach und hören endlich ganz auf. Die Kinder bleiben aber sehr in ihrer Entwicklung zurück, sind immer blass, rachitisch und zu Recidiven, die dann schon mehr ungünstig

enligen, geneigt. Von 15 Fällen, die ich mir notirt habe, starben acht. Billiet und Barthuz beobachteten unter neun Fällen, Hérard unter sieben ein einziges Mal Genesung. Im Allgemeinen ist anzunehmen, dass diese Mortalitätsverhältnisse doch etwas zu ungünstig ausgefallen sind, indem man nur die schweren Fälle und diejenigen, wo man selbst Anfälle beobachtet hat und oft zu Hilfe gerufen worden ist, im Gedächtniss behält, während man die leichteren Formen, die dem Arzte wenig Mühe und den Eltern keine so grosse Angst bereitet haben, eher übersieht.

Die Prognose richtet sich nach der Intensität und Frequenz der Anfälle, nach den Complicationen und nach den Ernährungsverhältnissen des Kindes. Am häufigsten gesessen die Brustkinder, am ehesten ausgere zur Atrophie geneigte Kinder. Je entwickelter und ausgezeichneter die Craniotabes, deren Zusammenhang mit dem Spasmus glottidis im folgenden Absatze, der Aetiologie, genauer erörtert werden wird, um so ungünstiger gestaltet sich die Prognose.

Aetiologie.

Wir müssen unterscheiden zwischen den Ursachen, welche den einzelnen Anfall bedingen oder ihn begünstigen, und zwischen den allgemeinen zu dieser Erkrankung überhaupt disponirenden.

Zu den ersteren, den momentanen, gehört der Schrecken. Ein starkes, plötzlich entstehendes Geräusch genügt zur Erzeugung des Glottiskrampfes. Derselbe kann auch veranlasst sein durch Hinterrücken der Zunge zum Zwecke einer Untersuchung der Mundhöhle, durch Schlingbewegungen, durch Husten und durch Schreien. Von dem durch Schreien entstehenden Stimmritzenverschluss ist aber jenes Ausbleiben streng zu scheiden, das sich sehr jähzornige, schon etwas ältere Kinder von 2—4 Jahren willkürlich erzeugen können. Es gibt sehr viele hauptsächlich schlecht erzogene, verwohnte Kinder, die bei jeder geringen Gelegenheit ein Zetorgeschrei anheben und sich dabei so gewaltig anstrengen, dass sie momentan keine Luft mehr bekommen, einen Augenblick dunkelroth oder selbst blauroth werden und dann mit einer pfeifenden Inspiration ihr Geschrei von neuem beginnen. Diese Art von willkürlichem Ausbleiben ist durchaus nicht gefährlich und es ist gar kein Grund vorhanden, dass solchen Kindern ihr Wille geschehe, um diesen Zustand zu verändern. Das schnellste, psychologische Heilmittel liegt eben in ein mit einem Male in das Gesicht gegossenes Glas Wasser.

Auf der Höhe der Krankheit bedarf es keiner näheren Ursache mehr. Der Anfall tritt im ruhigsten Schlafe, bei der ruhigsten Umgebung und zu jeder Zeit ohne alle Veranlassung ein.

Bei der Analyse der allgemeinen Ursachen ergeben sich ganz eigenthümliche Erscheinungen. Vor allem ist der Spasmus glottidis bezüglich des Geschlechtes dadurch ausgezeichnet, dass er Knaben viel häufiger befällt als Mädchen, was von den Autoren fast einstimmig anerkannt wird. Auch unter meinen 15 Fällen treffen 11 auf Knaben, so dass es scheint, als ob der Larynx der männlichen Kinder sich schon in frühester Jugend von dem der Mädchen durch die Form oder wenigstens die physiologische Thätigkeit zu unterscheiden beginne.

Das Alter, in welchem das Uebel auftritt, schwankt zwischen

$\frac{1}{2}$ —3 Jahren, d. h. es tritt auf mit dem Durchbruch des ersten Zahnes und endigt mit dem des letzten. Bei den Schneidezähnen, also im ersten Lebensjahre, stellt es sich viel häufiger ein, als bei den Eck- und Backenzähnen. Der Gedanke liegt sehr nahe, dass man eine direkte Fortpflanzung der in Folge der Zahnung gerötheten und geschwollenen Mundschleimhaut auf die des Larynx annähme. Es müsste aber dann der Glottiskrampf da am sichersten eintreten, wo die örtlichen Zahneschmerzen am ausgesprochensten sich zeigen, was nach meinen Beobachtungen der Fall durchaus nicht ist. Ich fand bei den meisten dieser Kinder die Mundhöhle nicht besonders geröthet und ohne reichlichere Sekretion.

Interessant ist die Erblichkeit. Es gibt Familien, in welchen alle Kinder mehr oder minder daran leiden und Powell erzählt sogar, dass von 13 von denselben Eltern erzeugten Kindern nur ein einziges verschont blieb. So viel ich die Mütter der von mir behandelten Kinder zu sehen bekam, waren sie alle ziemlich erregbarer Natur und erschwertes durch mannigfache hysterische Insulte die Pflege ihrer Kinder.

Der Zusammenhang der Craniotabes mit Spasmus glottidis (Tetanus apnoicus) wurde von Elsässer, dem Entdecker des weichen Hinterkopfs, zur Evidenz nachgewiesen. Nicht die Weichheit und Einrückbarkeit des Hinterhauptes an sich, sondern deren Folgen sind als veranlassende Momente anzuklagen, indem hiedurch die Gehirnhäute in einen normwidrigen Congestionszustand versetzt werden können; wirklich plastische Anschwellungen findet man bei Kindern, die an diesem Uebel gestorben sind, gewöhnlich nicht. Elsässer's Entdeckung wurde nachträglich von vielen anderen Autoren, namentlich von Lederer vollkommen bestätigt und es sind sogar einzelne Fälle bekannt gemacht worden, in welchen man durch einen Druck auf die erweiterten Stellen des rachitischen Hinterhauptes willkürlich den Glottiskrampf hervorrufen konnte. Ohne diese mechanische Ursache in Zweifel zu ziehen, muss sie doch nur als Ausnahme betrachtet werden; denn wenn dieselbe eine allgemeinere Geltung hätte, so müsste doch der Anfall häufiger im Schlafe, während die Kinder auf dem Hinterkopf liegen, als im wachen Zustande, wo sie meist schon aufrecht getragen werden, sich einstellen. Gerade das Gegentheil aber ist der Fall. Die von Elsässer besonders urgirten Hyperämien des Gehirnes und seiner Häute sind viel wahrscheinlicher die Folge als die Ursache des Uebels, und wenn man ex juvenibus et nocentibus einen Schluss auf das Wesen einer Krankheit machen darf, so stehen sie in keinem ursächlichen Zusammenhang mit den Krämpfen, weil sonst durch fetliche Blutentziehungen und durch Ableitungen auf den Darmkanal dieselben gehoben oder gemindert werden müssten, was bekanntlich hiedurch nicht zu erreichen ist. Wir müssen uns demnach darauf beschränken, das ausserordentlich häufige Zusammentreffen der Glottiskrämpfe mit Craniotabes als unwiderlegliche Thatsache hinstellen, den innern Zusammenhang zwischen beiden aber weiteren physiologischen und pathologisch-anatomischen Untersuchungen vorbehalten.

Störungen in der Verdauung können ebenfalls den Glottiskrampf verursachen, was auch schon daraus hervorgeht, dass eine vernünftige Regulirung der Diät, Weglassung schwerverdaulicher Nahrungs-

mittel eine deutliche schnelle Besserung bringt, während alle Behandlung fruchtlos bleibt, so lange die Verdauung in Unordnung, Flatulenz und Diarrhöe zugegen ist. Brustkinder erkranken nur äusserst selten an diesem Uebel, und von den künstlich aufgezogenen hauptsächlich die, welche die ihnen zugemessene Kost nicht gehörig vertragen. Dass die Kinder wohlhabender Eltern ganz verschont bleiben, wie Billiet in Genf beobachtet hat, kann man bei uns in München nicht behaupten. Es erkranken allerdings häufiger die Kinder armer Leute, man darf aber auch nicht vergessen, dass es deren in allen Städten eben viel mehr als reiche gibt.

Endlich hat Kopp und nach ihm eine grosse Anzahl von Aerzten die Thymusdrüse als veranlassendes und sogar als einziges Moment angenommen, so dass die Bezeichnung „*Asthma thymicum Kopp*“ häufig noch jetzt von älteren Aerzten gebraucht wird. Durch die pathologische Anatomie ist diese Theorie unhaltbar geworden. Man hat zu oft eine grosse Thymusdrüse in Leichen von Kindern gefunden, die an ganz anderen Krankheiten gestorben und niemals von Glottiskrampf befallen worden sind, und umgekehrt hat man in Fällen, wo dieser die Todesursache war, eine normale, selbst eine verkleinerte Thymus beobachtet. Es scheint deshalb gerechtfertigt, dass das *Asthma thymicum* als Krankheitsbenennung vollkommen aufgegeben wird.

Pathologische Anatomie.

Was den Larynx selbst betrifft, so ist der Leichenbefund regelmässig ein negativer, und es wird also auch durch die anatomische Untersuchung die spasmodische Natur des Uebels bestätigt. Die übrigen Befunde sind nicht constant und deshalb auch nicht charakteristisch. Am häufigsten findet sich noch die Rhachitis, am ausgeprägtesten am Hinterhaupt, ausserdem an den Rippen. Die Thymus ist bald gross, bald klein, bald in vollständiger Resorption begriffen. Im Darm finden sich zuweilen solitary Schwellungen, in den Bronchien Catarrh, in den Lungen wohl auch Tuberculosis. Die Bronchialdrüsen namentlich sind dann zu grossen käsigen Tuberkeln entartet. Die Verdickung und Injektion der Mesingen ist ein häufiger Befund. Die *Nn. vagi* wurden von einzelnen Autoren hart, von andern wieder weich gefunden.

Behandlung.

a) Prophylaxis. Wenn in einer Familie schon ein oder einige Kinder an Glottiskrampf zu Grunde gegangen sind, so schweben die Eltern natürlich und mit Recht in fortwährender Angst, dass sie die nachfolgenden Kinder zur Zeit der Dentition ebenfalls wieder verlieren werden, weshalb sie sich auch zu jedem Opfer bereit erklären, wenn dieses Unglück verhütet werden kann. Es wurde in dieser Beziehung ziemlich die Landluft empfohlen, wogegen jedoch einzurwenden ist, dass dieselbe nur während einiger Sommermonate, wo die Kinder auch wirklich in's Freie gebracht werden können, genösbar ist, dass die Mutter sich in solchen Fällen nur sehr ungern von ihrem gewohnten Arzte trennt und dass der Aufenthalt auf dem Lande durchaus keine bestimmte Garantie gegen den Eintritt des Anfalles bietet. Ich selbst bin schon zweimal auf das Land zu Kindern mit exquisiten Glottiskrämpfen geholt worden, die dort geboren und noch niemals in die

Stadt gekennnt waren. Es scheint deshalb zweckmäßiger, die Kinder unter der ärztlichen Aufsicht im elterlichen Hause zu lassen und für mehrstündigen Genuss frischer Luft in einem nahegelegenen Garten zu sorgen. Solche Kinder müssen möglichst lange, wenigstens bis zum Durchbruch der ersten sechs Schneidezähne, an der Brust der Mutter bleiben. Den Eintritt der den Laryngismus meistens bedingenden Schädelrachitis sucht man durch fleissige Ventilation des Zimmers, durch Kühlen und kalte Waschungen des Kopfes und durch aromatische Bäder zu verhüten. Allenfällige Verdauungsstörungen müssen durch kleine Dosen kohlensaurer Alkalien, denen man bei Verstopfung etwas Rheum beifügen kann, möglichst rasch beseitigt werden.

b) Behandlung des Anfalles. Bei der kurzen Zeit von einer Minute ist die Wahl der anzuwendenden Mittel eine sehr kleine, und es ist nicht zu begreifen, wie einzelne Aerzte den Anfall mit Senfteigen, Brechmitteln, Klystieren verschiedener Art und mit warmen Bädern behandeln wollen, indem zu allen diesen Verfahren eine viel längere Zeit der Vorbereitung gehört. Das erste ist immer, dass man das Kind aufhebt, um dem Larynx durch Zurückbeugung des Kopfes eine möglichst günstige Lage zu verschaffen, und dass man die die Brust beengenden Kleider so schnell als möglich beseitigt. In den wenigen Fällen, wo ich bei einem Anfalle selbst zugegen war, führte ich den Zeigefinger in den Mund bis an die hintere Pharynxwand, hob dann den Kehlkopf mit der Fingerspitze in die Höhe und berührte die Stimmbänder selbst, worauf sogleich bedeutende Würgbewegungen und dann die bekannte pfeifende schneidende Inspiration erfolgte. Die Laien können dieses Manöver nicht ausführen, und ich begnüge mich damit, ihnen zu zeigen, wie man durch einen Fingerdruck auf die Zungenwurzel ganz constante Würgbewegungen erzeugen kann. Die Entstehung dieser Würgbewegungen ist das einzige ungefährliche Mittel, den Anfall abzukürzen. Vom Anspritzen mit kaltem Wasser und von dem gewaltsamen Hin- und Herschwingen in der Luft, wie diese den Wärterinnen eigen ist, habe ich keinen bestimmten Erfolg gesehen, das Chloroform wird von einzelnen Aerzten, namentlich von Cox und Snage, ausserordentlich empfohlen, es scheint mir aber doch unstatthaft, dasselbe von Laien ausüben zu lassen. Zur Tracheotomie, die auch als letzte Vitalindikation aufgestellt worden ist, wird es wegen Mangel an Zeit noch niemals gekommen sein.

c) Causale Behandlung. Zur Bekämpfung des ausgebildeten Glottiskrampfes hat man eine so grosse Reihe von Mitteln empfohlen, dass die Menge derselben schon Misstrauen erregen muss. Das bekömmteste war früher das Zinkoxyd von 0,12—0,6 pro die, ferner das Argent. nitric. 0,01—0,03 pro die, der Kupfersulfiat, die Aca. foecida, die Meschustickzur, die Aq. amygdalar. amar., Belladonna, Hyoscyamus, Opium, Tinct. camab. indic., stündl. 5 Tropfen, kleine Dosen Calomel, Bromkalium, stündl. 0,03. In neuester Zeit kam das Chloralhydrat 0,06 pro dosi in Aufnahme. Alle diese Mittel sind unsicher und haben durchaus keine spezifische Wirkung, indem die Mehrzahl der Kinder trotz aller Behandlung zu Grunde geht. Ein Mittel, wodurch die Rachitis sicher zum Stillstand gebracht werden kann, ist der rohe, stark ranzig riechende Leberthran, und wenn man nun das häufige Zusammenreffen der Schädelrachitis mit dem Glottiskrampfe im Auge

behält, so hat derselbe den meisten Anspruch auf eine rationelle Behandlungswiese. In der That habe ich schon drei Kinder auf den einfachen Gebrauch des *Ol. jecoris* gesehen, nur Schade ist es, dass es sehr häufig nicht vertragen wird, sondern Gastricums und Erbrechen verursacht, worauf es dann natürlich weggelassen werden muss.

Die Scarificationen des Zahnfleisches, von denen die Engländer vielfach Gebrauch machen, haben bei uns wenig Anklang gefunden. Ich habe sie bei einem einzigen Kinde, bei dem der sechste und achte Schneidezahn dem Durchbruch ganz nahe waren, energisch jedoch ohne allen Erfolg angewendet. Die Anfälle repetirten sich immer öfter, wurden intensiver und das Kind ging zu Grunde, obwohl das geschwellene Zahnfleisch ganz abgetragen war und die scharfen Ränder der Zähne vollkommen sichtbar wurden.

In neuerer Zeit habe ich neben dem innerlichen Gebrauch des *Ol. jecor.* zwei Kinder fortwährend in einer geladenen Campheratmosphäre erhalten, indem ich ihnen ein Stückchen Campher, in Leinwand eingenäht, um den Hals hängen liess. Beide Kinder kamen durch; ob diese Campheratmosphäre etwas dazu beigetragen hat, kann erst nach deren öfterer Anwendung entschieden werden.

b) Paralyse glottidis.

Die Lähmung der Stimmritze ist eine seltene Krankheit, was eigentlich auffallend erscheinen muss, da am Hals so häufig Geschwülste vorkommen, die einen Druck auf den *N. vagus* und *recurrens* ausüben und hiermit Lähmung der Kehlkopfmuskeln bedingen könnten. Bei Vivisectionen sieht man nach Durchschneidung der *Nn. recurrentes* die Stimmritze sich weder bei der Inspiration erweitern noch bei der Expiration verengern, nur bei tiefen Inspirationen verengt oder verschliesst sie sich mechanisch, indem der stärker andrängende Luftstrom den schlaffen Stimmritzebändern die Form zweier Kugelsegmente gibt, und dadurch die Ränder derselben einander nähert oder gar mit einander in Berührung bringt. Die centrale Glottislähmung wird bei den meisten Sterbenden beobachtet und kann auch in ganz seltenen Fällen durch Geschwülste, grosse Tuberkel oder Krebs an der Basis des Gehirns längere Zeit vor dem Tode bestehen. Die periphere Glottislähmung entsteht durch Druck auf den Halskeil der *Nn. vagi* oder auf die *Nn. recurrentes*, welche nach den übereinstimmenden Untersuchungen von Volkmann, Longet etc. sowohl die Erweiterung als die Schliessung der Stimmritze allein vermitteln. Dieser Druck wird in der Regel ausgeübt durch scrofulöse Vergrösserung der längs des Vagus liegenden Lymphdrüsen, in welche man bei Sectionen den Vagus und Recurrens schon vollständig eingebettet, comprimirt, verdünnt oder abgeplattet gefunden hat. Nur auf diese Weise lassen sich die zuweilen auftretenden gewaltigen Respiationsbeschwerden scrofulöser Kinder erklären, bei denen die Drüsenschwellung oft so geringfügig ist, dass an eine direkte durch ihren Druck verursachte Athemnoth gar nicht zu denken ist.

Symptome.

Das Hauptsymptom ist eine unangenehm erschwerte, raselnde Athembewegung, welche bei jeder tiefen Inspiration durch Schreien,

Lachen, stärkere Anstrengungen etc. veranlaßt, in Hustenparoxysmen ausartet.

Das Athmungsgeräusch ist so laut wie beim Krup, unterscheidet sich aber vom Krupathmen durch den weniger schneidenden, mehr rasselnden Ton und ausserdem durch die viel geringere Dyspnoe, die für gewöhnlich sehr unbedeutend nur während der Hustenparoxysmen deutlich hervortritt und bis zur Orthopnoe sich steigern kann. Dieser Zustand ist immer chronisch und, wenn nicht andere Erkrankungen zufällig vorhanden, fieberlos. Die Stimme ist dabei rau, heiser oder es ist selbst vollständige Aphonie zugegen.

Die Dauer dieses Uebels lässt sich nicht bestimmen, einmal sah ich es spontan schwinden, obwohl die ausserlich sichtbaren Drüsenpakete an Grösse zunahmten, so dass in der Tiefe eine Erweichung oder Resorption angenommen werden musste. Die Prognose ist gewöhnlich ungünstig, es stellt sich bald eine ausgedehnte Bronchitis, häufig auch Lungentuberculose ein, welcher die Kinder in kurzer Zeit erliegen.

Behandlung.

Da die Scrofulosis fast regelmässig der Boden dieser Krankheit ist, so wird eine antiscrofulöse Behandlung dringend angezeigt sein. Der Leberthran ist entschieden das beste Mittel hiegegen, öftlich bewirkt eine 2—3 Mal wöchentlich wiederholte Eingeschlung mit Jodtinktur am schnellsten eine Verkleinerung der Drüsen. Gelingt es auf diese Weise nicht, in 8—14 Tagen das Uebel zu heben oder wenigstens zu mildern, so ist die Exstirpation der betreffenden Drüsen dringend indicirt. Die Wirkung, welche die geschwollenen Drüsen äussern, zeigen zur Genüge, dass sie tief hinein sich erstrecken, und verlangen deshalb einen geübten, mit gründlichen anatomischen Kenntnissen versehenen Operateur.

C. Schilddrüse.

Wenn wir von der ausserordentlich seltenen Thyreoiditis inflammatoria, traumatica, welche in Folge äusserer Verletzungen, von Drosseln, Einklemmungen etc. auftreten kann, wie billig, absehen, so bleiben nur mehr die verschiedenen Arten von Hypertrophie der Schilddrüse für die Betrachtung übrig.

Struma.

Unter Struma versteht man eine jede Vergrösserung der Schilddrüse. Die Volumenzunahme ist bisweilen nur eine vorübergehende, gewöhnlich aber eine bleibende und zwar stetig zunehmende. Es hypertrophirt entweder die ganze Drüse oder nur ein Lappen und selbst nur kleinere Abschnitte eines Lappens, und je nach der Richtung, in welcher die Vergrösserung eintritt, sind die Compressionssymptome verschieden. Vergrössert sich die Drüse nach vorne und aussen, so dehnt sich die darüber befindliche Haut allmählig aus, und mit Ausnahme der hässlichen Formveränderung tritt keine weitere Störung in der Function der Nachbarorgane ein. Vergrössert sie sich aber nach den Seiten und nach rückwärts, so werden die Mm. sternocleidomastoidei, die grossen Gefässe und Nerven des Halses verschoben und es treten dann mannig-

fache Störungen der Circulation und Innervation ein. Dann gewöhnen sich heftige Schling- und Respirationsschwerden, wenn, was jedoch nur selten geschieht, die Struma den Oesophagus und die Trachea ringförmig umfaßt, und am schwersten werden die Symptome, wenn der untere Rand der Drüse sich in die Länge vergrößert, unter das Manubrium sterni hinanwächst und nun nachträglich hier nach allen Seiten an Volumen zunimmt.

Die Vergrößerung der Drüse findet auf zweierlei Weise statt. Entweder entwickelt sich die Körner der physiologisch beschaffenen Drüse in grösserer Menge, wodurch eine ganz normale, nur an Masse hypertrophirte Drüsensubstanz entsteht (*Struma lymphatica*), oder es vergrössern sich einige Thyreoidealkörner zu ausgedehnten Cysten, die selbst bei Kindern von einigen Jahren schon einen Durchmesser von 1 Zoll und darüber erreichen können (*Struma cystica*). Der Inhalt dieser Cysten ist eine dickflüssige, leimähnliche gelbe oder bräunliche Flüssigkeit, für die man den Namen Colloid erfunden hat. Die Cystenwandung ist bei den Kröpfen der Kinder regelmässig sehr dünn und weich, während bekanntlich bei älteren Individuen beträchtliche Verdickungen und selbst Verknöcherungen beobachtet werden. Die Cystenkröpfe fühlen sich höckerig und ungleich an, grössere Cysten fuktuiren deutlich, die lymphatischen Kröpfe zeigen nirgends eine kugelige Auftreibung und haben an allen Stellen gleiche Consistenz.

Zuweilen kommen Kinder mit angeborener lymphatischer Struma auf die Welt, sind gewöhnlich asphyktisch und können nur schwer zum Leben gebracht werden, worauf sie dann fortwährend laut und mühsam respiriren. Die Kröpfe der Neugeborenen verschwinden merkwürdiger Weise nach einigen Wochen spontan. Gewöhnlich aber leiden ältere Kinder nach begonnener zweiter Dentition, namentlich häufig Mädchen, daran, und es kommen hier ebenso häufig lymphatische wie cystische Strumae zur Beobachtung. Die oben angeführten schweren Symptome von Verschiebung und Druck der Organe des Halses und von Compression der Trachea unterhalb des Sternums sind bei Kindern übrigens ausserordentlich selten, gewöhnlich wird die Hilfe bloss wegen des Schönheitsfehlers gesucht.

Behandlung.

Chirurgische Eingriffe sind bei der Gefährlichkeit der Kropfextirpation und selbst der einfachen Punktion und Injektion der Cysten nur gestattet bei lebensgefährlichen Symptomen, und selten niemals wegen des Schönheitsfehlers allein unternommen werden. Die lymphatischen Strumae verschwinden ohne Ausnahme auf 8—12malige Einspritzung mit Jodtinktur, in Intervallen von 3—6 Tagen angestellt. Die Cystenkröpfe verschwinden dadurch nicht, verkleinern sich aber auch sichtlich und wachsen wenigstens nicht mehr weiter, so dass bei zunehmender Körpergrösse des Kindes die Formveränderung nur wenig mehr in die Augen springt. Die Jodtinktur wirkt auffallend rascher und sicherer, als die Jodkaliumsalben, weshalb ich die letzteren niemals mehr gebrauchte. Die Jodtinktur ist selbstverständlich contraindicirt bei allen schwächlichen anämischen Kindern und besonders auch bei Verdacht auf Tuberculosis. Schlummernde Tuberculosis kommt durch dieses perfolio Mittel oft rasch zur Entwicklung.

D. Thymusdrüse.

Nachdem pag. 3 die Anatomie und Physiologie der Thymusdrüse schon erörtert worden, bleibt nur noch übrig, der wenigen pathologischen Befunde, die in seltenen Fällen vorkommen, zu gedenken.

Was das Asthma thymicum betrifft, so wurde schon oben im Abschnitte von Spasmus glottidis berichtet, dass die Grösse und Lagerung der Thymusdrüse wahrscheinlich gar keinen Einfluss auf diese Glottiskrämpfe hat, indem sie bei den Sectionen bald gross, bald klein gefunden wird. Der Name Asthma thymicum Koppii ist aber doppelt unrichtig, 1) weil die Thymus mit Asthma nichts zu schaffen hat und 2) weil lange vor Kopp, der seine Arbeit 1829 veröffentlichte, die grössten Autoritäten, wie Morgagni, P. Frank, Allan Burns etc. die Ansicht, dass die Thymus Sticksanfalle veranlassen könne, zu vertreten suchten.

F. Weber fand bei Neugeborenen und bei Kindern, welche todt zur Welt kamen, kleine Hämorrhagien im Parenchym der Thymus. Sie kommen neben starker Hyperämie des ganzen Organes vereinzelt oder in grösserer Menge vor und übersteigen nicht leicht die Grösse eines Stecknadelkopfes. Gewöhnlich finden sich auch Ecchymosen in anderen Organen. Weber führt alle diese Extravasate auf den Geburtsakt selbst zurück und gibt an, dass sie nur in den seltenen Fällen vermist werden, wo kleine Kinder bei weitem Becken aus irgend einer Ursache, die nicht auf Druckverhältnisse zurückzuführen ist, todt geboren werden. —

Bei todtgeborenen Kindern von syphilitischen Eltern sieht man in seltenen Fällen wirkliche Abscesse in der Thymus, muss sich aber wohl hüten, die physiologischen Hohlräume, welche einen weissen Saft enthalten und bei allen Kindern vorkommen, für Abscesse zu halten. Der Inhalt jener Hohlräume reagirt immer sauer, der der Abscesse, wie jeder Eiter, alkalisch. Im Allgemeinen muss bemerkt werden, dass bei den meisten an hereditäre Syphilis verstorbenen Kindern von diesen Eiterhöhlen nichts entdeckt werden kann. Ich habe wenigstens schon ein Dutzend solcher Kinder sectirt und erst ein einziges Mal eine Höhle gefunden, die einem Abscesse ähnlicher war als einem physiologischen Hohlraum, die Untersuchung der Reaction wurde leider verunmuthet. Bednar beobachtete auch Cystenbildung in der Thymus syphilitischer Kinder. Er fand höhnengrosse mit heller, gelblicher Flüssigkeit gefüllte Cysten in der Drüse, oder die ganzen Lappen zu zwei grossen, gelben Cysten umgewandelt.

Tuberculosis der Drüse kommt nicht selten vor, man hat sogar die grosse genuine Tuberkelmasse, welche gewöhnlich ihren Sitz in den Bronchialdrüsen hat, in der Thymus gefunden, während erstere frei waren.

Zweimal schon fand ich bei Knaben von fünf und sechs Jahren Carcinom des Mediastinum anticum, das sich in beiden Fällen nur wenig auf die Lungen, die Pleura und den Herzbeutel ausdehnte, und demnach höchst wahrscheinlich seinem Ursprung von der Thymus genommen hatte.

Die Thymuserkrankungen sind mit Ausnahme des Krebses im Mediastinum anticum, der sich durch ausgedehnte Dämpfung an der

vorderen Brusthälfte und durch die Zeichen des Druckes auf das Herz, die grossen Gefässe und die Lungen zu erkennen gibt, nicht zu diagnosticiren; denn die allerdings perceptiblere Dämpfung in der Gegend des Sternums erlaubt noch keinen Schluss auf die Beschaffenheit der Drüse. Gegen pathologisch-anatomische Veränderungen, deren Symptome bei Leukämien uns entgehen, kann natürlich auch keine Behandlung eingeleitet werden.

E. Lungen.

1) Bronchialeatarrh. Catarrhus bronchialis acutus, chronicus. Bronchitis.

Alle Schleimhäute sind im physiologischen Zustande mit einer gewissen Menge von Secret bedeckt, das die Funktion der Schleimhaut vermittelt. Die Bronchialschleimhaut secernirt nun ebenfalls eine gewisse Quantität von Schleim und zwar gerade in einer Menge, welche hinreicht ihre Vertrackung zu verhindern. Eine jede Hyperämie derselben veranlasst eine Vermehrung des Secretes, es wird mehr abgeschieden, als verdampfen kann, und die Folge hiervon ist eine Ansammlung von Schleim in den Bronchien, welcher Zustand als Bronchialeatarrh oder in heftigeren Fällen als Bronchitis bezeichnet wird.

Pathologische Anatomie.

Der Bronchialeatarrh kann vorkommen entweder in den Bronchien erster und zweiter Ordnung allein, die kleineren sind intact, oder umgekehrt die Hauptveränderungen finden sich in diesen, während die grossen Bronchien normal bleiben, oder endlich es können die Bronchien aller Ordnung gleichmässig catarrhalisch afficirt sein. Selten werden beide Lungen zugleich ergriffen, was hauptsächlich im Typhus und den acuten Exanthemen vorkommt, und selten nur ist in den Bronchien einer Lunge der Catarrh überall gleich stark entwickelt. Gewöhnlich ist die Secretion in den unteren Lappen profuser und die Schleimhautveränderung bedeutender als an den Lungenspitzen, was wahrscheinlich auf rein mechanischen Verhältnissen beruht, indem aus den oberen Lappen das Secret grösseren Theils durch seine eigene Schwere in den Hauptbronchus gelangt, während es aus den unteren Lappen nur durch die Flimmerbewegung und gewaltsame Expirationen, Husten, dahin gefördert werden kann.

Die Schleimhaut ist an den erkrankten Stellen roseuroth, bei höheren Graden karmoisinroth injicirt, diese Injection nimmt mehr und mehr zu und wird endlich in den höchsten Graden so dicht, dass die Schleimhaut einem scharlachrothen Sammet ähnlich sieht. Zu gleicher Zeit nimmt sie an Dicke zu, was man aus Querschnitten besonders leicht sehen kann, wenn man den Querschnitt eines gesunden Bronchus mit dem eines catarrhalischen derselben Ordnung vergleicht. Die Schleimhaut erscheint übrigens, leicht zerreiblich und lässt sich nicht mehr in Lappchen vom submucösen Gewebe abziehen.

Von der entzündlichen Röthe muss jedoch eine Imbibitionsröthe genau unterschieden werden, die man in allen Leichen findet, wenn die Fäulniss begonnen hat. Bei Mischillen soll zuweilen, nicht immer,

die Bronchialschleimhaut mit ähnlichen rothen Flecken wie die äussere Haut bedeckt sein, bei Variola kommen in der Trachea und in den Bronchien erster und zweiter Ordnung Variolapusteln vor. Die Erosionen, welche den chronischen Bronchialcatarrh Erwachsener begleiten, hat man bei Kindern, selbst wenn sie Jahre lang gehustet haben, noch nicht finden können.

Das Secret ist bald fein schaumig, weisslich, bald füllt es, von nur wenigen Luftblasen durchsetzt, als dickflüssige gelbe Masse fast das ganze Lumen eines Bronchus aus. Es besteht mikroskopisch aus wenig charakteristischen Epithelien, von denen die meisten eiförmig ohne fertig gebildete Winkel erscheinen, und aus Eiterzellen, die hier ungewöhnlich gross, fein granulirt und kugelförmig sind. Ausserdem finden sich Entzündungskugeln und wohl auch hier und da ganze Stückchen erweichter Schleimhaut.

Üebt man auf den Durchschnitt einer catarrhalischen Lunge einen sanften Druck aus, so quillt aus allen erkrankten Bronchien ein Tropfen dieses Secretes hervor, die Menge und Grösse der so entstehenden gelben Punkte im rothen Lungengewebe gestattet eine Taxirung der Ausdehnung und Heftigkeit des Catarrhs. Ob auch Fibrincoagula in diesen Secreten vorkommen, wie einzelne Autoren angeben, vermag ich nicht zu entscheiden, indem ich noch nie dergleichen gefunden habe. Eigenthümlich ist, dass solche catarrhalisch erkrankte Lungen bei Eröffnung des Thorax nicht collabiren, indem die massenhaft angehäuften Secrete eine Communication der äusseren Luft mit der in den Lungen verhindern. Bei lang bestehendem Catarrh erweitern sich die Bronchien etwas, indem eine Atonie der Schleimhaut sich einstellt. Die Erweiterung ist aber immer nur eine geringe, cylindrische, niemals eine blasige; die blasigen Bronchiektasien kommen im Kindesalter überhaupt nicht vor. Sehr gewöhnlich erkrankt bei Bronchialcatarrh schliesslich auch eine oder die andere Partie des Lungengewebes als lobuläre Pneumonie, die in dem folgenden Abschnitte speziell besprochen werden wird.

Symptome.

Dieselben theilen sich in subjective und objective. Die subjectiven kommen erst bei Kindern, die über zwei Jahre alt sind in Betracht und bestehen in Schmerz längs des Sternums, wozu sich während des Hustens ein gürtelförmiger Schmerz der Insertion des Zwerchfelles entsprechend, gewöhnlich, und zuweilen in einem allgemeinen Unbehagen, das sich durch weinerliches Wesen und Unlust an den gewohnten Spielen zu erkennen gibt. Die objectiven ergeben sich aus der physikalischen Exploration, aus der Beschaffenheit des Hustens, des Auswurfes und des allenthalben vorhandenen Fiebers. Das auffälligste Symptom ist immer der Husten, er allein ist es, der die Angehörigen veranlasst Hülfe zu suchen. Gewöhnlich sind die Hustenanfälle ziemlich heftig und dauern $\frac{1}{2}$ —1 Minute, wiederholen sich stündlich mehrmals, werden im Schlafe wohl seltener, sistiren aber nicht vollständig. Viele Kinder schlafen trotz des Hustens fort, andere aber wachen jedesmal auf und kommen durch diese häufigen Unterbrechungen der Nachtruhe sehr benüthet. Sehr verdächtig ist das kurze, sogleich wieder abgesetzte, frequente Hüsteln, welches gewöhnlich auf Tuberc-

valonia dant. Ein schlimmes Zeichen ist ferner, wenn die Kinder auf eine oder die andere Seite gelagert stärker husten als in der Rückenlage, indem diesem Husten auch meist materielle grössere Veränderungen des Lungengewebes zu Grunde liegen. Die Kinder mit einfacher Bronchitis husten in der Rückenlage weniger als in aufgerichteter Stellung, ein Unterschied zwischen Rücken- und Seitenlage ist bei ihnen nicht zu bemerken. Auch ist der dadurch entstehende Schmerz nicht so heftig, dass die Kinder jedesmal schmerzlich das Gesicht verziehen und nach vollendetem Husten weitere Schmerzausserungen von sich geben müssten.

Der Auswurf, bei Erwachsenen ein so wichtiger Anhaltspunkt für die Beurtheilung der Lungen, kommt bei Kindern fast niemals zu Tage. Man hört wohl am Tone des Hustens, ob aus dem Larynx Schleim herausbefördert wird oder nicht, die rumpelnden und rotirenden Bewegungen der Zunge aber verstehen Kinder bis zum dritten und selbst fünften Jahre noch nicht zu machen, sondern schlucken das an der Zungenwurzel angelangte Sputum regelmässig wieder hinunter. Nur wenn die Hustenanfälle sehr heftig sind und die Kinder dabei den Mund weit öffnen, bemerkt man zuweilen einzelne Sputa, öfters kann man sie sich leicht verschaffen, wenn man unmittelbar nach einem lockeren Husten mit einem reinen Leinwandlappchen über die Zungenwurzel streift, wobei sie an dem Lappchen hängen bleiben. Beim Bronchialcatarrh sind die Sputa entweder weiss und feinschaumig oder gelblich und dann in der Regel weniger reich an Luftbläschen. Sie sind niemals blutig gefärbt, doch können, wie bei jeder heftigen Anstrengung, auch durch Husten einzelne kleine Blutungen im Kehlkopf, dem Rachen oder der Mundhöhle eintreten, deren Blut sich aber niemals mit dem Sputis gleichmässig mischt, sondern immer nur in einzelnen Streifen oder Klümpchen sich zeigt. Der Ausdruck des Gesichtes ist in den meisten Fällen von einfachem Bronchialcatarrh nur wenig verändert; da in der Regel kein Fieber zugegen, so ist auch die Hauttemperatur am Kopfe nicht erhöht und keine Röthung der Wangen bemerkbar. Ist aber die Bronchitis sehr verbreitet, sind die Bronchien aller Ordnung in beiden Lungen ergriffen, so tritt eine sehr auffallende Cyanose ein, für die man, wenn man ein solches Kind zum ersten Male zu Gesichte bekommt, vergeblich eine andere Ursache in der Circulation sucht. Eine so ausgebreitete Bronchienkrankung ist höchst gefährlich, die Respiration mühsam wie bei Pneumonie und der Tod erfolgt gewöhnlich durch Erstickung. Nur ausnahmsweise findet man bei der Section das Lungensparenchym vollständig intakt, gewöhnlich ist an einigen Stellen lobuläre Pneumonie eingetreten.

Die physikalische Untersuchung der Lungen kleiner Kinder wurde schon im Allgemeinen Theile pag. 16 eingehend besprochen. Alle dort angegebenen Cautele und Abweichungen von der Untersuchung der Erwachsenen müssen in den nun folgenden Abschnitten der verschiedenen Lungenkrankheiten fortwährend berücksichtigt werden. Die Untersuchung grosserer Kinder, die über das fünfte Jahr hinaus sind, unterscheidet sich in nichts mehr von der der Erwachsenen, bei Kindern von 1—5 Jahren aber hängt die Möglichkeit einer solchen lediglich von dem Benehmen des Arztes ab. Die Hauptsache ist und bleibt

immer, dass man sich mit dem Kinde zuerst befreundet und es erst nach einiger Zeit untersucht. Wenn man das Kind einfach anschauen lässt und ohne weiteres Percussion und Auscultation beginnen will, so wird man unter 100 Kindern wenigstens 99 Mal ein Zetergeschrei veranlassen, das nicht eher aufhört, als bis der Verstärker desselben sich gänzlich zurückzieht, ja noch mehr, es wird immer wieder anheben, so oft der misliebige Kinderarzt wiederkehrt, wobei natürlich von einer Diagnose und rationellem Behandlung niemals die Rede sein kann.

Die Percussion gibt im Bronchialcatarrh durchaus negative Resultate, der tympanitische Beiklang ist gewöhnlich sehr exquisit vorhanden und die während der Bauchpresse auftretende physiologische Dämpfung rechts hinten ist bei kleinen Kindern, die an Bronchialcatarrh leiden, um so deutlicher, als durch die angehäuften Schleimmassen noch leichter eine momentane Absperrung der Bronchialluft zu Stande kommen kann.

Die Palpation ist die nützlichste und zugleich einfachste Untersuchungsmethode. Man fühlt beim Bronchialcatarrh ein deutliches Schurren und Raseln am ganzen Thorax, am stärksten in der Regel am Kehlkopf und an der Trachea, weil eben hier am häufigsten die grossen Schleimblasen platzen und einzelne zähe Schleimlamellen durch die auf- und abströmende Luft in Schwingungen versetzt werden. Wenn man von der Ausdehnung, in der man die Raselgeräusche am Thorax fühlt, einen Schluss machen wollte auf die Ausdehnung des Catarrhes, so wäre dass ein sehr Irrthum. So oft ein einigermaßen lautes Raselgeräusch im Larynx sich bildet, fühlt man dasselbe am ganzen Thorax, und es genügt zuweilen eine einzige kräftige Hustenbewegung, welche den das Geräusch veranlassenden Schleim aus dem Kehlkopf heraufbefördert, den Rhonchi auf der ganzen Brust verschwinden zu machen. Nur wenn man am Halbe keine Raselgeräusche fühlt, hingegen auf einer Seite oder nur an einer unbeschränkten Stelle solche wahrnimmt, verschwinden dieselben nicht nach so kurzer Zeit, sondern werden meist mehrere Tage oder Wochen lang beobachtet. Wenn überhaupt auf das Fühlen der Rhonchi grosses Gewicht gelegt werden soll, so ist ihr Auftreten auf einem kleinen Fleck ein ungünstigeres Zeichen als ihre Verbreitung über die ganze Brust, insofern im ersten Falle der Bronchialcatarrh sich in Bronchien 3.—4. Ordnung etablirt hat, während im letzteren möglicher Weise ein einziges Sputum in der Trachea, das in den nächsten Stunden ausgehustet wird, die Ursache sein kann. Ist das über den ganzen Thorax verbreitete Raselgeräusch aber constant, Tage und Wochen lang zu fühlen, so ist dies ein Beweis von ausgebreitetem Bronchialcatarrh, der gewöhnlich schon mit ziemlicher Dyspnoe verbunden ist.

Durch die Auscultation lernen wir im Bronchialcatarrh wenig mehr als durch die Palpation. Bei einiger Übung kann man die Rhonchi ebenso gut fühlen als hören, ja man ist sogar im Stande die Höhe und Rasigkeit zu unterscheiden und hat dabei den Vortheil, dass man die Untersuchung schneller, genauer und bei geringerem Widerstande von Seite des Kindes vornehmen kann. Die Auscultation ist nur deshalb wenigstenswerth, weil man durch sie eine Complication mit Pneumonie, die sich durch Knisterrasseln und später Bronchialathemen zu erkennen gibt, diagnostiziren kann. Der Aushalm einzelner

Anteem, dass bei Bronchitis capillaris Knisterrasseln gehört werden soll, kann ich nicht beitreten. Es fielen durch diese Annahme das letzte Unterscheidungsmerkmal zwischen Bronchitis und Pneumonie weg und die ohnedies schon heillose Verwirrung würde dadurch nur noch vergrößert. Wo Knisterrasseln bei einem Kinde gehört wird, da ist kein einfacher Catarrh der kleinen Bronchien mehr, sondern eine pneumonische, alveoläre Erkrankung anzunehmen. Für den Bronchialcatarrh und die Bronchitis spricht bloss die Anwesenheit von Rhonchi der verschiedensten Art und von rauhem Vesiculärrasseln; Knisterrasseln oder gar Bronchialrasseln darf hier nicht vorkommen.

Die Art der Athembewegung ist bei Kindern mit gewöhnlichem Bronchialcatarrh nicht abweichend von der physiologischen Beschaffenheit, nur bei grosser Ausdehnung wird die Respiration frequenter und mühsamer, da sich aber hierzu meistens Fieber gesellt, das es und für sich die Bewegungen auch ganz gesunder Lungen beschleunigt, so ist nicht zu ermitteln, wie viel von der frequenten Respiration auf den Catarrh, wie viel auf das Fieber zu schieben ist. Die jede Inspiration begleitenden Bewegungen der Nasenflügel sind im Bronchialcatarrh sehr selten und zeigen fast ohne Ausnahme eine Complication mit Pneumonie an.

Die Dauer dieses Uebels ist eine sehr verschiedene, je nach der Ursache und der Constitution des Kindes. Ein nicht zu Catarrhen geneigtes Kind kann durch äussere Reize, Abkühlung des Thorax, zu kalte Luft, schädliche, verunreinigte Luft sich Husten ziehen. Derselbe wird aber niemals lange dauern, sondern in wenigen Tagen wieder verschwinden. Hingegen gibt es andere Kinder, welche, ohne von tuberculösen Eltern zu stammen oder selbst tuberculös zu sein, Jahre lang an Bronchialcatarrh mit einzelnen Remissionen leiden, und endlich haben wir die wirklich tuberculösen, welche ihn fast niemals verlieren. Die Prognose ist nicht immer so günstig zu stellen, als man bei dem allgemeinen Wohlbefinden anzunehmen geneigt wäre. Die einfachste Bronchitis kann bei grosser Ausdehnung durch Ersticken tödtlich werden, die auf Tuberculose basirte gestattet natürlich nur eine höchst zweifelhafte Prognose.

Aetologie.

Es gibt kaum ein Kind, das nicht in den ersten Lebensjahren einen Bronchialcatarrh gehabt hätte, und es gibt kein Alter, in welchem derselbe so constant vorkäme als in dem der ersten Kindheit, namentlich zur Zeit der ersten Dentition. So husten z. B. alle Kinder, die während des Zahnens geßern, indem der Speichel fortwährend die Kleider durchlässt und eine Abkühlung der Brust bedingt. Im Winter ist der Bronchialcatarrh allgemeiner verbreitet als im heissen Sommer, in den Städten und den Quartieren der Armen häufiger als auf dem Lande. Kinder, die in staubigen Werkstätten aufgezogen werden, leiden gewöhnlich und Kinder von tuberculösen Eltern so regelmässig daran, dass es den letztern gar nicht mehr auffällt und sie hiervon gar nichts mehr erwähnen, wenn sie nicht speziell gefragt werden. Ausser diesen mehr äusseren Veranlassungen gibt es aber auch noch ein Contagium, das den Bronchialcatarrh von einem Individuum auf das andere fortpflanzt, nämlich die Influenza, die Grippe. Dieselbe besteht im Wesentlichen auch nur aus einem Bronchialcatarrh, der durch feber-

hafte Symptome und Appetitmangel eingeleitet wird, und verschont kein Alter, selbst das der jüngsten Säuglinge nicht. Bei gesunden Kindern nimmt die Grippe ihren regelmäßigen Verlauf und endet nach 2–3 Wochen mit vollständiger Genesung, bei tuberculösen hingegen leitet sie oft die Weiterentwicklung der Dyskrasie ein, die Kinder husten fort und fort, bekommen Fieber und gehen endlich hektisch zu Grunde.

Der Bronchialcatarrh tritt ferner als Complication bei einer Menge allgemeiner Erkrankungen auf. So leidet die Bronchialschleimhaut gleich der Darmschleimhaut bei jedem Typhus mit, und in leichten Fällen von *Febria typhoides* ist dieses nie fehlende Symptom das wichtigste für die Aufrechterhaltung der Diagnose.

Rokitansky ist sogar der Meinung, dass die Bronchitis, die Bronchostase, die Grundlage der exanthematischen ansteckenden Typhen, wie sie z. B. in Irland vorkommen, bilde.

Die ausführlicheren Angaben hierüber wurden schon pag. 169 bei Abdominaltyphus gesetzt.

Endlich ist der Bronchialcatarrh ein nie fehlendes Symptom bei Morbillen, wo er wahrscheinlich durch eine morbilläre Efflorescenz der Schleimhaut entsteht und desshalb ohne jegliche Ausnahme vorkommen muss. Häufig, jedoch nicht immer findet er sich bei Scharlach, Scharlach und unstillen Blättern.

Behandlung.

Es gibt kein Mittel, welches einen entschiedenen, direkten Einfluss auf den Verlauf des Bronchialcatarrhes hätte. Alle bisher angegebenen Behandlungsmethoden versagten häufig ihre Dämme. Zwei Symptome sind es hauptsächlich, deren Bekämpfung angestrebt werden muss, die Dyspnoe und die übermäßige Secretion. Die erstere entsteht durch wässerhafte Anhäufung von Bronchialschleim, mit dessen Entfernung auch die Athemnoth verschwindet, und das beste Mittel, diess zu bewirken, ist der Brechakt. Es ist nicht notwendig starke Brechmittel zu geben, es entsteht hiedurch das Erbrechen zu rasch und die Würgbewegungen, auf die es hierbei eigentlich ankommt, stehen durchaus nicht im geraden Verhältnis zur Grösse der Reiz. Eine sehr gute Art anhaltendes Würgen und Erbrechen zu bewirken, besteht in Darreichung eines starken Ipecacuanhaufuses (4.0 auf 30.0 Wasser), von dem schon ein Kaffeelöffel die kräftigste Wirkung macht, ohne den Darm in Mitleidenschaft zu ziehen. Wenn mit und unmittelbar nach dem Erbrechen nicht grössere Mengen Schleim sich entleeren und die Respiration dadurch freier wird, so nützen fernere Brechmittel auch nichts mehr, sondern erzeugen nur einen chronischen Magencatarrh, wobei die Kinder ausserordentlich herunterkommen. Aus der Klasse der Expectorantien sind vorzüglich die vegetabilischen anzuathen und nur da in Anwendung zu bringen, wo keine Verdauungsstörung besteht. Steht sich die letztere ein, so ist der Schaden der Expectorantien viel greifbarer als ihr überhaupt problematischer Nutzen, was hauptsächlich für die Antimontanien, Brechweinstein, Goldschwefel, Kermes-mineralis und das weisse Antimonoxyd gilt. Der in der Bronchitis Erwachsener so sehr beliebte Salmiak ist den Kindern gewöhnlich unter keiner Form heizubringen. Am besten eignet sich bei acutem Bronchialcatarrh ein ganz leichtes Infus. Ipecac. 0.06 : 30.0 mit etwas Oxymel

simplex oder eine sehr verdünnte Lösung kohlensauren Kalis 0,10 : 30/0. Terpentinreibungen werden von Little als vorzüglich empfohlen, alle 2—3 Stunden repetirt und die Brust dann mit Platell bedeckt. Werden die Anfälle mehr spasmodisch, so sind die Antispasmodica und Narcotica angezeigt, welche nicht nur eine günstige abkürzende Wirkung auf die Heftigkeit des Hustens, sondern auch auf den Verlauf im Allgemeinen haben. Hierher gehört vor Allen die *Aq. amygdal. amar.* 2—3 Mal so viel Tropfen pro dosi als das Kind Jahre zählt, täglich 3—4 solche Dosen, dann die Opiumtinktur in der schon mehrmals angegebenen Dosis, das Extr. belladonn. 0,003—0,006 mehrmals täglich etc.

Liegt Tuberculose dem Catarrh zu Grunde, so bleibt diese symptomatische Behandlung in der Regel ganz fruchtlos. Es muss in diesen Fällen *Ol. jecor.*, Eisen oder China versucht werden. Chinapulver, messerspitzenweise gereicht, ist fast allen Kindern gut beizubringen, und ich sah schon mehrmals auf seinen 4—8 Wochen lang fortgesetzten Gebrauch höchst verdächtige Bronchialcatarrhe, von häufigen Fieberrecidiven und Abmagerung begleitet, wieder verschwinden. Die Temperatur, in welcher sich solche Kranke befinden, sei gleichmässig warm, die Kleidung wärmer als in gesunden Tagen, das Getranke werde möglichst oft gereicht, damit ergiebige Schweisse sich einstellen. Wo die Ursache des Catarrhes noch fortbesteht, muss natürlich für deren Entfernung Sorge getragen werden, namentlich ist darauf zu dringen, dass die Kinder nicht in staubigen Werkstätten liegen, wie dies bei der arbeitenden Klasse so häufig vorkommt.

Zur Verhütung fernerer Bronchialcatarrhe, zur Abstumpfung der Disposition ist eine systematische Abhärtung dringend anzuzurathen. Bezüglich der Kleidung lassen sich keine bestimmten Vorschriften geben, sie darf jedenfalls nicht so warm sein, dass sie dem Kinde heiss fällt und dass es schon bei mässiger Körperbewegung in Schweiß geräth. Es werden durch eine solche Verweichlichung gewiss viel mehr Catarrhe erzeugt als verhütet. Die beste und rationellste Abhärtung ist eine kalte Waschung des ganzen Körpers, bevor die Kinder Abends zu Bett gehen, womit schon nach dem Durchbruch der Eckzähne begonnen werden kann.

2) Lobuläre und lobäre Lungentzündung. *Pneumonia lobularis et lobaris.*

Die Lungentzündungen kommen bei Kindern ausserordentlich häufig vor, gewöhnlich aber in einer Form, welche pathologisch anatomisch ein ganz anderes Bild bietet, als wir es bei Sektionen von Erwachsenen zu sehen pflegen. Die Lungen entzündeten sich nämlich nicht in grosser Ausdehnung durch ganze Lappen, sondern nur an einzelnen kann erkrankten Stellen, zwischen welchen sich wieder normales Gewebe in ziemlicher Menge findet. Ein Process, den man richtig bezeichnend lobuläre Pneumonie genannt hat. Es kommt wohl auch lobäre Pneumonie vor, allein verhältnissmässig viel seltener, sie kann idiopathisch und mit einem Schlage, wie bei Erwachsenen, sich einstellen, gewöhnlich aber ist sie, gleich der Pleuritis der Neugeborenen, pyämischer Natur. Im letzteren Falle endet sie immer tödtlich, übrigens ist auch bei der nicht pyämischen, lobulären Pneumonie die Prognose höchst ungünstig. Die lobuläre Pneumonie ist im Stup-

lingsalter eine ausserordentlich häufige Krankheit und rafft besonders viele Kinder während der Zahperiode fort. In den Findelhäusern starben viele Kinder daran und man hat als Ursache auch die anhaltende Horizontalallage, in welcher die Kinder Tag und Nacht gehalten werden, beschuldigt. Es spricht für diese Ansicht auch in der That der Umstand, dass bei den meisten Sectionen die hinteren und unteren Partien der Lungen, also die am tiefsten gelagerten Theile, am häufigsten erkrankt gefunden werden. Ausserdem hat sich statistisch herausgestellt, dass im Winter viel mehr Kinder daran erkranken als im Sommer und dass man niemals eine Stelle der Lunge lobulär entzündet findet, zu der nicht auch Bronchien führten, die einen beträchtlichen Grad von Catarrh zeigen. Es gestaltet sich das Verhältniss der lobulären Pneumonie zum Bronchialcatarrh wahrscheinlich so, dass das sich senkende Sekret auf die Endigung des betreffenden Bronchialgebüches Aemisch und mechanisch reizend wirkt und dass sich secundär an den gereizten Stellen keine Pneumonien entwickeln. Wir haben hier also das Verhältniss der Ursache zur Wirkung. Dasselbe ereignet sich auch in den meisten Fällen von Krup, doch ist hier die lobäre Pneumonie fast ebenso häufig als die lobuläre, und die Ausdehnung der Membranen — ob dieselben dick oder dünn, auf kleine Stellen beschränkt sind oder allseitig weit in den Bronchialbaum hinaustreten, — ist von keinem besondern Einfluss auf die Entstehung der Pneumonie. Ferner findet sich dieselbe fast in allen Leichen der an Zellgewebsverhärtung verstorbenen Kinder und tritt auch häufig als Schlussakt in tuberculösen Lungen auf.

Pathologische Anatomie.

Die pathologisch anatomischen Vorgänge sind, wie schon die Namen bezeichnen, zweierlei Art, allein nicht nur der Ausdehnung, sondern auch der Qualität des Exsudates nach unterscheidet sich die lobuläre Pneumonie von der lobären.

Die lobäre oder krupöse Pneumonie ist mit Ausnahme der metastatischen pyämischen in Gehir- und Findelhäusern vorkommenden im Säuglingsalter merkwürdig selten, wo sie aber vorkommt, zeigt sie dieselben anatomischen Veränderungen, wie bei Erwachsenen. Auch hier haben wir eine rothe und eine graue Hepatisation, je nach der Zeit des Eintrittes des Todes. Das Exsudat ist nicht zwischen den Lungenalveolen, noch in deren Wandungen, sondern in die Höhlen selbst ausgeschieden, füllt sie total aus und hat die Eigenschaften des rein krupösen Exsudates. Die roth hepatisirte Lunge collabirt nicht bei Eröffnung des Thorax, sie ist ganz luftleer, die Schnittfläche ist trocken, braunroth, meist gleichmässig körnig und es lassen sich solche Lungenpartien brechen wie das Parenchym der Leber. Die körnige Beschaffenheit des Durchschnittes entsteht, indem die durch starres Exsudat geschwollenen Alveolen durch die darzwischen liegenden, elastischen Fasern stellenweise gehoben werden. Die rothe Färbung des Exsudates rührt von eingestreuten Blutkörperchen her.

Das anfangs bis auf die Blutkörperchen amorphe Exsudat erweicht allmählig zu eiweiss- und schleimartigen Massen, und bald tritt Bildung von Zellen ein, welche sowohl von der Alveolenwand als dem Exsudat aus sich bilden. Mittlerweile lösen sich die Blutkörperchen

auf, ihr Farbstoff verschwindet, die ganze Masse entfärbt sich, — graue Hepatisation, — und das Exsudat wird dem Eiter immer ähnlicher, weshalb die Franzosen es auch Infiltration purulenta genannt haben. Der endlich zu einer Milch zerfließende Inhalt der Alveolen wird sofort resorbirt, und es ereignet sich hier der im Körper ziemlich seltene Vorgang einer vollkommenen *resolutio in integrum*. Ausnahmsweise bilden sich auch wirkliche grössere Abscesse, noch seltener kommt eine völlige Verödung und Verhärtung, Induration des Lungengewebes oder gar Gangrän zu Stande. Zur Tuberculisirung einer lobären Pneumonie, wie sich dies bei Erwachsenen zuweilen findet, kommt es bei Kindern fast nie, indem tuberculöse Kinder gewöhnlich schon in den ersten Tagen, nachdem sie ihre krupöse Pneumonie acquirit haben, zu Grunde gehen.

Die lobuläre Pneumonie, inselförmige Verdichtung, ist keine krupöse, sondern eine catarrhalische Entzündung. Es erkranken hier kleine Stellen im gesunden Lungensparenchym, die, wenn sie auch zuweilen confluiren, doch nicht das Bild der krupösen lobären Pneumonie bieten. Die Erkrankung ist gewöhnlich auf beiden Lungen, doch meistens stärker, und bedingt am ehesten die hinteren Parthien der unteren Lappen. Solche Lungen collabiren nicht vollkommen, was nicht so fast von der lobulären Pneumonie als von dem stets sie begleitenden Bronchialcatarrh herrührt, und betastet man sie nach verschiedenen Richtungen, so findet man in der Tiefe oder an der Oberfläche einzelne härtere Stellen. Schneidet man nun auf diese Stellen ein, so sieht man auf dem Querschnitte bläulichrothe, dickere Flecken ohne scharfe Abgrenzung. Die Wandungen der Alveolen sind stark gewulstet und durch Abstreifen der Schnittfläche mit der Messerklinge erhält man ein röthlich schleimiges, nur spärlich schäumendes Secret. Indem die umgebende Lungensubstanz meist emphysematös ist, so erscheinen die lobulären Pneumonien etwas unter dem Niveau der Lungenoberfläche und sind sogleich durch ihre dunklere Färbung kenntlich. Schneidet man solche Stellen mit Vorsicht aus, so dass keine normale Lungensubstanz damit in Verbindung bleibt, so gehen sie vollkommen im Wasser unter und zeigen keine Spur mehr von Crepitation. Durch Aufblasen der ganzen Lungen werden sie aber eingemassent wieder luftkaltig, zum Unterschied von der krupösen Pneumonie, bei der das Einblasen ohne alle Wirkung bleibt, doch behalten die aufgeblasenen, lobulär entzündeten Stellen immer eine dunklere Röthung und fühlbare Härte. Die mikroskopische Untersuchung ergibt, dass die Lungenbläschen mit massenhaft gebildeten Epithelien und dünnem Exsudate erfüllt sind. Wir haben also keine rothe und keine graue, überhaupt keine Hepatisation, wozu immer ein starrtes Exsudat gehört, und deshalb auch keine verschiedenen Stadien. Wenn lobuläre Pneumonien confluiren, so unterscheiden sie sich doch noch immer von den krupösen lobären durch das Fehlen der Bröchigkeit, durch die Möglichkeit des Lufteindringens mittelst Aufblasen, durch grössere Feuchtigkeit und durch die jeder Zeit ruhenden, dazwischenliegenden, freien Partien. Der Process bleibt immer catarrhalischer, wird nie krupöser Natter, und charakterisirt sich besonders durch das gleichzeitige Auftreten an verschiedenen Stellen in beiden Lungen, weshalb auch Lebert's Bezeichnung „inselförmige Verdichtung“ die zweckmässigste sein dürfte.

Ausserdem findet man bei oberflächlicher Lage der Pneumonie Ausschwitzungen auf der Pleura und regelmässig Bronchitis in den zu den entzündeten Stellen führenden Bronchien. Im Arachnoidealsack des Rückenmarks soll das Secret vermehrt sein. Die gewöhnlichsten Complicationen sind Scur, Enteritis folliculosa und Zellgewebsverhärtung.

Symptome.

Die Symptome der lobulären und lobären Pneumonie lassen sichüglich zusammenfassen, da sie sich bis auf ein einziges, durch Percussion zu ermittelndes, nur wenig von einander unterscheiden. In der nun folgenden Schilderung sind nur kleine Kinder bis zum beendeten zweiten Lebensjahre gemeint. Kinder, die über die erste Dentition hinaus sind, haben nur selten mehr lobuläre Pneumonie, sondern lobäre, die sich aber in keiner Weise von der der Erwachsenen unterscheidet. Die physikalische Diagnose der kindlichen Pneumonie hat grosse Schwierigkeiten und erfordert viel Zeit und Geduld. Die Kinder sträuben sich fast regelmässig und heben ein Geschrei an, das alles fernere Untersuchen unmöglich macht. Dann fehlen auch die Spats gänzlich, und erst wenn sie fehlen, empfindet man, wie sehr man ihrer bedarf zu einer bestimmten Diagnose. Dafür aber wird man durch das charakteristische Aussehen und die ganz eigenenthümliche Art der Respiration entschädigt, deren Zeichen so ausgesprochen sind, dass man bei einiger Uebung eine solche Säuglingspneumonie diagnosticiren kann, bevor das Kind entkleidet worden.

Der Anfang der lobulären Pneumonie ist selten genau zu constatiren, indem immer längere Zeit Bronchidcatarrh vorangeht und der Uebergang in die Pneumonie nicht mit einem Male erfolgt. Gewöhnlich beginnen die Kinder mit einem fieberlosen Husten, derselbe nimmt mehr und mehr zu, es stellt sich etwas Fieber ein, die Hauttemperatur wird immer höher und nach einigen Tagen hat sich die ganze Symptomengruppe der Pneumonie entwickelt.

Das augenfälligste Symptom ist eine enorme Beschleunigung der Athemzüge, die auf 60–80 in der Minute steigen können und einen umgekehrten Rhythmus annehmen. Während in gesunden Tagen der Accent auf der Inspiration liegt, und wenn überhaupt ein Respirationssst hörbar, der des Expirationen voranommen wird, so fällt bei der Pneumonie der Accent auf die Expiration, welche von einem viel lauteren Geräusche begleitet wird als die Inspiration. Lässt man nun die Kinder entkleiden, so sieht man die lebhaftesten und angestrengtesten Zwerchfelcontractionen. Bei jedem Athemzuge werden die unteren Rippen tief nach vorwärts gezogen, wodurch unter den Brustwarzen gegen das Sternum hin monotonate Gruben entstehen. In einem höheren Grade von Pneumonie participiren auch die Gesichtsmuskeln, die Nasenflügel gehen auf und nieder, eine Erscheinung, auf die man nicht scharf genug sein Augenmerk richten kann, der Mund ist geöffnet, die Mundwinkel sind schmerzlich nach abwärts verzogen, die Augen sind glänzend, stier oder blicken ängstlich umher.

So prägnant diese Symptome des Respirationmodus und der Gesichtsmuskeln sind, so unbestimmte Resultate liefert die physikalische Untersuchung.

Die Percussion hat einen rein negativen Erfolg bei der loba-

laren Pneumonie: bei der lobären findet man beständige Dämpfung an der entsprechenden Stelle, eine Dämpfung, die, zum Unterscheid von der physiologischen Dämpfung während der Bauchpresse, auch ohne dieselbe sowohl bei In- als Expiration nachweisbar sein muss. Dass die physiologische Dämpfung rechts links sehr häufig mit der pneumonischen verwechselt worden ist, ist nur zu klar, indem in allen Lehrbüchern eigens bemerkt wird, dass die krupöse Pneumonie sich vorzugsweise im rechten untern Lappen etablire.

Auch der rasche und gewöhnlich günstige Verlauf, der in den Jahresberichten der Kinderspitäler und Ambulatorien des Pneumotien verzeichnet wird, spricht ziemlich deutlich für die häufig stattfindende Verwechslung.

Die weiteren Cautelen, die man bei der Percussion zu beobachten hat, finden sich schon im allgemeinen Theil pag. 17 angegeben.

Durch Auskultation kann man bei der lobulären Pneumonie grobes Knisterrasseln entdecken, ohne dass damit behauptet werden soll, dass keine Pneumonie vorhanden, wo dieses Knisterrasseln vermist wird, indem ja die dasselbe bedingenden, verdichteten Stellen nicht immer peripherisch liegen. Daneben ist immer Bronchialcatarrh vorhanden, dessen Rasselgeräusche das viel leisere Knistern oft verdecken, auch hört man letzteres nicht, wenn die ergriffenen Stellen sehr zerstreut zwischen grösseren Strecken gesunden Parenchyms auftreten. Da es gewöhnlich nur in kleinen Umfange vorkommen wird, so ist hienü eine genaue, keine Stelle der Rückenfläche unberührt lassende Untersuchung notwendig, die bei unruhigen, einmal unwillig gemachten Kindern selbst mit der grössten Geduld und Ausdauer nicht vollständig durchgeführt werden kann. Rasselgeräusche hört man ohne Ausnahme auf beiden Lungen. Knisterrasseln ist ein werthvolles Zeichen für die Bestätigung der Diagnose, sein Fehlen aber schliesst die lobuläre Pneumonie nicht aus.

Bei der lobären Lungeneuthzündung hört man, wie bei Erwachsenen, anfangs feines Knisterrasseln, dann mehrere Tage hindurch deutliches Bronchialathmen, starke Consonanz des Hustens, der Stimme und der Rhonchi und hierauf wieder Knistern, bis endlich im Falle der Genesung nach 8—9 Tagen normales vesiculäres Athmen sich einstellt, wenn nicht der noch bestehende Bronchialcatarrh einige Zeit hindurch ausgedehnte Rasselgeräusche bebingt.

Durch die Palpation fühlt man bei der lobulären Pneumonie nichts als Rasselgeräusche, die Vibrationen des Thorax durch Husten oder Schreien veranlasst, sind auf beiden Seiten gleich. Bei der lobären Pneumonie fühlt man der Dämpfung entsprechend stärkere Vibrationen der Stimme, der Rhonchi und des Hustens, oder es ist gar nichts zu fühlen, wenn der nur verdichteten Lungenpartie fahrende Bronchien momentan mit Schleim verstopft ist. Die Palpation des Thorax kann nicht fleissig genug geübt werden; denn sie allein kann auch bei schreienden Kindern mit Vortheil in Anwendung kommen.

Das Geschrei pneumonisch erkrankter Kinder ist insofern charakteristisch, als es nie sehr laut und noch weniger andauernd ist, es muss vielmehr ein kurz abgesetztes Stöhnen und Aechzen genannt werden. Der Husten ist in allen Fällen häufig und anhaltend; wenn heftige Hustenanfälle sich einstellen, so bringen auch die kleinsten Kinder schon etwas weissen Schaum vor die Lippen, gewöhnlich aber be-

kommt man gar keinen Auswurf zu sehen. Der Husten ist, zum Unterschied vom Bronchialcatarrh, immer schmerzhaft, die Kinder stöhnen kläglich nach jedem Anfalle und verzerrn die Gesichtszüge schmerzhaft dabei.

Die allgemeinen Symptome sind verschieden nach der Ausdehnung des Uebels und seinen Complicationen. Das Fieber der lobulären Pneumonie beginnt gewöhnlich nach länger bestehendem, fieberlosem Bronchialcatarrh des Abends, verschwindet wohl wieder nach einigen Stunden, kehrt aber immer öfter und heftiger wieder, bis es endlich zu einem continuirlichen wird. Die Haut fühlt sich dabei trocken heiß an, nur die Füße sind kühl und schwer zu erwärmen. Der Puls wird ungemein schnell und kann sich bis zu 200 in der Minute steigern. Es ist das die äußerste Grenze, die man bei einiger Uebung zu zählen im Stande ist.

Bei der lobulären Pneumonie beginnt das Fieber meist plötzlich, bevor noch Symptome der gestörten Respiration wahrnehmbar sind, und ist so heftig, wie beim Ausbruch eines acuten Exanthemes. Am folgenden Tage stellt sich dann die Pneumonie ein und nimmt ihren cyclischen Verlauf. Die consensuellen Hirnsymptome richten sich nicht nach der Ausdehnung der Lungenkrankung, sondern nach der individuellen Reizbarkeit. Es gibt Kinder, die bei der heftigsten lobulären Pneumonie ein freies Sensorium behalten, und wieder andere, die bei der geringsten Erkrankung Convulsionen und Nervenerscheinungen aller Art bekommen.

Der Appetit ist natürlich vollkommen verschwunden, der Dureß gross, die Urinsecretion der Menge des Getränks entsprechend. Der Stuhl ist häufig diarrhöisch, weil die Mehrzahl der Erkrankungen in die Dentitionszeit fällt und hier oben in der Regel dünne Stühle sich einstellen. Derselben rühren auch oft genug von der Behandlung her, das ungeeignete dieser Behandlungsweise aber wird unten ausführlicher trörtert werden.

Der Verlauf ist bei der lobulären Pneumonie ausserordentlich rasch, indem in 6—8 Tagen Tod oder Besserung eintritt. Bei kleinen Kindern ist der lethale Ausgang häufiger als ein Umschlag zur Genesung. Kinder über zwei Jahre ertragen die lobuläre Pneumonie so gut als Erwachsene. Der Anfang der lobulären Pneumonie ist schwer zu bestimmen wegen des allmähigen Ueberganges aus einfachem Bronchialcatarrh, derselbe nützt mindestens 4—5 Tage vorausgegangen sein, kann aber ebenso gut auch Wochen und Monate lang bestanden haben. Ihr Verlauf ist durchaus nicht cyclisch, bald so rapid und mit so ausgesprochenen Symptomen, dass jeder Laie eine Veränderung der Lungen erkennt, bald so schleichend und wenig markirt, dass sie dem geübtesten Diagnostiker entgeht. Selten genesen solche Kinder vor 2—3 Wochen vollständig; meist es sich aber zum lethalen Ende, so steigern sich alle Symptome; die Athemnoth und die Pulsfrequenz nehmen zu, die Extremitäten werden kühl, die Nägel cyanotisch, die Gesichtsmuskeln verzerrn sich mehr und mehr und die Expiration ist nicht mehr besonders accentuirt. Endlich werden die Athembügel immer seltener, röchelnd oder schnappend und der Tod tritt unter Convulsionen ein. Derselbe ereignet sich in der lobulären Pneumonie selten vor der zweiten bis dritten Woche. Bouchut hat unter 55 Kranken in einem Alter von einigen Tagen bis zwei Jahren dreißigdreissig verloren. Nach Valleix starben alle davon befallenen

Neugeborenen im Pariser Findelhaus (unter 128 Kinder starben 127). Trausswein hat ein besonderes prognostisches Zeichen angegeben, nämlich eine Anschwellung der Venen des Handrückens, wodurch die Prognose sehr verschlimmert werden soll. Dieses Zeichen hat nur insofern seine Bedeutung, als man eben nur bei abgemagerten Kindern die Hautvenen zu sehen bekommt und diese letzteren überhaupt die Pneumonie seltener überstehen. Bei fetten Kindern, die daran zu Grunde gingen, sah ich niemals während des ganzen Verlaufes eine Venenschwellung an den Händen.

Behandlung.

Da einer jeden lobulären Pneumonie Bronchialcatarrh vorangeht, so ist einleuchtend, dass derselbe bei einem kleinen Kinde niemals und unter keiner Bedingung ignoriert werden darf. Es sind sogleich die im vorigen Abschnitte angegebenen Mittel in Anwendung zu bringen. Die Kinder müssen in einer ganz gleichmässigen Temperatur bleiben, dürfen auch im Sommer, wenn die Luft nicht vollkommen windstill ist, nicht aus dem Zimmer getragen werden und müssen besonders auf der Brust trocken und warm gehalten werden. Innerlich gibt man ihnen am zweckmässigsten ganz kleine Dosen Opium, Belladonna oder Aq. laurocerasol. Mit dieser Behandlung und strengen Ueberwachung muss fortgefahren werden, bis die letzten und leichesten Spuren von Husten verschwunden sind. Wer schon viele Kinder an lobulärer Pneumonie behandelt hat und die Wirkung der vielgepriesenen Mittel hat zu Schanden werden sehen, der wird diese minutöse und sorgfältige prophylactische Behandlung eines einfachen Bronchialcatarrhs nicht für pedantisch und ängstlich halten. Man muss sich nur daran gewöhnen, einen jeden Bronchialcatarrh eines sahnenden Kindes für den möglichen Beginn einer Pneumonie zu halten, und man wird leider nur zu oft erfahren, dass diese Anschauung eine vollkommen gerechtfertigte ist.

Gegen die einmal entwickelte lobäre und lobuläre Pneumonie werden noch ziemlich allgemein Blutentziehungen empfohlen und zwar werden hier mit besonderer Vorliebe die Blutegel angewendet, indem die Schröpfköpfe zu schmerzhaft und bei den kleinen Flächen des kindlichen Thorax schwer zu appliciren sind, der Aderlass aber wegen Kleinheit der Hautvenen und Mächtigkeit der subcutanen Fettschichten gewöhnlich misslingt. Die Rutegel, 2—3 an der Zahl, werden in die Gegend der Brustwarzen, auf das Sternum oder nach Bouchut an die Innenfläche der Schenkel gesetzt. Die Nachblutung soll eine Stunde unterhalten werden. Ich wende sie seit vielen Jahren nie mehr an und muss gestehen, dass ich mit meinen Heilresultaten seit jener Zeit zufriedener bin. Ich habe noch oft in Consilien Gelegenheit, Kinder zu beobachten, denen von andern denkenden Collegen vor meiner Beirathung Blutegel gesetzt wurden, und kann durchaus nichts günstiges über den Verlauf der so behandelten Pneumonien berichten. Die meisten Kinder liegen anästhetisch, mit blauen Lippen und Wangen da und sollen momentane Erleichterung ihrer Athemnoth gehabt haben, wovon aber schon am folgenden Tage nichts mehr zu entdecken ist. Der Verlauf wird nur insofern deutlich abgekürzt, als diese Kinder gewöhnlich schneller sterben als die expectativ behandelten. Die Be-

convalescenz dauert bei den meisten ganz entschieden länger, sie behalten ihre blasser Farbe und ihre anämischen Symptome noch lange Zeit und bleiben in ihrer Entwicklung überhaupt enorm zurück. Wenn ich nun noch niemals entschiedenen Nutzen und schon viele Dutzend Mal einen ganz kläglichen Zustand auf Eutegel habe entstehen sehen, so wäre es irredt, wenn ich diese Erfahrung nicht veröffentlichte und direkt vor den Blutenziehungen warnte. Die Autocriten Barthet und Legendre sprechen sich ebenfalls ganz entschieden gegen jede eingreifende Behandlung aus.

Ähnlich wie mit dieser verhält es sich auch mit dem so sehr beliebten Brech Weinstein, dem sogar sonst klar sehende Männer wie Valleix das Wort reden. Nach vielfachen Erfahrungen ist der Darmcatarrh die gefährlichste Complication der Pneumonie und es sind deshalb alle jene Mittel zu meiden, die denselben veranlassen können. Hierher gehört nun vor Allem der Tartar. stibiat, der gerade in kleinen Dosen, bei denen es nicht zum Erbrechen kommt, fast regelmäßig eine schwer zu stillende Diarrhöe bewirkt. Die schädliche Wirkung desselben auf den Darmkanal tritt viel schneller und sicherer ein, als seine günstige als Antiphlogisticum und Expectorans. Selbst die Ipecacuanha kann, obwohl viel seltener, in dieser Beziehung Schaden anrichten, doch sind die hierauf erfolgenden Diarrhöen von kürzerer Dauer, weniger perniciös, stehen bald von selbst oder lassen sich doch durch Opium zum Stillstand bringen. Bei Athemnoth und Stickenfällen wirken einige Kaffeebitter eines starken Ipecacuanhaufuses (4,0 auf 30,0 Wasser) entschieden günstig, es darf aber nicht öfter als höchstens einmal in 24 Stunden von diesem Verfahren Gebrauch gemacht werden. Gegen eine dadurch entstehende Diarrhöe muss man sogleich mit kleinen Dosen Opium, höchstens einem Trojden Tinct. pro dos einschreiten. Ein schwaches Ipecacuanhaufus (0,06 oder 0,12 auf 30,0 Wasser) reizt die Kinder weder zum Brechen noch zum Stuhle, ist also in dieser Beziehung jedenfalls unschädlich; ob die Expectorations des catarrhalischen Secretes hierdurch wesentlich befördert wird, ist eine andere Frage. So viel kann ohne allen Scepticismus behauptet werden, dass die hierauf eintretenden Aenderungen in der Art und Häufigkeit des Hustens keine frapanten sind.

Meine Behandlung besteht regelmässig darin, dass ich bei Beamtzung der Haut, wenn keine Diarrhöe zugegen, Calmel 0,01 täglich 4—5 Mal gebe, bis grüne, halbflüssige Stühle sich einstellen, worauf dann ein einfacher Mucilago g^r arb. mit etwas Syrup und Tinct. Opⁱ simpl. gut. j—ij so lange fortgesetzt wird, bis wieder Verstopfung eintritt. Das starke Ipecacuanhaufus wird so lange als möglich unterlassen, kann aber Vorsichtshalber gleich am ersten Tage bereitet und an einem kühlen Orte aufbewahrt werden. Bei rasch zunehmender Athemnoth wird durch einen ergiebigen Brechakt plötzlich eine grössere Menge Bronchialschleim entleert und auf diese Weise zuweilen sehr schnelle Erleichterung erzielt. Die örtliche Behandlung besteht in allen Fällen in einem feuchten Gürtel, der auf folgende Weise applicirt wird. Man legt eine Serviette zu einem 6—7 Finger breiten Gürtel zusammen, und macht es ebenso mit einem grossen, weissen Schnupftuche, nur dass diese letztere Binde etwas schmaler anfallen muss. Das Schnupftuch wird hierauf in warmes Wasser getaucht, so-

weit wieder ausgepresst, dass es nicht mehr troggt und nun auf die Seriette in der Weise gebräutet, dass deren trockene Ränder beiderseits über das feuchte Schnupftuch hervortragen. Hierauf bringt man beide Tücher zusammen auf das Kopfkissen des Kindes, entblöset dessen Rücken und legt den Patienten nun auf die feuchte Unterlage. Dann schlägt man die Enden der beiden Tücher vorn über der Brust möglichst hoch nach oben zusammen und befestigt sie mit zwei Sperrnadeln. Sehr gut thut man, wenn man zwischen das feuchte und trockene Tuch eine Lage Guttapercha oder Kautschuk bringt, wodurch einerseits die Feuchtigkeits des ersten länger conservirt wird, während andererseits das letztere nicht durchnässt werden kann. Wenn das Wasser, womit der Umschlag gemacht wird, nicht zu kalt ist, so lassen sich die Kinder ihm willig gefallen und man bemerkt schon nach kurzer Zeit eine kleine Verlangsamung der Respiration und eine geringere Reizthätigkeit der Nasenflügel. Mit diesen Umschlägen kann 4–6 Tage lang fortgefahren werden, man braucht den feuchten Gürtel während dieser ganzen Zeit gar nicht abzunehmen, sondern kann nach Entfernung der Guttapercha sogleich einige Kaffeebecken warmes Wasser auf die trocken gewordene Binde bringen, oder sie mit gebleicht getränktem Schwamm ein paar Mal ansetzen. Die Hauptsache ist, dass man keine anhaltende Abkühlung der Haut durch Verdampfung entstehen lässt, dass also das trockene Tuch das feuchte an allen Seiten gebleicht überdeckt und dass es, da einiges Feuchtwerden nie vermieden werden kann, täglich mehrmals gewechselt wird. Ich habe diesen Gürtel gewiss schon viele hundert Mal angelegt und schon sehr oft rasche Besserung entstehen sehen, doch kann freilich auch nicht verschwiegen werden, dass dennoch ungefähr die Hälfte dieser Kinder zu Grunde geht. Wenn man den Kindern die von einigen Autoren empfohlenen kalten Umschläge anlegt, so entsteht jedesmal ein ungemeines Geschrei, eine ziemliche Beklemmung und Beschleunigung der Respiration, die erst wieder nachlässt, wenn das kalte Wasser durch die Temperatur der Haut erwärmt worden ist. Es scheint demnach rationeller, die Umschläge lieber gleich mit erwärmtem Wasser zu machen, um jene vorübergehende Unruhe zu vermeiden.

3) Erworbene Atelektase der Lungen.

Bei den Krankheiten, die als unmittelbare Folge der Geburt zu betrachten sind, wurde die angeborene Atelektase schon abgehandelt (pag. 49); es erübrigt also hier nur mehr die erworbene zur Besprechung. Dieselbe steht in innigem Zusammenhang mit der Rachitis des Brustkorbes und betrifft deshalb meistens Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu drei Jahren. In seltenen Fällen rührt die Zunahme der Dichtigkeit des Lungengewebes und die endliche Atelektase von bedeutenden Verkrümmungen der Wirbelsäule, von erweiterten Herzbeutel, vergrößerten Herzen, von Aneurysmen oder Neoplasmen her. Am exquisitesten findet man sie bei pleuritischen Exsudaten, wo die Lunge bis zur Dicke eines Fingers comprimirt und entsprechend verdichtet ist.

Pathologische Anatomie.

Die Grade der Atelektase sind sehr verschieden. Es kommt eine einfache Zunahme der Dichtigkeit vor, die sich durch vermehrte Consistenz, grösseren Bluteichthum und gedrängteres Gewebe zu erkennen gibt, die Compression kann aber auch einen so hohen Grad erreichen, dass die Zellenträume verschwunden, das Gewebe verädelt und der capillare Kreislauf aufgehoben ist. Am Anfange enthalten diese comprimierten, atelektatischen Stellen noch Blut und haben diese Aehnlichkeit mit Muskelfleisch, weshalb man diesen Zustand auch Carnification genannt hat; nach längerem Bestehen aber werden sie bläulichbraun oder grau, schrumpfen zu einer lederartigen Schwarte zusammen, das Lungengewebe ist nicht mehr zu erkennen und wird zu einer zellig fibrösen Masse, die von der etwas emphysematösen Umgebung nach und nach verdrängt wird und schliesslich ganz verschwindet. Man findet wenigstens fast nie bei ältern Kindern oder Erwachsenen solche einzelne atelektatische Stellen mehr. Zuweilen gelingt es noch, die kürzer bestehenden Atelektasen aufzublasen, gewöhnlich aber bleibt dieses Experiment fruchtlos, indem die Alveolen wirklich geschwunden sind und durch eine zellig fibröse Masse ersetzt werden.

Ist die Veränderung einigermaßen ausgebreitet, so hat sie eine ähnliche Wirkung auf den Kreislauf wie das Lungenemphysem. Es wird dadurch der capillare Kreislauf so geschwächt, dass eine Stase im Stamme der Lungenarterie, Erweiterung des rechten Herzens und endlich verdr. Stauung, Cyanose, eintritt.

Der Grund der erworbenen Atelektase ist also meistens im rachitischen Thorax zu suchen, der letztere aber entsteht folgendermassen: Die Inspiration kommt zu Stande, indem die Inspirationsmuskeln sich contrahiren und hiedurch eine Erweiterung der Lungenbläschen verursachen. Es entsteht dabei eine momentane Verdünnung der Luft in denselben, die äussere Luft drückt stärker auf den Thorax, zu gleicher Zeit zerrt das elastische Lungengewebe an der Costalpleura, und die Wirkung dieser Kräfte ist eine Einwärtskrümmung der Intercostalräume und bei mageren Menschen auch der Claviculargegend bei jeder Inspiration. Am frappantesten wurde mir dies Verhältnis durch die Besichtigung eines Kindes, dem durch eine entgegenfahrende höfere Wagendeckel eine Rippe zweimal zerbrochen wurde. Das bei heiler Haut ganz ausser Continuität gesetzte Stück Rippe hatte eine Länge von 1½ Zoll und bewegte sich bei jeder Inspiration gleich der Klappe eines Blashalgens nach innen, bei jeder Expiration nach aussen. Haben nun die knöchernen Rippen durch Verarmung an Kalksalzen ihre Festigkeit verloren, so betheiligen sie sich auch an diesen Bewegungen nach einwärts, die sonst die Intercostal Muskeln allein zu machen pflegen, und verlieren hiedurch ihre nach aussen convexe Gestalt. Ausserdem folgen sie dem Zuge des Diaphragma's, weichen andererseits auch den andringenden Baucheingeweiden während der Bauchpresse weiter aus und bleiben zu allem Ueberflusse in ihrem Längswachsthum zurück (rachitische Knochenverkürzung), so dass endlich ein verkrümmter, eingedrückter, missgestalteter Thorax entsteht, dessen Inhalt nothwendiger Weise comprimirt werden muss, da er ja in Folge der Verkrümmung und des verlangsamten Wachsthumes der Wirbelsäule auch nicht nach unten ausweichen kann.

Symptome.

Durch eine Verminderung der lufthaltigen Alveolen muss eine Beschleunigung der Respirationen erfolgen, wenn ein dem Körpergewicht entsprechender Gasaustausch stattfinden soll. Die Respirationen vermehren sich nun auch in der That und werden mit beträchtlicher Anstrengung ausgeführt, so dass sich auch die Nasenflügel dabei theiligen. Die Anwendung des Stethoscopes ist beim rachitischen Thorax mit vielen Schwierigkeiten verbunden, indem die Knöpfe der Steretalenden und die Concavitäten in der Gegend der Brustwarzen ein solches Auflegen desselben nicht gestatten. Man muss sich beinahe immer auf die unmittelbare Auscultation der Rückenfläche beschränken, und hört hier fast ohne Ausnahme überall Rasselgeräusche, weil die zu den atelektatischen Stellen führenden Bronchien catarrhalisch afficirt sind. An den ergriffenen Stellen selbst hört man, wenn die Rasselgeräusche nicht alles überdecken, Knisterrasseln oder Bronchialathmen. Am kindlichen Thorax und namentlich dem rachitischen ist das vesiculäre, puerile Athmen aber so scharf und die Expiration so laut, dass der Unterschied zwischen puerilem und Bronchialathmen nur in einer feinen Nuance des Geräusches besteht und die grösste Übung dazu gehört, beide sicher zu unterscheiden.

Durch Percussion lassen sich die atelektatischen Stellen nur selten deutlich nachweisen, indem sie meist zu wenig ausgedehnt sind und am häufigsten an die Leber grenzen, wo durch Einklemmung der Lungenväuter zwischen die Oberfläche der Leber und die einwärts gebogenen Rippen eine Verdichtung des Gewebes begünstigt wird. Ueberdies haben wir immer die physiologische Dämpfung während der Bauchpresse, die rachitische Verdichtung der Schulterblätter und die sehr häufig dabei vorkommenden Verkrümmungen der Wirbelsäule zu berücksichtigen, bevor wir eine aufgefundenen Dämpfung der Atelektase zuschreiben dürfen.

Aus dem bisher Gesagten wird man noch keinen Unterschied zwischen den Symptomen der Pneumonie und der erworbenen Atelektase haben entdecken können, und es gilt wirklich nur ein Symptom, durch welches wir bei der ersten Beobachtung diese beiden Zustände deutlich unterscheiden können. Bei der Pneumonie nämlich ist immer Brennpunkt der Haut und Fieber zugegen, bei der Atelektase fehlt dasselbe. Wenn aber bei einem rachitischen Kinde mit erworbener Atelektase zufälliger Weise durch Dentition oder irgend ein acutes Leiden Fieber entsteht, so ist niemand im Stande, gleich nach der ersten Untersuchung eine bestimmte Diagnose zu stellen. Erst der Verlauf der zufälligen Complication, das Fortbestehen der Athemnoth und das Respirationemolus nach Verschwinden des Fiebers können Klarheit bringen, und es ist diese diagnostische Schwierigkeit ein weiterer Grund, die Pneumonien nicht gleich mit Blutegeln und antiplogistischen Mitteln zu behandeln. Den rachitischen Kindern bekommt eine solche Behandlung in allen Fällen sehr schlecht.

Die Entstehung der erworbenen rachitischen Atelektase ist immer eine allmähliche, der Verlauf ein chronischer und kann sich Jahre lang hinziehen. Mit zunehmender Kräftigung und wieder beginnendem Längenwachsthum der Rippen verlangsamen sich die Respirationen, die

starke Einwärtsbiegung der vierten bis sechsten Rippe bei jeder Inspiration nimmt ab, die Hühnerbrust wird wieder flacher, die respiratorischen Hilfsmuskeln am Halse und die Nasenflügel werden ausser Thätigkeit gesetzt.

Tritt aber nach einigen Monaten eine solche Consolidirung des Brustkorbes nicht ein, und dehnt sich somit die Atelektase auf immer grössere Strecken aus, so vermögen endlich die intact gebliebenen Lungenpartieen nicht mehr gehörig zu vicariiren, es tritt eine intensivere Bronchitis ein und die Kinder sterben an erstickenden Hustenanstößen, nachdem sie Wochen und selbst Monate lang an dem höchsten Grade von Athemnoth zu leiden hatten, zu welcher sich einige Wochen vor dem Tode noch Oedem der Füße gesellen kann.

Die Prognose richtet sich nach dem Grade und der Dauer der Erscheinungen. Je entwickelter die Hühnerbrust, um so ausgedehnter ist die Verdichtung des Gewebes, um so grösser die Athemnoth und um so näher liegt die Gefahr, dass die Kinder an einem geringfügigen Bronchialcatarrh oder an Hydrämie in Folge des mangelhaften Stoffwechsels zu Grunde gehen. Uebrigens heissen auch sehr bedeutende Formveränderungen des Thorax und daraus entstehende Atelektasen oft vollständig.

Behandlung.

Die erste Frage ist immer die der Ernährung, die zweite die der Wohnung. Da die Hühnerbrust sich erst im sechsten bis neunten Lebensmonat entwickelt, so sind die Kinder gewöhnlich nicht mehr an der Brust, sondern bekommen die verschiedensten Arten von Brei und Suppen. Es lässt sich nun von keiner dieser Ernährungswesen behaupten, dass sie absolut schädlich wäre; denn bei einer jeden gedeiht oder stirbt eine Anzahl von Kindern, und es lässt sich auch nicht bestimmen, welche von ihnen die Rachitis besser verhält, indem sie bei allen Arten von Kost sich einstellt. Das wesentliche dabei ist, dass die Kost überhaupt vertragen wird und dass keine Darmcatarrhe oder anderseitige Verdauungsbeschwerden dadurch entstehen. Kinder mit vollkommen geregelter Verdauung werden nur äusserst selten rachitisch.

Der Aufenthalt in feuchten, dämpfen Zimmern befördert entschieden die Entstehung der Rachitis, wesshalb sie auch im Winter viel häufiger vorkommt als im Sommer und bei der armen Klasse der Bevölkerung häufiger als bei der besitzenden. Die Behandlung hat also ihr Hauptaugenmerk auf gut ventilirte, trockne Zimmer und möglichst anhaltenden Aufenthalt in freier Luft zu richten. Wo diese Bedingungen nicht erzielt werden können, da wird der Auszug gewöhnlich ein ungünstiger sein. Ueberhaupt wird man sich meist vergeblich bemühen, durch Expectorantien, Narcotica, oder was immer für Mittel den die Atelektasen begleitenden Bronchialcatarrh zu vertreiben. Derselbe vergeht spontan, sobald die Lungen wieder unter bessere räumliche Verhältnisse gelangen. Ich beschränke mich auf Fetteinreibungen, die mehrmals täglich über die Brust gemacht werden, und gebe das *Ol. jecoris* oder die apfelsaure Eiseninktur, deren genauere Indicationen weiter unten bei der Behandlung der Rachitis gegeben werden sollen.

4) Lungenemphysem (et *inspiratum*, das Aufblähen)

Das bekannte grossblasige Lungenemphysem, wodurch erwachsene Kranke den faßförmigen Thorax bekommen, und Herz und Diaphragma verdrängt werden, wird in dieser Ausdehnung bei Kindern kaum jemals beobachtet, ja es scheint diese Art von Rarefaktion des Lungengewebes dem kindlichen Organismus ganz zu fehlen. Hingegen findet man häufig das vesiculäre und interstitielle Emphysem unter folgenden anatomischen Erscheinungen.

Pathologische Anatomie.

Das reine vesiculäre Emphysem besteht in einer bleibenden Erweiterung einer grossen Parthie von Lungenbläschen, die jedoch hierbei nicht zerreißen, sondern nur vielleicht um das doppelte anschwellen. In dieser Weise verändert sich fast regelmässig das lufthaltige Lungengewebe in der Nachbarschaft luftleerer Stellen, also neben Pneumonie, Atelektase und Tuberculose. Die emphysematöse Lunge kollabirt nach Eröffnung des Thorax nicht, fühlt sich eigenthümlich, wie ein mit Luft gefülltes Kissen an, ist grasgrün anmisch und sinkt beim Anschneiden mit einem diffusen, kaum knisternden Geräusche zusammen. Bei längerem Bestehen und zunehmender Atrophie der Alveolarwand gesellt sich hienzu immer das interlobuläre Emphysem.

Dasselbe besteht in einer Ansammlung von Luft in dem Zellgewebe, das die einzelnen Lungenlappchen mit einander verbindet, und kann nur durch Zerreissung einzelner Lungenzellen und durch Austritt der Luft in die anstossenden, interlobulären Interstitien entstanden gedacht werden. Es erscheinen dann an der Oberfläche unter der Lungenpleura kleinere und grössere durchscheinende Luftblasen oder Streifen, welche sich in der Richtung der Interstitien verschieben lassen und auch in die Tiefe der Lunge sich verzweigen. Zuweilen umschreiben sie ein Lungenlappchen ineckförmig und bilden, wenn zwischen vieler benachbarten Lappchen das interlobuläre Emphysem sich entwickelt, grössere Luftblasen, welche über ausgehöhltere Strecken der Pleura hin- und hergeschoben werden können. Ein ganz seltenes Ereigniss ist das Austreten von Luft in das die Bronchien umgebende Bindegewebe, in das Mediastinum anticum und von da aus in das Zellgewebe des Halses und der Brust. Es gehen diese Fälle fast immer tödtlich aus.

Ueber die Entstehung des gewöhnlichen Emphysems existiren vielfache zum Theil nicht stichhaltige Ansichten. Gewiss ist nur, das Verdichtungen eines Theiles des Lungensparenchyms ein vicariirendes, vesiculäres Emphysem des übrigen Gewebes veranlassen, und dass bei den Sectionen atrophischer Kinder hauptsächlich in Folge von Enteritis folliculosa und Cholera nostras gewöhnlich interlobuläres Emphysem gefunden wird. Ueber das in vielen Büchern erwähnte Vorkommen des Emphysems nach Keuchhusten habe ich keine positiven Erfahrungen gemacht, ich kann mich im Gegentheil nicht entsinnen, dasselbe jemals bei einem an Keuchhusten oder dessen Nachkrankheiten verstorbenen Kinde beobachtet zu haben. Auch Rilliet und Barthex wollen von dieser Complication nichts wissen, und es geht eben hieraus hervor, dass ausser der mechanischen Ausdehnung der Alveolen, welche sich

bei pressender Expiration auf Kosten des Blutgehaltes der Lungen denkbar ist, noch eine specielle Ernährungsstörung der Alveolenwandung zugegen sein muss, ohne welche trotz aller Geklagtheitsursachen doch kein Emphysem zu Stande kommt. Als eine fernere Ursache hat man auch noch das Einblasen von Luft bei asphyktischen Neugeborenen angeführt, was aber auch nur wenig Wahrscheinlichkeit für sich hat, wenn man berücksichtigt, dass bei Sectionen die Lungen Neugeborener mit aller Kraft aufgeblasen werden können, ohne jemals zu zerreißen. Die Lungen sind so dehnbar und lassen sich durch forcirtes Einblasen so vergrößern, dass eine einzige die ganze Brusthöhle anfüllt; wenn man aber die Luft wieder ausströmen lässt, so collapsiren sie wieder, ohne die geringste Spur von Emphysem zurückzulassen.

Symptome.

Da wir bei Kindern, wie es scheint, fast niemals chronisches, sondern immer nur *acutes* Emphysem haben, so entwickelt sich auch bei ihnen nicht die Form des Thorax und es kommt auch nicht zu einem Tiefstand des Zwerchfelles. Wir haben demnach kein physikalisches Zeichen und es fragt sich sehr, ob die in den Büchern beschriebene Beschleunigung der Respiration nicht besser den das Emphysem bedingenden Lungenkrankheiten als diesem selbst zugeschrieben werden muss. Es hat also nur pathologisch-anatomische Bedeutung. Von einer Prognose und Therapie kann bei einer Veränderung, die sich der Diagnose entzieht, natürlich keine Rede sein.

b) Oedema pulmonum (πύ οἰσμα, die Geschwulst).

Bei den meisten Krankheiten des Herzens, der grossen Gefässe und der Lungen tritt als Schlussakt der ganzen Krankheit oder auch erst in Agent ein rasch tödtendes Lungenödem auf. Dasselbe hat natürlich als pathologischer Zustand wenig Bedeutung mehr, sondern muss als Anfang des Todes betrachtet werden. Hingegen kommt bei Malaria und hauptsächlich bei Scharlach ein rasch auftretendes Lungenödem vor, das nicht immer zum Tode führt, sondern spontan oder durch Anwendung geistigter Mittel wieder verschwindet. Dieses letztere ist es, worauf unser Augenmerk sich besonders zu richten hat.

Pathologische Anatomie.

Wir verstehen unter Lungenödem eine *seröse* Anschwellung in die Lungenalveolen, die feinsten Bronchien und in das interstitielle Gewebe. Weder das erste noch das letzte kann allein ohne Bethheiligung des andern *serös* infiltrirt werden, und es kann deshalb der Streit einzelner Autoren, ob das Oedem in den Alveolen oder in den Interstitia seinen Sitz habe, zum Vortheile beider Partheien entfallen werden. Oedematöse Lungen sinken bei Eröffnung des Thorax nicht zusammen, sind von einer graublauen oder graugelben Farbe, je nach dem Blutgehalte der ergriffenen Lungenparthien und von schwerem Gewicht, schwimmen im Wasser und knistern stark bei Druck. Der Eindruck des Fingers hinterlässt eine leichte Delle, indem auch die entsprechende Pleura oedematosa infiltrirt ist. Auf dem Durchschnitt bietet sich eine glatte glänzende Fläche, aus welcher beim leichtesten Druck

ein rother oder gelber feinschlämiger Schaum in grosser Menge hervorquillt. Der Austritt dieses Schaumes ist ebenfalls von einem knisternden Geräusche begleitet. Das Lungenödem beschränkt sich niemals auf kleine Parthien des Lungengewebes, sondern ergreift gewöhnlich die unteren Lappen beider Lungen, ein Beweis, dass seine Ursache keine locale, sondern eine allgemeinere, auf Circulationsstörungen beruhende, sein muss. Die ödematösen Lungen lassen sich aufblasen, und es sind nicht alle Alveolen mit Serum gefüllt. Die entsprechenden Bronchien sind schleimhaltig und in den Bronchien höherer Ordnung findet sich immer ein ähnlicher röthlicher Schaum, wie er beim Einschnitten auf der Schnittfläche hervortritt.

Symptome.

Das vorherrschendste Symptom ist eine betrübliche Athemnoth, die sich rasch bis zur Erstickungsgefahr steigern und in wenigen Stunden tödtlich endigen kann. Sind die Kinder schon gross genug und erlauben es ihre Kräfte, so richten sie sich auf und setzen sich gerade in ihr Bett, um eine möglichste Ausdehnung des Thorax zu erzielen. Die kleinen Kinder bekommen im Liegen heftige Stickerfälle, wodurch es nothwendig wird, sie aufzuheben. Das Athmen wird ausserordentlich frequent, laut keuchend und rasselnd, und die Sprache wird leise, undeutlich. Der Husten ist locker und grössere Kinder bringen auch etwas weissen Schaum aus dem Munde. Der Puls ist sehr klein, steht aber, was die Zahl der Schläge betrifft, in keinem Verhältnis zur Frequenz der Athemzüge.

Die physikalische Untersuchung ergibt bei grosser Ausdehnung des Oedems einen weniger resonanten, niemals ganz gedämpften Percussionschall. Da das Lungenödem in den meisten Fällen doppelseitig und die Dämpfung keine exquisite ist, so gibt die Percussion häufig keine genügende Auskunft über die vorhandene Veränderung des Lungengewebes. Wichtiger ist die Auscultation. Man hört über den ödematösen Stellen ein weit verbreitetes, feuchtes Knisterrasseln, das sich für ein geübtes Ohr durch ein gröberes und unregelmässigeres Geräusch vom pneumonischen Knistern unterscheidet. Oft wird dasselbe übertönt durch die lauten Rasselgeräusche, welche durch den in den grösseren Bronchien angesammelten Schleim erzeugt werden, nach einer kräftigen Hustenbewegung aber momentan verschwinden. Die aufgelegte Hand fühlt diese Rhetik ausserordentlich stark, während das Knisterrasseln sich gewöhnlich nicht durch Palpation erkennen lässt. Von einer Pneumonie ist das Oedem schwer zu unterscheiden, hauptsächlich in jenen seltenen Fällen von Oedem, wo dasselbe von starkem Fieber begleitet wird. Die Athemnoth ist bei Oedem wenigstens noch grösser als bei Lungenentzündung, die physikalische Untersuchung gibt keine charakteristischen Unterschiede, und das einzige, was Oedem mit ziemlicher Bestimmtheit vermuthen lässt, ist das doppelseitige Auftreten des Knisterrasseln, während die lobäre Pneumonie gewöhnlich doch nur halbseitig beobachtet wird.

Die Prognose ist, wenn der Ursprung derselben nicht auf einen Herzfehler oder eine chronische Lungenerkrankung zurückzuführen ist, nicht so ungünstig, als man dem ersten Eindrucke nach glauben sollte. Die nach Scharlach von Nephritis und consecutivem Lungenödem be-

fallenen Kinder haben oft die grösste Athemnoth, ihre Gesichtszüge sind entstellt und man glaubt ein baldiges Ende sicher prognosticiren zu können, nach und nach erholen sie sich dennoch mit Abnahme des Erweisses und der Cylinder im Urine und mit gleichzeitiger Zunahme der Urinquantität.

Behandlung.

Gegen die Nephritis nach Scharlach als veranlassendes Moment dieser Lungenerkrankung erweist sich die antiphlogistische Behandlung mit Calomel, Purgantien und Blutentziehung als entschieden schädlich. Es kann zwar allerdings durch eine Venäsection bei grösseren Kindern die Athemnoth rasch beseitigt werden, sie kehrt aber sehr bald wieder und es wird man der Zustand, da noch Anämie sich dazu gesellt hat, bedeutend verschlimmert. Eine grosse Anzahl trockner Schröpfköpfe, auf Brust und Rücken gesetzt, erleichtert die Dyspnoe sehr beträchtlich und es kann dieses Mittel ein- bis zweimal täglich ohne allen Schaden und ohne besondere Umstände wiederholt werden. Der Pflege der Haut muss natürlich besondere Sorgfalt zugewendet werden, was durch warme Bäder und Waschungen mit stark verdünnter Lauge am besten erreicht wird. Die Urinsecretion wird nach meinen bisherigen Beobachtungen durch kein Mittel so entschieden angeregt als durch das längst bekannte, auch als Volksmittel beliebte Roos Juniperi, wovon man täglich 1—2 Mal einen halben Kaffeelöffel reicht. Es hat dasselbe auch den Vortheil, dass es durchaus nicht ungünstig auf Appetit und Stuhl wirkt, und dass die Kinder es mit Honig oder Syrup vermischt lange Zeit nehmen können. Die übrigen Diuretica, wie die Scilla, die Digitalis, das essigsaure Kali etc. sind alle schädlicher zu nehmen, und haben vielfach unangenehme Nebenwirkungen, weshalb sie weniger brauchbar erscheinen als dieses Roos Juniperi. In den höchsten Graden von Athemnoth leistet zuweilen ein Brechmittel aus Ipecacuanha und Tartarus stibatus entschiedene Dienste.

6) Lungenblutung. Haemorrhagia pulmonum. Haemoptoe.

Bei Erwachsenen kennt man dreierlei Arten von Lungenblutungen. Es kommen entweder längere Zeit hindurch die Sputa blutig gefärbt zum Vorschein, oder es ergiesst sich das Blut plötzlich stromweise aus Mund und Nase (Blutsturz) oder es sinkt ein Kranker bewusstlos zusammen und hustet, erst nachdem er wieder erwacht ist, Blut aus. Bei Kindern kommt meines Wissens nur die zweite Art vor und zwar als Complication zweier ganz verschiedener Zustände, des Keuchhustens und der Tuberculosis. In einzelnen Keuchhustenepidemien wird ziemlich häufig Blut in grosser Menge aus Mund und Nase ausgefördert, der überaus gutartige Verlauf, der Mangel der consecutiven, blutigen Sputa und überhaupt aller anderen schlimmen Folgen lässt aber gegründete Zweifel entstehen, ob das Blut wirklich aus den Lungen kommt oder ob nicht vielmehr in Folge der heftigen Hustenparoxysmen im Pharynx oder Larynx einzelne Gefässerkrankungen sich ereignen. Mir scheint aus den obengenannten Gründen das letztere in der That wahrscheinlicher.

Die Lungenblutungen tuberculöser Kinder sind ausserordentlich

selten. Man kann hunderte derselben am Pithitis nehmen, zu Grunde gehen sehen, ohne nur ein einziges Mal Hämoptoe zu beobachten, und wo sie vorkommen, sind sie nicht am Anfange des tuberculösen Processes zu bemerken, sondern als Schlussakt, einige Tage vor dem Tode. Bei kleinen Kindern habe ich sie noch niemals gesehen und erst einmal bei einem 10jährigen Mädchen.

Die Behandlung der Hämoptoe in Folge von Keuchhusten findet sich in dem hiesigen handlichen Abchnitte, die bei tuberculösen Kindern ist nur eine symptomatische und besteht lediglich in Darreichung kleiner Dosen Narcotica zur Milderung des Hustens und zum Zwecke der Entlassung.

2) Der hämoptische Lungeninfarkt.

Diese von Linnec zuerst genau beschriebene Veränderung der Lunge findet sich nicht gar zu selten bei Sectionen von Kindern, die an Purpura oder Lungentuberculose zu Grunde gegangen sind, kommt aber auch schon bei Neugeborenen vor und ist hier meist mit Pyämie und Keimfäule in den Lungen complicirt.

Pathologische Anatomie.

In einer, zuweilen auch in beiden Lungen finden sich schwarz-rothe Stellen von der Grösse einer Erbse bis zu der einer Wallnuss, die sich scharf vom übrigen Lungengewebe abgrenzen und eine bedeutend grössere Resistenz bieten. Der Durchschnitt ist trocken und nicht glatt, sondern etwas körnig, und die so veränderten Stellen der Lunge lassen sich brechen fast wie Leberparenchym. Der Grund dieser dunkleren Färbung und vermehrten Resistenz liegt in einem Bluterguss, der eine grössere Anzahl von Alveolen ausgefüllt und die Interstitien comprimirt hat. Der dickkörnige Durchschnitt erklärt sich ebenfalls daraus, indem das gewonnene Blut genuine Abgüsse der traubenförmig geordneten Alveolen darstellt. Streift man mit den Scalpeldrücken etwas hart über einen solchen Durchschnitt, so bekommt man eine blutig gefärbte, mit feinkörnigen Blutcoagulis gemischte Flüssigkeit.

Verwechslung mit krupöser Pneumonie wäre möglich. Berücksichtigt man aber die umschriebene Form des hämoptischen Infarktes, seine dunkelrothe Farbe, die scharfe Abgrenzung und den dunkelrothen, krümeligen Brei, den man von der Schnittfläche abschaben kann, so wird nicht leicht ein Zweifel über die Diagnose bestehen können. Wenn diese Infarkte zwischen dunkelrothem, hypostatischem Gewebe, z. B. hinten und unten, sich entwickelt haben, so fällt der Unterschied der Farbe weg, doch bieten die grössere Dichtigkeit und Bröcklichkeit, sowie der Mangel der Luftbläschen immer noch Anhaltspunkte genug. Die hämoptischen Infarkte sind häufiger central als peripherisch und schwimmen im letzteren Falle durch die Pleura durch. Die zu ihnen führenden Bronchien sind bis zu einer gewissen Höhe mit Coagulis gefüllt, das Blut erstreckt sich aber gewöhnlich nicht weit nach aufwärts und es werden desshalb auch keine blutigen Spots ausgeworfen.

Nach Rokitsansky trifft dieser Zustand häufig mit aktiver Er-

weiterung des rechten Herzens zusammen und er kann sich bei höheren Graden mit Zerbreitung der Lungensubstanz compliciren, wo man dann grössere Höhlen mit Blut und lesem Lungengewebe gefüllt sieht. Nach demselben Ausse ist auch eine Rückbildung möglich, indem entweder der Infarkt sich verflüssigt, wobei er eine schwärzlich-bräunliche, rost- und weinbeinfarbenliche Färbung annimmt und so theils resorbiert, theils durch die Bronchien ausgeworfen wird, oder indem das geronnene Blut schrumpft und zu einem fleisigen oder braunen Gewebe obsolescirt. In schlimmen Fällen kann der Infarkt auch brandig werden und dann das Bild eines completen Lungengangrän bieten.

Symptome.

Der hämoptoische Infarkt ist normale idiopathisch, sondern complicirt sich mit Purpura, Tuberculosis, Pneumonie und Herzhöhlen, in allen Fällen steigert sich durch seine Entstehung die Athemnoth und das Fieber. Wir sind weder durch physikalische Diagnostik, noch anderweitige Symptome im Stande, ihn von lobulärer Pneumonie zu unterscheiden. Die physikalischen Zeichen sind schon deshalb meistens ohne Belang, weil der Infarkt gewöhnlich gegen die Lungenwurzel und nicht an der Peripherie vorkommt. Von einer speciellen Therapie kann bei so mangelhaften diagnostischen Anhaltspunkten natürlich nicht die Rede sein.

8) Der Lungenbrand. Gangraena s. Mortificatio pulmonum.

Der Lungenbrand ist bei Kindern eine ausserordentlich seltene Krankheit. Er kommt vor nach traumatischer Pneumonie, veranlasst durch fremde Körper, die während einer heftigen Inspiration in die Lungen gelangt sind, bei hässartigen Verläufen zoster Exantheme, der Noma oder des Abdominaltyphus, bei Pyämie und endlich als schlimmer Ausgang des hämoptoischen Infarktes.

Pathologische Anatomie.

Seit Linnæe unterscheidet man einen diffusen und einen umschriebenen Lungenbrand.

Die Charaktere des diffusen sind: Verbreitung über grössere Partien der Lunge, über einen Lappen oder einen ganzen Flügel, schmutzig grünliche oder bräunliche Färbung des morschen oder ganz zerfliessenden, brandig stinkenden Gewebes, welches mit einer flockigen schaumigen, ebenfalls brandig stinkenden Jauche infiltrirt ist. Diese Art von Brand ist nirgends scharf begrenzt, sondern geht allmählig durch ein ödematöses in gesundes Gewebe über. Sie ist fast niemals für sich allein zu beobachten, sondern gesellt sich gewöhnlich zum circumscribten Brande.

Der umschriebene Brand kommt häufiger vor als der erstere. Es wird hierbei an irgend einer Stelle das Gewebe zu einem schwarz-grünen, feuchten, nicht leicht zerfalligen Schoef verwandelt, der überall scharf begrenzt ist. Die Grösse dieser Mortificationen erreicht im kindlichen Alter nicht leicht die einer Wallnuss. Nach einiger Zeit löst sich nun dieser brandige Pfropf von seiner normalen Umgebung ab und liegt in einer Anhüftung des brandigen Lungensparenchym,

ringum von brandiger Jauche umspült, oder er zerfällt alsbald zu einem jauchigen Reie, der von einer zelligen Brandexcavation umgeben ist. Er sitzt häufiger an der Peripherie und im unteren Lappen als im Centrum der Lunge und fällt, wenn die Pleura mit gangränescirt und nicht fest mit der Costalpleura verwachsen ist, nach seiner Lösung in den Pleurasack, worauf jauchige Pleuritis und Pneumothorax sich entwickelt.

Das den brandigen Piroph umgebende Lungengewebe ist entweder nur oedematis oder erkrankt in verschiedener Ausdehnung pneumonisch, in beiden Fällen ist grosse Neigung zum diffusen Brande vorhanden, so dass man, wenn die Kinder die grossartige Zerstörung lange genug aushalten, einen ganzen Lungenlappen in breiige Jauche verwandelt finden kann. Wenn die in den erkrankten Stellen verlaufenden Arterien nicht allseitig thrombosirt sind, so entstehen beträchtliche Blutungen, die sich durch die Bronchien nach aussen ergiessen können, jedenfalls aber durch das sich in der gangränösen Hohl sammelnde Blut das brandige Material vergrössern. Mit Ausnahme der traumatischen Gangrän ist wohl noch niemals eine Heilung beobachtet worden.

Symptome.

Die Symptome sind je nach der Ursache der Gangrän verschieden. Bei Typhus, Noma und blässrigen Mäsem ist die Allgemeinerkrankung so bedeutend und die Schmerzempfindung dabei so vermindert, dass gar keine subjektiven und nur unbedeutende objektive Symptome sich einstellen, während der traumatische Brand mit den Symptomen der Pneumonie beginnt. Ich beobachtete einmal einen solchen Fall, in welchem ein 14-jähriger Knabe eine Grasnähre im Mund hatte und durch plötzliches Gelächter in den Larynx bewachte. Er war hierauf noch ein paar Tage ziemlich wohl, so dass man glaubte, er habe sich geirrt und die Achse geschluckt, bis sich plötzlich sämtliche Symptome einer Pneumonie einstellten, die aber nicht regelmässig verlief. Es wurden die Sputa nämlich gangränös und unter heftigen Hustenparoxysmen expectorirte der Kranke einzelne Theile der Achse und grosse Mengen brandiger Fetzen, die die Luft des Zimmers in unerträglicher Weise verpesteten. Dieser Auswurf dauerte mehrere Wochen fort und hörte erst nach vielen Monaten gänzlich auf. Der zum Gerippe abgemagerte Knabe behielt eine grosse Caverne, die sich nach und nach verkleinerte und nach sechs Jahren kaum mehr nachzuweisen war. Er gewann erst nach Jahren sein früheres gesundes Aussehen wieder. Dies ist zu gleicher Zeit der einzige Fall von Gangraena pulmonum, den ich glücklich endigen sah.

Bei den übrigen nicht traumatischen Fällen von Lungenbrand gibt sich der Eintritt desselben durch eine plötzliche Verschlechterung des Allgemeinzustandes zu erkennen, wobei besonders das Gesicht sich schnell verändert, ein bläufarbiges einstelltes, hippokratisches Aussehen annimmt und der Puls ausserordentlich klein und frequent wird. Die Hauttemperatur ist dabei nicht erhöht, das charakteristischste Kennzeichen aber bleibt immer ein nachhafter Geruch aus dem Munde, der sich durch Veränderungen der Mundhöhle nicht erklären lässt. Die physikalische Untersuchung kann möglicherweise resultatlos bleiben, wenn der Process central ist, oder es finden sich schwache circumscripte

Dämpfung, Knisterrasseln, Bronchialathmen und Rasselgeräusche und bei Perforation der Lunge die Zeichen des Pneumothorax. Gewöhnlich sind die Sputa blutig, der Husten ist quälend krampfhaft. Bald gesellen sich colliquative Schweisse, hektisches Fieber und Delirien dazu, worauf fast regelmässig der Tod erfolgt.

Behandlung.

Wo fast regelmässig der Tod erfolgt, erscheint eine rationelle Behandlung ziemlich mislich. Die bisher beobachteten Genesungen sind unter einer Behandlung mit Clena, Mineralsäuren, essigsaurem Blei, Chlor und dessen Präparaten und endlich mit Kresot erfolgt.

9) Tuberculosis der Lungen und Bronchialdrüsen.

Da in einem späteren Abschnitte die Dykrasien als Gesamtkrankheiten einer ausführlichen Erörterung unterworfen werden sollen, so wird es genügen, wenn der Vollständigkeit halber hier die pathologische Anatomie und Symptomatologie der chronischen Lungentuberculose ihre Stelle findet, während die Ätiologie und die Betrachtung der Allgemeinerkrankung besonders bei den Dykrasien folgen wird.

Pathologische Anatomie.

Im ersten Anfange der Lungentuberculose zeigen sich auf der Schnittfläche zahlreiche, weisse, derbe Knötchen, welche, wie Rindfleisch besonders klar bewiesen und abgebildet hat, Ziemssen's Handbuch der speciellen Pathologie Bd. V, immer an den Übergangstellen der kleinsten Bronchiolen in die Lungenacini ihren Sitz haben. Sie stellen ein solches, blutleeres Infiltrat des Lungenparenchyms dar und gelangen niemals zu weiterer Organisation, sondern verfallen stets der rückgängigen Metamorphose, der Verkäsung und Erweichung. Verkäsung wird im kindlichen Alter viel seltener beobachtet als bei Erwachsenen. Die kleinen Tuberkelknötchen vermehren sich rasch und vergrössern sich endlich zu umfangreicheren Herden, in welchen sich meistens kleine Bronchien im Quer- oder Längsschnitte finden.

Die Zellen der zuerst ergriffenen Partien verschwinden allmählig und das ganze Lungengewebe wird zu einem moleculären, diffusen Infiltrate umgewandelt, während sich an der Peripherie desselben immer neue Alveolen mit grossen, epithelartigen Zellen füllen, Buhl's Desquamativpneumonie. Die Verkäsung kann so schnell zu Stande kommen, dass die einzelnen Tuberkelknötchen sich noch nicht vereinigt haben und also käsige Lokalarherde entstehen. Bei Kindern aber kommt es gewöhnlich rasch zu grösseren Infiltrationen, käsigen Leberpneumonien, welche sich keineswegs mit Vorliebe der Lungenspitzen bemächtigen, sondern auch vielfach an den unteren Lappen vorkommen. An diesen grösseren tuberculösen Infiltrationen kann man den Process des Erweichens und Zerfallens am besten beobachten. Die endlich zerfliessende Tuberkelmasse entleert sich durch einen Bronchus und es bleibt eine von Theil noch gefüllte oder vollkommen leere Höhle zurück, in deren Wandung wieder neue Tuberkeln sich absetzen und dann durch ihre Erweichung die Caverne von Neuem vergrössern. So entstehen endlich brüchige unregelmässige, mit verschiedenen Ver-

sprengen verschiedene Höhlen, die mit einem schaumigen, bröckligen, gelben oder grauen Eiter angefüllt sind. Bald finden sich mehrere kleinere, bald nur eine einzige, die einen ganzen Lappen einnehmen kann, wobei zu bemerken ist, dass fast niemals eine Caverne auf den nächstgelegenen Lappen übergreift, sondern die zwischen den einzelnen Lappen bestehendsten Adhäsionen unversehrt lässt. Grössere Cavernen communiciren immer mit einzelnen Bronchien, deren Lumen wie scharf abgeschnitten an der Höhlenwandung klappt. Zuweilen laufen obliterirte Gefässe oder Parenchymreste strang- oder brückenartig quer durch eine Höhle. Diese Gefässe scheinen aber regelmässig obliterirt zu sein, indem Lungenblutungen bei Kindern ausserordentlich selten und namhaftere gar nie beobachtet werden. Auch der Durchbruch einer Caverne in den Pleurasack und somit Pneumothorax kommt meines Wissens bei tuberculösen Kindern nicht vor. Das eine Caverne umgebende Lungengewebe ist niemals vollkommen normal, sondern hartig verklebt oder im Zustande grauer, rother oder schon neuerdings tuberculisirter Hepatisation. Häufig findet man auch Oedem, besonders in den unteren Lappen, während ein ricariirendes Emphysem gewöhnlich des oberen Lappen einnimmt. Die Bronchien, welche mit den Cavernen communiciren, enthalten einen gelben, bröcklichen Cavernenexsudat, während die übrigen eine injicirte und geschwellte Schleimhaut zeigen. Nach Hassel obliteriren die zu den tuberculösen Höhlen und Ablagerungen führenden Aeste der Pulmonalarterie, in gleichem Verhältnisse aber kommen in diesen Lungentheilen, die ihr Hauptgefässnetz eingebüsst haben, neue Gefässe zur Geltung, welche zum Theile theils der Bronchialarterien, theils der Art. intercostales gehören und ihr Blut in die Bronchialvenen und in die Vena azygos abgeben; eine Kreislaufstörung, mit welcher auch die partielle Erweiterung und ungewöhnliche Entwicklung der subcutanen Venen in Verbindung stehen mag.

Cavernen können bekanntlich heilen durch Verödung oder durch Narbenbildung. Zu beiden Arten von Heilbestrebungen ist jedenfalls eine Reihe von Jahren erforderlich und es ist deshalb nicht leicht bei der Section einer kindlichen Leiche dergleichen zu finden. Verödung kommt bei Kindern niemals vor, hingegen sieht man zuweilen schon noch bestehenden Cavernen verdichtete, strahlig eingezogene Stellen, welche höchst wahrscheinlich als die Reste kleiner Cavernen zu betrachten sind.

Die tuberculöse Kinderlunge zeichnet sich schliesslich vor der der Erwachsenen durch den Mangel der Pigmentirung aus.

Die Bronchialdrüsen sind viel häufiger der Sitz der Tuberkeln als die Lunge, sie sind regelmässig tuberculos entartet, wenn sich diese Erkrankung in den Lungen findet, aber oft findet sie sich in den Bronchialdrüsen allein, ohne auf die Lungen übergegriffen zu haben. Es kommt hier hauptsächlich der grosse gelbe Tuberkel vor, während die aggregirten Haufen kleiner Tuberkel seltener sind und Miliartuberkel fast gar nicht beobachtet werden.

Gewöhnlich entartet die ganze Drüse zu einem grossen gelben Tuberkel und erreicht die Grösse einer Hasel- und selbst einer Wallnuss. Die Tuberculosis erstreckt sich meist über mehrere Drüsen, so dass die Bifurkation der Bronchien von einem grossen Tuberkelpaque-

eingeschlossen ist. Nur die ausserhalb der Lungen liegenden Drüsen erreichen eine so erhebliche Grösse, die die Bronchien innerhalb der Lungen begleitenden Drüsen werden kaum grösser als eine kleine Mandel sehr lagern sich als kugelförmige Rinsen um die ersteren. Das Drüsenparenchym ist in der Regel ganz verschwunden und es bleibt nichts mehr übrig als eine Hülle, die ehemalige Drüsenmembran, an welcher allseitig eine gelbe Tuberkelmasse adhärirt. Dasselbe scheint wenig Neigung zur Erweichung zu haben, man findet wenigstens auffallend selten schmelzende Tuberkel in den Drüsen, wenn sie aber statt hat, so kann sie ebenso gut an der Peripherie wie im Centrum beginnen. Bei älteren Kindern kommt wohl hier und da auch eine partielle Verkäsung zu Stande. Die Wirkung der tuberculösen Bronchialdrüsen auf die Nachbarorgane ist eine zweifache, wie Billiet und Barthex sehr gründlich entwickeln. Aus den Angaben dieser Autoren sind folgende Thatsachen zu entnehmen: Die Drüsen wirken entweder 1) durch Compression oder 2) durch feste Verwachsung mit den Nachbarorganen und nachträgliche Perforation.

ad 1) Die Anatomen scheiden die ausserhalb der Lungen liegenden Drüsen a) in Trachealdrüsen, zur Seite der Trachea bis zur Theilung derselben; b) in Bronchialdrüsen zwischen der Bifurkation; c) in Herzdrüsen auf dem Herzbeutel und den grossen Gefässen; und d) in Oesophagusdrüsen, im Mediastinum posticum in der Nähe des Oesophagus. Alle diese Drüsen können eine tuberculöse Ecartung und Vergrösserung erfahren und dann auf die zunächst liegenden Organe drücken.

Was die Compression von Gefässen betrifft, so sind derselben unterworfen: die Vena cava superior, die Lungenarterie, die Lungenvenen und die Vena azygos. Es sind Beispiele von vollständiger Obliteration der genannten Venen in der Literatur aufgezählt, ich selbst habe dergleichen noch nie beobachtet, sondern erinnere mich nur einmal in einer Lungenvene bei gleichzeitiger Bronchialdrüsentuberculose eine Verengung gesehen zu haben. Die Compression der Gefässe kann Hämorrhagien und Oedeme verursachen. So veranlasste z. B. die der oberen Hohlvenen nach den genannten Autoren eine Blutung in den Arachnoidealsack und Oedem des Gesichtes. Bei Druck auf die Lungenvenen liegt die Möglichkeit eines Lungenödemes sehr nahe.

An der Trachea und der Bifurkation findet man zuweilen Eindrücke und Abflachungen, die ebenfalls von tuberculösen Drüsen herühren, aber keine deutliche Verengung des Lumens zu erzeugen im Stande sind. Wichtiger ist die Compression der Nerven, namentlich der N. vagi. Die Drüsen wachsen zuweilen so innig um dieselben herum, dass es dem anatomischen Messer geradezu unmöglich wird, sie in denselben zu präpariren. Die Leitung scheint nichts desto weniger nicht unterbrochen zu sein, sonst müssten beträchtlichere Störungen in Circulation und Respiration viel häufiger bei Drüsentuberculose beobachtet werden, als diese in Wirklichkeit der Fall ist. Compression des Oesophagus scheint sehr selten vorzukommen, zuweilen wird eine einfache, zeitliche Verschiebung derselben wahrgenommen.

ad 2) Die Bronchialdrüsen können in- und ausserhalb der Lunge mit den Bronchien innig verwachsen und bei man eintretendem Schmelzungsprocess die Bronchialwand perforiren. Nach Billiet und Barthex

sollen auch nicht schmelzende, harte Tuberkelknoten die Knorpelringe der Bronchien umhüllen und so Perforation veranlassen können, ein Zustand, der von den pathologischen Anatomen bisher wenig beobachtet worden ist. In den Lungen selbst ist es schwer, eine Caverne von einer in einen Bruchus durchgebrochenen, vereiternden Bronchialöhre zu unterscheiden. Diese Pseudocavernen sitzen stets in der Nähe der Lungenwurzel und ihre Höhlung hängt nach aussen mit den übrigen Tuberkelmassen der entarteten Bronchialdrüsen zusammen.

Die genannten Autoren sprechen auch von einer tuberculösen Perforation der Pulmonararterie und des Oesophagus, worüber ich keine eigene Erfahrung besitze.

Symptome.

Was zuerst die physikalische Untersuchung betrifft, so muss hier nochmals eingeschärft werden, dass die Percussion sehr leise und in langsamer Aufeinanderfolge der Schläge vorzunehmen ist, weil sonst die köchleren Dämpfungen regelmässig übersehen werden. Bei Miliartuberculose, wo die beiden Lungen gleichmässig mit sandkerngrossen Tuberkeln durchsetzt sind, gibt die Percussion natürlich keine Aufklärung, der Percussionschall ist im Allgemeinen etwas tympanitisch, eine Ungleichheit zwischen den beiden Brusthälften lässt sich aber nicht entdecken. Das gleiche gilt von der Tuberculose der Bronchialdrüsen, die von den Lungen und grossen Gefässstämmen bedeckt sind und so der physikalischen Diagnose gänzlich entgehen. Hingegen lassen sich grössere tuberculöse Infiltrationen durch leises aufmerksames Percutiren sehr wohl finden, nur sind, wie schon bei der pathologischen Anatomie erwähnt wurde, die Lungenspitzen nicht so ansehnlich der Sitz derselben. Man findet häufig weiter unten oder seitwärts eine umschriebene Dämpfung, die ebenfalls auf Tuberculose zu beziehen ist und bei Erwachsenen in dieser Weise fast niemals vorkommt. Wenn einmal Cavernen sich gebildet und ihren Inhalt durch einen Bronchus entleert haben, so wird der matte Percussionschall wieder etwas mehr wech und bekommt den tympanitischen Beiklang, was durchaus keine Besserung noch Verkleinerung der Tuberkelinfiltration anzeigt.

Durch Auscultation entdeckt man bei Miliartuberculose nichts Charakteristisches; der hierbei immer bestehende Bronchialcatarrh verursacht weit verbreitete gross- und kleinklaorige Rasselgeräusche, die sich von denen eines einfachen Bronchialcatarrhes durch nichts unterscheiden. Bei grösseren tuberculösen Verdichtungen des Lungengewebes hört man Bronchialathmen, starke Consonanz der Stimme und des Hustens und abnorme deutliche Fortleitung der Herzstöne in vom Herzen entfernten Lungentheilen. Am Rande der Dämpfung wird an einzelnen Stellen Knisterrasseln oder einfach verschärftes Athmen vernommen. Der Herzhok ist bei allen tuberculösen Kindern auffallend stark. Schmilzt nun eine solche Tuberkelinfiltration und entstehen Cavernen, so ändern sich auch die auscultatorischen Symptome ebenso, wie diese schon bei der Percussion erwähnt wurde; es stellt sich nun cavernöses Gurgeln und Rassel ein und das Athmungsgeräusch wird cavernös, doch sind die Cavernen der kleineren Kinder in der Regel nicht von solchem Umfange, dass diese Symptome immer regelmässig und gehörig charakteristisch zum Vorschein kämen.

Was nun die funktionellen Symptome betrifft, so sind dieselben mannigfacher Art. Die Respirationsbewegungen sind fast immer beschleunigt, am schnellsten bei fieberhafter acuter Tuberculose, wo die beiden Faktoren, 1) Fieber und 2) mechanisches Hindernis der Luftwege, sich vereinigen. Sie steigern sich dann zu einer Höhe von 60—80 in der Minute. Bei chronischer Tuberculose ist die Beschleunigung kaum merklich und gar keine Dyspnöe zugegen. In den rasch sich entwickelnden und fortschreitenden Fällen aber kann grosse Athemnoth, selbst Orthopnöe und Nasenflügelathmen sich einstellen, was mehr auf Rechnung gleichzeitiger Pleuritis und partieller tuberculöser Pneumonie als auf Rechnung der Raumbeengung in Folge der Tuberkeln kommt. Im Allgemeinen kann angenommen werden, je acuter und verbreiteter der Process in den Lungen, um so beschleunigter und erschwerter sind die Respirationsbewegungen.

Der Husten ist unter allen Symptomen das constanteste; denn gänzlich fehlt er niemals, am schwächsten und am wenigsten bemerkbar ist derselbe bei acuter Miliartuberculose, wo derselbe Process in anderen Organen, vor allem im Gehirn, die Reizbarkeit des Nervensystems in einer solchen Weise herabsetzt, dass diese hydrocephalischen Kinder oft Tage lang nicht ein einziges Mal husten, obwohl bei der bald darauf stattfindenden Section beide Lungen mit miliaren Tuberkeln durchsetzt und die Bronchialdrüsen in eine käsige Masse verwandelt gefunden werden.

Der Husten ist nicht nur das constanteste sondern auch das frühzeitigste aller Symptome, er hört während des ganzen Verlaufes niemals vollständig auf, wenn auch zuweilen kurze, zur Stellung einer günstigeren Prognose verführende Remissionen eintreten. Anfangs ist er trocken und kurz, aber doch schon häufig wiederkehrend, später, wenn grössere Partien der Lunge sich heftigen, wird er feucht und wohl auch von convulsivischen Anfällen begleitet. Diese Anfälle haben grosse Aehnlichkeit mit denen des Keuchhustens, nur fehlt hierbei die charakteristische, laute, langgezogene Inspiration am Ende des Hustens, auch kommt es im Verlaufe einiger Wochen nicht zum Auswurf des massenhaften glasigen Schleimes. Dieser krampfartige Husten hat in der Regel seinen Grund in den tuberculösen vergrösserten Trachealdrüsen, welche einen sich fortwährend steigenden Druck und Reiz auf die Trachea und consequent auf den Larynx ausüben, kann übrigens auch durch profuse Secretion allein bedingt werden, wie diess bei erwachsenen Kranken, die an einfacher Bronchialdrüsenentzündung leiden, oft genug beobachtet wird. Wenn die letztere Ursache besteht, so hört der Anfall auf, sobald der Schleim den Larynx passiert hat, was bei Kindern nicht so leicht zu beurtheilen ist, da sie ihn abhald wieder verschlucken. Bei Bronchialdrüsentuberculose hingegen können die Anfälle unbestimmte Zeit und ohne alle Expektoracion fortbestehen und hören in der Regel erst auf, wenn die Erschöpfung einen hohen Grad erreicht hat.

Die Expektoracion, welche bei erwachsenen Tuberculösen einen vortrefflichen Anhaltspunkt gibt, kann bei Kindern bis zum fünften oder sechsten Lebensjahre gar nicht vorkommen, indem diess die aus dem Larynx ausgehusteten Massen sogleich wieder schlucken. Nur bei heftigen Hustenanfällen sieht man zuweilen auch bei

ganzt kleinen Kindern einen weissen, feinstoigigen Schaum auf der Zunge, und selbst zwischen die Lippen treten, der aber durchaus nur als einfaches Secret der catarrhaliſchen Bronchien zu betrachten und keineswegs für Tuberculose charakteriſtiſch iſt. Ueber sieben Jahre alte Kinder, bei welchen übrigens bis zum Eintritt der Pubertät die Phthisis der Lungen sehr selten ist, expectoriren wie die Erwachsenen, und der aus den Cavernen entlohrte Eiter ist theils zerfliessend und arm an Luftblasen wie bei jeten. Das seltene Eintreten der Hämoptoe tuberculöser Kinder wurde schon p. 256 bei Gelegenheit der Lungenerkrankungen überhaupt erwähnt.

Sind die Kinder schon gross genug, um den Ort ihrer Schmerzen anzugeben, so bezeichnen sie fast immer die Herzgrube oder das Sternum und nur äusserst selten eine seitliche Partlie des Thorax als Sitz derselben. Die Erforschung des mehr oder minder heftigen Schmerzes ist prognostiſch nicht ohne Bedeutung, denn je heftiger derselbe und je grösser die dadurch bedingte Unruhe, um so rascher gehen die Kinder dem sicheren Untergang entgegen. Da die Tuberculose selten auf eine Lunge beschränkt ist, so bemerkt man auch an der Lagerung solcher Kinder keine constanten Veränderungen; sie liegen meist auf dem Rücken und wälden nur selten eine Seitenlage. Auffallend ist, dass sie sich trotz der schrecklichen Abmagerung, der langen Dauer der Krankheit und dem anhaltenden Fieber nur wenig und sehr spät aufliegen. Am Habitus des Thorax ist stets eine mit den übrigen Körperverhältnissen nicht übereinstimmende grössere Abmagerung und eine für Tuberculose ziemlich charakteristische Entwicklung der subcutanen Venen zu bemerken. Es erweisen diese Venen besonders in der Nähe des Sternums von der ersten bis dritten Rippe eine gewaltige Ausdehnung und können bis zur Breite einer Linse schwellen.

An den Fingerspitzen bemerkt man bei allen chronischen Krankheiten, in welchen die Blutcirculation der Lungen gehemmt ist, also namentlich bei ausgebreiteter Tuberculose und bei Herzleiden, eine eigenthümliche, kollige Anschwellung, wobei die Nägel sich krallenartig nach vorne krümmen. In den höchsten Graden dieser Wölbung bekommen die Finger das Aussehen eines Trommelschlägels. Wir besitzen hierin ein sehr werthvolles Zeichen, weil dieses Dickerwerden der Fingerspitzen niemals angeboren und nie bei gesunden Kindern vorkommt, sondern immer einen höheren Grad von Stase im rechten Herzen, der in der Regel seinen Grund in den Lungen hat, anzukennen lässt.

Bedeutend vergrösserte Bronchialdrüsen machen, wie schon bei der pathologischen Anatomie bemerkt wurde, zuweilen ein Oedem des Gesichtes. Dasselbe muss auf locale Circulationsstörung zurückgeführt werden, weil bei dem in Folge der Dyskrasie entstehenden Hydrops bekanntlich zuerst die Füsse schwellen und erst nach längerer Zeit ein Oedem der oberen Extremitäten und des Gesichtes nachfolgt, während in diesem Falle das des Gesichtes allein besteht. Man findet alsdann auch eine beträchtliche Erweiterung der subcutanen Halbvenen und eine leichte Cyanose an den Lippen und Augenblern. Rilliet und Barthoz haben durch mehrere Sectionsbefunde in solchen Fällen nachgewiesen, dass wirklich ein Druck vergrösserter Drüsen auf die V. cava descendens stattgefunden hat.

Die Tuberculose der Lungen verläuft entweder als acute Miliartuberculose, wobei dann derselbe Process auch in anderen Organen, namentlich oft im Gehirn und auf dem Peritonäum, sich etablirt und durch mannigfache von anderen Organen ausgehende Symptome die der Lungen in den Hintergrund treten lässt, oder sie verläuft chronisch wie bei Erwachsenen unter den Zeichen der *Phthisis pulmonum*. Die erste Form wird bei der Besprechung der Dyskrasie nochmals erörtert werden, die zweite hat eine Dauer von zwei Monaten bis zwei Jahren und kann auch wieder vollständig zum Stillstande gebracht werden. Ich kenne Kinder von nachweisbar tuberculösen Eltern, die in den ersten Jahren ihres Lebens ganz entschiedene Zeichen der entwickelten Lungentuberculose, deutliche Dämpfung an einer oder der anderen Stelle der Lungen, Bronchialathemen, Knisterrasseln, heftige lang andauernde Bronchitis, Abmagerung, Fieber etc. erkennen liessen und dennoch wieder vollkommen genesen, d. h. nur scheinbar, die Ernährung kam in Gang, das Aussehen wurde blühend, das Fieber und der Husten nahm langsam ab, die Dämpfung aber blieb, und bei der geringsten Störung des Allgemeinbefindens tritt immer wieder neue, hartnäckige Bronchitis auf. Zuweilen vorallgemeinert sich zum Schluss der Process noch und es gehen dann auch die phthisischen Kinder unter den Symptomen der Miliartuberculose zu Grunde.

Bezüglich der Therapie muss auf die Vorschriften verwiesen werden, welche bei der Tuberculose als Dyskrasie gegeben werden sollen.

10) Krebs der Lungen und des Mediastinum anticum.

Krebs ist im Allgemeinen bei Kindern schon ausserordentlich selten und der der Lungen ist erst einige Male beschrieben worden. Man fand in dem Leichen neben Krebsknoten anderer Organe auch Carcinoma medullare der Lunge in Form weisser oder grauöthlicher Knoten der verschiedensten Grösse. Sie sitzen sowohl in der Tiefe als an der Peripherie, flachen sich ab, wenn sie an der Pleura angelangt sind, und bekommen ebenso wie die Leberkrebs eine nabelförmige Vertiefung in ihrer Mitte. Die bei Lebzeiten bemerkbaren Symptome reduciren sich auf Bronchitis und Athemnoth und werden gewöhnlich von denen der Krebse in anderen Organen verhängt.

Krebs im Mediastinum anticum beobachtete ich schon drei Mal bei 5—10jährigen Knaben. Da in diesen Fällen das ganze Mediastinum anticum mit demselben erfüllt und die Pleuren, die Lungen und der Herzbeutel damit verwachsen waren, so wird eine Beschreibung derselben an diesem Platze nicht ungeeignet erscheinen.

Die Entwicklung dieses Krebses scheint eine ziemlich rapide zu sein, wenigstens gaben die Kinder erst wenige Wochen vorher die ersten Zeichen eines Respirationsleidens zu erkennen und doch war bei der abhald vorgenommenen Percussion schon eine beträchtliche Dämpfung unter dem Sternum, die sich nach beiden Seiten über dasselbe hinaus erstreckte, bemerkbar. Das Hauptkriterium ist also die besagte Dämpfung, welche sich im Verlaufe nicht bloss durch Wachsen des Krebses, sondern auch durch hydropische Ergüsse in die Pleurasäcke gewaltig vergrössert. Dass das die Dämpfung veranlassende Exsudat

nicht flüssiger Natur ist, lässt sich leicht nachweisen. Man hört nämlich über demselben das Herztönen fast so laut, als wenn man das Herz selbst auskultirt, auch die in den catarrhalischen Bronchien entstehenden Rasselgeräusche sind über der Krebsgeschwulst ausserordentlich deutlich vernehmbar. Die funktionellen Störungen richten sich hauptsächlich nach der Richtung, in welcher der Krebs am schnellsten wächst. Die grossen Venenstämme müssen in zweien meiner Fälle comprimirt gewesen sein; denn es waren Ödem des Gesichtes und der Hände zugegen und die Halbsenon beträchtlich ausgedehnt. Wegen der höchst peniblen Compression der vorderen Lungenparthien haben die Kinder fortwährend Orthopnoe und atmen am leichtesten, wenn sie den Rücken krümmen und den Kopf nach vorwärts beugen, welche Stellung auch im Schlafe beibehalten wird. Die Rückenfalte des Thorax gibt einen sonor tympanitischen Percussionsschall, und da diese Parthien für die vorderen comprimierten vicariiren müssen, so ist das Athmungsgeräusch in denselben ausserordentlich verschärft und häufig durch Rasselgeräusche verdeckt. Das Herz ist nach aussen und unten verdrängt und liess in dem einen Falle ein blasendes systolisches Geräusch hören, ohne dass bei der Section materielle Veränderungen am Herzen oder den Klappen dasselbe hätten erklären können. Der Puls ist sehr beschleunigt, der Appetit nicht vollkommen geschwunden, weshalb auch die Abmagerung keinen so hohen Grad wie bei Tuberculosis erreicht. Endlich wird zum Glück für die Kranken und ihre Umgebung das Gehirn in Mitbetheilung gezogen, es tritt Sopor oder Irrewerden ein und die Kranken gehen dann rasch zu Grunde.

Bei der Section fand ich in dem einen Falle einen Medullarkrebs, der das ganze Mediastinum anticum einnahm und sich auf die vorderen Parthien der rechten Lunge erstreckte, ohne in derselben noch in irgend anderen Organen secundäre Knoten verursacht zu haben, in dem anderen Falle ein Cystosarkom, das Lungen und Herz einfach verdrängte, nicht aber infectirte, von der Grösse einer starken Mannesfaust. In beiden Fällen beträchtlicher Hydrothorax, aber nur unbedeutender Ascites. Der dritte Fall konnte nicht secirt werden.

Die höchst traurig aussehende Athemnoth dieser Kinder konnte durch grössere Dosen Morphin 0,005—0,03 pro die in ganz überraschender Weise temporär beschwichtigt werden.

11) Keuchhusten. *Tussis convulsiva*. *Pertussis*.

Der Keuchhusten ist ein epidemischer, contagioser Bronchialcatarrh mit eigenthümlichen, convulsivischen Hustenanfällen. Hippokrates hat ihn an keiner Stelle deutlich beschrieben, die Schilderungen der Epidemien aus früheren Jahrhunderten passen nicht vollständig auf den Symptomencomplex, wie er jetzt beobachtet wird, und erst seit dem 18. Jahrhundert finden sich aus den verschiedensten Ländern exaktere Angaben hierüber. Er hat ausser den oben aufgeführten noch eine Menge anderer Bezeichnungen erhalten, als: coqueluche (in Frankreich); chin-cough (England); affection pneumogastro-pulmonaire; broncho-céphalite; catarrhe convulsif, pertussis, tussis suffocativa, spasmodica, strangulata, dactiosa, ferina, blauer Husten, Schaaflhusten, Eselhusten. Wir haben es hier mit keiner einfachen pathologisch-

anatomischen Veränderung, sondern mit einer acuten kosmischen Krankheit und zwar aus der Klasse der sog. atmosphärischen Seuchen zu thun.

Symptome.

Man kann im Verlaufe des Keuchhustens mit ziemlicher Exaktheit drei Stadien unterscheiden: 1) ein Stad. catarrhale, 2) ein Stad. convulsivum und 3) ein Stad. decrementi.

1. Stadium. Die Erscheinungen des Stad. catarrhale oder prodromorum oder invasionis sind die des einfachen Bronchialcatarrhas, zuweilen mit gastrischen Symptomen complicirt. Etwas Heiserkeit, Kitzel im Halse, trockner Husten, Niesen, reichlicher Schleimfluss aus der Nase, Thränen und Röthung der Augen werden zusammen oder vereinzelt fast bei jedem Kinde mit beginnendem Keuchhusten beobachtet. Gesellen sich, was häufig vorkommt, leicht noch Fiebersymptome, heisse Haut, frequenter Puls, Abgeschlagenheit, allgemeines Unbehagen und Appetitmangel, — hat man ganz das Bild des Incubationsstadiums der Masern, worauf, wenn Keuchhusten und Masern zugleich in einem Orte herrschen, prognostisch wohl zu achten ist. Der Husten nimmt schon gleich zu Anfang einen eigenthümlich hohlen, metallischen Klang an, tritt bald paroxysmusartig auf und ist, wenn kein früher bestehendes Lungenleiden zugegen ist, stets vollkommen trocken. Dieses Stadium dauert zwischen einer halben und drei Wochen und wird, mehr oder minder ausgeprägt, bei jedem Keuchhusten beobachtet.

2. Stadium. Das Stad. convulsivum oder nervosum zeichnet sich durch den in heftigen Paroxysmen sich wiederholenden Husten aus, der — eigenthümlich ist, dass man ihn nie wieder vergisst, wenn man ihn nur einmal gehört hat. Etwas grössere Kinder haben gewöhnlich eine Vorempfindung des Anfalles. Sie bekommen Kitzel im Halse, Drücken auf der Brust oder Ueblichkeit, sie athmen ängstlich und hastig, richten sich im Bette in die Höhe, oder laufen, wenn sie wach sind, nach einem Stuhle oder irgend einer andern Stütze, um so den Anfällen kräftigen Widerstand leisten zu können. Der Anfall selber besteht in einer grossen Reihe kurzer, rasch aufeinander folgender, nicht ganz gleichmässiger Hustenstösse, welche von einem längerdauernden, pfeifenden, schlurfenden Inspirationsversuche unterbrochen werden. Die Franzosen bezeichnen diese pfeifenden Inspirationen mit „reprise“. Unmittelbar nach der ersten Reprise beginnen die convulsivischen, expiratorischen Hustenstösse von Neuem, dauern 10–15 Sekunden an, worauf dann wieder eine Reprise folgt, und so wiederholen sich diese beiden Akte gewöhnlich mehrmals in der Weise, dass ein ganzer Anfall von Beginn bis zum Wiedereintritt der normalen Respiration 1–15 Minuten dauert. Die Hustenerschütterungen zu Anfang des Paroxysmus folgen ausserordentlich schnell und ohne alle Intervalle auf einander, so dass man die Kinder dem Erstickungstode nahe glaubt. Es dringt auch in der That während des Hustens bis zur Reprise gar keine Luft in die Lungen ein, wovon man sich durch Auskultation der Rückenflechte des Thorax überzeugen kann. Bei der Reprise ist offenbar die Stimmritze in einen Zustand momentaner Verengung, entweder in Folge von Krampf oder von Paralyse, wie diese

schon bei der Lehre vom Krup ausführlicher auseinandergesetzt wurde, und alle respiratorischen Hülfsmuskeln des Halses und Abdomens kommen hierbei in Thätigkeit. Bei den wirgenden Hustenbewegungen entstehen gewaltige Stauungen des Kreislaufes, das Blut staut sich in der Pulmonalarterie und bedingt alsdann eine Erweiterung des rechten Herzens und des ganzen peripherischen Venensystems, was namentlich an den grossen Halsvenen deutlich zu sehen ist. Uebrigens werden die Kinder am ganzen Kopfe blauroth, wobei auch die Bezeichnung des „Blauhustens“ entstanden ist. Die Augen injiciren sich und treten etwas vor. Das Gesicht schwillt an und bedeckt sich mit einem kalten Schweisse, die Herzbegegerungen, und diesen entsprechend der Puls, werden schwach und ungleich; oft werden Harn und Koth durch die heftigen Contraktionen der Bauchmuskeln unwillkürlich ausgetrieben, amweilen entstehen hiessdurch auch Hernien und Mastdarmproctalle. Die venöse Stase gibt häufig Veranlassung zu Blutungen; die gewöhnlichsten sind die aus Mund und Nase. Ob das hier in grosser Menge ausgehustete und erbrochene Blut aus den Lungen kommt, wie einige glauben, ist sehr zu bezweifeln, weil darauf sehr häufig gar keine consecutive Veränderung der Lungen und keine Verschlimmerung des Allgemeinbefindens sich einstellt und bei einem nach einigen Husten wiederkehrenden Hustenanfalle ein vollkommen farblosor Schleim ausgeworfen wird. Wir wissen aber, dass nach einer Hämoptoe, z. B. von Tuberculisten, die Sputa nach mehrere Tage blutig gefärbt bleiben. Häufig treten auch Extravasate auf der Conjunctiva bulbi, oder im lockeren Zellgewebe der Augendeckel ein, wo dann das extravasirte Blut dieselben Farbenveränderungen eingeht, die wir bei anderen Verletzungen beobachten können. Bonchut erzählt einen Fall, wo ein Kind in Wirklichkeit blutige Thränen weinte und gibt auch an, dass die Hämorrhagien bei Keuchhusten bisweilen bis zur Lebensgefahr grüfen werden, was ich noch nicht erfahren konnte. Auch die Blutungen aus den Ohren, deren in den meisten Handbüchern Erwähnung geschieht, konnte ich noch niemals beobachten, bezweifle sie jedoch nicht, hauptsächlich wenn Otitiden und Ulcerationen im äusseren Gehörgang vorhanden sind. P. Frank berichtet von einer merkwürdigen Kranken, die bei jedem Anfalle 100 Mal und darüber niesen musste. Reizbare Kinder endlich können in allgemeine Convulsionen verfallen.

Den Schluss des Anfalles bildet gewöhnlich Erbrechen, wodurch zu Anfang dieses zweiten Stadiums nur wenig Schleim aber viel Speisebrei und Magensaft entleert wird. Je länger der Keuchhusten besteht, je näher er dem dritten Stadium kommt, um so profusier wird die Secretion der Bronchien, und endlich wird bei jedem Hustenanfalle halb durch Husten, halb durch Brechbewegung eine grosse Menge farblosen, zähen Schleimes expectorirt.

Sind die Anfälle von sehr langer Dauer, bis zu 10 und 15 Minuten, so fühlen sich die Kinder hierauf erschöpft, klagen über Schmerzen in der Brust, athmen noch einige Zeit ängstlich und frequent und sinken alsbald in einen Schlaf. Gewöhnlich aber, bei mässig starken Paroxysmen, vergessen sie unmittelbar nach dem Aufhören derselben ihr ganzes Leid und setzen zum grossen Erstaunen der unerfahrenen Umgebung ihre Spiele oder sogar ihre Mahlzeiten sogleich wieder fort.

Der einfache Keuchhusten ist fieberlos, der Eintritt von Fieber und Appetitmangel zeigt immer eine Complication an.

Die Anzahl der Paroxysmen binnen 24 Stunden variiert zwischen 4–60, gewöhnlich aber treten nicht mehr als 18–24 in diesem Zeitraume ein, wobei jedoch niemals eine wirkliche Regelmässigkeit in der Aufeinanderfolge oder Gleichheit der Intervalle beobachtet wird. Am stärksten und häufigsten sind sie des Abends, wo gewöhnlich verschiedene äussere Gelegenheitsursachen, Erhitzung, geistige Aufregung, Essen und Trinken zusammenwirken. Die Anfälle stellen sich entweder ganz spontan bei ganz ruhig sich verhaltenden Kindern ein, oder sie werden durch Schreien, Gemüthsbewegungen aller Art, Lachen, Schlucken besonders von trocknen kratzenden Bissen, kalte oder verunreinigte Luft etc. veranlasst. Sind mehrere keuchhustenkranke Kinder beisammen und eines beginnt zu husten, so steckt dieser Anblick meistens an und alsbald stimmt der ganze Chor in dieses höchst jämmerlich anersiehende Concert ein.

Dieses Stadium dauert bei gesunden Kindern und unter günstigen äusseren Verhältnissen vier Wochen, kann aber im entgegengesetzten Falle acht Wochen und darüber währen. Nachlass der Heftigkeit und Häufigkeit der Paroxysmen verbunden mit zunehmender Bronchialsecretion deutet den baldigen Uebergang in das dritte Stadium an.

3. Stadium. In diesem Stadium *criticum & decrementi* haben die Hustenanfälle ihre Heftigkeit verloren. Die Paroxysmen sind nicht mehr so lang und rapid, die Reprise hört ganz auf, Bronchialbewegungen sind wohl noch vorhanden, es wird durch dieselben aber kein Speisebrei, sondern nur eine ungeborene Menge von Bronchialschleim zu Tage gefördert. Dieser Schleim ist meistens gelblich oder grünlich gefärbt und mit jedem Hustenanfälle wird nahezu ein Esslöffel voll desselben expectorirt. Bei den meisten Kindern stellen sich zu dieser Zeit nächtliche Schweißausbrüche ein, zuweilen brechen auch Exantheme aus. Auscultirt man die Lungen, so hört man allseitig grobbleasige Rasselgeräusche. Der Husten, einmal in diesem Stadium angelangt, hört bei gesunden Kindern in 2–3 Wochen vollständig auf, bei tuberculösen und scrophulösen Kindern hingegen dauert er noch viele Monate fort. Oft kommen auch noch kleine Recidive vor, wobei ein Rückschritt in das zweite Stadium bemerkbar wird, gewöhnlich aber bald wieder Besserung eintritt.

Die Complicationen dieser Krankheit sind zahlreich und meistens Theils gefährlicher Natur.

Die häufigste und am nächsten liegende Complication ist die Erkrankung des Lungensparenchym, welche sich sehr leicht durch Senkung und Zersetzung des massenhaften Bronchialschleimes entwickeln kann. Gewöhnlich charakterisirt sie sich als lobuläre Pneumonie, nur ausnahmsweise als lobäre, und ist um so mehr zu fürchten, je jünger die Kinder sind. Kinder unter einem Jahre, welche viel auf dem Rücken liegen und noch nicht so entwickelte Muskulatur haben, dass die Schleimmassen gehörig expectorirt werden können, bekommen ausserordentlich häufig während des Keuchhustens die Symptome der lobulären Pneumonie, blasser Haut und frequente, schmerzliche Respiration mit lauten Geräuschen beim Anathmen und mit Heben der

Nasenblut. Die Paroxysmen verlieren dabei ihren Charakter, indem ein trockner aber häufiger, mit schmerzhafter Verengung der Gesichtszüge verbundenen Husten sich einstellt. Die meisten Kinder gehen hierauf nach einigen Tagen unter Convulsionen und merklicher Cyanose zu Grunde, und nur bei einzelnen wenigen nehmen die Symptome der lobulären Pneumonie wieder ab, worauf dann der frühere Keuchhusten abermals zum Vorschein kommt, jedoch immer noch die grosse Gefahr von Recidiven besteht.

Andere Kinder erkranken an der gastrischen Complication. Sie bekommen belegte Zunge, Appetitmangel, Fieber, allgemeine Abgeschlagenheit und faulig riechende Faeces. Eigenthümlich ist das in Deutschland längst bekannte, zum Theil wieder in Vergessenheit gerathene Geschwür am Zungenbändchen, wozuf in neuerer Zeit Gambardini in Mailand aufmerksam macht. Das Geschwür zeigt fast immer eine die Längsachse des Zungenbändchens querdurchschneidende Richtung und findet sich sehr häufig bei 1—2jährigen Keuchhustenkindern, niemals bei ganz kleinen und sehr selten bei älteren Kindern. Es scheint auf mechanische Weise erklärt werden zu müssen, indem nämlich bei den forcirten Hustenbewegungen die Zunge stark vorgestreckt und das Zungenbändchen von den scharfen unteren Schneidezähnen gleichsam abgesägt wird. Es kommt deshalb niemals bei noch zahnlosen Kindern und bei grossen Kindern aus dem Grunde selten vor, weil die letzteren schon mehr abgestumpfte Schneidezähne haben und ausserdem bei den Anfällen die Zunge nicht so weit vorzustrecken pflegen. Es fehlt übrigens in einer grossen Zahl von heftigen Keuchhustenerkrankungen und wird auch bei anderen Kindern mit einfacher Bronchitis, sowie auch ohne allen Husten als aphthöses Geschwür, besonders während des Zahnens, beobachtet. Dieses Geschwür heilt trotz aller Behandlung nicht, so lange das convulsivische Stadium währt, sobald aber die Intensität des Hustens nachlässt, heilt es spontan.

Weder bei anderen Kindern stellen sich in Folge der voran-
Stane heftigsten Gehirnsymptome ein, was jedoch im Allgemeinen schon seltener beobachtet wird. Die Kinder werden schlafstüchtig, greifen oft nach dem Kopfe, klagen über heftige Kopfschmerzen und der Keuchhusten tritt hierbei ziemlich in den Hintergrund. Endlich kommt es sogar zu Zahndünnschmerzen, hydrocephalischen Erbrechen, Convulsionen und abwechselndem Sopor, der Tod erfolgt jedoch nur ausserst selten und man findet dann eine mit dem Keuchhusten nicht direct zusammenhängende Gehirnkrankung, Hydrocephalus acutus oder eitrige Meningitis.

Als weitere seltene Complicationen sind noch zu erwähnen, Pleuritis, Pericarditis und Pemphigus. Jachlot sah in mehreren Epidemien Pemphigusblasen entstehen, worauf in allen Fällen der Tod erfolgte.

Unter den Narkkrankheiten sind als die häufigsten zu erwähnen: chronischer Bronchialcatarrh, Kropf, Hernien, Verfall, Hydrops, Tuberculose und Aneurysmen.

Der Tod direct in Folge eines Anfalles ist ausserordentlich selten, so dass ich mich trotz mehrfacher, ausgebreiteter Epidemien keines einzigen Falles zu erinnern weisse. Hingegen stirbt die Mehrzahl der von lobulärer Pneumonie ergriffenen Kranken, und die Kinder unter einem

Jahre können auch ohne Fieber so atrophisch werden, dass sie sich nicht mehr erholen.

Strenge Anschliessungen zwischen Keuchhusten und anderen epidemischen Krankheiten existiren nicht. Die Keuchhustenkranke können alle möglichen Krankheiten, die acuten Exantheme, Wechselieber, Typhus, Cholera etc. acquiriren, nur die chronischen Miasmenschläge gehen zweifeln auffallend zurück, so lange der Keuchhusten währt.

Die Diagnose des Keuchhustens ist sehr leicht zu stellen. Der cyclische Verlauf, der eigenthümliche Husten mit den langgezogenen, lauten Inspirationen, das Erbrechen am Schluss der Anfälle und hauptsächlich das epidemische Auftreten sowie die oft nachweisbare Contagiosität sind so constante Symptome, dass ihr Complex mit Sicherheit zur Diagnose führt. Uebrigens kann man bei einem jeden Keuchhustenkinde zugleich einen Anfall hervorrufen (was für klinische Zwecke vortheilhaft erscheint), wenn man mit dem Finger auf die Zungenwurzel drückt. Der hierdurch verursachten Würgbewegung folgt fast regelmässig ein heftiger Paroxysmus, der bei mangelhafter Beschreibung und Beaufsichtigung von Seite der Angehörigen die Diagnose sichert.

Pathologische Anatomie.

Stirbt ein vorher gesundes Keuchhustenkind in Folge eines Trauma's oder irgend einer acuten Krankheit, so findet man im convulsiven Stadium die Luftwege zuweilen injicirt und hyperämisch, zuweilen aber auch ganz normal, im letzten Stadium hingegen die Trachea und die grossen Bronchien mit jenem Schleime erfüllt, der bei Lebrzeiten in so grosser Menge expectorirt wird. An der Stimmritze ist nicht die mindeste Veränderung wahrzunehmen.

Die Bronchialdrüsen sind zuweilen, aber durchaus nicht regelmässig geschwellt. Da man schon seit langer Zeit eine Neurase im Spiele glaubt, so wurden das Gehirn und Rückenmark sowie auch die Nn. vagi schon oftmals einer gründlichen Untersuchung unterworfen; dieselbe blieb in der Mehrzahl der Fälle gänzlich resultatlos, nur einzelne Forscher sprechen von einer Rührung der Nn. vagi, die höchst wahrscheinlich als Leicheninhibition zu betrachten ist, keineswegs aber bei der Seltenheit des Befundes den Keuchhusten bedingen kann.

Als Folgezustände findet man am häufigsten lobuläre und lobäre Pneumonie, cylindrische Erweiterung der Bronchien, partielles Lungenemphysem, Pleuritis, Pericarditis, Meningitis oder Tubercelose der Lungen und Bronchialdrüsen.

Aetiology.

Der Keuchhusten ist contagios und befällt ein jedes Individuum nur einmal. Die Contagiosität einer Krankheit ist erwiesen, wenn sich eine grössere Anzahl von Fällen erweisen lässt, die entschieden durch Ansteckung entstanden sind. Dies ist nun zur Genüge für den Keuchhusten geschehen und es ist deshalb ganz verkehrt, aus einzelnen Fällen, in welchen keine Berührung mit Keuchhustenkranke vorgekommen ist, eine spontane Entstehung desselben ableiten zu wollen. Wissen wir ja doch noch gar nicht, ob nicht das Contagium so intensiv ist, dass es durch dritte Personen, z. B. Erwachsene, die selbst ganz gesund bleiben, übertragen werden kann. Uebrigens begünstigt die

Fieberlosigkeit und lange Dauer des Processes, in Folge deren die kranken Kinder vielfach auf die Strassen und öffentlichen Plätze kommen, die Berührung mit denselben viel mehr, als dies bei irgend einer anderen contagiösen Krankheit der Fall ist. Die meisten erfahrenen und beschäftigten Aerzte sprechen sich mit Bestimmtheit dahin aus, dass der echte Keuchhusten die Kinder nur einmal befälle. Die Angaben weniger Anderer, die ihn zweimal bei ein und demselben Individuum beobachtet haben wollen, beruhen wahrscheinlich auf dem Umstande, dass manche Tuberculöse dem Keuchhusten ähnliche Paroxysmen bekommen, oder dass ein schon in völliger Abnahme begriffener Keuchhusten von Neuem recidivirte.

Diese Ansteckungsfähigkeit und die hierauf eintretende Immunität bewirken nur, dass der Keuchhusten fast ausschließlich eine Kinderkrankheit ist und dass nur selten Erwachsene, hauptsächlich aus sehr vornehmen, hochadeligen Familien, wo die Kinder immer streng separirt worden sind, daran erkranken. Die Eltern und Kindsmägde der Keuchhustenkranke leiden jedoch häufig an einer leichteren Art spasmodischen Hustens, der ebenfalls durch das Zusammensein mit den Kranken bedingt scheint, indem die Leute oft gar nicht zum Husten disponirt sind und ihn wieder verlieren, sobald sie aus der infectösen Atmosphäre auf längere Zeit hervorkommen. Kleine Kinder vor Beginn der ersten Dentition sind weniger empfänglich als die, welche über die ersten Monate hinaus sind, jedoch kommt ausnahmsweise auch bei erstern ein completter Keuchhusten vor, der sich gewöhnlich mit lobulärer Pneumonie complicirt und dann tödtlich endigt.

Welcher Art das contagiöse Princip ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit angeben. Es ist höchst wahrscheinlich an die expectorirten Schleimmassen gebunden und verbreitet sich bei deren Verdampfung in die nächste Umgebung, wofür auch die Erfahrung spricht, dass Kinder im letzten Stadium am leichtesten anstecken. In neuester Zeit beschrieb Letzerich einen Pilz, der constant im Auswurfe der Keuchhustenkranke und bei Sectionen auch massenhaft auf der Bronchialschleimhaut vorkommen soll. Auf Semmelstückchen, mit Milch durchtränkt, konnte der Pilz cultivirt werden und diese künstlich erzeugten Pilze, bei Kaninchen in eine kleine Trachealwunde gebracht, verurachten dann echte Hustenanfälle, klingend oder keuchend. Die Anfälle traten manchmal so heftig auf, dass ein ungemein zäher Schleim aus den Nasenlöchern herangeschafft wurde. Bei den Sectionen der Thiere fanden sich die Pilze reichlich in den Lungen. Seitdem wir diese Arbeit zu Gesicht gekommen, hatte ich noch keine Gelegenheit, eine Keuchhustenepidemie zu beobachten, werde aber nicht versäumen, bald möglichst diese wichtigen Untersuchungen aufzunehmen. Ein Räthsel bleibt freilich vor der Hand, warum im Falle der Bestätigung dieser Angaben die oben erwähnte Durchseuchung stattfindet, welche bei anderen, motorischen Pilzkrankheiten, wie Soor, Diphtheritis, Pityriasis versicolor etc., bekanntlich nicht beobachtet wird.

Das Incubationsstadium dauert nur kurze Zeit, kaum jemals länger als 3—4 Tage. Das Geschlecht, die Constitution, die Lebensweise und die Jahreszeit ist ohne deutlichen Einfluss auf die Entstehung oder Verhinderung der Krankheit.

Durch die Contagiosität ist nun die epidemische Verbreitung des

Keuchhusten befallt, so dass im Verlaufe eines viertel-, längstens eines halben Jahres die ganze jugendliche Bevölkerung oder wenigstens ein grosser Theil derselben durchseucht ist. Als die Herde der Verbreitung sind die Schulen, Kinderbewahranstalten und Kinderspitäler zu betrachten. In dem letzteren namentlich herrscht derselbe oft Jahre lang wohl fort, nachdem er längst in der Stadt erloschen ist, indem immer wieder neue Kinder wegen chirurgischer oder anderer innerer Krankheiten dahin gebracht werden und dann den Husten dazu acquiriren.

Behandlung.

Die Prophylaxis besteht lediglich in Entfernung der Kinder aus dem Orte, in welchem der Keuchhusten eben herrscht, indem eine Absperrung nur sehr schwer durchzuführen ist und niemals die Garantie eines wirklichen Ortswechsels bietet. Schon Jenner bemerkte, dass vor Kurzem geimpfte Kinder von dem Keuchhusten bewahrt blieben und dass die Vaccination auf nicht geimpfte Keuchhustenkranke einen günstigen, abkürzenden Einfluss ausübte. Da bei uns zu Lande die Impfung gewöhnlich schon in den ersten Lebensmonaten vorgenommen wird, und kleine Kinder seltener daran erkranken als die nach vollendetem ersten Lebensjahre, so ist das Contingent, auf welches diese Prophylaxe anwendbar sein kann, ein ziemlich beschränktes. Ich impfte erst zweimal kleine Keuchhustenspatienten, wovon der eine vor zwei, der andere vor drei Wochen erkrankt war, bei beiden war der Verlauf ein regelloser, die wirklichen Paroxysmen dauerten bei dem ersten Kinde noch zehn, bei dem zweiten sieben Tage lang fort, so dass, wenn man für den vollen Verlauf eine Dauer von sechs Wochen rechnet, allerdings eine mässige Abkürzung des Processes eingetreten ist. Die innerliche Darreichung von Belladonna und das Umhängen von Stücken mit verschiedenen stark riechenden Substanzen, Moschus, Kampfer etc. hat sich in prophylactischer Beziehung längst als wirkungslos herausgestellt.

Die rationelle Behandlung der ausgesprochenen Krankheit zerfällt in Anordnung eines geeigneten Regimes, in Behandlung des einzelnen Paroxysmus und in Versuchen, auf medicamentösem Wege eine Abkürzung des ganzen Processes zu erzielen.

Was die Lebensweise betrifft, so richtet sich dieselbe nach der Jahreszeit; im Winter und bei scharfen rauhen Winden ist das Ausgelassene Keuchhustenkranke immer bedenklich und veranlasst häufig entzündliche Complicationen, im Sommer hingegen befinden sich die Kinder am allerbesten den ganzen Tag über im Freien. Es verläuft deshalb der Keuchhusten im Winter, wo die Kinder mehrere Wochen lang in das Zimmer gesperrt bleiben müssen und höchstens in einer warmen Mittagstunde einmal hinaus dürfen, immer langsamer und hinterlässt häufiger Nachkrankheiten als im Sommer.

Bezüglich der Diät ist, so lange der Process einfach fieberlos verläuft, nichts zu ändern, nur muss man trockenes Brod, trocknen Kuchen und überhaupt alle trocknen, etwas kratzenden Nahrungsmittel meiden, weil durch deren Vorbeigleiten am Kehlkopf unfehlbar ein Anfall erzeugt wird. Bei eintretender fieberhafter Complication versteht sich

eine antiphlogistische Diät von selbst. Einen wohlthätigen Einfluss üben die Milchspeisen und der reichliche Genuss kuhwarmer Milch, während der so vielfach empfohlene Eibisch, Pfaffen- und Wollblumen-thee gewöhnlich von den Kindern verschmäht wird.

Was die so sehr beliebte Luftveränderung betrifft, so hat ein Landaufenthalt bei weitem nicht den abkürzenden Einfluss, der ihm gewöhnlich zugeschrieben wird, wohl aber wirkt er zuweilen sehr überraschend, wenn Kinder im letzten Stadium des Keuchlustens, also in der vierten oder fünften Woche auf das Land gebracht werden. Durch die grosse Freude über den Ortswechsel, die veränderte Kost und Lebensweise sind die Reste des Keuchlustens gleichsam abgeschüttelt, und man hört die Kinder kein einziges Mal mehr husten.

Schickt man aber Kinder, welche eben erst den Keuchlusten requirirt haben, auf das Land hinaus, so ist durchaus keine Veränderung noch Abkürzung zu bemerken, sie stocken die Bauerkinder des ganzen bisher verschonten Dorfes an und es kommt, wenn das eine oder andere Kind des Dorfes dann an lobulärer Pneumonie stirbt, zu höchst unangenehmen Auftritten. In England und Frankreich wurde in neuester Zeit der Aufenthalt in Gasfabriken als auffallend heilsam empfohlen, und es kann in der That auch nicht geleugnet werden, dass manche Kinder, allerdings nur nach der vierten Woche des Keuchlustens, denselben dadurch rasch verlieren. Dieses Verfahren ist jedoch nur für eine geringe Zahl von Kranken anwendbar, da die Anstalten unmöglich eine grosse Zahl von Kindern mit ihren Müttern und Wärtern bergen können, der Betrieb der Fabrik belästigt wird, und in ruhiger Jahreszeit der Gang zu den meist entlegenen Anstalten unstatthaft ist. Meine auf dieser Erfahrung fussenden Versuche, die Kinder in eine Benzoinatmosphäre zu bringen, indem man ihre Kleider und Betten damit besprengt, fesseln keine deutliche Abkürzung noch Milderung des Hustens erkennen.

Bezüglich des Anfalles sind alle Gelegenheitsursachen sorgfältig zu vermeiden. Die Kinder müssen angehalten werden, langsam und stille zu essen, sie dürfen nicht laufen noch sich erhitzen, auch sollen ihnen, so lange es irgend geht, Gemüthsalterationen erspart werden. Da der Anblick Keuchlustenkranker, die eben einen Anfall haben, bei anderen gleichfalls einen solchen verursacht, so ist es zweckmässig, auch die kranken Kinder so viel als möglich von einander zu separiren.

Im Paroxysmus selbst befinden sich die Kinder am besten mit vorgebeugtem Kopfe, die Arme an irgend einer Stütze anklammernd. Wenn der Kopf zu weit nach vor- und abwärts sich neigt, so unterstützt man die Stirne passend mit der flachen Hand. Sehr heftige und langdauernde Anfälle kann man zuweilen abkürzen, indem man ihnen den Finger weit in den Mund steckt und dadurch vorzeitiges Erbrechen erzielt, worauf der Paroxysmus sogleich nachlässt. Churchill räth, zu Beginn des Anfalles 20 Aether oder Chloroform in der kühlen Hand vor dem Gesichte des Kindes verdunsten zu lassen. Ich habe dies ein einziges Mal versucht, das Kind wehrte sich aber entschieden gegen diese Dämpfe, und das Zimmer noch den ganzen Tag stark nach Chloroform, so dass seine Bewolger Kopfweh bekamen und gegen eine fernere Application Verwahrung einlegten. Tritt nach Beendigung des Anfalles leichter Schwindel und Betäubung ein, so

müssen die Kinder einige Zeit in liegender Stellung zubringen und der Kopf muss mit kalten Compressen bedeckt werden.

Die Mittel, welche gegen den Keuchhusten in Gebrauch gezogen worden sind, alle aufzuwählen, würde zu weit führen und doch wenig Nutzen bringen, da es sich jetzt zur Evidenz herausgestellt hat, dass solche, die in einer Epidemie entschieden günstig wirkten, in einer anderen vollkommen ohne Erfolg blieben.

Unbegreiflicher Weise war und ist zum Theil noch eine beliebte Behandlung die mit Brechmitteln. Man reichte diese Emetica alle Tage oder wenigstens alle anderen Tage 1—2 Wochen lang fort und glaubte eine Milderung und Milderung der Anfälle zu erreichen. Die Franzosen geben bei kleinen Kindern ihren Syrup. Ipecacuanhao, bei grösseren Kindern den Vin. stibiat. Ich konnte mich um so weniger entschliessen, diese Therapie nachzuxperimentiren, als ihre Verehrer jetzt im Allgemeinen sehr abgenommen haben, und bei einer Krankheit, zu deren Wesen so schon ein mehrmals sich wiederholendes Erbrechen gehört, eine künstliche Erzeugung des Brechaktes zum mindesten überflüssig erscheint.

Unter den Narcoticis kam die Belladonna vorzugsweise in Gebrauch und gerade bei diesem Mittel wurde es am entschiedensten und öftesten beobachtet, dass ihre Wirksamkeit in verschiedenen Epidemien verschieden deutlich war. So hatte z. B. J. Frank in einer Epidemie günstige, in sechs anderen gar keine Resultate. Ich selbst habe gegen die Belladonna nur aussetzen die Ungleichheit der einzelnen Präparate, wodurch man zu einer äusserst vorsichtigen Steigerung der Dosis genöthigt wird. Sobald Erweiterung der Pupillen und Kratzen im Halse eintritt, müssen sich die Paroxysmen allerdings sehr merklich; es sind diese Intoxikationssymptome an und für sich schon unangenehm, erschrecken die Angehörigen und steigern sich bei einzelnen Kindern, auch wenn mit dem Mittel ausgesetzt wird, zu fast vollkommener Blindheit, zu Schwindel und bedenklichen Delirien.

So lange aber die Pupille sich nicht erweitert, habe ich noch niemals einen Nachlass in den Paroxysmen entdecken können. Die mittlere Gabe ist 0,005 Rad. Belladonnae in Pulverform täglich zweimal. Da viele Kinder nicht gerne Pulver nehmen, so gibt man auch das Extr. Belladonn. 0,1—0,2 in 15,0 Bittermandelwasser gelöst, wovon täglich 2—bis zu 20 Tropfen genommen werden sollen. Der Vorwurf der Ungleichheit in der Wirkung je nach dem Alter und der Art der Aufbewahrung trifft das Belladonna-Extract noch mehr als das Pulver. Eine Abkürzung des Keuchhustens in seinem ganzen Verlaufe kann man durch die Belladonna nicht erreichen, und eine Schwächung des einzelnen Anfalles nur durch eine von unangenehmen Nebenwirkungen begleitete Intoxikation.

Das Opium wurde auch schon vielfach empfohlen. Es gilt von demselben das gegen die Belladonna Vorgebrachte in noch erhöhtem Masse. Länger fortgegeben bewirkt es schwer zu hebende Verstopfung und Gehirncongestion. Doch ist es auf der Höhe der Krankheit, wenn die Kinder schon mehrere Nächte fast schlaflos zugebracht haben und in grosse Aufregung gerathen sind, ein sehr werthvolles Mittel. Es bewirkt dann 1—5 Tropfen Opiumtinktur, je nach dem Alter des Kindes von 1—10 Jahren, einen tiefen mehrstündigen Schlaf, worauf

dann freilich die Paroxysmen in ihrer früheren Heftigkeit wieder beginnen. Vom Chloralhydrat (0,5–1,0 pro die) sah ich einige Male guten Erfolg.

Außerdem werden von Einzelnen gerühmt das Extr. Canii, — Hyoscyami — Lactucæ virosæ — Pulsatillae — Nicotianæ und die Aq. amygdal. amar. und von vielen Andern wieder verworfen. In den Keuchhustenepidemien, die ich bisher zu beobachten Gelegenheit hatte, machte ich vielfach die Erfahrung, dass ein mehrere Tage fortgesetzter Gebrauch der Narcotica nur Schalen bringt, während auf der Höhe der Krankheit eine ein- oder auch mehrmals erzeugte leichte Intoxikation mit Opium, Belladonna oder Chloralhydrat einen wohlthätigen Einfluss auf die erschöpften und doch aufgeregten Kinder ausübt.

Von den Gegnern dieser Narcotica werden vorzugsweise die metallischen Antispasmodica eingeführt. Ihre Lobredner sagen sehr naiv, dass mit denselben weniger eine rasche Beschwichtigung des heftigen Hustens, als eine allmähige Tilgung des krampfhaften Charakters und endlich erst Heilung bewirkt werde, d. h. mit anderen Worten: der Keuchhusten lässt sich in seinem regelmässigen Verlaufe heilsam nicht viel heirren. Das heilsamste Mittel dieser Classe ist das Zinkoxyd 0,5–1,0 pro die, dann das kohlensaure Eisen 1,5–3,0 pro die, das essigsaure Blei, das salpetersaure Wismuth, das schwefelsaure Kupfer und endlich der Hallerstein.

Von den pflanzlichen und thierischen Nervins gibt man mit Vorliebe den Moschus, das Castoreum, die Aca. fetida, das Bernsteinäure Ammoniak und den Kaffee.

Tonische und adstringirende Mittel sind im letzten Stadium des Keuchhustens von merklichem Erfolge, und hier steht die gepulverte Chinarinde oben an. Ich gebe sehr vielen schwächlichen Kindern in diesem Stadium täglich 2–3 Messerspitzen des reinen Chinapulvers ohne weiteren Zusatz und finde, dass sie es ohne Widerstreben nehmen, weshalb es dem Chinadekokt und dem gar zu bitteren China vorzuziehen ist. Auch Tannin für sich allein oder zu gleichen Theilen mit Benzoeblumen, täglich bis zu 0,3 gereicht, wird vielfach gerühmt. Störend ist nur der ebenfalls sehr schlechte Geschmack und namentlich auch die überaus steifende Wirkung der Gerbsäure.

Ein rein empirisches, unter den Praktikern Englands ziemlich verbreitetes Mittel ist die Cochenille, welche nach vollkommen zuverlässigen Berichten in einzelnen Epidemien eine auffallende Wirkung gezeigt haben soll. Man gibt sie wegen leichter Zersetzbarkeit am besten in Pulverform mit Zucker gemischt, 0,1–0,4 pro die. Meine damit angestellten Versuche lieferten in zwei Epidemien ganz negative Resultate, und ich wand, zumal das Mittel auch ziemlich kostspielig ist, wieder davon ab. Hingegen habe ich in den letzten zwei Jahren vielfach von einem Mittel Gebrauch gemacht, das so ziemlich in Mitleid gekommen war, vom Calomel. Ich gebe dasselbe allen Keuchhustenkrankeu unter einem Jahre, täglich 0,01 2–3 Wochen lang fort, bis die Heftigkeit der Paroxysmen abnimmt, und habe seitdem viel weniger lobuläre Pneumonien, welche sonst einen beträchtlichen Theil der kleinen Kinder hinwegraffen, beobachtet. Nachtheilige Folgen, weder unmittelbare noch spätere, treten auf diese Behandlung nicht ein.

Von anderen empirischen internen Mitteln sind noch zu erwähnen der Schwefel, die *Labellia inflata*, *Viscum quercinum*, die Salzsäure und endlich gar der Arsenik, der Phosphor und die Cantharidentinktur.

Die endermatische Behandlung mit Ung. tartar. stibiat. hat man als grausam und dennoch wirkungslos jetzt vollkommen aufgegeben. Hingegen wäre die Methode von Lachmünd einer weiteren Prüfung werth. Derselbe behauptet, dass durch Vaccination der Keuchhusten im ersten Stadium unterdrückt werden könne und bringt bei schon geimpften Kindern gepulverte Vaccinokrusten auf Vesicatorwunden, wo er sie mit Heftpflaster befestigt und mehrere Tage liegen lässt. Die so behandelten Wunden sollen zuweilen lebhaft Schmerzen verursachen und können sogar brandig werden. Auch innerlich versuchte er das Pulver, er gab eine Impfböcke mit Milchsücker abgerieben und wiederholte diese Dosis nach vier Tagen, worauf ebenfalls eine rasche Heilung eingetreten sein soll.

Schliesslich sind noch Watson's oft wiederholte, ziemlich mühsame Aetzungen der Rachen- und Kehlkopfschleimhaut mit Hollensteinlösung zu erwähnen, wozuf nach 8—10 Tagen die Krankheit beseitigt sein soll. Sie haben sich bei uns nicht von dieser entschiedenen Wirksamkeit gezeigt und keine allgemeine Anerkennung gefunden. Bei der schonen Vereinfachung unserer jetzigen Inhalationsapparate ist das Inhaliren verdünnter Aetzmittel der gewaltsamen Applikation mittelst Schwammchen entschieden vorzuziehen. Rohlfess einigen grösseren über vier Jahre alten Kindern täglich eine halbe Unze einer verdünnten Hollensteinlösung (1 : 1000) inhaliren und beobachtete nach 8—10maliger Inhalation eine deutliche Abnahme sämtlicher Keuchhustensymptome, indem nur ein einfacher Bronchialcatarrh zurückblieb.

Wenn ich nun resumirend über meine Ansicht eine Erklärung abgeben soll, so geht sie dahin, dass es höchst wahrscheinlich keine Mittel gibt noch jemals geben wird, wodurch der Keuchhusten curirt werden kann, so wenig wie wir dies bei den acuten Exanthemen, bei Typhus oder Pneumonie zu thun im Stande sind. Man soll deshalb möglichst expectativ verfahren, zu heftige Anfälle durch Narkotica mildern, bei kleinen Kindern durch Calomel die lobuläre Pneumonie zu verhüten suchen, schwächliche Kinder roborend behandeln und im Uebrigen die Kinder nur möglichst unter günstige hygienische Verhältnisse bringen.

12) Periodischer Nachhusten.

Der periodische Nachhusten ist eine höchst eigenthümliche und seltene Krankheit. Er wird bei ganz gesunden Kindern, häufiger aber bei solchen mit hereditärer Tuberculose beobachtet und befallt hauptsächlich Kinder von 2—10 Jahren.

Das Kind befindet sich den Tag, über vollkommen wohl und hustet kein einziges Mal, schläft Abends ruhig ein und erwacht in der Regel erst nach Mitternacht, heftig schreidend und hustend. Der Husten ist gewöhnlich anhaltend und trocken, nicht so paroxysmenartig, dass die Kinder 2—3 Stunden lang nicht mehr schlafen können. Auswurf kommt dabei nicht vor und der Charakter des Hustens ist noch am

meisten dem der hysterischen Mädchen, welche auch zuweilen an rein spasmodischen Hustenanfällen leiden, zu vergleichen. Dieser Husten stellt sich jede Nacht, nicht genau, aber ungefähr um dieselbe Stunde ein, jeder Paroxysmus dauert auch immer eine gleich lange Zeit, bis endlich die Kinder ganz erschöpft und schnell respirirend wieder einschlafen, um dann bis zum Morgen nicht mehr zu erwachen. So geht es nun Wochen selbst Monate fort, die Anfälle werden schliesslich kürzer und schwächer und hören endlich von selbst auf. Oft bildet der Durchbruch eines Zahnes der ersten oder zweiten Dentition den Schlussakt dieser räthselhaften Krankheit. Ich habe dieselbe erst dreimal beobachtet, ein Kind war vor- und nachher vollkommen gesund, die zwei anderen aber stammten von tuberculösen Eltern und liessen später deutliche Zeichen der fortschreitenden Tuberculose erkennen. Obwohl der Husten unter Tage vollkommen sistirt und auch durchaus keine Rasselgeräusche am Thorax gehört werden können, so sind die Kinder doch während der ganzen Zeit traurig, mürrisch und von blasser Gesichtsfarbe. Sie haben nicht den gehörigen Appetit und leiden meistens an kalten Füssen.

Behandlung.

Es liegt sehr nahe, bei den deutlichen Internasialien, mit welchen dieses Uebel verläuft, eine Behandlung mit Chinin einzuleiten. Es hat sich dieselbe aber trotz dieses Umstandes als wenig wirksam erwiesen, indem der Husten meistens wiederkehrt, wenn auch grössere Gaben von 0,3—0,4 auf einmal gereicht wurden. Ebenso ungenügend sind kleinere Dosen der Narcotica. Opium und Morphinum bis zur tiefen Narcose gereicht, veranlassen allerdings für eine Nacht einen Stillstand des Uebels, die Nebenwirkungen grösserer Gaben aber, als Kopfschmerz, Appetitmangel und hartnäckige Obstipation, sind so unangenehm, dass ich immer von fortgesetzter Darreichung dieses Mittels abstecken musste, bevor Genesung eingetreten ist. Die Unwirksamkeit des Chinins und Morphinums sprechen mit ziemlicher Bestimmtheit dafür, dass hier eine materielle Veränderung, die vielleicht in einer Schwellung oder Tuberculose der Bronchialdrüsen zu suchen sein dürfte, zu Grunde liegt. Man beschränkt sich am besten auf eine diätetische, roborende Behandlung, gute nahrhafte Kost, frische Luft und gleichmässige Temperatur, wobei nach den bisherigen Erfahrungen das Uebel, wenn auch nach langer Zeit, immer günstig verlaufen ist.

F. Pleura.

1) Pleuritis, Rippenfellentzündung.

Es können die Kinder schon im Mutterleibe an Pleuritis erkranken, sterben dann in der Regel ab oder überleben die Geburt nur kurze Zeit. Bei Neugeborenen ist ausserdem die Plebitis umbilicalis eine häufige Ursache der Jancheresorption und damit der secundären Pleuritis.

Empyeme kommen im ersten Kindesalter so selten vor, dass die beschäftigten Pädiatruken nur ganz vereinzelte Fälle anzuführen im Stande sind. Hingegen findet man sehr häufig bei kleinen Kindern,

Die zu Lebzeiten an Lungenaffectioren, namentlich an Lungentuberculose gelitten haben, allseitige pleuritische Verwachsungen. Bei grösseren Kindern kommen Empyeme nicht selten vor, werden, wenn keine Complicationen zugegen sind, ziemlich schnell resorbirt und hinterlassen keine auffallenden Deformitäten des Thorax. Im Ganzen ist die Pleuritis im ersten Kindesalter als eine äusserst seltene, nach Beginn der zweiten Dentition immer noch als eine ziemlich seltene Krankheit zu betrachten.

Pathologische Anatomie.

Nach E. Weber in Kiel, dem wir die meiste Aufklärung über diese Zustände verdanken, ist von der wirklichen Pleuritis todtgeborener Kinder wohl zu scheiden die oft ziemlich profuse Durchsickerung von Blutsrum in die serösen Säcke, also auch in die Pleurahöhle. In dieser einfachen cadaverischen Durchsickerung kommen niemals Fibrinflocken vor, auch hat die Mutter keine darauf zu beziehenden Symptome während der Schwangerschaft geboten. Weber nimmt bei diesen todten Früchten eine rein entzündliche und eine dyskrasische Pleuritis an.

Bei der rein entzündlichen Pleuritis der Kinder vor der Geburt ist meistens auch die entsprechende Lunge pneumonisch erkrankt. Die Pleuritis ist einseitig oder doppelt und gibt sich zu erkennen als eine dickere oder dünnere, fibrinöse, wässlich durchscheinende Schwarte, die bald schwer, bald leicht abzurheben ist. Der seröse Erguss ist hierbei immer sehr unbedeutend, gelb und klar, er riecht am Unterschied von der dyskrasischen Pleuritis niemals faulig und ist nie stark blutig tingirt.

Bei der dyskrasischen Pleuritis sind immer beide Pleurasäcke und ausserdem gewöhnlich auch der Herzbeutel und das Bauchfell in gleicher Weise erkrankt. Die Exsudate sind in grösserer Menge vorhanden als in der ersteren Form und haben ein schmutzig trübes Aussehen und einen fauligen Geruch. Sie finden sich nur in Gehäusen und auf der Höhe einer Puerperalfieberepidemie. Denselben Charakter hat auch die in Folge von Umbilicalphlebitis auftretende pyämische Pleuritis.

Bei grösseren Kindern finden sich häufig pleuritische Adhäsionen und Schwarten, sehr selten aber grosse flüssige Exsudate. Primär und isolirt kommen diese entzündlichen Affektionen der Pleura nur äusserst selten vor, sondern sind gewöhnlich mit Lungenerkrankungen, mit Tuberculose complicirt. Die anatomische Beschaffenheit der Schwarten, die Verdrängung der Brusteingeweide und des Zwerchfelles sind dieselben wie bei Erwachsenen.

Symptome.

Eine jede Pleuritis beginnt mit erhöhter Hauttemperatur, mit Fieber. Die Kinder werden unruhig, schlaflos, verlieren den Appetit und trinken viel. Das deutlichste Zeichen des Fiebers ist immer die Erhöhung der Hauttemperatur, während die Frequenz des Pulses besonders bei kleinen Kindern wegen ihrer grossen physiologischen Schwankungen geringere Beachtung verdient. Grössere Kinder bekommen auch einen Schüttelfrost.

Den Schmerz kann man bei kleinen Kindern nicht anders cursiren, als indem man auf verschiedene Stellen des Thorax einen abwechselnden Druck ausübt oder percutirt. Druck oder Schlag auf eine von frischer Pleuritis befallene Stelle wird immer die Kinder zu einem schmerzhaften Geschrei oder Wimmern veranlassen. Etwas grössere Kinder von 2—3 Jahren zeigen, wenn man sie nach dem Sitze des Schmerzes fragt, gewöhnlich auf die Herzgrube, ohne dass desshalb hier die Entzündung sich wirklich etablirt hätte. Erst vom fünften bis sechsten Jahre kann man auf die Angabe des Schmerzes einigen Werth legen. Derselbe tritt gewöhnlich zugleich mit dem Fieber ein, ist aber fast nie lange anhaltend, sondern zeigt meist deutliche Remissionen und verschwindet oft nach 4—6 Tagen gänzlich, ohne dass Medicamente dagegen in Anwendung gebracht wurden.

Im Allgemeinen lässt sich zwar sagen, dass Fieber und Schmerz ziemlich gleichen Schritt halten, doch kommen auch sehr häufige Ausnahmen von dieser Regel vor. Besondere Berücksichtigung verdient die plötzliche Erneuerung eines schon mehrere Tage ausgebliebenen Schmerzes, zumal wenn sie mit Fieber verbunden ist; sie zeigt an, dass die Pleuritis keine einfache, sondern eine complicirte ist; als die häufigste Complication oder eigentliche Veranlassung dieses so sich gestaltenden Processes muss die Lungentuberculose bezeichnet werden. Der Schmerz ist auch von grossem Einflusse auf den Grad der Dyspnoe, welche zu Anfang viel bedeutender durch ihn als durch das mechanische Hinderniss, das Exsudat gesteigert wird. Sobald die Dämpfung beträchtlich wird, das Exsudat also eine grössere Ausdehnung erreicht hat, hört in den meisten Fällen der Schmerz vollständig auf, dafür stellen sich nun die durch die Compression der Lunge bedingten mechanischen Beschwerden ein. Warum der Schmerz trotz grosser Ausdehnung der Pleuritis oft nur ein ganz unschriebener ist, lässt sich schwer erklären. Am wahrscheinlichsten scheint mir doch, dass die Entzündung an einzelnen Stellen auf das Neurilem der Intercostalnerven übergeht und dadurch den fixen, unschriebenen, auf Druck gewaltig zunehmenden Schmerz bedingt.

Die Lagerung hat bei kleinen Kindern, welche sich überhaupt immer in der Rückenlage befinden, natürlich keine Bedeutung, grössere Kinder liegen zu Anfang der Pleuritis, so lange die Schmerzen währen, in der Regel auf einer Seite, jedoch nicht immer auf der der Entzündung entsprechenden, sondern zeitweilen auch auf der entgegengesetzten, je nachdem eben der Schmerz mehr durch Druck oder mehr durch die Respirationsbewegung gesteigert wird. Im ersten Falle liegen sie auf der gesunden, im zweiten auf der kranken Seite, indem durch diese letztere Lagerung die Respirationsbewegungen ohne besondere Bemühungen des Kranken auf rein mechanische Weise kleiner werden.

Die Art und Anzahl der Respirationsbewegungen ist je nach dem Fieber und dem Schmerze verschieden. Je intensiver diese beiden Symptome sind, um so schneller und oberflächlicher respiriren die Kinder. Hingegen ist nach Sistirung des acuten Processes das flüssige Exsudat schon so massenhaft, dass die Respiration hiernach anhaltend beschleunigt wurde. Die Form des beschleunigten Athmens ist die expiratorische, d. h. der Accent liegt auf dem Expirationsgeräusche.

Eigenthlicher Lufthunger ist hierbei nicht vorhanden, sondern die Respirationen sind nur frequent und oberflächlich, damit die tieferen und beträchtlich schmerzhafteren vermieden werden können. Aus demselben Grunde sind auch die Nasenflügel weniger deutlich in Bewegung, als bei einer Parenchymerkrankung der Lungen, z. B. bei Pneumonie oder vorgeschrittener Tuberculose.

Durch die Inspektion kann man nicht erkennen, auf welcher Seite der Sitz der Pleuritis ist, so lange nur eine pleuritische Schwarte und kein massenhaftes flüssiges Exsudat vorhanden ist. Hat aber letzteres sich gebildet, so verstreichen die Intercostalräume, wölben sich wohl auch nach aussen, und es bewegen sich alle die Rippen nicht mehr, welche durch ein flüssiges Exsudat von ihren entsprechenden Lungenpartien getrennt sind. Dann ergibt auch die Mensuration der beiden Thoraxhälften einen grösseren Umfang der erkrankten Seite. Bei mageren Kindern sieht man bei rechtsseitigem Exsudat einen Tiefstand der Leber und bei linksseitigem eine Verdrängung des Herzens nach rechts gegen den Schwertfortsatz und selbst über denselben hinaus.

Durch Palpation des Vocalfremitus können pleurnische Ergüsse sehr leicht und genau bestimmt werden, was bei Kindern um so grösseren Werth hat, als diese Untersuchungsmethode auch bei unruhigen, schreienden Kranken angewendet werden kann. So weit nämlich das flüssige Exsudat reicht, ebensoweit ist kein oder nur ein schwacher Fremitus der Stimme zu fühlen; an den übrigen Thoraxstellen ist derselbe dafür um so stärker. Reibungsgeräusche sind bei Kindern zu Anfang der Pleuritis ausserordentlich selten, etwas häufiger kommen sie vor bei einem in Resorption begriffenen Empyem und zwar gewöhnlich an der Uebergangsstelle vom gedämpften Percussionsschall zum sonoren. Man ist zwar auch im Stande, sie durch Palpation allein zu bestimmen, kann aber durch das Gefühl sehr ähnlich auftretender Rasselgeräusche leicht getäuscht werden. Bei ruhigen vorzüflichen Kindern kann diese physikalische Untersuchungsmethode leicht durch die Auscultation complementirt werden. Man hört zu Anfang einer Pleuritis entweder Reibungsgeräusch oder normales vesiculäres Athmen, vorausgesetzt, dass die Lunge nicht vorher erkrankt ist. Sobald eine flüssige Exsudatschichte die Lungen von den Rippen trennt, ist in den meisten Fällen gar nichts mehr zu hören, zuweilen aber hört man wider alles Erwarten und ohne dass bis jetzt eine physikalische Erklärung gelungen wäre, exquisites Bronchialathmen, das aber doch nur wenige Tage währt und dann gänzlich verschwindet. Wird das Exsudat aber so massenhaft, dass die Lunge der erkrankten Seite gänzlich comprimirt und als ein kompakter Klumpen nach hinten gedrängt wird, so vernimmt man auf der Rückenfliche des Thorax, so weit diese luftleere Lunge anliegt, kein pueriles, sondern rein bronchiales Athmen. Bei der Aufsaugung des Empyems kehrt sich diese Lunge wieder mehr und mehr aus, das bronchiale Athmen verschwindet, häufig stellen sich Rasselgeräusche ein oder es wird wieder normales Vesiculärrathmen vernommen.

Die Percussion liefert positive Resultate nur bei grösseren, flüssigen Exsudaten; kompakte pleuritische Schwarten und noch mehr die einfachen pleuritischen Adhäsionen bringen gar keine Veränderung

im Percussionsschall hervor. Ist aber einmal ein flüssiges Exsudat gesetzt, so haben wir eine viel exquisitere Dämpfung als bei den Verdichtungen des Lungengewebes, wir bekommen den sogen. *Sokenal* oder *Mauerton*. An der Grenze der Dämpfung bemerkt man regelmäßig einen tympanitischen Beiklang, der sich noch eine Strecke in den *sonoren* Schall hinein erstreckt.

War eine grössere Menge eitriger Flüssigkeit einmal in einer Pleurasacke angesammelt und wird dieselbe später wieder resorbiert, ein Zustand, der sich fast nur bei mehrjährigen Kindern findet, so entsteht bei denselben ebenso der Habitus des resorbierten Empyems, wie diese bei Erwachsenen in so augenfälliger Weise beobachtet wird. Auf der erkrankten Seite steht die Schulter niedriger, der Hinterbacken etwas höher, die ganze Brusthälfte ist abgedacht und eingezogen, am stärksten zwischen der fünften und achten Rippe und die Wirbelsäule erfährt eine seitliche Krümmung, deren Concavität nach der kranken, deren Convexität nach der gesunden Seite hin gerichtet ist. Es ist selbstverständlich eine *Compensationskrümmung* der Lendenwirbel vorhanden. Bei zunehmender Genesung und Erstarkung der Kinder gleichen sich diese Verkrümmungen nach einigen Jahren fast vollkommen wieder aus, wobei eine entsprechende Gymnastik sehr förderlich wirkt.

Die spontane Eröffnung der Empyeme nach aussen kommt bei Kindern häufiger vor als bei Erwachsenen. Unter Fieber und stechendem Schmerz entwickelt sich an irgend einer Stelle des Thorax, am häufigsten nach vorne unter der Brustwarze, eine erysipelatöse Rötze, der entsprechende Interkostalraum wölbt sich mehr und mehr, das Fluktationsgefühl wird immer deutlicher und es bildet sich endlich eine umschriebene, eirunde Geschwulst, welche sich spontan öffnet oder mit einer Lancette ohne Gefahr eröffnet werden kann. Anfangs entleeren sich grosse Quantitäten Eiter, die Abscessöffnung zieht sich aber bald zurück und wird zu einem schiefen, meist winkligen Fistelgang, welcher sich häufig schliesst, nach einiger Zeit aber wieder von neuem in Entzündung geräth und aufbricht. Je nach der Beschaffenheit und Ausdehnungsfähigkeit der entsprechenden Lunge bleibt ein solcher Fistelkanal Monate und selbst Jahre lang offen und schliesst sich endlich mit einer strahlenförmig eingezogenen, tiefen grubigen Narbe. Rippen-caries tritt trotz der langen Dauer fast niemals hierbei ein.

Die Complicationen der Pleuritis sind sehr mannigfaltig. Zuerst sind verschiedene Allgemeinerkrankungen, in deren Verlauf Pleuritis sich entwickeln kann, zu nennen. So kommt dieselbe vor bei Scharlach, Masern, Blattern, bei Typhus, Pyämie und Sepsis. Die Häufigkeit dieser Complication ist verschieden je nach einzelnen Epidemien. Am ungünstigsten und gefährlichsten ist die Pleuritis, wenn sie frühzeitig, schon zu Anfang der Allgemeinerkrankung entsteht, während die in der Reconvalescenz auftretende verhältnissmässig oft einen glücklichen Verlauf nimmt. Die Pleuritis in Folge von Pyämie und Sepsis ist natürlich ohne Ausnahme tödtlich.

Sehr häufig ist die Pleuritis eine secundäre Erkrankung von Tuberculose und Pneumonie. Es gibt überhaupt gar keine periphere Veränderung des Lungensparencyms, an welcher nicht die Lungenpleura Theil nahm. Wenn auch die gewöhnliche Form die der cir-

fichen Adhäsionen oder höchstens der schmalen pleuritischen Schwarten ist, so kommen doch namentlich bei tuberculösen Kindern gar nicht selten grössere flüssige Exsudate vor. Dieselben sind fast niemals einfach eitrig, sondern metamorphosiren selbst wieder tuberculös. Die ganze das Exsudat umgebende Pleura wird zu einer granulirenden Tuberkelschwarte, und eine Resorption eines solchen Exsudates ist wohl noch niemals beobachtet worden. Die Perforation einer tuberculösen Lunge in den Pleurasack und in Folge dessen Pyopneumothorax kommt bei dem mehr acuten Verlaufe der Tuberkeln bei Kindern fast niemals vor.

Der Verlauf und die Ausgänge sind mannigfach. Die acute, primäre Pleuritis, wie sie gesunde, grössere Kinder zuweilen befällt, ist trotz des grossen Exsudates, das den ganzen Pleurasack bis hinauf zur Lungenspitze anfüllt, keine gefährliche Krankheit. Nach 1—2 Monaten beginnt die Resorption und ist, wenn anders das Kind gesund ist, in $\frac{1}{4}$ Jahr vollendet. Selbst der zurückbleibende Habitus des resorbirten Empyems kann sich nach Jahren wieder ziemlich verwachsen. Ungleich gefährlicher ist die acute secundäre Pleuritis, wie sie im Verlaufe von acuten Exanthemen, von Typhus und Tuberculosis beobachtet wird, und geradezu tödtlich ist die pyämische Pleuritis der Neugeborenen, sowie der übrigens sehr seltene Pyopneumothorax nach Durchbruch einer tuberculösen Caverne.

Die chronischen Pleuritiden, wie sie jede Lungenerkrankung begleiten, dünne Schwarten oder einfache Adhäsionen, unterliegen gar keiner oder wenigstens einer äusserst langsamen Resorption. Die Veränderung der Lungen tritt hierbei so in den Vordergrund, dass die pleuritischen Erscheinungen fast niemals in Betracht kommen. Abgessackte Empyeme, welche bei Erwachsenen 10 und 20 Jahre lang bestehen können, kommen bei Kindern, bei denen die Resorption der rascheren Entwicklung gemäss ebenfalls rasch vor sich zu gehen pflegt, nicht vor.

Behandlung.

Ueber die Therapie der secundären, pyämischen Pleuritis der Neugeborenen sind nicht viele Worte zu verlieren, indem sie unter allen Verhältnissen tödtlich ist. Die primäre Pleuritis grösserer Kinder mit rascher Exsudatbildung ist zu Anfang mässig antiphlogistisch zu behandeln. Es gibt kein Mittel, das in jedem heilbringenden Momente die Zunahme eines flüssigen Exsudates zum Stillstande brächte, auch durch die grössten Blutentziehungen gelingt dies keineswegs. Dieselben sind deshalb auch durchaus nicht dringend indicirt, doch ist nicht zu leugnen, dass bei grössern über fünf Jahre alten Kindern die Heftigkeit der pleuritischen Schmerzen durch einige Blutegel sehr gemindert wird. Bei kleineren Kindern genügt zur Schmerzstillung der schon bei der Pneumonie beschriebene fenckte Gürtel, der den ganzen Thorax umgebend 4—6 Tage liegen bleiben kann.

Die interne Behandlung ist, so lange das Fieber und die Schmerzen sehr beträchtlich sind, am besten mit kleinen Dosen Calomel, dem ganz passend etwas Opium beigesetzt wird, einzuleiten. Einem Kinde von 3—6 Jahren gibt man täglich 0,015—0,03 Calomel und 0,005—0,01 Opium. Diarrhöe darf nicht anhaltend geduldet werden. Ist das pleuritische

Exsudat einmal gesteht und hat es aufgehört zu wachsen, so hört auch das Fieber und hienit die Indication zu obigem Mittel auf und es handelt sich um Sarcin, dasselbe möglichst rasch zum Schwenden zu bringen. Man macht zu diesem Zweck Einreibungen von grauer Salbe, von Jodsalbe, Einsparungen mit Jodtinktur oder unterhält längere Zeit fliegende Vesicantien. Innerlich werden die verschiedenen Diuretica gerühmt.

Die salinischen Diuretica, das Kali nitricum oder aceticum passen wegen ihres schlechten Geschmacks und ihrer abführenden Wirkung nicht für Kinder. Hingegen vertragen dieselben kleine Dosen Digitalis-tinktur 0,6 pro die in 30,0–80,0 Vehikel sehr gut; man setzt dieselbe aus, sobald die Pulserelaxation eintritt und fährt wieder damit fort, wenn sie abklingt. Am liebsten und besten wird Roeb Juniperi vertragen, wovon man Monate lang den Kindern täglich 1–2 Kaffeebecher reichen kann. Man darf übrigens die Wirkung der Diuretica nicht überschätzen, indem schon oft genug beobachtet worden ist, dass unter günstigen Verhältnissen solche einfache pleuritische Exsudate in wenigen Wochen gänzlich verschwinden sind, wenn auch gar keine interne Behandlung eingeleitet worden ist. Gute Nahrung und gute Luft sind die Hauptfactoren für das Gelingen einer raschen Aufsaugung. Die Spitalluft wirkt ausserordentlich schädlich auf die Resorption eines Empyems ein, und es sind deshalb solche Kranke von den Kinderspitälern möglichst fern zu halten. Die Operation der Thoracostomie wurde bei grösseren Kindern schon öfters mit günstigem Erfolge von mir ausgeführt. Bisher reichte ich stets mit dem Explorativtroikart aus, durch welchen bis zu 350 CC Eiter auf einmal entleert wurden. Die Einstiche mit diesem Instrumentchen bei verschobener Cima sind ganz ungefährlich, können öfter repetirt werden und sind offenbar rationeller, als die grossen Schnitte und Wasserauspülungen der Pleurahöhle, wodurch leicht Jauchung entsteht. Das Bestreben, den mit Eiter gefüllten Pleurasack möglichst vollständig zu entleeren, hat natürlich keinen Erfolg, wenn die Lungenpleura mit Schwarten bedeckt ist, die der Lunge erst eine allmähliche Rückkehr zu ihrem normalen Volumen gestatten.

Zweimal sah ich bei kräftigen, wohlgenährten Kindern unter der Mamma eine Geschwulst entstehen, welche einmal spontan sich öffnete, das andere Mal durch einen Einschnitt mit der Lancette eröffnet wurde. In beiden Fällen floss Anfangs eine grosse Menge Eiter ab, die Lunge dehnte sich entsprechend aus. Die zurückbleibende Fistel schloss sich aber erst nach Jahren und brach mehrmals wieder auf.

2) Hydrothorax.

Seröse Ergüsse in die Pleurasäcke kommen bei Säuglingen ausserordentlich selten, bei grösseren Kindern aber ziemlich häufig als Folgen gewisser krankhafter Zustände vor. Die ergossene Flüssigkeit ist rein serös, gelb, albuminhaltig, und ihre Salze zeigen dieselben quantitativen Verhältnisse, wie sie sich im Blutserum ergeben. An der Pleura selbst sind keine pathologischen Veränderungen zu entdecken, wenn nicht Lungenkrankungen mit consecutiver leichter Pleuritis vorausgegangen sind.

Aetiologie.

Die Annahme eines primären, essentiellen Hydrothorax, wie manche Autoren ihn noch aufführen, ist eine höchst problematische, indem einzelne vorausgehende Krankheiten in gewissen Fällen leicht zu übersehen sind. Unstreitig die häufigste Veranlassung gibt die Nephritis in Folge von Scharlach ab, dann folgt die Intermitteuscachexie und endlich als die seltenste Ursache ein erworbenes Herzfehler. Die übrigen Coeloxien, wodurch bei Erwachsenen noch Hydrothorax erzeugt werden kann, als Lebereirrhosis, chronischer Morb. Brightii, Carcinom, Lähmungen etc. kommen bei Kindern so gut wie gar nicht vor.

Symptome.

Der Hydrothorax nach Scharlach bildet sich immer erst, nachdem schon einige Tage vorher Anasarka aufgetreten ist, ohne damit sagen zu wollen, dass er nothwendiger Weise hierauf folgen müsste. Das Anasarka wird regelmässig durch deutliche Fiebererscheinungen eingeleitet, welche sich noch steigern, wenn die serösen Ergüsse der Pleura und des Peritonäums sich hinzugesellen. Die Diagnose wird in diesem Falle durch das regelmässig vorhandene Anasarka erleichtert.

Der Hydrothorax in Folge von Intermitteuscachexie tritt bald mit, bald ohne Fieber ein. Gewöhnlich ist aber hier auch Anasarka wenigstens an den unteren Extremitäten vorhanden. Die grangelfarbene Gesichtsfarbe, die österröthete Anämie der Schleimhäute und der constant bestehende Milztumor sind so auffällige Zeichen, dass die Intermitteuscachexie mit keiner andern verwechselt werden kann.

Der Hydrothorax in Folge von Herzfehler ist der seltenste, weil eben Endocarditis bei Kindern ausserordentlich selten auftritt und gewöhnlich bald tödtlich endet, und weil die angeborenen Herzfehler ebenfalls nur in wenigen Fällen ein Alter erreichen, in welchem hydroptische Ergüsse sich zu bilden pflegen.

Der Hydrothorax ist zum Unterschied von der Pleuritis viel häufiger auf beiden Seiten als nur auf einer, doch ist die Höhe des Exsudates selten auf beiden Seiten gleich, und dann fehlt bei ersterem regelmässig das in andern Fälle so constante und lang andauernde Seitenstochen. Die Dämpfung ist bei etwas beträchtlicherem Hydrothorax eine complete und kann durch verschiedene Lagerungen, welche sich die Kinder jedoch nur ungern gefallen lassen, leicht verändert werden, indem das Exsudat so dünnflüssig und zugleich copios ist, dass es nach dem Gesetz der Schwere noch seinen Platz verändert. Reibungsgeräusch wird hier niemals geföhlt noch gehört, und die äussere Form des Thorax verändert sich ebenso auffallend, vielleicht noch auffallender als bei Empyem. Erweiterung und Vorwölbung der Intercostalräume, Unbeweglichkeit der Thoraxparthien, an welchen das Serum aufliegt, Veränderung der Leber und des Herzens finden sich hier in der auffallendsten Weise.

Da der Hydrothorax in den meisten Fällen ein doppelseitiger ist, so nimmt die Athemnoth rasch zu, es stellt sich Orthopöie, Cyanose und Lungenödem ein, worauf dann bald der Tod erfolgt. Die Harnsecretion ist in allen Fällen sehr vermindert, der Stuhl meist angehalten, wenn nicht, wie es gewöhnlich geschieht, der Darmkanal in den Versuchen der Ableitung in Anspruch genommen wird.

Die Pulsfrequenz ist zu Anfang eine erhöhte, kann aber bei mässiger Athemnoth bald zu ihrem normalen Maass zurückkehren.

Die Prognose ist am günstigsten nach Scharlach, weniger günstig nach Intermittens und entschieden ungünstig, ja lethal, nach Herzkrankheiten zu stellen.

Behandlung.

Eine schwächende antiphlogistische Behandlung ist hier niemals indicirt, wenn auch in den ersten Tagen der Erkrankung öftliche Fiebererscheinungen sich eingestellt haben sollten. Die Kinder haben immer durch die vorausgehenden Leiden so sehr an Kraft verloren, dass es dringend notwendig erscheint, vor allem die Ernährung in's Auge zu fassen. Man gibt ihnen deshalb kräftige Suppen mit Eigelb oder gute Milch, so viel nur immer beizubringen ist, und versucht durch leichte, die Verdauung nicht störende, keine Diarrhöe verursachende Diuretica die Harnsecretion zu vermehren. In dieser Beziehung eignen sich, wie schon öfter erwähnt, einige Tropfen Digitalis- oder auch Juniperi in grösserer Dosis am besten. Als Nachbehandlung sind China und Eisen am meisten zu empfehlen.

4. Capitel.

Krankheiten der Circulationsorgane.

A. Herz- und Gefässstämme.

1) Angeborene Anomalie.

Zu einem richtigen Verständniss der angeborenen Anomalien des Herzens muss aus der Entwicklungsgeschichte vorausgeschickt werden, dass ganz zu Anfang der Entwicklung das Herz und die Gefässstämme nicht bald sind, sondern aus locker zusammenliegenden Zellen ohne Lücke und ohne Höhlung bestehen. Das Herz hat zu dieser Zeit noch die Form eines gerade liegenden Cylinders, der unten und oben in je zwei Schenkel ausläuft; die beiden unteren Schenkel sind die Stämme der Gefässe, welche in Zukunft sich in der Keimblase verzweigen und von ihr das Blut in das Herz führen, die Venae omphalo-mesentericae; die beiden oberen sind die beiden zukünftigen ersten Aortenbogen, welche das Blut aus dem Herzen in den Embryo führen. Erst allmählig wird nach Bischoff die äussere Oberfläche fester, indem sich die Zellen hier dichter aneinander lagern und so Wandungen bilden, und damit entwickelt sich im Innern eine Höhle, in welcher sich Flüssigkeit und lose Zellen, die ersten Spuren des Blutes, ansammeln. Der Herzcylinder nimmt dann eine etwas S-förmig gebogene Gestalt an, und beginnt in sehr langsamem Rhythmus sich zusammenzuziehen und auszudehnen, wodurch sein flüssiger Inhalt nach vorn und oben

in den Aortenbogen getrieben wird, während andererseits der der Venenstämme von hinten und unten beigezogen wird.

Nach und nach wird aus dieser Herzkammer unter verschiedenen Krümmungen, Erweiterungen und Abschnürungen einzelner Parthien zum Herzen selbst, bestehend aus der Aortenschwelling, aus einer Kammer und einer Vorkammer. Erst später kommt es zur Entwicklung von Scheidewänden, wodurch eine rechte und linke Kammer und Vorkammer gebildet werden. Die mangelhafte Entwicklung oder fehlerhafte Insertion dieser Scheidewände nun gibt die häufigste Veranlassung zu den Bildungsfehlern des Herzens.

Es werden jedoch auch Fälle beobachtet, welche einen embryonalen entzündlichen Process des Herzmuskels und dessen Folgen, Atrophie und Verwärtung der erkrankten Stellen, deutlich erkennen lassen.

Die besten Zusammenstellungen der angeborenen Herzanomalien finden sich in den Lehrbüchern von Rokitansky und Bauharger, welche auch die Grundlage zu der nun folgenden Uebersicht abgegeben haben:

1) Der Mangel des Herzens, *Acardia*, kommt nur bei Monstren vor, wo zugleich die obere Hälfte des Rumpfes mangelnd und deshalb auch das Nervensystem nur höchst rudimentär vorhanden ist. Dem entgegengesetzt ist die Duplicität des Herzens bei Doppelmissbildungen, besonders bei Duplicität der oberen Körperhälfte. Zwei vollständig getrennte Herzen in zwei gesonderten Herzbecken oder in einem gemeinschaftlichen.

2) *Abnorme Lage des Herzens*. Hierher gehört ein Beibehalten der fötalen Lage in der Mitte der Brusthöhle, dann die Transposition des Herzens, wobei der Herzschlag rechts vom Sternum zu fühlen ist und meistens auch Verlagerung anderer Eingeweide, namentlich der Leber und des Magens, stattgefunden hat, und endlich die *Ektopie* des Herzens. Es fehlt hierbei das Sternum, die Haut ist bald normal, bald fehlt auch diese. In dem letzteren Falle liegt das Herz ganz frei oder nur vom Herzbeutel bedeckt zu Tage und es wird hierdurch absolute Lebensunfähigkeit bedingt. Wenn ein grosserer Theil der Brustwand und der Bauchdecken fehlt, so liegen noch andere Eingeweide ausserhalb der Höhlen, was man *Eventration* genannt hat. In ganz seltenen Fällen ereignet sich auch ein Defekt oder eine Spaltung des Zwerchfelles, und das Herz dringt dann durch diese Spalte in die Bauchhöhle.

3) *Abnorme Gestalt und Grösse*. Die Gestaltvariationen des Herzens sind häufig ohne Belang. Ein breites, ein cylindrisches, ein an der Spitze gespaltenes, ein spitzes und ein rundes Herz kann vollkommen normal funktionieren, hingegen sind mit abnormer Grösse und Kleinheit des ganzen Herzens oder einzelner Theile desselben meist Funktionsstörungen complicirt. Am häufigsten findet sich der rechte Ventrikel vergrössert in Folge von Offenbleiben des fötalen Kreislaufes.

4) *Abnorme Beschaffenheit einzelner Theile des Herzens*. Wir begegnen hier Abnormitäten a) des Septums, b) der Gefässstämme und c) der Oastien und Klappen.

a) Wenn die Bildung der Septa ganz unterblieben ist, so haben

wir nur einen Vorhof und eine Kammer. Gewöhnlich aber sind die Septa durch vorspringende Leisten angedeutet und in dem einen oder anderen Hohlraum auch vollständig entwickelt, so dass wir zwei vollkommen getrennte Vorhöfe und nur Eine Kammer, oder umgekehrt, vor uns haben können. Da auch im physiologischen Zustand anfangs das Foramen ovale eine kleine Communication der beiden Vorhöfe gestattet, so finden sich hier auch die häufigsten Defekte. Auch kommt es vor, dass der linke Vorhof durch einen schiefverlaufenden Verbindungsgang mit dem rechten Ventrikel, oder umgekehrt, communicirt. Meistens sind mit grösseren Fehlem der Septa auch fehlerhafte Ursprünge der grossen Gefässstämme verbunden, die auch dadurch bedingt sein können, dass die Insertion der Septa die Mittellinie verlässt. Es wird hiernach möglich, dass die untere Hohlvene in den linken Vorhof statt in den rechten einmündet, oder dass die Aorta aus dem rechten Herzen entspringt.

b) Wie schon erwähnt, hängen die Abnormalitäten der Gefässstämme grössten Theils von mangelhafter Entwicklung oder fehlerhafter Insertion der Septa ab. Die häufigsten Abweichungen sind:

1) Die Lungenarterie fehlt entweder gänzlich oder sie ist an ihrem Ursprunge sehr verengt und erweitert sich erst vom Ductus arter. Botalli an, der ihr aus der Aorta Blut zuführt. Wenn nur eine Kammer vorhanden, so versieht die Aorta ganz die Stelle der Pulmonalarterie.

2) Das von der Lungenarterie Gesagte kann auch mit der Aorta geschehen, auch diese kann verkrümmt oder vollkommen verschlossen sein, sie erhält dann ihr Blut aus dem offen bleibenden Ductus Botalli.

3) Der fötale Typus der Blutvertheilung wird ganz beibehalten, indem die Aorta die obere Körperhälfte, die Pulmonalarterie durch den Botall'schen Gang die untere Körperhälfte mit Blut versieht.

4) Es findet eine Transposition der grossen Gefässe statt, so dass die Aorta aus dem rechten, die Lungenarterie aus dem linken Ventrikel entspringt.

5) Beide Gefässe entspringen aus Einer Kammer.

6) Die Aorta hat zwei gleiche oder ungleiche Wurzeln, von denen die eine aus dem linken, die andere aus dem rechten Ventrikel entspringt.

7) Der Bulbus der Aorta vergrössert sich beträchtlich und stellt einen dritten Ventrikel dar.

8) Der Ductus Botalli bleibt häufig durchgängig, oder er kann gänzlich fehlen, oder sich zu einem bleibenden Gefässstamm entwickeln.

Eine eingehendere Besprechung verdient die Obliteration der Aorta jenseits der Mündung des Botall'schen Ganges, eine Anomalie, welche namentlich von Rokittansky genauer untersucht worden ist. Es findet sich an dieser Stelle eine starke Einschnürung der Aorta, welche jedoch nur einige Linien lang ist, und dann wieder in eine Aorta descendens von ganz normalem Caliber endet. Diese Anomalie beruht darauf, dass sich im Fötus die Arteria pulmonalis unter Bildung eines Bogens in die absteigende Aorta fortsetzt, während das Blut der Aorta nur in die Arterien der Arme und des Kopfes, also in die Arteria, Carotis und Subclavia sinistra gelangt. Das Blut der Pulmonalarterie strömt durch den weiten Ductus Botalli in die Aorta descendens. Als Fortsetzung der Aorta tritt ein enges Gefässstück zum Bogen der Pulmonalarterie, das mit dem Namen Isthmus aortae

bezeichnet wird. Nach der Geburt wird durch die Erweiterung der Lungen die Blutbahn vom Ductus Botalli abgelenkt, welche alsdahl verodet und undurchgänglich wird, und zu gleicher Zeit erweitert sich jenes ursprünglich enge Gefäßstück, der Isthmus aortae, zu dem Durchmesser der normalen Aorta. Kommt nun nach der Geburt diese Erweiterung des Isthmus aortae nicht zu Stande und verodet dennoch der Botallische Gang, so entsteht eine bleibende Einschnürung des Isthmus aortae.

Es stellt sich nun für das Blut des linken Herzens, dem der Weg zur unteren Körperhälfte somit versperrt ist, ein Collateralkreislauf ein, wodurch die unterhalb der Einschnürung liegende Aorta dennoch mit Blut gefüllt wird. Es erweitern sich zu diesem Zwecke die Äste der Art. subclavia und nehmen einen geschwängelten Verlauf an. Die wichtigsten Äste für die neu herzustellende Verbindung sind: Die Arteria mammaria interna, deren Ramus intercostales anteriores das Blut in die mit ihnen anastomosirenden Ramus intercostales posteriores führen, welche aus der Aorta descendens entspringen, oder richtiger gesagt für diesen Fall, in sie einmünden. Ferner sind zu erwähnen die Anastomosen zwischen Mammaria interna, Epigastrica superior und den Lumbalarterien, dann die A. intercostalis suprema mit den Intercostalisten der Mammaria, und endlich die A. dorsalis scapulae mit den Dorsalisten der Zwischenrippenarterien.

Die Aorta descendens wird auf diese Weise gänzlich gefüllt, doch erreicht sie nicht das normale Lumen, während der Bogen der Aorta bis zur Stelle der Einschnürung sich erweitert zeigt. Diese Individuen sind vollkommen lebensfähig.

9) Die Venenemündungen in die Vorhöfe können ebenso transportirt sein, wie diese von den Arterien und den Kammern entwickelt wurde, oder es münden die Hohlvenen und die Lungenvenen nur in einen Vorhof etc.

c) Die angeborenen Abnormitäten der Klappen und Ostien sind im Allgemeinen verhältnissmäßig seltener und lassen sich leichter auf fötale Entzündungsproccesse, fötale Myocarditis, als auf wirkliche Bildungshemmungen zurückführen. Das häufigste Vorkommnis ist:

1) Stenose des Conus der Lungenarterie oder der Aorta, wobei sich das das Conus bildende Muskelfleisch zu einer weissen, schwammigen Masse umgewandelt hat. An der Lungenarterie findet sich diese Stenose häufiger als an der Aorta und ist nach Bamberger eine der häufigsten Ursachen der angeborenen Cyanose. Regelmässig bleibt das Foramen ovale offen oder es kommt nicht einmal zu einer völligen Entwicklung des Septum der Ventrikel.

2) Die Klappen können knorpelig verdickt sein, an den Atrioventrikularklappen kommen verdickte und überzählige Papillarmuskeln und falsch inserirte Sehnenfäden vor, oder es sind im Gegentheil die Klappen durchscheinend, sehr verdünnt, durchlöchert. Bei rudimentärer Bildung der grossen Arterien oder unrichtiger Insertion der Septa können die Zipfelklappen oder die Semilunares auch vollständig fehlen.

3) Die Klappe des Foramen ovale kann gänzlich fehlen oder vorzeitig sich verschliessen, auch an der Eustachischen Klappe wird mangelhafte Entwicklung beobachtet.

Symptome.

Anatomische Betrachtungen über angeborene Bildungsfehler des Circulationsapparates finden sich hauptsächlich in Dissertationen und grösseren Monographien, hingegen sind die dabei beobachteten Symptome nur selten ausführlich geschildert, und wo diese geschehen, gewöhnlich nicht harmonisirend bei ein und demselben anatomischen Befunde. Wir können mit Bamberger alle Bildungsfehler bezüglich ihrer Symptome in drei Gruppen bringen.

1) In die erste Gruppe kommen die Bildungsfehler, welche absolute Lebensunfähigkeit bedingen. Hierher gehören die Monstrositäten, Ektopie des Herzens mit Hautdefekt und vollkommen ein-kammerige Herzen, Transposition der grossen Gefässe.

2) Zur zweiten Gruppe sind jene zu rechnen, mit welchen die Kinder wohl am Leben bleiben und sich die ersten Jahre hindurch nothdürftig oder selbst normal entwickeln, jedoch mit jedem Jahre eine Zunahme ihrer Kreislaufstörung erfahren, so dass während der ersten, spätestens im Verlaufe der zweiten Dentition sicher der Tod eintritt. Hierher gehören die angeborenen Verengerungen am Coarct. der Pulmonalarterie oder der Aorta, grössere Communicationen der Ventrikel oder der Vorhöfe, oder eines Ventrikels mit dem gegenüberstehenden Vorhofe, das Einspringen der Aorta aus beiden Ventrikeln, Offenbleiben des Ductus Botalli.

3) Es gibt eine Reihe von kleinen Anomalien, wodurch der Kreislauf keineswegs gestört und also auch gar kein Hinderniss für die Entwicklung des Kindes geboten wird. Hierher gehören besonders die äusseren Formveränderungen des Herzens, die Spaltung der Herzspitze und die konische oder die walzenförmige, die breite oder runde Form. Auch die Transposition des Herzens auf die rechte Seite, gewöhnlich complicirt mit Transposition der Leber und des Magens, ist ohne allen Einfluss auf die Fortdauer des Lebens. Das Offenbleiben des Foramen ovale ist ebenfalls höchst irrelevant, wie schon durch vielfache Sektionsbefunde dargethan worden, namentlich wird dieselbe kaum jemals als Ursache der Cyanose, auf welche wir später nochmals zurückkommen müssen, zu betrachten sein.

Was nun die Zeit des Eintrittes der Symptome betrifft, so ist dieselbe sehr verschieden. Es ist allerdings richtig, dass die durch angeborene Herzfehler verursachten Circulationsstörungen anfangs unbedeutend sein können, und erst von Monat zu Monat zunehmen, höchst unwahrscheinlich aber klingen die Angaben einzelner Autoren, nach welchen erst nach mehreren Jahren oder gar erst mit Eintritt der Pubertät ein angeborener Herzfehler anfangen soll, Symptome zu verursachen. Es liegen hier wahrscheinlich Täuschungen zu Grunde und sind acute Herzerkrankungen übersehen worden. Genug Kinder haben übrigens schon gleich nach der Geburt die deutlichsten Zeichen bedeutender Kreislaufstörungen. Sie kommen asphyktisch zur Welt und gehen an Atelaktase der Lungen abstoß zu Grunde. Sie schreien sehr leise und nicht zusammenhängend, sind immer kühl, etwas cyanotisch, schlafen viel und haben convulsivische Hustenanfälle, wobei die Cyanose schnell zunimmt und namentlich die vorgestreckte Zunge eine dunkel bläurothe Farbe annimmt.

Das constanteste und zuverlässigste Symptom ist immer die Cyanose, über deren Entstehung aber theilweise unrichtige Anschauungen bestehen. Früher nahm man an, dass Cyanose bei angeborenen Herzfehlern entsteht, wenn arterielles und venöses Blut sich mischt, wenn also dunkler rothes Blut, als im Normalzustand, in das arterielle Gefäßsystem dringt. Dass diese Anschauung unrichtig ist, geht schon aus den vielen Cyanosen hervor, bei welchen die anatomischen Verhältnisse des Herzens vollkommen normal sind, bei Cholera oder bei Vergiftungen mit Kohlenoxydgas. Es sind hier bekanntlich die Cyanosen ziemlich hochgradig und doch findet man bei der Sektion keine Spur von Veränderungen am Herzen. Wegen derselben irrigen Ansicht hat man auch dem Foramen ovale eine allzugroße Aufmerksamkeit geschenkt und gab sich zufrieden, wenn man mit einer Saule von einem Vorhof zum andern gelangen konnte, gleichviel ob die Klappe sufficient war oder nicht.

Der einzige stichhaltige Grund der Cyanose liegt in einer mangelhaften Oxydation des Blutes in den Lungen, verbunden mit einer Stase im peripherischen Venensystem. Dieser Process aber kann durch verschiedene Zustände bedingt sein; es findet sich entweder ein Hinderniss im linken Herzen und hiemit Stauung des Blutes in den Lungenvenen, oder es ist durch eine Stenose im rechten Herzen die Zufuhr von Blut zu den Lungen vermindert, und wird deshalb weniger Blut oxydirt, oder es stellen sich in den Lungen in Folge von Gewebskrankheiten dem Kreisläufe Hindernisse entgegen, oder endlich es ist die eingeathmete Luft sauerstoffarm und oxydirt dann ebenfalls nur unvollständig. Auch die Consistenz des Blutes kann sich so ändern, dass die Strömung dadurch verlangsamt wird, was namentlich für die Eindickung des Blutes in der Cholera gilt. So sehen wir nun, dass die Bedingungen der Cyanose ziemlich mannigfache sind und keineswegs nur in mechanischen Veränderungen des Herzens gesucht werden dürfen.

Die Grade der Cyanose sind sehr verschieden und schwanken zwischen einer leichten, bläulichen Färbung der Lippen und Wangen, und einer Bläurothe des ganzen Körpers, auch veranlassen die eben auftretenden Congestionen eine Steigerung der bestehenden Cyanose. Zu hohe und zu niedrige Temperatur, Aufregung, Schreien, Lachen, körperliche Anstrengung sind also die häufigsten Ursachen dieser Zunahme.

Überleben Kinder mit angeborenen Herzfehlern die ersten Lebensjahre, so stellen sich noch verschiedene andere Symptome der Kreislaufstörung ein. Sie leiden fast alle an schlecht entwickelten Brustmuskeln und Hühnerbrust. Die Extremitäten sind immer kalt und feucht, wie die Haut des Frosches, die Fingerspitzen schwellen zu Kloben an, über welche der Nagel krallenartig gekrümmet hervorragt, die Hautvenen sind übermäßig stark, die Kinder können sich in keiner Weise anstrengen, weder laufen noch steigen, noch anhaltend schreien, indem ihnen all diese einen heftigen Schmerz in der Herzgegend, Dyspnoe und Palpitationen verursacht. In seltenen Fällen wird bei grösseren Kindern auch Hämoptoe beobachtet, Nasenbluten hingegen ist ein sehr häufig auftretendes Symptom, das in der Regel einige momentane Erleichterung verschafft. Endlich macht allgemeiner Hydrops

des Zellgewebes und der serösen Sacke, dem sich noch Albuminurie hinzugesellt, dem traurigen Leben dieser Kinder ein Ende.

Die physikalische Untersuchung der angeborenen Herzfehler bietet ausserordentliche Schwierigkeiten. Hypertrophie des Herzens lässt sich fast ohne Ausnahme nachweisen und rührt gewöhnlich von einer beträchtlichen Vergrößerung des rechten Herzens her. Der Herzschlag ist dabei ausgedehnt und verstärkt zu fühlen. Durch die Auscultation lassen sich selten reine Herzklappe-ernittehn, sondern es sind meist Geräusche statt des einen oder andern Tones oder gar statt beider Töne zu hören. Anhaltende starke Geräusche lassen eine beträchtliche abnorme Communication der Herzklappen, eine Perforation des Septums vermuthen, ein starkes systolisches Geräusch, das über der Pulmonalarterie am deutlichsten gehört wird, zeigt eine Verengung der Pulmonalarterie, einen der gewöhnlicheren Bildungsfelder an. Zuweilen jedoch passt der auscultatorische Befund weder auf das eine noch das andere Uebel, und es kann dann die Diagnose nicht genauer als auf angeborenen Herzfehler überhaupt gestellt werden. Nach statistischen Zusammenstellungen von Friedberg und Aberle sind besonders die Perioden der ersten und zweiten Zahnung für die Kinder mit angeborenen Herzfehlern gefährlich. Vor 159 Fällen starben 53 im ersten Jahre, 51 vom 2—11. Jahre, 30 zwischen dem 11—25 Jahre und nur fünf wurden über 44 Jahre alt.

Behandlung.

Von einer direkten Behandlung kann natürlich nicht die Rede sein, man muss sich vielmehr darauf beschränken, Schädlichkeiten möglichst abzuhalten und ein passendes diätetisches Verfahren einzuleiten. Die notwendige Ruhe ist bei solchen Kindern leicht aufrecht zu erhalten, da sie selbst durch die Erfahrung bald belehrt werden, wie schädlich und qualvoll eine stärkere Wallung des Herzens für sie ist. Bezüglich der Nahrung hat man keine besonderen Vorsichtsmaßregeln zu beobachten, nur müssen reizende, alkoholische Getränke streng gemieden werden. Warme Kleidung ist in diesen Fällen ausserordentlich antraglich, und es sind desshalb besonders Leibchen von Flanell zu empfehlen. Eine strenge antiplogistische Behandlung, Blutegel, Calomel, Laxantien etc. sind unter allen Verhältnissen zu meiden, indem der Hydrops und das lethale Ende hindurch sichtlich beschleunigt wird. Starke Congestivzustände, wie sie sich ausserordentlich häufig einstellen, müssen durch äussere Anwendung der Kälte, durch sauerliche Getränke und strenge Diät beseitigt werden.

Kommen die Kinder asphyktisch zur Welt, so müssen die bei der Asphyxie schon angegebenen Belebungsversuche angestellt werden, welche aber in diesen Fällen gewöhnlich fruchtlos bleiben.

2) Endocarditis, Pericarditis und Rheumatismus acutus

Wir bringen hier drei Krankheiten in einen Rahmen zusammen, welche pathologisch-anatomisch gar keine Aehnlichkeit unter einander haben, klinisch aber sich kaum trennen lassen, wenn man nicht bei später Beschreibung der einzelnen Veränderungen sich vielfachen Wiederholungen aussetzen will. Zudem sind diese Zustände bei Kindern

ausserordentlich selten, so dass es kaum notwendig erscheint, eine ausführlichere Besprechung zu geben.

Symptome.

Wir beginnen mit den Symptomen des Rheumatismus acutus und lassen dann als häufigste Complicationen die Endo- und Pericarditis folgen.

Rheumatismus acutus.

Der acute Rheumatismus der Kinder unterscheidet sich wenig von dem der Erwachsenen, nur ist sein Verlauf kürzer und die Erkrankung in der Regel weniger intensiv. Das jüngste Kind, das ich an ausgesprochenem Rheumatismus acutus mit nachfolgender, theilweise Endocarditis zu behandeln hatte, war 1 $\frac{1}{4}$ Jahr alt, und erlag nach 4-jähriger Krankheit dem Herzfehler. Es ist das ein sehr seltener Fall, indem in den Lehrbüchern die Krankheit meistens nur Kindern von sechs Jahren und darüber zugeschrieben wird. Viele Erkrankungen, welche von den Laien mit dem vagen Namen Wachsfeber bezeichnet worden, gehören hieher.

Anfangs ist immer heftiges Fieber zugegen, die Haut wird brennend heiss, der Durst gross, der Puls enorm beschleunigt; es tritt grosse Unruhe und Schlaflosigkeit ein. Dieses heftige Fieber dauert höchstens 8—10 Tage, verliert sich aber dann allmählig, und nur wenn heftige Complicationen, namentlich Erkrankungen des Herzens eingetreten sind, besteht dasselbe auf unbestimmt lange Zeit und ohne Unterbrechungen fort. Die Kinder sind meist sehr blass und collabirt, haben einen auffallend wehmüthigen, schmerzhaften Ausdruck des Gesichtes und einen matten Blick, sie beobachten an den ergriffenen Gelenken die grösstmögliche Ruhe, während die freien Extremitäten wegen der grossen Fieberhitze in fortwährender Unruhe sich befinden.

Das Wesentliche der Krankheit besteht nun in einer eigenthümlichen Anschwellung an verschiedenen Gelenken, vorwiegend der unteren Extremitäten, welche sich gerade so wie bei Erwachsenen verhalten. Die Berührung und noch mehr die Bewegung der erkrankten Glieder ist ausserordentlich schmerzhaft, so dass die Kinder mit dem Ausdruck der grössten Angst jede Annäherung an die schmerzhaften Gelenke überwachen und abwehren. Die Anschwellungen sind anfangs immer etwas geröthet, die Röthe nimmt aber früher ab als die Geschwulst. Am häufigsten sind die Kniegelenke ergriffen, dann folgen die Fussgelenke, dann die der oberen Extremitäten und die Wirbelsäule.

Diese Gelenkschwellungen gehen bei Kindern von niemals in Eiterung über, sondern schwellen spurlos wieder ab und hinterlassen höchstens einige Schwäche und Schmerzhaftigkeit bei Gebrauch der Extremität. Charakteristisch aber ist die Wanderung oder das Ueberspringen der Affektion von einem Gelenk zum anderen. Nur ausserordentlich selten ist der Process mit dem gleichzeitigen Ergriffenwerden einiger Gelenke beendet, sondern gewöhnlich erkranken nach einigen Tagen, wenn die zuerst befallenen Gelenke wieder abschwellen, andere neue mit derselben Heftigkeit und demselben Verlaufe, was sich in einem dritten und selbst vierten Nachschub wiederholen kann.

Die allgemeinen Symptome sind der Heftigkeit des Fiebers ent-

sprechend. Der Appetit ist sehr vermindert oder vollständig verschwunden, der Stuhl angehalten, der Urin dunkel pigmentirt, reich an Harnsäure, wird nur in geringer Menge gelassen. Die Kinder schwitzen sehr viel und werden mit Miliarien besetzt.

Die Diagnose des Rheumatismus acutus ist sehr leicht, zumal er fast ausschließlich ältere Kinder, die ihre Klagen schon vernünftig vorbringen können, befällt. Im Beginn könnte er nur verwechselt werden mit einem noch nicht angebrochenen acuten Exantheme oder mit einem Typhus, wo auch zuweilen sehr heftige Schmerzen in den Knie- und Fußgelenken vorkommen. Die letzteren lassen sich aber leicht dadurch erkennen, dass keine Anschwellung hierbei zu Stande kommt und dass durch leisen Druck oder langsame passive Bewegung der Schmerz nicht besonders vermehrt wird, was bei Rheumatismus semper jedesmal der Fall ist. Die Verwechslung mit scrophulöser Arthrocace, mit Tumor albus könnte höchstens einige Tage bei Beginn derselben bestehen, da hier durchaus keine Wanderung von einem Gelenk auf das andere beobachtet wird, und der Verlauf ein ganz anderer chronischer ist.

Der einfache Rheumatismus acutus hat ohne Complicationen eine Dauer von höchstens 14 Tagen. Ist er aber mit Herzaffectionen complicirt, was mindestens bei $\frac{1}{2}$ der Erkrankungen der Fall ist, so ist die Dauer eine unbestimmt lange, und es kann nach Jahre langem Siechthum noch das letzhale Ende eintreten. Unter den Complicationen verdienen eine specielle Betrachtung a) die Endocarditis und b) die Pericarditis.

a) Endocarditis.

Pathologische Anatomie.

Die vortrefflichen Untersuchungen von Luschka haben ergeben, dass das Endocardium aus denselben Schichten besteht wie die Gefässe. Die Oberfläche wird durch eine dünne Schichte Epithel gebildet, das als unmittelbare Fortsetzung von jenem der Gefässe zu betrachten, ist. Dann folgt eine Schichte gestreckter Längsfasern, dann eine von sehr feinen, sich vielfach kreuzenden elastischen Fasern, welche der contractilen Haut der Gefässe analog ist, und endlich verbindet eine Schicht von Bindegewebe diese elastische Haut mit dem Herzmuskel. Die Gefässe und Nerven finden sich fast nur in diesem Bindegewebe und berühren nur wenig die elastischen Fasern, weshalb auch nur in dem ersteren eine wirkliche Exudation zu Stande kommen kann. Das Exudat dringt aber bald die überliegenden Schichten bei Seite und kommt in der Herzhöhle frei zu Tage, anderer Seite ergreift es auch die zunächst gelegenen Schichten des Herzmuskels, so dass immer eine kleine Myocarditis die Endocarditis begleitet. Zuerst bemerkt man nach Luschka rötliche Flecke im Endocardium, wobei die Oberfläche noch vollkommen glatt ist; bald aber schwindet diese Glätte, die Oberfläche wird rauh und es zeigt nun diese Exudation unter dem Mikroskope ganze und zertrümmerte Epithelien, Exudatkörper und Faserfragmente. Der vorbeihieselbe Blutstrom lässt an diesen rauhen Stellen alsdann einzelne Fibrinfasern hängen, wodurch dieselben ein flockiges Aussehen bekommen. Diese endocarditischen Exsudate können nach Bamberger folgende Metamorphosen eingehen:

1) Das Exsudat kann vollständig resorbirt werden, was jedoch nur bei ganz geringen Schichten, welche das Epithel noch nicht durchbrechen haben, möglich erscheint.

2) In den meisten Fällen verschwindet es nicht mehr ganz, sondern verursacht bleibende Veränderungen auf der Innentfläche des Herzens. Die gewöhnlichsten derselben sind weisse, verdichtete Stellen, welche immer eine Neigung zum Schwunde, zur narbigen Contraction haben und nun, wenn sie an den Klappen oder in deren Nähe vorkommen, dieselben zum Schrumpfen oder zu veränderten Stellungen und Insertionen veranlassen. Die Endocarditis ist somit die Hauptursache späterer Herzfehler. In anderen Fällen hat das endocarditische Exsudat die Neigung, zu polypösen Wucherungen anzunehmen, welche viel Aehnlichkeit mit spitzen Condylomen haben und deshalb fälschlich auch für eine wirkliche Anwesenheit der Syphilis gehalten worden sind.

3) Hauptsächlich durch Virchow's unermüdlige Forschungen ist dargethan worden, dass auch einzelne schon geronnene Theile wieder abgerissen und fortgeschwemmt werden können, wodurch dann in verschiedenen Körpertheilen Thrombosen entstehen. Der häufigste Sitz dieser Thrombosen sind die Milz, dann die Nieren und das Gehirn. Fast regelmäßig erfolgt der Tod nach einer solchen Fortschwemmung.

Symptome.

Wenn das endocarditische Exsudat so gelagert ist, dass es auf keine Klappe deutlich influenciren kann, so lässt es sich physikalisch gar nicht ermitteln, die funktionellen Erscheinungen aber sind so verschieden und werden auch von grösseren Kindern so undeutlich beschrieben, dass die Diagnose fast unmöglich erscheint. Gewöhnlich jedoch kommen Wucherungen an den Klappen vor, und dann treten deutliche physikalische Veränderungen ein.

Das linke Herz erkrankt viel häufiger als das rechte und zwar am häufigsten die Mitrals. Nicht nur Auflagerung auf der Klappe selbst, sondern auch jene in der Nähe der Papillarmuskeln und der Sehnenfäden können eine Schiefstellung, eine Verzerrenng oder einen Schwund der Klappe und hienit Insufficienz derselben veranlassen. Wir haben deshalb als gewöhnlichstes physikalisches Zeichen statt des ersten Tones ein systolisches Blasen, am deutlichsten an der Herzspitze, wenig an der Aorta und gar nicht an den Carotiden vornehmbar. Das rechte Herz erweitert sich bald consecutiv, so dass die Dämpfung in der Herzgegend eine ausgedehntere und dem entsprechend der Herzschlag in grösserem Umfange und verstärkt gefühlt wird. Wenn die Wucherungen am Ostium venosum des linken Ventrikels sehr massenhaft werden, so kann allerdings auch eine Stenose in diesem Ostium und hienit auch ein diastolisches Geräusch entstehen, was jedoch unverhältnissmässig selten zu sein scheint.

Die Semilunaren der Aorta können ebenfalls in den Bereich der Endocarditis gezogen und durch Schrumpfung oder Durchlöcherung insuffizient werden. Die gewöhnlichere Erscheinung an diesen Klappen ist aber, dass sie mit Vegetationen sich bedecken und somit eine Stenose am Ostium arteriosum bedingen. Man hört in diesem Falle eben-

falls ein systolisches Geräusch, das aber am stärksten an der Aorta ist und deutlich in die Carotiden sich fortplaut.

Das rechte Herz wird viel seltener von Endocarditis ergriffen als das linke, die dort aufstretenden Geräusche müssen ebenso gedeutet werden, wie diese für den linken Ventrikel geschrieben ist, nur sind dort die ventralen Stauungen an den Halsvenen viel ausgesprochener, als dies bei Klappenfehlern des linken Ventrikels der Fall ist.

Die funktionellen Symptome der Endocarditis sind sehr verschieden. Der Schmerz ist dabei selbst von Bedeutung, constant ist schon die Angst, die fortwährende Unruhe, soweit der Rheumatismus weiter sie gestattet, und Beklemmung der Brust. Doch sind alle diese Symptome bei Pericarditis ausgesprochener als bei Endocarditis. Herzklappen ist immer zugegen und nimmt zu durch Anstrengung als Geschrei oder Körperbewegung und zu gleicher Zeit stellt sich regelmässig eine eigene Art nervöser Dyspnoe, eine Kurzatmigkeit ein, die Anfangs keine nachweisbaren mechanischen Ursachen entdecken lässt, später aber durch die Stauung im linken Vorhof genügend erklärt wird.

Die an Endocarditis leidenden Kinder fiebern immer und bekommen, wenn sie das den Rheumatismus acutus begleitende Fieber schon verliern haben, wieder neue heftige febrile Symptome. Dieselben dauern unbestimmt lange Zeit, oft viele Wochen lang fort, und von ihrer Intensität, nicht von dem beginnenden Herzfehler hängt zum grossen Theil die enorme Abmagerung ab, in welche die Kinder verfallen. Zuweilen stellen sich anhaltende fieberhafte Delirien ein, und wenn hierbei die Milz noch vergrössert ist, was hauptsächlich bei Keilbildung deutlich beobachtet wird, so kann möglicher Weise dieser Symptomencomplex für Typhus gehalten werden. Uebrigens sind die secundären Symptome durch Fortschwenkung bei Kindern ausserordentlich selten. Ein einziges Mal erst fand ich bei einem an Endocarditis verstorbenen sechsjährigen Knaben Keilbildung in Milz und Nieren.

Die Diagnose der Endocarditis ist fast immer mit grossen Schwierigkeiten verbunden, und es ist hier vor allem zu beherzigen, dass nicht ein jedes blasendes Geräusch am Herzen Endocarditis anzeigt, indem die Kinder in fieberhaften Krankheiten sehr häufig und rasch anämische Geräusche bekommen, welche bei beginnender Reconvalescent von selbst verschwinden. Es wird dieses namentlich nach Blennorrhöen, schon nach öftlichen, beobachtet, und da dieselben auch gegen die rheumatischen Schmerzen häufig in Anwendung kommen, so werden auch anämische Geräusche in Folge von Rheumatismus acutus sich einstellen müssen.

Zur Diagnose der Endocarditis gehört ausser einem blasenden Geräusche noch ein ausgedehntes Click, eine Vergrösserung des Herzens, nachweisbar durch grössere Dämpfung, Beschleunigung des Pulses und Athemnoth. Die Ausgänge der Endocarditis sind Heilung, Tod oder Nachkrankheiten. Die vollständige Heilung einer gehörig entwickelten Endocarditis dürfte wohl zu den Selbstenheiten zählen, weil die Reste des Exsudates gewöhnlich Veränderungen an den Klappen und damit Herzfehler bedingen. Der Tod tritt schon auf der Höhe der Krankheit durch Erschöpfung oder Keilbildung ein, meist atrophiren die Kinder unter fortwährendem Fieber, accidentellen Diarrhöen und Bronchitiden und gehen an lobulärer Pneumonie zu Grunde. Die aus dieser Krank-

heit entstehenden Herzfehler entwickeln sich oft erst nach Monaten durch Schrumpfung des Exsudates und üben mehr und mehr Einfluss auf die Circulation aus, bis endlich der Herzfehler als solcher sich geltend macht und nach kurzer oder längerer Dauer den Tod herbeiführt.

b) Pericarditis.

Die Pericarditis ist erst seit der Entdeckung des pericarditischen Reibungsgeräusches durch Collin (1824) sicher diagnostizierbar. Die Diagnose ist aber auch noch jetzt höchst schwierig und mangelhaft, wie man aus Folgendem sehen wird.

Pathologische Anatomie.

Je nach der Ausdehnung spricht man von einer allgemeinen und einer umschriebenen Pericarditis. Die Neigung sich auszubreiten ist der Pericarditis im hohen Grade eigen, und man findet deshalb häufiger die allgemeine als die begrenzte. Die Veränderung kann sowohl am parietalen als visceralen Blatt beginnen, und es stellt sich alsdann eine Infektion und sofort eine plastische Exsudation an der Oberfläche ein.

Nach der Beschaffenheit des Exsudates unterscheidet man verschiedene Formen:

1) Das faserstoffige Exsudat. Man findet hierbei sowohl Herz als Herzbeutel dicht mit einer zottigen, gelbweissen Membran bedeckt und im ganzen Umfang oder partiell mit einander verwachsen. Dieses Exsudat ist sehr organisationsfähig und es entwickelt sich bald in ihm Capillargefässe, welche häufig zu kleinen Extravasaten Gelegenheit geben. Neben dieser organisierten Membran besteht immer noch eine kleinere oder grössere Menge flüssigen Exsudates, welche von den sich ablösenden Zotten und oberflächlichen Gerinnseln gelblich, trüb und flockig erscheint. Dieser flüssige Theil des Exsudates wird später gewöhnlich resorbiert, worauf sich die festen Entzündungsmembranen allseitig berühren und nun entweder mit einander fest verwachsen oder, wenn die Plasticität eine nur geringe ist, sich gegen einander abgleiten und endlich fast ganz verschwinden. Von Verkalkungen des Exsudates, wie diese zuweilen bei Sectionen Erwachsener gefunden wird, ist meines Wissens in der Pädiatrik nichts bekannt.

2) Das eitrige jauchige Exsudat. Wenn neben den Faserstoffmembranen das flüssige Exsudat in grösserer Menge vorhanden ist und eine eiterähnliche Consistenz hat, so pflegt man eine solche Pericarditis eine eitrige zu nennen. Eine strenge Grenze zwischen der vorigen und dieser Form existirt natürlich nicht, indem bei beiden sowohl Membranen als flüssiges Exsudat zusammen vorkommen. Es kann sehr wohl geschehen, dass eine Pericarditis, die zu Anfang als eitrige bezeichnet werden müsste, nach kurzer Zeit, wenn der flüssige Theil des Exsudates resorbiert worden ist, eine faserstoffige wird. Hingegen kommt fast ausschliesslich bei Neugeborenen die jauchige, pyämische Pericarditis vor, deren schon bei der pyämischen Pleuritis gedacht wurde. Sie kommt nie isolirt, sondern immer gemeinsam mit Pleuritis oder Peritonitis vor, und zeichnet sich dadurch aus, dass das ziemlich dünnflüssige Exsudat von braunrother Farbe und jauchigem Geruche ist und dass auch die darin suspendirten Flocken von graubrauner,

nicht von weissgelber Farbe sind. Wie schon früher bemerkt, findet man hierbei gewöhnlich Nabelvenenphlebitis und Verjauchung des Nabels.

3) Das tuberculöse Exsudat. Tuberculöse Pericarditis ist trotzdem, dass so viele Kinder an Tuberculosis zu Grunde gehen, immerhin ein seltener Befund. Die Tuberkel auf dem Herzbeutel sind meistens grösser als die Miliartuberkel in den Lungen und stehen bald vereinzelt, bald so dicht, dass sie eine höckerige Membran bilden, der man auf den ersten Anblick ihren tuberculösen Charakter gar nicht ansieht. Makroskopisch lassen sie sich jedoch durch die Bröcklichkeit und leichtere Zerbrechlichkeit der verklebten Membranen, mikroskopisch durch den tuberculösen Detritus erkennen.

Symptome.

Das Krankheitsbild, welches die Lehrbücher von der Pericarditis zu geben pflegen, trifft bei Kindern nur selten zu, sondern die Erscheinungen sind so variabel, dass man genau genommen eigentlich ganz verzichten muss auf eine Schilderung überall zutreffender Symptome. Oft sind dieselben sehr gering und werden namentlich durch die gleichzeitigen Krankheiten, Rheumatismus acutus, Pyämie, Morbus Brightii und Tuberculosis, völlig maskirt, oft sind sie wieder sehr augenfällig und manifestiren sich in grosser Beklemmung und heftigem Schmerz, in Athemnoth, schnellem unregelmässigem Puls, Ohnmächten, Delirien und Comas. Die wichtigsten Anhaltspunkte bietet immer die physikalische Untersuchung.

Bei der Besichtigung der entblössen Brust sieht man zu Anfang der Pericarditis das Herz in grösserer Ausdehnung anschlagen, und zuweilen ist schon eine geringe Ungleichmässigkeit des Rhythmus zu bemerken. Später, wenn das Exsudat an Masse zunimmt und namentlich, wenn der flüssige Theil desselben überwiegend gross ist, wird das Herz nach links und oben verdrängt und schlägt dem entsprechend mehr nach links und etwas weiter oben an die Brustwand. Wächst aber das Exsudat noch mehr, so tritt das charakteristische Zeichen auf, dass der Herzschock gar nicht mehr zu sehen noch zu fühlen ist. Wenn das pericardische Reibungsgeräusch sehr deutlich und laut zu hören ist, so kann es zuweilen auch durch das Gefühl entdeckt werden.

Durch die Percussion ist bei kleinen Exsudaten gar nichts Abnormes zu entdecken, wenn aber das Exsudat massenhaft und flüssig ist, so bekommt man eine ausgedehntere Dämpfung und zwar in Form einer abgestumpften Pyramide, deren Spitze nach oben gerichtet ist. Die Dämpfung nach oben, welche bis zum dritten und selbst zweiten Rippenknorpel reichen kann, ist besonders charakteristisch und erleichtert wesentlich die Diagnose. Es darf nicht vergessen werden, dass ganz bedeutende Herzbeutelentzündungen, bei denen das Exsudat sich vorherrschend membranös gestaltet, durch Percussion nicht ermittelt werden können.

Die Auskultation lässt anfangs ganz normale, etwas verstärkte Herztöne unterscheiden, an denen nur manchmal kleine Abweichungen vom normalen Rhythmus vorkommen. Bald aber wird an einer oder der anderen Stelle der Dämpfung ein Reibungsgeräusch vernommen, das meist ausserordentlich schwer von einem leichten endocarditischen

Hauche unterschieden werden kann, später jedoch sich deutlich als Reibungsgeräusch manifestirt. Es erscheint je nach seiner Intensität als ein leichtes Anstreifen, Schaben, Kratzen oder Kratzen und zeichnet sich namentlich dadurch aus, dass es gewöhnlich weder systolisch noch diastolisch, sondern zwischen den beiden Herztonen gehört wird. Oft ist es sehr schwer von endocarditischem Geräusch zu unterscheiden, und es ist dazu immer erforderlich, dass man die Kinder in Schlaf untersucht, wobei man die Vorsicht gebraucht, sie mit einer Bekleidung einschließen zu lassen, die vorne leicht aufgeht und den Thorax zu enthiessen gestattet. Die Hauptunterschiede bleiben immer, dass das pericarditische Reibungsgeräusch ausserordentlich eng begrenzt ist und sich niemals so weit fortplant als die endocarditischen Geräusche, dass es weder systolisch noch diastolisch ist und dass es oft plötzlich aufhört, um an einer benachbarten Stelle wiederzukehren oder gänzlich zu verschwinden. Zuweilen entstehen hierdurch in Consilien verschiedene Meinungen, nicht nur über die Krankheit, sondern auch über die diagnostischen Fähigkeiten der consultirenden Ärzte.

Der Puls ist zu Anfang der Krankheit gross, schnell und schwer zu unterdrücken, im Verlaufe wird er meist klein, unrythmisch und ist dann leicht wegdrückbar. An den Jugularvenen bemerkt man bei grösseren pericarditischen Exsudaten deutlich undulirende Bewegungen, und zwar findet eine Anschwellung der Venen während der Systole, eine Abschwellung während der Diastole statt. Bei Beginn der Systole schliesst sich nämlich die dreizipfelige Klappe und erweitert sich der rechte Vorhof; da nun aber wegen des vorhandenen Exsudates diese Erweiterung nicht gehörig geschehen kann, so staut sich das Blut in den zuführenden Gefässen und bedingt demnach eine sichtbare Erweiterung der Jugularvenen. Ausserdem findet man fast regelmässig Catarrh und wohl auch partielle Compression der linken Lunge.

Die functionellen und allgemeinen Störungen sind, wie schon obengangs dieser Schilderung bemerkt worden, höchst variabel und richten sich viel mehr nach den Complicationen der Endocarditis als nach dieser selbst. Die Ausgänge derselben sind nun entweder Genesung, wohl nur in seltenen Fällen, unter plötzlichem Verschwinden des Reibungsgeräusches, oder der Tod, welcher oft unerwartet schnell eintritt, oder endlich Nachkrankheiten, allseitige Verwachsung des Herzens mit dem Herzbeutel, Dilatation einzelner Herzabtheilungen, Erkrankung des Herzmuskels und in Folge dieser Prozesse mannigfache Circulationsstörungen.

Behandlung.

Der Rheumatismus acutus kann nicht coupirt, vielleicht nicht einmal abgekürzt werden, weder Calomel, noch Brechweinstein, noch Veratrin, noch Blutentziehungen, noch Kaltwasserbehandlung äussern eine deutlich günstige Wirkung. Unter solchen Umständen bleibt nichts übrig als eine symptomatische Behandlung, wobei das Morphinum die grösste Rolle spielt. Durch einen Morphinum haltigen Saft kann man den Kindern die nöthige Ruhe und einige Stunden Schlaf verschaffen, wobei der Process durchaus nicht modificirt wird. Die ergriffenen Gelenke werden am besten mit Oel gerieben und mit Watte dick umgeben, um jede unnötige äussere Berührung zu verhüten.

Die Endocarditis und Pericarditis, welche den Rheumatismus acutus

compliciren, behandle ich niemals streng antiphlogistisch, höchstens dürften bei wohlgenährten Kindern einige Dozen Calomel günstig anstößig wirken. Leichte Hautreize, wie Senfteige, trockene Schröpfköpfe etc. sind hier zu empfehlen. Die pyämische Pericarditis der Neugeborenen geht natürlich immer lethäl aus und bedarf deshalb keiner spec. Behandlung. Die nachfolgenden Herzfehler verlangen ein sehr vorsichtiges strenges Regime, wie dies schon ausführlicher bei der Behandlung der angeborenen Herzfehler im vorausgehenden Abschnitte geschildert worden ist.

3) Hydropericardium. Herzbeutelwassersucht.

Für sich allein kommt die Herzbeutelwassersucht nur bei Herzfehlern vor, wo dann die Circulationsstörung sich früher an Herzbeutel als an der Pleura und dem Bauchfell offenbaren kann. In den meisten Fällen aber ist sie mit serösen Ergüssen in den oben genannten Säcken complicirt und tritt als Schlussakt des Hydrops mit gewöhnlich bald folgendem, lethalem Ende auf. Nephritis nach Scharlach ist bei Kindern fast die einzige Ursache der reinen Hydropsien.

Pathologische Anatomie.

Man findet im Herzbeutel einen hellgelben, klaren Erguss von 30 bis 120 CCL, der die chemischen Eigenschaften der übrigen serösen Ergüsse, d. h. die eines verdünnten Blaserums hat. Zum Unterschied von eitriger Pericarditis ist das Pericardium bis auf eine leichte seröse Infiltration völlig intakt, weder mit Pseudomembranen bedeckt, noch an irgend einer Stelle abnorm verwachsen. Der Herzmuskel selbst ist, wie bei allen Hydropsen, mehr gelb als roth gefärbt.

Symptome.

Kleine Ergüsse lassen sich nicht diagnosticiren und machen auch wahrscheinlich gar keine Symptome, indem ja selbst im physiologischen Zustande Flüssigkeit im Herzbeutel sich findet und die Quantität dieser Flüssigkeit nicht unbedeutenden Schwankungen unterworfen ist. Bei grossen Ergüssen sind die Symptome der oben geschilderten Pericarditis deutlich zu beobachten. Es stellt sich grosse Beklemmung und selbst Orthopnoe ein, die Jugularvenen schwellen bei jeder Systole ein, bei jeder Diastole wieder ab. Die Haut wird an den bekannten Stellen etwas cyanotisch und ihre Temperatur vermindert. Da fast immer noch anderweitige Hydropsien vorausgegangen sind und gleichzeitige fortbestehen, so wird das Krankheitsbild des reinen Hydropericardiums mannigfach getrübt und verwischt, was namentlich für die Respirationstörungen gelten mag. Die physikalischen Zeichen sind dieselben wie bei der Pericarditis, nur noch viel ausgesprochener und leichter zu constatiren, indem diese Kranken in ihrem Allgemeinbefinden weniger tief ergriffen und deshalb ruhiger sind, als die an Pericarditis Leidenden. Die Präcordialgegend ist etwas vorgewölbt, der Herztoss schwach oder gar nicht zu fühlen, der Puls klein, die Dämpfung nach oben sehr exquirt. Nur ein Zeichen der Pericarditis kommt hier niemals vor, das Reibungsgeräusch, da die Bedingungen desselben, nämlich mit Membranen besetzte Wandungen, hier nicht gegeben sind. Die

Ausgänge des Hydropericardium sind je nach der Ursache verschieden. Immer lethal endigen die zu Herzfehlern hinzutretenden Ergüsse, während die nach Scharlach sich einstellenden bei passender Behandlung sehr wohl resorptionsfähig sind.

Behandlung.

Wie bei allen Hydrogien, so ist auch hier die diuretische Behandlung noch am meisten indicirt und unter den Diureticis wird der reine Rooh Jumperi ohne allen Zusatz am besten und längsten vertragen. Die Ableitungen auf den Darm dürfen bei kranken Kindern dieser Art nicht versucht werden, weil hiedurch immer die Verdauung leidet und nur bei geläutrigem Stoffumsatz die Heilung einer Hydroscie denkbar ist. Auch die Ableitung auf die Haut durch wiederholte Vesicators dürfte wegen des dabei entstehenden Schmerzes nicht geeignet erscheinen und bei Kindern mit Nephritis um so weniger, als durch die Canthariden stets ein neuer Reiz der Nieren gesetzt wird. Die Paracentese des Herzbeutels wird zwar in manchen Lehrbüchern der Vollständigkeit halber als letztes Mittel anempfohlen, wird aber meines Wissens in der Praxis fast gar nie ausgeführt.

B. Arterien und Venen.

Krankheiten der Arterien kommen bei Kindern niemals vor, und nach atheromatöser Arterienkrankung, die fast bei keiner Section älterer Individuen vermisst wird, sucht man hier vergeblich. Das einzige, worauf hier aufmerksam gemacht werden muss, ist ein anomaler Verlauf der Radialarterien, der in manchen Fällen von schwerkranken oder anämischen Kindern zu argen prognostischen Trugschlüssen Veranlassung geben kann. Es ist desshalb bei auffälliger Kleinheit oder vollkommenem Fehlen des Radialpulses immer notwendig, sich auch von der Beschaffenheit anderer Arterien, der Carotiden und der Aa. temporales zu überzeugen, bevor man einen Schluss auf die Fülle oder Leere des Gefäßsystems wagen darf. Als Uebergang zu den Erkrankungen der Venen mögen hier die erektilen Geschwülste Platz finden.

1) Erektile Geschwulst, Naevus vasculosus, arterielle Teleangiectasie.

Symptome.

Unter erektiler Geschwulst versteht man eine Erweiterung einer grösseren Partie von Capillaren, ein Zustand, der namentlich am Gesicht, an den Augenlidern, den Lippen und am Hals vorkommt. Diese Krankheit der Capillargefässe trifft bald die der Cutis, bald die des Unterhautzellgewebes, bald beide zugleich in grösserer oder geringerer Ausdehnung. Im ersteren Falle haben wir eine rothe Erhabenheit der Haut von Farbe und oft auch von Gestalt einer Himbeere, im letzteren eine etwas teigige Geschwulst vor uns, über welcher die Hautlocke entweder von normaler Beschaffenheit oder ebenfalls von erweiterten Gefässen durchzogen ist. Diese Gefässerweiterungen sind gewöhnlich angeboren, ihr Wachsthum steht aber nicht in geradem Verhältnisse zur Entwicklung des Gesamtorganismus, sondern übertrifft dieselbe be-

deutend, so dass eine kleine Teleangiectasie bei der Geburt von der Grösse eines Stecknadelskopfes nach einem Jahre schon die Grösse einer Erbse oder einer Haselnuss erreicht haben kann. Diese Thatsache ist allgemein bekannt, hingegen kennen die meisten Aerzte nicht gehörig den spontanen Verlauf dieser erektilen Geschwülste und Gefässmalen. Es besteht nämlich die Ansicht, dass dieselben, wenn keine operative Hilfe entgegentritt, fort und fort wachsen, und man hat sich noch nicht gehörig klar gemacht, warum sie so sehr selten bei Erwachsenen und verhältnissmässig so häufig bei Kindern vorkommen. Der Grund dieses Verhältnisses ist der, dass eben die meisten von selbst kleiner werden und endlich total verschwinden, wenn auch gar nichts dagegen unternommen wird. Dieses spontane Atrophiren nach Art der kindlichen Hautwarzen unterscheidet den Naevus vasculosus hinlänglich von einem bösartigen Neoplasma.

Die erektilen Geschwülste, deren Hautdecken nahezu normal sind, lassen sich dadurch leicht diagnosticiren, dass sie unter dem Fingerdrucke schwinden, beim Schreien und Pressen grösser und gespannter werden, zuweilen leicht pulsiren und durch Auscultation ein schwirrendes Geräusch erkennen lassen.

Pathologische Anatomie.

Schneidet man an der Leiche eine solche Geschwulst durch, so collabirt sie sehr und entleert eine ziemliche Menge rothen Serums. Bei genauerer Untersuchung ergibt sich, dass sie aus huter erweiterter ausgedehnter Capillaren besteht, welche mannigfach untereinander communiciren und somit ein schwammiges Gewebe darstellen. Hierin liegt nach der Grund, dass sich die erektilen Geschwülste durch den Fingerdruck entleeren comprimiren lassen. Untersucht man sie weiter mikroskopisch, so findet man Länge- und Querschnitte von Capillaren, und zuweilen hat es den Anschein, als existirten an denselben kleine beutelförmige Ausbuchtungen oder als existierten einzelne Capillaren mit einer kolligen Anschwellung. Zwischen den Gefässen liegt vollkommen ausgebildetes Bindegewebe.

Behandlung.

Bei Hautnaevus ist die Behandlung eine andere als bei erektilen Geschwülsten des Unterhautzellgewebes. Die himbeerfarbigen Hautstellen auf der Stirn, den Augenlidern etc. werden am besten und einfachsten durch die Vaccination entfernt. Man sticht zu diesem Zwecke mit einer in Impfstoff getauchten Nadel den Naevus 10 bis 20 Mal an, worauf immer einige Tropfen Blut sich entleeren und wenn nichts weiter geschieht, gewöhnlich durch Herausschwemmen des Impfstoffes das Resultat negativ ausfällt. Lässt man aber diese Einstiche ruhig anstehen, reinigt dann die Stelle mit kaltem Wasser und bestreicht die Einstiche nochmals mit einer Lage von Vaccinolymphe, so schlagen alle oder fast alle Stiche an. Es erhebt sich am fünften Tage der Naevus in vielen bläurothen Pusteln, welche alsbald confluiren, heftige Fiebererscheinungen verursachen, am achten bis neunten Tage vertrocknen und nach Ablauf der Krusten eine anfangs bläurothe, später aber erbleichende Narbe zurücklassen. Hat man bei schon gewapften Kindern einen Naevus zu behandeln, so ist natürlich dieses Verfahren ohne Erfolg, in diesen

Falles kann man durch eine Pflastermasse, bestehend aus einem Theil Tartarus stibiatus und drei Theilen Wachspflaster, welche man auf Leinwand gestrichen 4—6 Tage lang liegen lässt, tiefegehende Pusteln erzeugen, nach deren Verschorfung der Nævus auch verschwinden oder wenigstens in einzelne kleinere getheilt werden kann. Kleinere Rückstände können ohne allen Nachtheil zu wiederholten Malen mit diesem Pflaster belegt werden. Einzelne grosse Nävi können auch durch Tärterwien weniger auffallend gemacht werden. Man zieht durch eine Korkplatte 10—12 Nadeln und punktiert man mit diesem Instrumente den Nævus an allen Stellen, worauf Magnesia usta oder Zinkoxyd in die frischen Stichwunden eingesiebt wird. Es entsteht durch diese Mischung von Roth und Weiss eine rosa Farbe, welche von der Hautfarbe nur wenig absticht.

Bevor man zu intensiveren Actungen mit Wiener Aetzpaste, Chlorzink, concentrirte Schwefelsäure etc., wodurch zuweilen grosse Brandscarfen und entstehende Narben entstehen könnten, oder zu einem operativen Eingriff schreitet, möge man immer bedenken, dass viele Nävi mit der Zeit von selbst verschwinden und höchstens eine etwas röttere Hautstelle zurücklassen, welche oft weniger entsteht als grosse strahlig contrahirte Operationsnarben. Ich habe mir zum Grundsatz gemacht, alle Hautnävi, welche nicht durch zwei gehobene Schütten leicht umgangen und durch die blutige Naht genau vereinigt werden können, nicht chirurgisch zu behandeln.

Anders verhält sich die Sache mit den subcutanen erektilen Geschwülsten, welche übrigens bei weitem seltener sind, als die Teleangiectasien der Cutis. Dieselben können durch spontanes Aufbrechen oder leichte Verletzungen zu grossem lebensgefährlichen Blutungen Veranlassung geben und es ist desshalb ihre Behandlung nicht zu verschieben. In einzelnen Fällen ist es allerdings gelungen, durch consequente Compression eine solche Geschwulst zum Schwinden zu bringen, es gehört hierzu immer grosse Geduld und Ausdauer und ausserdem muss nothwendiger Weise eine feste, knöcherne Unterlage vorhanden sein. Sind diese Vorbedingungen nicht gegeben, so ist der Versuch der Compression ein vergeblicher. Zur Beseitigung dieser subcutanen Capillartumoren hat man früher hauptsächlich das Abbinden unternommen, indem an der Basis der Geschwulst eine lange Nadel mit doppeltem Faden oder noch besser Bändchen durchgestochen und nun die Geschwulst nach zwei Seiten hin abgebunden wird, in neuerer Zeit hat die Galvanocaustik hier vortreffliche Dienste geleistet. Man führt zu diesem Zwecke mehrere Platindrähte in einer gegenseitigen Entfernung von 2—3 Linien durch die Basis der Geschwulst und bringt sie dann mittelst der Batterie zum Weissglühen, worauf Brandscarfen, grosse Coagula, Eiterung und schliesslich Heilung eintreten.

2) Thrombosen in den Sinus der Dura mater

Seitdem Virchow die Lehre von der Thrombusbildung weiter ausgebildet und cultivirt hat, wird mannigfach hierauf untersucht und der anatomische Befund für die Deutung des Krankheitsverlaufes verworthen. So fand auch Gerhardt unter 26 Sectionen von Kindern unter einem Jahre sieben Mal Thrombose der Hirsinsus, und alle diese

sieben Kinder waren nach vorausgegangenen, profusen Durchfällen unter Eintritt von Cyanose, Sopor und Convulsionen gestorben.

Das merkwürdige bei diesen Thromben ist die Taxirung ihres Alters. Ob ein Thrombus mehrere Tage vor dem Tode, in Agone oder erst nach dem Tode entstanden ist, lässt sich nicht immer leicht entscheiden. Die Hauptanhaltspunkte sind die Schichtung der Thromben, ihre centrale Erweichung und ihre Anheftung an die Venenwand; auf die Färbung, ob gelb oder roth, darf kein so grosses Gewicht gelegt werden. Sie scheinen jedoch nicht charakteristisch für die Atrophie der Kinder zu sein, indem ich sie schon oft vermisse und in andern Fällen rothe frische Thromben fand, die gewiss erst nach dem Tode entstanden waren. Es hat deshalb dieser Befund nur geringe klinische Bedeutung.

5. Capitel.

Krankheiten des Nervensystems.

A. Gehirn.

1) Hydrocephalus acutus internus. Der hitzige Wasserkopf.

Synonyma, Meningealtuberculose, Morbus cerebri Whistl., Hydrophlogosis ventriculorum cerebri (Lobstein), Febris hydrocephalica. Entero-Cephalopyria!! (Eisenmann).

Das Wesen des Hydrocephalus acutus besteht in Miliartuberculose der Arachnoidea, namentlich an der Basis des Gehirns, in einer enormen Vermehrung des normalen flüssigen Inhaltes der Hirnventrikel und in einer Erweichung der die Gehirnköhlen bildenden Hirnhäuten. Man fñhlt gewöhnlich die Tuberculose als eine Gelegenheitsursache an und spricht auch von einem nicht tuberculösen Hydrocephalus acutus internus. Diese letztere Art von acutem Wasserkopf ist mir noch nicht vorgekommen, von der ersteren hingegen habe ich selbst schon über 60 Fälle seen und grössten Theils auch bei Lebzeiten beobachtet.

Pathologische Anatomie.

Bei diesen Sectionen ist die Eröffnung der Schädelhöhle mit grösster Vorsicht vorzunehmen. Ist die grosse Fontanelle noch nicht geschlossen, so wird eine enorme Wölbung derselben beobachtet und häufig ist deutliche Fluctuation nachzuweisen. Man säge langsam und mache namentlich am Ende sehr leise Sägezüge, damit nicht das oft sehr weiche Gehirn verletzt werde und vor genauer Besichtigung der Inhalt der Ventrikel abflüsse. Wenn die Dura mater auch an dem Knochen stellenweise adhärirt, so gelingt es sehr schwer, das Schädeldach nebst der harten Hirnhaut hinwegzunehmen, ohne dass man das Gehirn hiebei verletzt. Es ist für diese seltenen Fälle rathsam, nach völlig durchgetragten Knochen die Dura mater nicht allein zu durchschneiden, sondern mit einem grossen, Papiermesser ähnlichen Gehirn-

messer das Schädeldach, die Dura mater und alle Gehirnteile, die oberhalb des Knochenschnittes liegen, zusammen wegnehmen. Man trifft hierbei zwar die Ventrikel und entleert deren wässerigen Inhalt, hat aber den Vortheil, das überaus weiche, zerteilliche Gehirn im Uebrigen zu schonen und dessen Basis genauer untersuchen zu können.

Hat man nun das Schädeldach und die harte Hirnhaut entfernt, so quillt das Gehirn gewissermaßen aus der Schädelhöhle heraus, es sind die weichen Hirnhäute sehr gespannt, die Arachnoidea auf dem convexen Theile des Gehirnes trocken, die Gyri sind verstrichen und man sieht deutlich, dass die Gehirnsubstanz von innen nach aussen an den Knochen fest angedrückt worden ist. Dass die Injektion der Gehirnhäute in der Leiche keinen Zusammenhang hat mit der Congestion derselben bei Lebzeiten, ist jetzt hinreichend constatirt, und es ist deshalb auch nicht auffallend, dass man bei Hydrocephalus acutus die Meningen bald dunkelroth und bald wieder ganz anämisch findet. Will man, was sehr wünschenswerth ist, eine chemische Untersuchung der hydrocephalischen Flüssigkeit vornehmen lassen, so punktirt man die Ventrikel mit einem Troikart vorsichtig und lässt nur die so entleerte Flüssigkeit chemisch untersuchen, denn wenn man die ganze Wassermenge, welche sich beim Einscheiden in die Ventrikel entleert, in einer Schale auffängt, so bekommt man immer ein Gemisch von Blut und Hirnhäutwasser, das sich zu einer chemischen Bestimmung durchaus nicht eignet.

Die chemische Analyse einer reinen Hydrocephalusflüssigkeit liefert höchst eigenthümliche Resultate, worauf C. Schmidt in Dorpat zuerst aufmerksam gemacht hat. Die Reaktion ist immer deutlich alkalisch, die Flüssigkeit ist fast wasserhell und enthält nur geringe Spuren von Eiweiss, indem sie durch Ansäuern und Kochen nur am wenigsten mehr sich trübt, aber durchaus keine grösseren, dichteren Eiweissflocken absetzt. Sehr eigenthümlich ist das Verhältniss der Salze. Während das peripherisch gesammelte Transudat der Hirnhäute, Pia mater und Arachnoidea, die Salze vollkommen in demselben Verhältniss enthält, wie die Ausscheidungen anderer seröser Membranen, nämlich im Verhältniss des Blütersums, sind in dem Transudat der Choroidealplexus mehr Kaliumverbindungen und Phosphate enthalten, so dass die Proportion des Kaliums zum Natrium und die der Phosphate zu den Chloriden sich mehr der der Salze, wie sie in den Blutkörperchen vorkommen, nähert. Während nach C. Schmidt in den Salzen des peripherischen Hirnhäuttransudates auf 2,8 % Kalium 40,0 % Natrium kommen, sind in den Salzen der Flüssigkeit von Hydrocephalus internus neben 17,8 % Kalium nur 27,2 % Natrium. Wir haben also in diesem Falle kein reines Filtrat des Blütersums, sondern ein eigenthümliches Secret, an dessen Bildung die Salze der Blutkörperchen sich zu betheiligen scheinen.

Die Ventrikelwände sind mehr oder weniger erweicht, ihr Ependym ist zerstört. Die Ausdehnung der Seitenventrikel ist oft eine so bedeutende, dass das Septum ventriculorum zerrissen und die Ventrikel unmittelbar mit einander communiciren. Im höchsten Grade finden sich diese Erweichungen an den Schlaggeiz, dann am Corpus callosum und am Corpus striatum, deren Oberfläche zuweilen erodirt, fettig, flockig aussieht. Die Plexus choroidei sind hinfällig, ganz blass,

nicht von Blut strotzend, wie unbegreiflicher Weise in den neueren französischen Compendien gelehrt wird. Es ist diese Blässe auch sehr natürlich, indem die enorme Anlaufung von Flüssigkeit der Füllung dieses Adergefässes sehr im Wege stehen muss. Die Blässe der Plexus ist neben der allgemeinen Erweiterung der Ventrikel das beste Kriterium für die Ausdehnung des Hydrocephalus, wenn durch Unvorsichtigkeit bei Eröffnung des Schädels das Wasser sich vorzeitig entleert hat.

Sind diese Untersuchungen zum beendeten, so wendet man sich der Basis des Gehirnes zu. Man findet hier ein weissgelbes oder gelbgrünes Exsudat von eigenthümlich zäher, gallertartiger Beschaffenheit, welches in und zwischen die Pia mater und Arachnoidea gesetzt werden ist. Es werden hiedurch die Gehirnfurchen ziemlich fest verklebt und die Vertiefungen an der Basis des Gehirnes namentlich die dem Türkensattel entsprechenden eben ausgefüllt. Am massenhaftesten ist das Exsudat innerhalb des beiderseitigen Hilus cerebri vom Chiasma opticum bis zum Pons und über diesen an die Medulla oblongata hin angeheftet und verbreitet sich nach aufwärts namentlich in die Fossa Sylvii und die Längsrinne des Grosshirns. Hier in der Fossa Sylvii ist längs der Arterie und Vene der tuberculöse Charakter dieses Exsudates am deutlichsten zu erkennen, indem sich namentlich hier eine über-grosse Menge feiner weisser Körnchen findet, welche sich bei mikroskopischer Untersuchung als Miliartuberkeln zu erkennen geben. Sie bestehen nämlich lediglich aus amorpher Körnchenmasse, aus einem Detritus, und die sich hier und da zeigenden Bindegewebsfasern gehören nicht dem Miliartuberkel, sondern der Pia mater an, in welche der Tuberkel eingelagert ist. Ausser in der Fossa Sylvii finden sich noch mannigfache Miliartuberkel an der Basis des Gehirnes längs der Gefässe abgelagert.

Was die anderen Organe betrifft, so wird hier constant beobachtet, dass sich irgendwo im Körper ein alter, grosser, gelber Tuberkel findet und zwar am häufigsten in den Bronchialdrüsen, dann in den Lungen, im Gehirne selbst oder zuweilen auch in einem Knochen. Der in den Leberthieren hier und da erwähnte Zusammenhang zwischen Hydrocephalus acutus und Magenverweichung besteht in Wirklichkeit natürlich nicht, wie schon schon bei der Demonstration der Magenverweichung pag. 136 hinlänglich erörtert worden ist.

Symptome.

Die Krankheit befallt am häufigsten die Kinder von 2—7 Jahren. Das jüngste Kind, an welchem Meningealtuberculose beobachtet wurde, hatte ein Alter von 3 Monaten, bei älteren Kindern und Erwachsenen localisirt sich die Miliartuberculose viel häufiger auf den Lungen als den Meningen.

Zur leichteren Verständigung sind schon verschiedene Stadieneintheilungen vorgeschlagen worden. Man hat 1) ein Stadium der Congestion, 2) der Entzündung und 3) der Transsudation angenommen; Bouchut spricht von einem Stadium prodromicum, invasivum und convalescens, streng genommen aber lässt sich pathologisch anatomisch gar keine, symptomatisch nur eine Stadieneintheilung aufstellen, nämlich 1) das Stadium der Reizung und 2) das der Lähmung. Im ersten

Stadium können dann noch die Vorboten und die Symptome des wirklich eingetretenen Hydrocephalus unterschieden werden.

Die Vorboten sind höchst eigenthümlicher und mannigfacher Art. Wenn allerdings nicht geläugnet werden darf, dass die Lehre von denselben sich etwas zu weit ausgedehnt und manches Ungehörige aufgenommen hat, so ist doch deren Existenz nicht zu verkennen. Man muss vor allem unterscheiden, ob sich der Hydrocephalus entwickelt bei einem Kinde, das schon lange Zeit vorher deutliche Zeichen von Tuberculose, gewöhnlich von Lungentuberculose, gehabt hat, oder ob diese Zeichen bisher gefehlt haben und die Krankheit bei einem scheinbar ganz gesunden Kinde sich entwickelt. Dass die Vorboten vollkommen fehlen und mit einem Male sich die Symptome des entwickelten, hitzigen Wasserkopfes einstellen können, wird zwar von einzelnen Spitalärzten angegeben, in der Privatpraxis aber niemals beobachtet. Man sieht hier immer mehrere Tage, gewöhnlich sogar Wochen lang, einzelne ziemlich constant Vorboten, die sich nur langsam steigern, bis wir endlich die Krankheit selbst in ihrer ganzen Gefährlichkeit vor uns ausgebildet sehen.

Dieses Stadium prodromorum dauert gewöhnlich 2—3 Wochen, doch kommen auch Fälle vor, wo die Kinder diese Zeichen mehrere Monate hindurch erkennen lassen. Das constanteste unter diesen Symptomen ist eine langsam sich einstellende Abmagerung, welche merkwürdiger Weise das Gesicht fast ganz verschont, so dass die Kinder, wenn sie angekleidet sind, keinerlei Veränderung erkennen lassen. Aufmerksamen Müttern und Kinderfrauen fällt dieselbe jedoch regelmäßig auf, und namentlich macht das Sichtbarwerden der Rippen sie besorgt. Hierauf folgt bald eine leichte Blässe im Gesicht und ein eigenthümlicher Glanz der Augen. Die Kinder verlieren die allen gesunden anwohnende Fröhlichkeit und Lebhaftigkeit. Sie schlafen mehr als gewöhnlich, ziehen sich bald von sonst beliebten Spielen zurück, sie werden mürrisch und schüchtern gegen ihre Umgebung und weinen bei der geringsten Veranlassung. Sehr eigenthümlich ist auch, dass sie ihre früheren kleinen Wagnisse, z. B. das Klettern auf einen Stuhl, das Öffnen schwer erreichbarer Thüreschrauben, selbst das Hinusschauen durch ein vergittertes Fenster nicht mehr versuchen, und hierzu aufgefordert, entschieden es verweigern. Knaben, welche sich von ihren Kameraden früher nichts gefallen lassen, raufen und sich wehren, so lange es ihre Kräfte erlauben, schleichen sich nun vor dergleichen Angriffen feige und weinend davon. Andere Kinder werden wieder auffallend zärtlich, umarmen ihre Eltern fortwährend und können sich lange nicht trösten, wenn dieselben sie verlassen.

Bei älteren Kindern, welche schon etwas gelernt haben, bemerken die Lehrer eine ungewöhnliche Zerstreuung und Gleichgültigkeit, das Auswendiglernen geht schwerer als sonst und das endlich Erlernte wird stotternd vorgebracht. Bei Tag schlafen die Kinder ungewöhnlich viel und oft, hingegen ist die Nachtruhe weniger tief und wird durch schwere Träume, Herumwälzen im Bett und häufiges, ängstliches Aufschreien unterbrochen. Der Appetit ist vermindert, oft stellen sich Gelfäste nach etwas reizenden Nahrungsmitteln ein, von denen jedoch auch nur sehr wenig genossen wird. Der Durst ist nicht vermehrt, die Urinsecretion etwas vermindert, der Urin häufig so reich an harn-

sauren Salzen, dass sie ziemlich bald als sog. Ziegelmehlniederschlag herausfallen. Der Stuhl ist gewöhnlich angehalten, besonders bei grösseren Kindern, jedoch darf eine bestehende Diarrhöe durchaus nicht so gedeutet werden, als ob hierdurch die Vermuthung eines ausstehenden Hydrocephalus acutus unmöglich geworden wäre. Namentlich kommt es bei kleinen Kindern, die noch in der ersten Zahnung begriffen sind, vor, dass die gewöhnliche Dentitionsdiarrhöe wie im Normalzustande fortbesteht und doch ein Hydrocephalus acutus sich vorbereitet. Kopfschmerz wird selbst von älteren Kindern fast niemals angegeben, häufiger wird Schwindel und unsicherer Gang beobachtet. Es wurde vor einiger Zeit ein 4jähriger Knabe zu mir geführt, der mehrere Vorläufersymptome von Hydrocephalus erkennen liess und beim Gehen auf ebenem Boden die Beine immer so hoch aufhob, als wenn er eine Stiege hinaufsteigen wollte. Nach einigen Tagen entwickelte sich das Leiden entschieden und die Section lehrte die Richtigkeit der Diagnose. Ziemlich häufig klagen die Kinder über Leibschmerz, der auf Druck deutlich zunimmt. Fieber ist gewöhnlich nicht zugegen, doch gilt auch hier, was von der Diarrhöe gesagt worden ist, die Gegenwart des Fiebers ist durchaus kein Grund, die Möglichkeit eines beginnenden Hydrocephalus auszuschliessen.

Die oben geschilderten Symptome nehmen nun, alle zusammen oder vereinzelt, mehr und mehr zu, die Kinder legen sich hin und es entwickeln sich hierauf die Zeichen der beginnenden Exudation als die des Gehirnerizes.

Anderes gestalten sich die Verhältnisse, wenn Kinder mit entschiedener Lungentuberculose schliesslich Meningealtuberculose und Hydrocephalus bekommen. Hier treten natürlich die Symptome der länger bestehenden Lungentuberculose, hektisches Fieber, grosse Schwäche, starke Bronchitis etc. so in den Vordergrund, dass die oben geschilderten Vorläufer kaum bemerkt werden können. Die Krankheit beginnt in diesem Falle sogleich mit den Symptomen der beginnenden Exudation und des dadurch gesetzten Reizes.

Die prägnantesten Symptome des Stadiums der Reizung sind: Erbrechen, Verstopfung, langsamer Puls, unrythmische Respiration, erhöhte Hauttemperatur, eingezogenes Abdomen, Kopfschmerz, grössere Aufregung abwechselnd mit einiger Somnolenz, beginnende Abnahme der Intelligenz und Motilitätsstörungen aller Art.

Die vorwiegenden Symptome des Stadiums der Lähmung sind einem beschleunigten Puls, tiefes Coma und Lähmung der der Willkür unterworfenen Muskeln. Um die Schilderung der einzelnen Symptome nicht immer abbrechen, und da der Uebergang des einen Stadiums in das andere durchaus nicht so genau bestimmt werden kann wie manche Lehrbücher angeben, so wird in der folgenden Schilderung von dieser Stadieneintheilung ganz abgesehen und jedes Symptom gleich bis zum lethalen Ausgange geschildert werden.

Was vorerst die Störungen in der Digestion betrifft, so nimmt das Erbrechen hier die erste Stelle ein. Es ist ein ausserordentlich constantes Symptom und tritt gewöhnlich so frühzeitig auf, dass man hierdurch zuerst die Diagnose bestimmen kann. Die Dauer des Erbrechens aber ist sehr verschieden. Einzelne Kinder brechen nur einen oder einige Tage und da nicht einmal alles Genossene, andere

hingegen brechen vom Beginn der Krankheit fast bis zum Tode unaufhörlich fort, und es lässt sich durchaus kein Aliment finden, das nicht nach kurzer Zeit wieder nach oben entleert würde. Eigenthümlich ist hierbei, dass es keine Remissionen macht, sondern nicht mehr eintritt, wenn es einmal 24 Stunden sistirt hat. Höchst wichtig für die Diagnose ist die Art des Erbrechen. Während nämlich ein Kind, das an einer Indigestion leidet, längere Zeit vor dem wirklichen Erbrechen Ueblichkeiten, Aufstossen, Würgen und Angstschreie hat, erbrechen die hydrocephalischen Kinder ohne alle dergleichen Vorbereitungen, gerade so, als wenn sie eben den Mund voll Wasser genommen hätten und dasselbe einfach wieder ausspuckten. Begünstigt wird der Brechakt, wenn man die Kinder aufrichtet oder auf die Seite legt. Es sistirt, so lange der Magen ganz leer bleibt, kommen Flüssigkeiten oder gar compacte Nahrungsmittel hinein, so werden sie abhald wieder entleert, ohne dass das Kind besondere Angst oder Beschwerde davon hätte. Galle ist dem Erbrochenen nur sehr selten beigemischt, was sich auch aus den geringen antiperistaltischen Bewegungen leicht erklären lässt. Da der Arzt nur selten beim Brechakt selbst zugegen ist, so bleibt ihm nichts übrig als ein gründliches Examen; die Angehörigen müssen eben darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie die Art des Erbrechen, ob leicht oder schwer, mit oder ohne Würgen, genau und richtig beobachten.

Ein zweites fast ebenso constantes Symptom ist die Verstopfung, an welcher wenigstens $\frac{1}{2}$ der hydrocephalischen Kinder leiden. Die Darmsaccretion wird sehr vermindert, selbst stärkere Drastica bleiben ohne Wirkung, wozu noch als ungünstiger Umstand kommt, dass dieselben grössten Theils wieder erbrochen statt resorbiert werden. Das bei Obstipation der Kinder so beliebte Calomel bleibt hier meistens ohne Erfolg. Diese Obstipation dauert nicht bis zum Tode fort, sondern später stellen sich einige breiige Stühle ein, gleichviel ob Abführmittel gereicht worden sind oder nicht. Sogar profuse Diarrhöen in Folge von Darmtuberculose können bei beginnendem Hydrocephalus sistiren, die später jedoch erfolgenden Stühle sind wieder dünn und von dem bekannten sahnigen Geruche. Im allgemeinen kann als Regel gelten, dass die Obstipation weniger constant beobachtet wird als das Erbrechen, indem nicht gar zu selten Fälle vorkommen, in welchen von Anfang bis zu Ende täglich Stuhl erfolgt. Dass die Quantität desselben bedeutend abnimmt, erklärt sich ganz natürlich aus der sehr verminderten Zufuhr von Nahrungsmitteln. Der Appetit ist verschwunden und das mühsam Beigebrachte wird wieder erbrochen; so ist es einleuchtend, dass eine mehrnägige Verstopfung entsteht, bei welcher der Leib dennoch mehr und mehr einstulkt und nirgends Kothmassen durchgefühlt werden können.

Die übrigen Veränderungen auf Seite des Digestionsapparates sind weniger charakteristisch. Der Dufst wird nie so heftig, wie bei andern acuten fieberhaften Zuständen, z. B. Typhus oder acuten Exanthemen, und dem entsprechend ist die Urinscretion immer sehr vermindert. Es hängt dieses geringe Verlangen nach Flüssigkeit wohl mit der wenig erhöhten Hauttemperatur, dem nur Anfangs und in unbedeutendem Maasse beschleunigten Pulse und mit der gestörten Innervation des Magens zusammen. Der Urin ist sehr concentrirt, reich

an Harnstoff, Harnsäure, Farbstoff und Salzen, und setzt desshalb schon in der Blase, oder bald nachdem er klar gelassen, ein dickes Sediment ab. Gegen das Ende der Krankheit lassen die Kinder oft 24 Stunden und noch länger keinen Urin, ohne dass die Blase eine besondere Ausdehnung zeigte, was auf eine Paralyse der diese Secretion vermittelnden Nerven deutet. Der endlich entleerte oder durch den Catheter abgenommene Urin ist trübe, hat einen stechenden Geruch und ammoniakalische Reaction. Eiweiss kommt meines Wissens hier nicht vor.

Auch der Appetit ist selten so gänzlich verschwunden als bei den ebenerwähnten Krankheiten; es besteht zwar kein Verlangen nach Nahrung, doch gelingt es meist ohne Schwierigkeit, den Kindern Milch oder Fleischbrühe beizubringen, was um so mehr zu verwundern ist, als regelmässig darauf Erbrechen eintritt.

Die Zunge ist in diesem Stadium immer feucht, mehr oder weniger weiss belegt und bietet nichts Charakteristisches. Die Zunge bleibt fast bei allen Kinderkrankheiten feucht, was davon herrührt, dass die Schleimsecretion der Mundhöhle in diesem Alter eine sehr profuse ist, und dass die Kinder die gute Gewohnheit haben, mit geschlossenem Munde zu schlafen. Ebenso ist das Zahnfleisch beständig feucht, nur findet sich auch hier bei den meisten Krankheiten auftretende weisse Beleg.

Die Fiebererscheinungen sind in keinem Stadium des Hydrocephalus acutus von imponirender Heftigkeit. Bei einer Miliartuberculose, welche sich ganz local in der Pia mater entwickelt, kommt es niemals zu wirklicher allgemeiner Fieberhitze, wenn hingegen die Miliartuberculose sich auch in verschiedenen anderen Organen, namentlich in den Lungen, auf dem Peritonäum und dem Herzbeutel etablirt, so tritt jene Gehirnhitze der Haut ein, welche man sonst nur bei den Ausbrüchen acuter Exantheme zu fühlen gewohnt ist. Die Temperatur des Kopfes, namentlich der Stirne, ist in allen Fällen beträchtlich erhöht und bleibt es bis zum letzten Ende, während die Füsse grosse Neigung haben, kalt zu werden.

Die Temperatur der Haut steht im Allgemeinen im geraden Verhältnisse zur Schnelligkeit des Pulses, nur die Stirne bleibt immer heiss, wenn der Puls sich auch noch so sehr verlangsamt.

Auf den Puls hat man bei Hydr. acutus von jeher ein grosses Gewicht gelegt, und es gibt auch in der That keine Krankheit, bei welcher er so genaue Beachtung verdiente, als bei der unsrigen. Seine Frequenz im Beginne des Leidens hängt mehr von der Miliartuberculose, die sich in den übrigen Organen entwickelt, als von der der Meningen ab. Ist die Miliartuberculose sehr ausgebreitet und in vielen Organen in der Ausbildung begriffen, so überwältigt die dabei entstehende Pulsbeschleunigung die durch das Gehirnleiden eigentlich bedingte Verlangsamung, und es kann viele Tage währen, bis endlich der langsame, hydrocephalische Puls sich einstellt. Wenn hingegen die Meningealtuberculose localisirt auftritt, so kommt derselbe sehr bald zur Geltung und lässt sich durch die verminderte Quantität und modifizierte Qualität der Pulsschläge leicht erkennen. So viel steht jedenfalls fest, dass zu Anfang des Hydrocephalus acutus der Puls häufig beschleunigt ist, dass er aber in anderen Fällen auch vom ersten Tage der Erkrankung an langsamer und immer langsamer wird. In der

Mehrzahl der Fälle ist er Anfangs etwas beschleunigt, um nach einigen Tagen sich zu verlangsamen. Im Verlaufe des zunehmenden Wassergeusses in die Hirnhäuten sinkt die Zahl der Schläge auf 40—60 herab, bleibt jedoch gewöhnlich nicht auf einer bestimmten Ziffer stehen, sondern wechselt, oft von Stunde zu Stunde, so dass man binnen 24 Stunden bald 40, bald 60, bald wieder 80 Schläge zählen kann. Wenn diese Pulzzählungen von verschiedenen Beobachtern angestellt werden, so ist man sehr geneigt, diese grossen Unterschiede durch Beobachtungsfehler zu erklären; ich habe mich aber selbst zu wiederholten Malen von der Richtigkeit dieser Thatsache überzeugt. Ausserdem kommen meistens auch qualitative Veränderungen des Pulses vor, auf eine starke Pulswelle folgen wieder mehrere kleine, oder umgekehrt; auch finden deutliche, jedoch nicht regelmässig sich wiederholende Intermissionen statt und zuweilen nimmt der Puls einen eigenthümlichen schwirrenden Charakter an, wie wenn man den Finger an eine vibrierende Saite hält. Dieser Charakter verliert sich, sobald man den Finger etwas fester auf die Arterie drückt, und es ist desshalb zu dieser Untersuchung eine leise, vorsichtige Betastung nothwendig.

1—3 Tage vor dem Tode wird der Puls wieder schnell, und zwar so schnell, dass man kaum mehr im Stande ist, ihn zu zählen, wobei er bis zu 180 und 200 in der Minute sich steigern kann. Tritt auf die oben geschilderte Pulserlangsamung mit ihren begleitenden Qualitätsveränderungen diese continuirliche Zunahme der Frequenz ein, so kann man mit grosser Bestimmtheit ein baldiges Ende prognosticiren, indem diese enorme Beschleunigung als der Beginn einer Vaguslähmung zu deuten ist.

Von grosser Bedeutung sind auch die Veränderungen der Respiration. Im Beginne der Krankheit geht das Athmen normal von Statten, ausgenommen bei jenen Fällen, wo die Miliartuberculose in den Lungen grosse Fortschritte gemacht hat und das Fieber ein heftiges wird. Es ist dann natürlich die Respiration sehr beschleunigt, und diese Beschleunigung hat ihren Grund eben so sehr in den localen Störungen, als in dem Fieber, dem Ergriffensein des Organismus durch die Allgemeinerkrankung. Sobald aber die Symptome der Exantheme einmal mehr zur Geltung gekommen sind, so machen sie sich auch unfehlbar in der Respiration bemerkbar. Sie wird nämlich viel langsamer und vollkommen anrhythmisch. In einer Minute respiriren die Kinder 15, in der andern 30, in einer andern wieder 20 Mal, bald sind die Athembzüge oberflächlich und geschehen mit kaum sichtbarer Erweiterung des Thorax und ohne alles Geräusch, bald sind sie wieder tiefe Senfter, welche letztere so constant beobachtet werden, dass man sie kurzweg hydrocephalische Senfter genannt hat. Diese verlangsamte und unrhythmische Respiration stellt sich in allen Fällen ein, auch in denen, wo vorgeschrittene Lungentuberculose eine bedeutende Beschleunigung der Athembzüge bedingen müsste. Zuweilen wird das Athmen 10 Sekunden und noch länger vollständig unterbrochen, und der nächste Athembzug, welcher als tiefer Senfter sich einstellt, mit Bangen erwartet, unmittelbar darauf folgen dann wieder einige ganz normale ruhige Inspirationen. Man hat in neuester Zeit dieser Art der Athembewegung, dem sogenannten Cheyne-Stokes'schen Athmen, besondere Aufmerksamkeit geschenkt, und dasselbe auch bei

tingen anderen Krankheiten, die mit Circulationsstörungen und Oedem des Gehirnes einhergehen, beobachtet. Wenn kurz vor dem Tode der Puls jene außerordentliche Beschleunigung angenommen hat, so werden auch die Athembewegungen wieder frequenter, ungefähr so schnell wie im Normalzustand, aber durchaus nicht im geraden Verhältniss zur ersten Pulsfrequenz.

Die physikalische Untersuchung der Lungen liefert entweder ganz negative Resultate, oder es ist in einzelnen Fällen Tuberculose mit Cavitenbildung, in der Kindheit merkwürdiger Weise viel häufiger an den unteren Lappen als an der Lungenspitze, nachweisbar. Ich perkutirte lange Zeit bei allen hydrocephalischen Kindern genau und wiederholt das Sternum, in der Vermuthung, es möchten die gewöhnlich so grossen Paquisten angeschwollenen, tuberculösen Bronchialdrüsen eine besondere Dämpfung in jener Gegend veranlassen. Es hat sich jedoch diese Untersuchung als nutzlos erwiesen, indem die Bronchialdrüsen, wenn sie auch noch so sehr vergrössert sind, niemals nach vorne gegen das Brustbein zu, sondern immer seitlich in die Lungen hinein, nach abwärts unter die Bifurkation und nach hinten gegen die Wirbelsäule hin sich vergrössern. Am Sternum wird deshalb niemals eine ausgebreitete Dämpfung beobachtet, obgleich man in der Leiche die tuberculösen Bronchialdrüsen zur Grösse von Tauben- und Hühner-eiern hypertrophirt findet.

Die Erscheinungen auf der Haut sind von untergeordnetem Belang. Am Anfange der Krankheit ist die Haut gewöhnlich feucht, auch werden starke Kopfschmerzen beobachtet, mit zunehmender Krankheit wird die Haut aber trocken, spröde, schuppt sich kleinartig ab, und erst wenn die lethale Pulsbeschleunigung eintritt, stellt sich ein profuser Sch weiss, ein Todessch weiss, ein. Sadamum ein dem entsprechend selten. Die Haut behält fast bis zum lethalen Ende ihrer Empfindlichkeit für Hautreize, die grausamen Salben mit Tarrar, stibiat, oder Schlimal, sowie die Vesicatores wirken fast ebenso schnell als bei einem gesunden Kinde, auch die einfachen Einreibungen mit grauer Quecksilbersalbe machen bei Kindern mit zarter Epidermis den gewöhnlichen Blasenauschlag.

In den französischen Compendien ist auf Tremsen's Anregung viel die Rede von eigenthümlichen meningitischen Flecken (*taches méningitiques*); dieselben sollen entstehen, wenn man mit dem Fingernagel leicht über die Brust oder den Leib streicht, und mehrere Minuten lang scharlachrothe Striemen zurücklassen, welche diffus in die übrige, rosearöthliche Hautfarbe übergehen. Ich habe diese „meningitischen Flecken“ oft zu machen versucht, bemerkte aber niemals etwas anderes als einen rothen Strich, wie er oben durch Kratzen auf jeder feineren Hautpartie gesunder Individuen fast augenblicklich erzeugt werden kann. Dass in Folge von localen Congestionen bald da, bald dort, namentlich im Gesichte rothe Hautstellen entstehen, ist eine dem Hydrocephalus durchaus nicht speciell zukommende Erscheinung. Ihr häufigeres Vorkommen hier findet eine ganz natürliche Erklärung in dem ungleichen unrythmischen Pulse, in den dadurch bedingten Kreislaufstörungen und in der Rückwirkung des veränderten Centralnervensystems auf die vasomotorischen Nerven.

Der Kopfschmerz ist ebenfalls ein hervorragendes, ziemlich

constantes Symptom. Er stellt sich jedoch nicht so frühzeitig ein, als man der Grundursache der ganzen Krankheit gemäss, die doch in den Meningen zu suchen ist, glauben sollte, und fehlt fast regelmässig im Stadium der Vorboten, wie oben schon erwähnt worden. Er beginnt mit oder etwas vor dem Erbrechen und erreicht bald einen so hohen Grad, dass ältere Kinder fortwährend laut weinen und klagen, jüngere viel mit den Häufchen auf den Kopf greifen, sich an den Ohren und Haaren zupfen und unruhig den Kopf auf dem Kissen hin- und herwerfen. Diese Schmerzäußerungen dauern fort, so lange die Kinder das Bewusstsein behalten, eine bestimmte Stelle am Schädel wird gewöhnlich nicht angegangen, doch deuten sie, darüber befragt, in der Mehrzahl der Fälle auf die Stirne. Bei kleineren Kindern kommen automatische Bewegungen vor, welche auch auf Kopfschmerz sich zu beziehen scheinen und meist darin bestehen, dass sie mit grosser Schnelligkeit die Hand bald auf den Scheitel legen, bald wieder zurückziehen. Die Schmerzen intermittiren gewöhnlich nicht, sondern dauern ununterbrochen fort, bis endlich Coma eintritt.

Auffallend häufig, jedoch nicht regelmässig, klagen grössere Kinder über Leibschmerzen, besonders in der Magenregion. Sie nehmen auf Druck entschieden zu und können so heftig werden, dass die Kinder einen lauten Schmerzensschrei ausstossen, wenn man nur leise den Magen oder eine andere Stelle des Abdomens berührt. Uebrigens dauern sie nicht so lange als der Kopfschmerz, hören oft plötzlich auf, kehren wohl auch wieder, lassen sich aber nicht immer auf anatomische Veränderungen der Darm Schleimhaut zurückführen. Ich habe schon bei mehreren Sectionen Hydrocephalischer, bei welchen diese Schmerzen sehr ausgesprochen waren, Magen und Darm genau untersucht, ohne jemals eine wesentliche Veränderung dabei nachweisen zu können.

Die Form des Unterleibes ist ausserordentlich charakteristisch. Am Anfangs ist nichts besonderes zu bemerken, nachdem aber das Erbrechen, die Verstopfung und überhaupt die hydrocephalischen Symptome einige Zeit gedauert haben, wird der Unterleib täglich kleiner, faltiger und sinkt ein, bis er schliesslich kahnförmig wird und durch leichtes Andrücken die Abdominalgegend deutlich auf der Wirbelsäule zu fühlen ist. Man erklärt diesen kahnförmigen Leib gewöhnlich durch eine Lähmung der Bauchmuskeln, welche das contrahirte Darmrohr einfach überlagern sollen; es ist diese jedoch durchaus keine Lähmung, sondern eine ständige krampfartige Contraction des Musc. transversus und der Musc. obliqui abdominis, worin sich auch die Darmmuscularia theilhaft: denn das Darmrohr ist hierbei immer auffallend verengt. Eine gewisse Härte und Spannung bleibt stets der Bauchwand eigen, wenn sie auch noch so kahnförmig erscheint, und erst in den letzten Lebenstagen tritt zuweilen Lähmung ein, worauf jedoch die starke Einziehung schwindet, und man eine weiche, nicht sehr eingesunkene Bauchwand vor sich hat. Anders verhält es sich mit der der Bauchwand bedeckenden Cutis; an dieser bemerkt man sehr frühzeitig Paralyse, so dass eine emporgehobene Hautfalte längere Zeit braucht, bis sie sich wieder ausgleicht.

Die Einziehung des Unterleibes fehlt bei keinem Hydrocephalus, die Bezeichnung kahnförmig ist ziemlich treffend, indem der Schambein, die Rippenknorpel und der Schwertfortsatz hohe Prominenzen bilden, zwischen welchen die contrahirten Bauchmuskeln eine tiefe

Mulde darstellen. Schon Gölls hält dieses Symptom für besonders wichtig und glaubt, man könne durch dasselbe am sichersten den Wasserkopf von Typhus unterscheiden.

Was die wasserigen Veränderungen am Schädel betrifft, so sind solche nur bei nicht geschlossener Fontanelle zu bemerken. Dieselbe wölbt sich mit zunehmendem Ergüsse mehr und mehr und läßt eine deutliche Fluktuation erkennen. Bei schon geschlossener Fontanelle entwickelt sich ausserdem rasch ein peripherischer Collateralkreislauf in den Venen der Kopfschwarte, eine Folge des Druckes der ergossenen Flüssigkeit auf die Blatteiter der Dura mater.

Die psychischen Funktionen erfahren sehr frühzeitig Störungen, wie solche schon bei dem Stadium prodromicum ausführlicher erörtert worden sind. Am meisten in die Augen fallend ist der wirre, starrs Blick, das murrende, feindselige Wesen oder in anderen Fällen die vollständige Gleichgültigkeit gegen sonst liebe Personen und Gegenstände. Später, wenn die übrigen Symptome die Diagnose schon über allen Zweifel erheben haben, stellen sich auch wirkliche Delirien ein, gewöhnlich jedoch ruhigerer Art, als bei der eitrigen Meningitis des convexen Theiles der Hirnhäute. Erhebliche Delirien kommen bei Hydrocephalus acutus nur ausnahmsweise und sehr kurze Zeit hindurch vor, um bald einem stillen, murmelnden Irreden Platz zu machen, auf welches dann ein beständiger Zustand tiefen Coma's folgt. Nach den Untersuchungen von Rilliet und Barthex, die ich manchmal bei Sectionen bestätigen konnte, steht die Heftigkeit der Delirien und der nervösen Symptome überhaupt durchaus nicht im geraden Verhältnis zur Anordnung der Erkrankung der Gehirnhäute. Wo man bei lebenden Gehirnsymptomen eine dicke Exsudatschicht und eine grosse Menge von Miliartuberkeln vermutet, findet man bei der Section nur Andeutung davon, und wo gar keine Delirien, sondern nur in den letzten Lebenstagen Coma zugegen, hat sich oft massenhaftes Transsudat und ausgedehnte Meningealtuberculose entwickelt.

Ein sehr geröhnliches Symptom ist ein sich in längeren Abständen wiederholender, lauter, klaglicher Schrei, welchen Coindet für so charakteristisch hält, dass er ihn gradum als „hydrocephalischen Schrei“ bezeichnete. Oft wiederholen die Kinder auch ganze Nächte hindurch in ziemlich gleichen längeren Intervallen eintönige Wehklagen oder rufen ein klagliches „O weh“, das jedesmal von einem lauten Seufzer begleitet wird. Diese Symptome der Aufregung, welche für theilnehmende Angehörige ausserordentlich quälend und deprimirend sind, dauern zum Glück nicht länger als höchstens 6–8 Tage, worauf eine tiefe Betäubung folgt.

Sind die Kinder einmal in Coma verfallen, so erwachen sie in der Regel gar nicht mehr aus demselben bis zum Tode, nur zwecks wechseln Coma und Delirien mit einander ab, das erste ist aber immer die bei weitem vorwiegendere Erscheinung. In ganz seltenen Fällen, Rilliet und Barthex erzählen solche, soll das Bewusstsein noch einmal völlig zurückgekehrt sein, um jedoch nur zu bald der früheren Betäubung wieder Platz zu machen.

Die Störungen im Bewegungsapparat, in der Motilität, sind ausserordentlich mannigfaltig und fehlen absolut bei keinem Hydrocephalus, treten aber gewöhnlich so spät auf, dass sie bei Stellung der

Diagnose wenig in Betracht kommen. Das Studiren derselben ist für den Neuropathologen von grossem Interesse und gibt manche Aufklärung über die Innervation verschiedener Körpertheile. Es kommen Convulsionen und Lähmungen vor, die erstern gehen den letzteren voraus, und bei den Convulsionen muss man vor Allem die allgemeinen und örtlichen unterscheiden.

Die allgemeinen Convulsionen treten paroxysmenweise auf. Die Intervalle zwischen den einzelnen Paroxysmen sind Anfangs gross, und es vergehen oft 3—4 Tage von einem Anfalle zum andern. Gewöhnlich repetiren sie sich jedoch öfter und können in einzelnen Fällen viele Stunden lang permanent bleiben. Sie beginnen gewöhnlich an den Inspirationsmuskeln, so dass ein Stillstand der Respiration eintritt, welcher nur wenige Male in der Minute durch einen raschen, unvollständigen Athemzug unterbrochen wird. Alsbald werden die Extremitäten durch rasch sich folgende, electricisch-tetanische Stösse erschüttert, welche mit starken Verdrehungen der Vorderarme und Oppisthotonus abwechseln. Dabei entstehen natürlich starke venöse Stasen, das Gesicht rothet sich, die Augen werden injicirt, rollen nach verschiedenen Richtungen ausser und fixiren sich meist nach oben, so dass man zwischen den halb geöffneten Lidspalten keine Pupille noch Iris, sondern lediglich die weisse Sklera durchblicken sieht. Nach einigen Minuten, zuweilen erst nach 2—3 Stunden lassen diese allgemeinen Convulsionen nach, worauf die Kinder leichenblass in die tiefe Prostration verfallen und eine bedeutende Verschlimmerung des Allgemeinbefindens zeigen.

Die örtlichen Convulsionen ergreifen die verschiedensten Muskelpartien, am häufigsten die des Gesichtes. Hier kommen Verzerungen der Oberlippe, ein krampfhaftes Lächeln und eigenthümliche saugende Bewegungen vor, wobei die Kinder Stunden lang den Mund abwechselnd spitzen und wieder abflachen. An den Augen bemerkt man ziemlich spät Strabismus, bald schielen die Kinder nach aussen bald nach innen. Der Strabismus ist oft nicht anhaltend, sondern es kann die theilweise Reizung oder antagonistische Lähmung der Reihe nach verschiedene Muskeln des Augapfels befallen und in den letzten Lebenstagen gänzlich wieder verschwinden. Es tritt, wie gesagt, dieses Symptom gewöhnlich spät auf, doch erinnere ich mich auch eines Falles, wo ein 3-jähriges Kind lediglich wegen des täglich zunehmenden Schielens zu mir gebracht wurde, in den folgenden Tagen immer mehr hydrocephalische Symptome entwickelte und bei der Section dann einen basallagrossen Tuberkel in einem Schlägel hatte.

Sehr eigenthümlich und von erfahrenen Wärterinnen wohl gekannt und gefürchtet ist das Zähneknirschen, welches eben auch auf spasmodischen Contraktionen der Kaumuskeln beruht und bis zur vollkommenen allgemeinen Paralyse andauert. An den Armen kommen theils automatische grössere Bewegungen, theils Contrakturen, theils loses Zittern, theils Hüpfen an einzelnen Sehnen vor; viele Hydrocephalische bringen die Hände immer an die Genitalien und machen erotische Bewegungen.

Die unteren Extremitäten werden weniger von partiellen Convulsionen befallen als die oberen, sie befinden sich meist halb gebeugt in einem paralytischen Zustand und, wenn es zu Krämpfen

kommt, so gestalten sich dieselben zu kurzen tetanischen Stößen mit möglichster Anspannung der Fußzehen.

Die Nacken- und Rückenmuskeln sind stark contractirt und die meisten Kinder liegen, auf die Seite gelegt oder aufgerichtet, den Kopf weit hinten über. Das tonischen Krampfes der Bauchmuskeln, wodurch der bekannte, kahnförmige Unterleib entsteht, wurde schon oben gedacht.

Nicht weniger auffallend sind die Störungen der Sensibilität und die Veränderungen, die an den Sinnesorganen vor sich gehen. Bei den meisten Kindern bemerkt man nämlich zu Anfang der Krankheit eine beträchtlich erhöhte Sensibilität der Haut, die sich durch eine grosse Empfindlichkeit gegen jede Berührung kund gibt. Man mag auch so sanft sie aufheben, ihre Lage verändern, einen leichten Druck auf den Kopf, das Abdomen oder die Hände ausüben, immer wird ein heftiges Widerstreben mit deutlichen Schmerzaeusserungen erfolgen. Bei zunehmendem Ergüsse hingegen ändert sich rasch das Krankheitsbild, indem Paralyse der Gefühlsnerven eintritt. Man kann die Kinder nun kneipen und stechen, sie ohne Schonung hin- und herlegen, mit Pustelsalben und Vesicationen behandeln, so viel man will, sie werden sich nicht dagegen aufheben und höchstens den Rest ihrer Sensibilität durch ein leises, gleich wieder sistirendes Wimmern anzeigen. Der Mangel der Sensibilität kommt sehr auffällig an der Conjunctiva zum Vorschein, über welche man mit dem Finger streichen kann. Selbst eine Berührung des Bulbus veranlasst die Lider nicht, sich zu schliessen.

An den Augen sind ausser dem Strabismus, der schon bei den Motilitätsstörungen besprochen worden, und ausser dem wirren oder gestauten Blicke noch die Verhältnisse der Pupille und die Verengerung der Schilmsaccretion bemerkenswerth. Das Stadium der Pupillenverengerung ist sehr vorübergehend und durchaus nicht constant, gewöhnlich hat die Pupille sehr bald eine Tendenz zur Erweiterung und diese Erweiterung nimmt von Tag zu Tag merklich zu. Gegen das Ende der Krankheit tritt xewellen die merkwürdige Erscheinung ein, dass die Pupillen ungleich werden. So beobachtete ich bei einem 3-jähr. Kind in den letzten Lebenstagen eine einseitige Erweiterung auf jener Seite, auf der das Kind gerade lag, und zu gleicher Zeit eigenthümliche oscillatorische Bewegungen desselben Augapfels, während Pupille und Bulbus der nach oben gerichteten Körperhälfte ruhig blieben; durch Hecumlegen auf die andere Seite gelang es mir einige Male, doch nicht immer, diese Veränderungen in dem zuerst ruhigen Bulbus zu erzeugen, während der erstere dann zuweilen anfuhrte zu oscilliren.

Die Beobachtung von Brachet, dass auf Lichtendruck die schon erweiterten Pupillen sich auf kurze Zeit contractiren, um nach 1—2 Minuten trotz fortdauernder, intensiver Beleuchtung wieder weit zu werden, habe ich öfters constatiren können. In den letzten Lebenstagen jedoch macht auch die grellste Beleuchtung keinen Eindruck mehr. Die Secresion der Conjunctiva und der Meibomischen Drüsen nimmt während der Krankheit zu und man ist deshalb genöthigt, mehrmals des Tages ziemlich voluminöse Schleimklumpen aus dem inneren Augwinkel und von den Cilien zu entfernen.

Das Gehör scheint ziemlich lange fortzubestehen, indem die Kinder, bis sie nicht vollkommen komatös sind, auf Ausrufen und selbst lautes Anreden etwas reagieren. Auch der Geruch und Geschmack geht erst gegen das Ende verloren; denn die Kinder sträuben sich ganz entschieden gegen Einbringung schlechtschmeckender und übelriechender Medicamente. —

Was nun schliesslich die Lähmungen betrifft, so wird eine allgemeine andauernde Lähmung, wie z. B. nach einer *Comotio cerebri*, niemals beobachtet, hingegen kommen in einzelnen Fällen Hemiplegien, welche bis zum Tode fortbestehen, vor. Man findet dann in der Section ausser der Miliartuberculose der Meningen gewöhnlich noch einen oder einige alte gelbe Tuberkel im Innern des Gehirnes. Am häufigsten werden Paralyse des einen oberen Augenlides oder einer Gesichtshälfte mit Betheiligung der Zungenmuskeln beobachtet, auch kommen Lähmungen einer oberen, selten einer unteren Extremität vor. Die Zurückhaltung des Harnes in den letzten Lebensstagen ist, wie schon erwähnt, nicht so fast einer Lähmung der Blase als einer Lähmung der secretorischen Nerven zuzuschreiben, indem die Blase sich gewöhnlich nicht über die Symphyse hinaus ausdehnt und der eingelegte Catheter keine besonders grossen Mengen Urin entleert.

Der Tod tritt meistens nach heftigen, Stunden lang dauernden, allgemeinen Convulsionen ein, nur ausnahmsweise nehmen die paralytischen Symptome stetig zu und bewirken so ohne allen Todeskampf einen einfachen Stillstand der das Leben onstigmirenden Funktionen.

Die Diagnose der Meningitis ist in der Mehrzahl der Fälle leicht zu stellen, ob sie aber tuberculöse oder einfach eitriger Natur sei, lässt sich gewöhnlich nur approximativ bestimmen. Die Gehirnsymptome sind in beiden Processen die nämlichen, nur treten sie bei der einfachen Meningitis, viel rascher und stürmischer auf, verlaufen viel schneller und können möglicher Weise auch in Genesung endigen, während die tuberculöse Meningitis eine unbedingt tödliche Krankheit genannt werden muss. Das Nähere hierüber wird in dem folgenden, von eben dieser einfachen Meningitis handelnden Abschnitte besprochen werden. Die Verwechslung mit Typhus ist bei nur geringer diagnostischer Übung nicht leicht möglich. Die Diarrhöe, der Meteorismus, der schnelle Puls und der Milztumor sind zu constante Zeichen des Typhus, der eingezogene Leib, die Verstopfung, die Art des Erbrechens, der langsame Puls und die unrythmische Respiration zu auffallende Symptome des Hydrocephalus, als dass hier ein Irrthum geschehen könne. Eher noch wäre es denkbar, dass chronische Magenkatarrhe, bei welchen auch grössere Kinder zuweilen sichtlich abmagern, und worin sich auch einzelne Gehirnsymptome gesellen können, zu Verwechslung Anlass geben. Bei der Lehre von den Eingeweideswürmern wurde schon eines Falles erwähnt, wo ein Kind unter hydrocephalischen Symptomen zu Grunde ging und in der Leiche nichts gefunden wurde als eine grosse Menge von Spulwürmern (pag. 188).

Wenn nun diese Fälle als ausserordentlich selten bezeichnet werden müssen, so ist doch erwiesen, dass einzelne Wurmkrankte weisse Pupillen, häufiges Erbrechen und selbst eine Pulsverlangsamung bekommen, und man also recht wohl auf die Idee eines irregulär beginnenden Hydrocephalus gebracht werden kann.

Das bisher Gesagte bezieht sich nur auf den entwickelten, völlig ausgebildeten Process, nicht auf die Vorstufen, welche durchaus keine diagnostische Präcision zulassen. Hier kommen allerdings vielfache Tauschungen und Verwechslungen mit beginnendem Typhus, mit einfachem Magenkatarrh, mit Helminthen und unregelmässigem, erschwerterem Zahngewachse etc, und auf diesen falschen Diagnosen beruhen wohl auch die Fälle von geheilter Meningealtuberculose mit hydrocephalischen Ergüssen. Den wesentlichsten Anhaltspunkt für die Diagnose in zweifelhaften Fällen liefert immer die erbliche tuberculöse Anlage; wenn Vater oder Mutter oder eines der Geschwister schon an Tuberculosis zu Grunde gegangen, so wird die Wahrscheinlichkeit, dass zweifelhafte Vorboten Symptome dennoch dem Hydrocephalus angehören, viel grösser, als wenn durchaus keine Tuberculosis in der ganzen Familie nachweisbar ist.

Ausgang und Prognose.

Ganz aus dem Anfange meiner medicinischen Laufbahn erinner ich mich eines Falles von ziemlich ausgesprochenem Hydrocephalus, in welchem Genesung eintrat und das Kind nach mehreren Wochen anscheinend vollkommen gesund entlassen werden konnte. Derselbe Knabe von 7—8 Jahren kam aber ein Jahr nach der ersten Erkrankung wieder in Behandlung und starb nun an Meningealtuberculose und grossen hydrocephalischen Ergüssen, wovon wir uns auch durch die Section überzeugten.

Bei allen meinen übrigen Kranken, deren ich wenigstens schon 40 bis 50 behandelt habe, trat, wenn die Symptome einmal einen entwickelten reinen Wasserkopf anzeigten, regelmässig der Tod nach 2—4 Wochen ein. Es soll jedoch mit dieser Zeitbestimmung nicht gesagt sein, dass die Krankheit immer in einem solchen Zeitraum verlaufen müsse; denn nirgends ist es schwerer, als gerade hier, den Anfang zu bestimmen. Man pflegt den Beginn der Krankheit von dem Tage, an welchem die Kinder sich legen, zu datiren, aufmerksam Mütter bemerken aber Wochen und selbst Monate vorher schon eine ganze Menge von Symptomen, die sie sich nicht erklären können und deshalb häufig Aezzte consultiren.

Wenn nun nach meinen Erfahrungen noch gar kein Kind genesen und nur ein einziges einen Anfall überstanden hat, um im nächsten Jahre doch noch an einem zweiten zu Grunde zu gehen, so erhält daraus, dass man vom wissenschaftlichen Standpunkte aus die Prognose direkt letal stellen muss. Hingegen gebietet sowohl die Humanität als auch die Politik, dass den Angehörigen bis zum Tode ein Hoffnungstrahl gelassen wird, indem durch Hoffnung auf Erfolg einer Seite die so aufwändige Wart und Pflege sehr erleichtert wird und anderer Seite den Angehörigen nicht verargt werden kann, dass sie sich bei einem anderen Arzte um Hilfe ansehen, wenn sie ihnen von dem zuerst consultirten geradezu abgesprochen worden ist.

In der Literatur finden sich Fälle von Heilung aufgeführt und durch Namen von gutem Klange garantirt. Es bedarf wohl kaum einer Erwähnung, dass ich die dabei angegebene Behandlung zum Oeffnen mit grösster Consequenz und Genauigkeit eingelehrt habe und dennoch

immer denselben trostlosen Erfolg, als wenn irgend etwas Indifferentes gegeben worden wäre, erleben müssen.

Behandlung.

Der einzige, wesentliche Nutzen, den der Arzt bei dieser schrecklichen Calamität stiften kann, ist der, dass er in tuberculösen Familien eine umsichtige, consequente Prophylaxis einführt. Es muss alles strenge vermieden werden, was Congestionen zum Gehirne veranlassen könnte. Solche Kinder dürfen geistig durchaus nicht anhaltend angestrengt werden, sie dürfen nie lärmende, wilde Spiele spielen, nicht lange und rasch laufen, springen etc. und müssen am Kopfe stets kühl gehalten, vor der Einwirkung der direkten Sonnenstrahlen auf diesen Körpertheil bewahrt werden. Im übrigen müssen alle die bei der Tuberculosis als Dykrasie noch auszuhebenden Verhaltensmassregeln beobachtet werden. Da bekanntlich Stuhlverstopfung ein sehr häufiges und feistliches Moment zu Gehirncongestionen ist, so ist hierauf besonders zu achten, niemals jedoch sollte durch Drastica oder Mittel, welche Stuhl erzielt werden, sondern immer nur durch Vermeidung der erfahrungsgemäss stopfenden und durch Darreichung Stuhl befördernder Nahrungsmittel. Da fast alle Kinder tuberculöser Eltern in ihren ersten Lebensjahren scrophulöse Affectioren, namentlich stark nässende Ausschläge am Kopf und im Gesichte bekommen, so wurde schon seit der ältesten Zeit darüber gestritten, ob diese Hautausschläge einen Zusammenhang mit dem Hydrocephalus haben können oder nicht. Man war früher ganz darüber einig, dieselben nicht weiter, als es die Reinlichkeit eben fordert, zu behandeln, indem man beobachtete, dass sie nach einer gewissen Zeit, zuweilen freilich erst nach vielen Monaten, aufhörten, zu nässen, trockene Krusten bildeten und nach deren Abfall eine normale Cutis ohne sichtbare Narbenbildung zum Vorschein kommen lassen. Da unsere Verfahren in der Therapie unstrittig viel geschäftiger waren als unsere jüngere Generation und jedenfalls auch so gut wie wir wussten, dass man durch Höllestein- oder Sublimatlösung, durch Bleiwasser oder Zinksalbe die Heilung einer Inapetite sehr beschleunigen kann, so mussten sie doch jedenfalls durch unangenehme Erfahrungen dazu gekommen sein, diese entschieden wirksame Behandlung zu unterlassen. In der neueren Zeit erklärt man nun fast allgemein eine solche Ansicht kurzweg für ein Vorurtheil und beseitigt die scrophulösen Ausschläge so schnell es eben geht, ein Verfahren, dem auch ich lange Zeit gehuligt habe. Es ist mir aber nun schon zweimal begegnet, dass Kinder, denen grosse Kopfausschläge plötzlich abtrockneten, zu derselben Zeit Hydrocephalus bekamen, und ich stelle mithin von der austrocknenden Behandlung derselben ab. Hiermit soll durchaus nicht behauptet werden, dass ein wirklicher Zusammenhang zwischen Kopfausschlägen und Meningealtuberculose bestehe, denn wären die beiden bisher erlebten Fälle, noch nicht ausreichend und können durch viele Hundert andere, bei welchen die Kopfausschläge ohne alle Consequenzen rasch abgetrocknet sind, widerlegt werden. Da aber durch eine ebenfalls hundertfache Erfahrung erwiesen ist, dass sie nach einiger Zeit ohne alles Darnuthun von selbst heilen, so kann durch eine expectative Behandlung keinesfalls geschadet, möglicher Weise aber genützt werden.

Welche Therapie soll am ehesten eingeschlagen werden, wenn wirklich die ersten Symptome des Hydrocephalus aufgetreten sind? Die Antwort kann leicht errathen werden, wenn man sich des bei der Prognose Gesagten erinnert. Bei keiner Krankheit kann so bestimmt die Wirkungslosigkeit aller Mittel behauptet werden, als bei dieser, und wenn zu folgendem die bisher üblichen Behandlungsmethoden kurz aufgeführt werden, so geschieht es nicht, um zur Darschächtung aufzufordern, sondern vielmehr deshalb, um den Therapeuten zu zeigen, wie viel gegen diesen traurigen Process schon vergeblich versucht worden ist.

In den ersten Tagen der Erkrankung sind besonders die Ableitungen auf die Haut beliebt; ein Haarseil in den Nacken, grosse Postellen auf die Arme, ein in Eiterung unterhaltenes Vesicans, Pustilsalben mit Tartarus stibiatus oder Sublimat, die Aetzung mit Kali causticum dienen alle dem nämlichen Zwecke, der Erzeugung eines starken Hautreizes mit möglichst profunder, unelösender Eiterung.

Dass die antiphlogistische Heilmethode in verschiedener Intensität und bei jedem Stadium applicirt werden, versteht sich wohl von selbst. Man setzt viele oder wenige Blutegel an die Schläfen, hinter die Ohren, in den Nacken, an den Arm, zwischen die Schenkel, man macht kleine und grosse Aderlässe am Arm, am Fuss, an der Jugularis und hat sogar die Unterbindung der Carotiden vorgeschlagen, meines Wissens aber niemals ausgeführt.

Die Anwendung der Kälte wurde auf verschiedene Weise probirt. Man macht die gewöhnlichen kalten Umschläge auf den geschorenen oder rasirten Kopf, man legt die Eisdase auf, man wäscht oder begiesst den Kopf 2—3 Mal in der Stunde mit kaltem Wasser und man hat sogar Vorrichtungen zu einer ununterbrochenen Irrigation erfunden. Gegen die ersteren Methoden lässt sich nichts einwenden, die Irrigation jedoch ist eine etwas gar zu kühne Idee. „Man wickelt nach Bouchut den Hals des Kindes zu diesem Zwecke mässig fest in einen wasserdichten Stoff, der nach beiden Seiten mit einer Rinne in Verbindung steht, so dass das angewendete Wasser auf beiden Seiten des Bettes abfließen kann, und lässt nun aus einem über dem Kopf des Kindes aufgehängten Gefäss einen dünnen Wasserstrahl auf denselben beträufeln.“ Ob hydrocephalische Kinder sich dieses Beträufeln auch gefallen lassen, findet sich nicht weiter angeführt, erscheint übrigens leicht unwahrscheinlich.

Als Mittel, welche das gesetzte Transsudat zur Resorption bringen sollen, stehen oben an das Quecksilber und das Jod, in zweiter Reihe die Diuretika. Unter den Quecksilberpräparaten kommen am meisten in Gebrauch die graue Salbe, deren Resorption durch bald eintretende Stomatose sich zu erkennen gibt, der Sublimat und das Calomel, welches in grösseren Dosen gereicht zugleich auf den Stuhl wirken soll. Als sogenanntes allgemein anstimmendes Mittel hat man sogar schon täglich mehrere Gran Tartarus stibiatus gereicht. Auch der Phosphor als ein integrierender Bestandtheil der Gehirnmasse ist versucht worden. Unter den Diuretica ist der Salpeter, die Digitalis, Squilla und Juniperus, unter den Antispasmodica die Aca foetida, der Campher, Moschus und Castoreum in Gebrauch. Unruhigen, delirirenden Kindern hat man mit entschieden beruhigendem Erfolge Opium

gegeben, die meisten Aerzte fürchten aber die lähmende Wirkung des Opiums und glauben nur zu gerne, die stetig zunehmende Verschlechterung der Kinder sei durch dieses Mittel theilweise beseitigt. Wer aber schon eine grössere Reihe solcher Kinder ohne Narcotica hat zu Grunde gehen sehen, wird ohne Scheu und ohne sich je Geisteskränken zu dürfen, bei grosser Unruhe und heftigen Kopfschmerzen Opium oder noch besser Morphinum reichen.

Das kurze aber höchst traurige Resumé der ganzen Behandlung ist nun, dass man die Kinder Anfangs wie zu einfacher nicht tuberculöser Meningitis leicht antipylogisch mit kleinen Dosen Calomel, grauer Salbe und kalten Begiessungen des Kopfes behandelt, vielleicht auch nicht gar zu schmerzhaftes Hautreize anwendet, dass man vorherrschende Aufregung durch Morphinum beschwichtigt und die Kräfte durch China aufrecht zu halten sucht. Grausame, eingreifende Methoden sind ganz zu meiden, indem man schon zur Genüge von deren Erfolglosigkeit sich überzeugt hat, und solche Quälereien doch nur bei einiger Hoffnung auf Heilung gestattet sein sollten. Im übrigen müssen bei einer allgemein für tödtlich gehaltenen Krankheit alle möglichen therapeutischen Experimente schraubi sein.

2) Meningitis simplex, purulenta und Encephalitis. Die einfache oder eitrige Entzündung der Gehirnhäute und des Gehirnes.

Obwohl sich an den seltenen Wasserkopf naturgemäss der chronische anschliesst, so mögen hier doch wegen der grossen Analogien vorerst einige Worte über die einfache Meningitis Platz finden.

Dieselbe ist in Deutschland eine viel seltenere Krankheit als der Hydrocephalus acutus und kommt bei Kindern nicht öfter vor als bei Erwachsenen. Fast immer betheiligen sich hierbei die den Gehirnhäuten zunächst gelegenen Gehirnpartien, und da vom klinischen Standpunkte Entzündung der Meningen und Congestion und Entzündung der Gehirnschsubstanz selbst nicht unterschieden werden können, so werden diese verschiedenen anatomischen Prozesse am besten in eine klinische Schilderung zusammenfassen.

Aetiologie.

Die Ursachen dieser Erkrankung lassen sich zuweilen mit grosser Bestimmtheit ermitteln. Die zunächst gelegenen sind immer die Traumen des Schädels, Gehirnerschütterung, welche bei der Lebendigkeit und Ungeschicklichkeit der Kinder allerdings häufig genug vorkommen; direkt auf die Gehirnschsubstanz wirkende Schädlichkeit, grosse Hitze und Kälte, Insolation, übermässige geistige Anstrengung, durch Uebergreifen der Entzündung von Nachbarorganen aus; die häufigste Veranlassung ist in dieser Beziehung die Otorrhöe, viel seltener nimmt die Meningitis ihren Ausgang von einer Otitis oder von den Augenhäuten aus. Auch nach Erysipelen kommt Meningitis vor, in der Mehrzahl der hierher gehörigen Fälle scheint der Rothlauf jedoch traumatischer Natur zu sein und eine Jaucheresorption durch die Knochengefässe angenommen werden zu müssen. Am problematischesten sind die auf Metastasen, zurückgetretene Hautausschläge, unterdrücktes Nasen-

bluten etc. erfolgenden Meningitiden, obwohl auch hierfür sich in der Literatur einige zuverlässige Gewährsmänner finden. Zu gewissen Zeiten wird sogar ein epidemisches Auftreten dieser Krankheit beobachtet.

Pathologische Anatomie.

Die *Dura mater* theiligt sich nur in traumatischen Fällen an der Entzündung, welche hier immer *circumscrip*t bleibt und von einem flachen, faserstoffigen oder eiterigen Exsudat bedeckt wird. In chronischen Fällen, welche bei Kindern ausserordentlich selten vorkommen, verdickt sich die harte Hirnhaut beträchtlich, und es entsteht Thrombose in dem einen oder anderen ihrer Blutleiter. Das entzündliche Exsudat sitzt bei der einfachen Meningitis zwischen *Arachnoidea* und *Pia mater*, in deren Vertiefungen und Gyri es sich ziemlich weit einsenkt. Es findet sich, zum wesentlichen Unterschiede von der Meningealmeningitis, nie so ausgedehnt an der Basis des Gehirns als auf der Oberfläche der Hemisphären, erstreckt sich aber häufig auch auf das Rückenmark als *Meningitis spinalis*. Das Exsudat ist gelb, gelbgrün, faserstoffig oder eiterig, und der Dickendurchmesser desselben übersteigt kaum eine Linie, es ist entweder von einer grösseren Quantität trüben Serums umgeben, wenn es sich verflüssigt und zu einem flockigen, grünlich schillernden Fluidum wird, oder es ist arm an Serum und reich an Faserstoff, so dass es zum Theil an der *Arachnoidea*, zum Theil an Gehirne hängen bleibt, wenn man versucht, die *Arachnoidea* abzuschieben. Eigentümlich ist ferner, dass sich mit der einfachen Meningitis niemals acuter *Hydrocephalus* combinirt, während bei der tuberculösen Basilmeningitis derselbe regelmässig sich einstellt, was eben seinen Grund darin haben wird, dass in dem ersten Falle die direkte Fortsetzung der *Pia mater* in die Gehirnhöhlen frei ist, im letzteren hingegen gerade die Basis des Gehirns der Sitz der eitrigen Masse wird. Die Gehirnrinde kann hierbei im entzündeten oder erweichten Zustande oder auch ganz intakt sein.

Diese einfache, höchst akut auftretende Meningitis endet zwar meistens tödtlich, doch sind auch deutliche Spuren von Rückbildung gefunden worden. Das Exsudat gestaltet sich in diesem letzteren Falle zu einem fibrösen Gewebe um, die *Pia mater* wird eine milchige dichte Membran und verwächst mit der Gehirnrinde und der *Arachnoidea*.

Symptome.

Die einfache Meningitis befällt, wenn sie nicht traumatischer Natur ist oder von einer Oeuerlase ausgeht, fast nur wohlgenährte, kräftige Kinder, welche keine Spur von Scrophulosis an sich tragen, ausserdem werden durch sie nicht selten Kretins geädert und man findet dann bei der Section neben alten Verdickungen der Gehirnhäute ein frisch gesetztes eiteriges Exsudat, so dass die letzte tödtliche Krankheit als ein Nachschub früherer Meningitiden betrachtet werden muss. Der Beginn ist äusserst akut und am zweiten oder dritten Tage ist immer schon die Höhe erreicht; alle die Vorboten, welche bei dem *Hydrocephalus acutus* aufgeführt wurden, fehlen hier vollständig. Ein auf der Höhe stehender *Hydrocephalus* aber ist nicht mehr von einer Hemisphärenmeningitis zu unterscheiden, nur der Vorlauf der beiden Krankheiten gebe einige Anhaltspunkte für die Differentialdiagnose.

Bei der einfachen Meningitis kommt, geradezu wie bei der tuberculösen, Erbrechen ohne Würgen, Verstopfung, verlangsamter Puls, unrythmische Respiration, heftiger Kopfschmerz, eingezogener Leib und die ganze Schaar von Nervenerkrankungen vor, wozüber das Ausführlichere im vorhergehenden Abschnitt besprochen wurde. Folgende Unterschiede können allenfalls geltend gemacht werden: Der Verlauf der Meningitis simplex ist viel rapider, denn der Tod tritt gewöhnlich schon zwischen dem 3.—6. Tage der Krankheit ein und demgemäss ist die Temperatur der Haut namentlich am Kopfe deutlicher erhöht. Die Delirien sind hier gewöhnlich ausserordentlich laut, selbst furchend, das Gesicht hat einen wilden, verwirrten Ausdruck und die Convulsionen und Contraktionen des Rumpfes sind von exquisiter Heftigkeit. Der Puls ist weniger verlangsamt als anrhythmisch, das Erbrechen ist nicht so constant und kann sogar ganz fehlen.

Wenn die Kinder nicht in den ersten Tagen an ihrer Meningitis zu Grunde gehen, so mildern sich die Symptome ganz allmählig, doch bleibt immer noch die Diagnose zwischen unserer Krankheit und Hydrocephalus acutus schwankend. Es tritt eine enorme Abmagerung ein und bleibt leicht eine lebenslangliche Geisteschwäche zurück, wie ich in meiner Praxis schon zweimal erfahren habe. Die grosse Ähnlichkeit im Verlaufe der Meningitis und des Hydrocephalus macht die Behauptung, dass acuter Hydrocephalus zuweilen geheilt wurde, geradezu unzulässig; denn es wäre ja sogar möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass Kinder tuberculöser Eltern ausnahmsweise einmal eine einfache Meningitis acquiriren, von der sie ebenfalls noch genesen könnten.

Behandlung.

Hier ist eine Quecksilberbehandlung von entschiedenem Nutzen, und die beiden Kinder, welche ich gemessen sah, wurden anschliessend mit Quecksilber äusserlich und innerlich behandelt. Man reibt zu diesem Zwecke täglich 4.0 grame Salbe auf den geschorenen Kopf und gibt mündlich 0.03 Calomel. Bei beiden Kindern, welche schon auf der Höhe der Krankheit standen, cerebrales Erbrechen, unrythmischen Puls, eingezogenen Leib und mannigfache Convulsionen hatten, trat gegen den dritten Tag starke Stomatocoe und alsbald allmählicher Nachlass aller schweren Symptome ein. Auf die Delirien übten kalte Begiessungen des Kopfes, alle 2—3 Stunden wiederholt, einen sehr günstigen Einfluss. Sie werden am einfachsten so bewerkstelligt, dass man die Brust und die Arme des Kindes in ein grosses Tuch wickelt und den Kopf des Kindes über eine Schüssel hält, worauf man mit einer Kanne aus mässiger Höhe 1—2 Minuten lang eine Begiessung macht. Es ist in allen Fällen eine, wenn auch nur vorübergehende Milderung der Gehirnsymptome zu beobachten.

Fünf Kinder, die ich mit Blutegel behandelt, gingen sämtlich zu Grunde, nachdem noch plötzliches Erblassen der Lippen und schneller Collaps, die einzigen sichtbaren Folgen dieses Verfahrens, eingetreten waren. Jenen beiden gemessenen Kindern hingegen waren keine Blutegel gesetzt worden, so dass ich nach meinen Erfahrungen die Behandlung ohne Blutegel für die richtigere halten muss.

Die in Folge des Quecksilbers eintretende Stomatocoe und Saliva-

tion, welche übrigens keineswegs als kritisch betrachtet werden darf, sondern auch bei Kindern, die den folgenden Tag schon verschleiden, eintreten kann, heilt in allen Fällen auf Darreichung von rhodraurem Kali, wozu man täglich 4.0 in 400 — 450 Gramms Wasser gelöst nehmen lässt.

Ob man, wie Einige wollen, bei grosser Aufregung des Calomel mit Opium verbinden soll, kann ich nicht entscheiden, indem ich in dieser gefährlichen und so rasch durch Lähmung tödenden Krankheit die Narcotica für contraindicirt halte und zudem in den kalten Begisungen ein werthvolles Mittel gegen die Aufregung gefunden habe.

Die Digitaliscompression der Carotiden, welche vor einiger Zeit in Frankreich warm empfohlen wurde, wird ausgeführt, indem man die Carotiden mit Daumen und Zeigefinger gegen die Seitenwände des Kehlkopfes oder noch hinten gegen die Wirbelsäule eine Minute lang andrückt und diese Procedur mehrmals im Tage wiederholt, bis die Kopfsymptome sich bessern. Dass diese Compression, schwach ausgeführt, nur eine illusorische ist, kräftig ausgeführt hingegen noch viel sicherer die Jugularvenen comprimiren und am Ende gar auf die Nervenstämmen reizend wirken muss, wurde von S. Lewis schon zur Genüge erwiesen. Es hat dieses Verfahren entschieden nur historisches Interesse.

Die auf eine Meningitis folgende, beträchtliche Abmagerung muss durch kräftige Kost und robocirende Behandlung, Eisen, China etc. gehoben werden. Gegen die meist zurückbleibende Geistesschwäche gibt es meines Wissens kein anderes Mittel als grosse Schonung der Geistesthätigkeit und eine ruhige, psychische Behandlung.

3) Der Sonnenstich. *Insolatio.*

An die eitrige Meningitis schliesst sich eng die Insolatio an, obwohl die pathologische Anatomie keinen direkten Zusammenhang der beiden Krankheiten zeigt. Man findet nämlich bei letzterer kein eitriges Exsudat auf den Meningen, sondern blos starke Injektion, etwa Vermehrung des röthlichen Ventrikelfahalles und Weichheit der Gehirnhaut.

Symptome.

Kinder, die mit blossen Köpfen mehrere Stunden sich den heissen Sonnenstrahlen ausgesetzt haben, kehren mit geröthetem Gesicht, Nacken und Armen in ihre Wohnung zurück und klagen sogleich über heftigen Kopfschmerz. Die rothe Färbung der gesamten Hautpartlien verschwindet nicht wie nach einfacher Erhitzung, sondern besteht Tage lang als kleinfleckiges Erythem fort. Nach wenigen Stunden entstehen Delirien, oft furibunder Art, mit Entwicklung ausserordentlicher Muskelkraft. Geröthete Augen, enge Pupillen, starke Pulsation der Carotiden, heisse Haut, heftiger Durst und trockene Zunge lassen eine heftige Meningitis vermuthen. Nur der Puls ist sehr beschleunigt und meistens rhythmisch, während er bei eitriger Meningitis bald unrythmisch wird und sich häufig verlangsamt. Auch das Erbrechen fällt, wenn nicht grössere Mengen unverdauter Speisen sich noch im Magen befinden.

Der Verlauf der Insolation ist ein der Meningitis sehr entgegengesetzter, nach einem halben, einem ganzen oder längstens nach zwei Tagen verschwinden alle die genannten Symptome. Die Kinder verfallen in einen zuerst unruhigen, dann tiefen Schlaf und erwachen aus demselben mit vollem Bewusstsein und Nachlass des Fiebers. Nach weiteren 2–3 Tagen ist die Gesundheit vollkommen wiedergekehrt. Es gibt Fälle, wo der Tod gleich bei Beginn der Insolation unter rasch sich steigendem Sopor, allgemeiner Unempfindlichkeit, Lähmung und Rötheln erfolgt, sie scheinen jedoch zu den Ausnahmen zu gehören und werden in unseren gemäßigten Climates nur selten beobachtet.

Behandlung.

Ventri-sectionen bringen einigen Nachlass der Symptome, doch sind sie bei furiösem Delirirenden sehr schwer zu machen, das gleiche gilt von Application der Blutegel. Das beste und kürzeste bleibt immer, die Haare mit einigen Seilemschnitten möglichst kurz zu schneiden und nun alle Stunden eine kalte Begießung in trockener Waare vorzunehmen. Es folgt hierauf regelmäßig eine bedeutende Ermässigung der stürmischen Erscheinungen. Sobald die Kinder etwas ruhiger geworden, macht man Eisumschläge auf den Kopf, setzt Senfteige an die unteren Extremitäten, gibt Calomel und Jalappa und setzt reizende Clystiere. Fast alle Kinder genesen von diesem höchst bedrohlich aussehenden Zustande.

4) Hydrocephaloid und Irritatio cerebri.

Marshall Hall fand einige Aehnlichkeit zwischen dem acuten Wasserkopf und den auf Blutmuth beruhenden Symptomen atrophischer Kinder, weshalb er letzteren Zustand Hydrocephaloid disease nannte. Es ging diese neue Krankheit, obwohl pathologisch-anatomisch keineswegs begründet, in alle Lehrbücher über und soll auch hier eine kurze Erörterung finden. Wenn gleich keine eigene Krankheit, sondern vielmehr nur ein Ausgang einer solchen, so verdient der Name doch beibehalten zu werden, und wäre es auch nur der Bequemlichkeit wegen, um mit einem Worte einen ganzen Symptomencomplex bezeichnen zu können. Unter Irritatio cerebri, Gehirneriz, versteht man in der Pädiatrik fast ausschließlich jene Gehirnsymptome, welche in Folge von unterbrochener Ernährung, von Atrophie, sich einzustellen pflegen, so dass man recht wohl die Symptome des Hydrocephaloid und der Irritatio cerebri zusammen geben kann.

Symptome.

Nach verschiedenen erschöpfenden Krankheiten, am häufigsten nach Durchfällen und Blutentziehungen, bekommen Kinder unter einem Jahre eine Reihe von Gehirnsymptomen, welche auf den ersten Anblick ohne Berücksichtigung der Anamnese allerdings den Gedanken an eine materielle Veränderung des Gehirnes, an eine Exsudation rege machen können.

Unter den Gehirnsymptomen sind die auffälligsten: ein fortwährendes Hin- und Herreiben des Kopfes und ein Zurückbohren in das Kopfkissen, wodurch die Haare am Hinterhaupt vollkommen ver-

schwinden und häufig kleine Histrupuren, Verlust der Epidermis und Furunkulosis eintreten. Viele Kinder greifen auch an den Kopf, zerrn sich an den Haaren und Ohren und kratzen sich das Gesicht blutig. Sie hören auf, ihre Umgebung zu fixiren und rollen meist bei halbgeschlossenen Lidern die Bülbi nach aufwärts. Die oberen Extremitäten befinden sich in anhaltender starrer Beugung, die Hände ballen sich mit eingeschlagenen Daumen so fest zu Fäusten, dass einige Gewalt dazu gehört, sie zu öffnen, und der Handteller seiner Epidermis beraubt wird. Das letztere wird namentlich bei Kindern beobachtet, welche die Hände oft an den gährenden Schenkel bringen. Die unteren Extremitäten sind ebenfalls starr, entweder ausgestreckt oder so den Leib gezogen und die Nackenmuskeln befinden sich in starker Kontraktion, so dass die Kinder auf die Seite gelegt sich weit nach hinten krümmen. Zuweilen namentlich gegen das Ende stellen sich auch tetanische Krämpfe ein.

Fast alle diese Kinder erbrechen und zwar bald, nachdem ihnen Speise oder Trank beigebracht worden ist, wodurch die Aehnlichkeit mit einer exsudativen Erkrankung des Gehirns noch vermehrt wird. Dieses Erbrechen geschieht zwar auch ohne Würgen und Anstrengung, wie dies überhaupt bei kleinen Kindern gewöhnlich ist, hat aber seinen Grund in einem Reizungszustande der Magen- oder Darmschleimhaut.

Untersucht man den Schädel von Kindern, welche in Folge einer Darmcatarrhe atrophisch geworden sind und diese Gehirnsymptome zeigen, so findet man eine erhöhte Temperatur, eingesunkene grosse Fontanelle und eine Uebereinanderschichtung der Schädelknochen, kurz die Zeichen eines hochgradigen Gehirnschwundes, welcher mit grosser Bestimmtheit eine letale Prognose stellen lässt.

Der Stuhl ist öfter angehalten als diarrhöisch, niemals copios, der Appetit ist meist gänzlich verschwunden, zuweilen aber stellt sich eine wunderbare grosse Eslust ein, die fast bis zum Tode währt.

Zum Unterschiede vom echten Hydrocephalus ist hier der Puls immer ausserordentlich schnell und die Respiration, wenn auch unrythmisch, doch meistens deutlich beschleunigt. Am Anfange scheinen die Kinder anhaltend mehrere Tage und Nächte hindurch, gegen das Ende zu sind sie bloss noch im Stande ein kleines Stöhnen und einzelne Schreie hervorzubringen.

In der Leiche findet man nun das Gehirn sehr weich und wasserig, die graue Substanz blass und atrophisch ohne scharfe Abgrenzung in die weisse übergehend, die Meninges serös infiltrirt und in den Ventrikeln keine grössere Menge von Flüssigkeit als im Normalzustande. Es ist zu vermuthen, dass die Quantität des Fettes im Gehirn bedeutend abgenommen hat und auf diese Weise die Gehirnsymptome erklärt werden müssen; chemische Untersuchungen, in dieser Richtung angestellt, sind mir nicht bekannt.

Behandlung.

Es gilt hier alles, was bei der Behandlung des Darmcatarrhes und der Enteritis folliculosa schon angeführt worden und worauf löstlich verwiesen werden muss. Gegen das anhaltende Schreien und die Schlaflosigkeit sind noch am meisten kalte Begiessungen des Kopfes mit Trockenbathen des Bumpfes zu empfehlen, es tritt nach einem

welchen mehrere Minuten mit der kalten Hand ausgeführten Abgüssen meistens eine Ruhe von einer oder einigen Stunden ein. Das einzige trappante Mittel, eine so tief darniederliegende Ernährung nochmals in die Höhe zu bringen, ist die Brust einer guten Amme. Nur muss man dabei die Vorsicht gebrauchen, das eigene Kind der Amme nicht eher abzunehmen, bis das kranke im Stande ist, ordentlich zu saugen, wofür oft mehrere Tage vergehen. Eine Erkrankung der Amme, Mastitis oder Ausbleiben der Milch wäre die nothwendige Folge dieser Unvorsichtigkeit.

5) Hydrocephalus chronicus. Der chronische Wasserkopf.

Man unterscheidet theoretisch einen äusseren und einen inneren, einen angeborenen und einen erworbenen chronischen Wasserkopf, in Praxi aber lassen sich diese Arten gewöhnlich nicht trennen, indem, besonders was den letzteren Unterschied betrifft, nicht angegeben werden kann, ob ein Kind mit einem kleinen Erguss, der erst später deutlich zunimmt, auf die Welt gekommen ist, oder ob es wirklich anfangs normal gebildet erst später hydrocephalisch wird. Der äussere Wasserkopf ist fast immer angeboren und gewöhnlich mit Gehirnhernie complicirt, woshalb wir erst weiter unten darauf zurückkommen werden.

Pathologische Anatomie.

Die grössten Ergüsse in die Ventrikel kommen im Fötus vor, so dass die Geburt unmöglich wird und zur Perforation des Schädels geschritten werden muss. Die Menge des Wassers kann bei angeborenem Wasserkopf bis zu mehreren Pfunden, nach einigen Autoren bis zu zehn Pfund zunehmen. Die Ventrikel sind zu grossen Säcken ausgefüllt und ihre Wandungen nach oben so verdünnt, dass sie kaum mehr den Durchmesser einer Linie haben oder gar zu einem kaum präparirbaren Belege reducirt sind. Die Gyri des Grosshirns sind nur angedeutet, die Oberfläche ist vollkommen glatt und die Hirnhäute sind ausserordentlich zart und dünn, die Missbildung des knöchernen Gehirns entspricht der Grösse der Wassermenge. Die Verknöcherung der Schädelknochen bleibt natürlich sehr zurück, die Nähte werden über fingerbreit, die grosse Fontanelle bekommt einen Querdurchmesser von mehreren Zollen. Kommt endlich, wenn das Leben Jahre lang besteht, dennoch eine Verknöcherung zu Stande, so geschieht diese dadurch, dass die Knochenränder lange strahlförmige Zacken gegen einander senden, oder sich mittels einer brüchigen Naht aneinanderlagern oder endlich indem sich in den Fontanellen und breiten Nähten Zwischelknochen entwickeln. Da diese Arten von Verwachsung niemals gleichmässig vor sich gehen, eine Naht sich früher auf der einen als auf der anderen Seite schliesst, so entstehen beträchtliche Missbildungen des Schädels, werauf besonders Virchow sein Augenmerk gerichtet hat. Zu erwähnen sind als die häufigsten Abnormitäten: der übermässig lange, breite, hohe Schädel, der runde, der stumpfviereckige, der nach dem Längs- oder Querdurchmesser schiefes Schädel.

Nicht minder auffallend als nach oben wirkt auch nach unten die ergossene Wassermenge. Die Stirnen- und Schlägel sind abgeflacht,

durch Erweiterung der dritten Hirnlöhle auseinandergedrängt, die Boden der letzteren verdünnt und durchsichtig. Aus demselben Grunde sind auch die Vorhügel abgeplattet, die Commissuren gestert und verdünnt, die Schenkel des Gewölbes auseinandergedrängt, das Septum der Ventrikel an mehreren Stellen durchbrochen. Das Kleinhirn, dessen Volumen in gar keinem Verhältnisse mehr steht zu dem des Grosshirns, ist abgeplattet, ebenso die Brücke und die Schläfenrinne.

Weniger bedeutend sind die Veränderungen beim erworbenen Hydrocephalus chronicus, der sich bei Kindern entwickelt, welche längere Zeit, einige Monate bis mehrere Jahre, eine ganz physiologische Entwicklung des Schädels genossen haben. Die Menge des Serums hängt in diesem Falle von der Beschaffenheit der Schädelknochen ab, ob und welche Nähte noch nicht knöchern geschlossen sind und bei Eintritt der Wassersammlung noch ein Auseinanderweichen gestatten. Die Quantität des Serums beträgt hier nicht leicht mehr als 150–200 Gramm, und die Formveränderungen des Schädels und Gehirns werden natürlich nie mehr so beträchtlich, wie beim angeborenen Wasserkopf, welcher nach der Geburt rasch forträchst. Die Beschreibung der äusseren Schädelform wird passender bei der Symptomatologie folgen.

Unter den unmittelbaren Ursachen des Hydrocephalus sind Neoplasmen besonders zu erwähnen, durch welche ein Sinus meningum gemacht und so die Ansammlung von Serum veranlasst wird. Andere bestimmte Complicationen, welche in einen gewissen Zusammenhang mit dem Hydrocephalus gebracht werden könnten, existiren nicht, und namentlich ist noch hervorzuheben, dass zum Unterschied von der acuten Form hier Tuberculosis gewöhnlich nicht beobachtet wird.

Die oculoischen Untersuchungen der ergossenen Flüssigkeit haben gelehrt, dass sie ganz ähnliche chemische Eigenschaften besitzt wie die des acuten Wasserkopfes. Auch hier ist die Reaktion deutlich alkalisch, Eiweiss nur in Spuren und das Verhältniss des Kaliums zum Natrium ein anderes als im Blutserum. weither das Nähere pag. 308 nachzusehen.

Symptome.

Die Untersuchung des Schädels ergibt bedeutende Abweichungen von der normalen Form. Das Schädelgelenk wird um so grösser, je früher der Hydrocephalus begonnen hat, am grössten im Mutterleibe, am wenigsten ausgedehnt bei schon geschlossenen Nähten. Je früher die Exsudation oder, richtiger gesagt, die Verdrängung des physiologischen Hirnlöhleintransudates eintritt, um so ausgesprochener wird die Kugelform, je später dies geschieht, um so anormalere Formen entstehen. Sind einzelne Nähte knöchern geschlossen, während andere noch ausdehnungsfähig sind, so verlängert sich immer der Schädel nach der Richtung der geschlossenen Naht. Der Vollständigkeit halber kann man auch Messungen des vergrösserten Schädeldaches anstellen, wobei man gewöhnlich den grössten Umfang, der über die Stirnhöcker geht, misst und das Mass von einem Ohr zum andern, und von der Protuberantia occipitalis externa bis zur Nasenwurzel bestimmt. Praktisch haben diese Messungen wenig Werth, indem die Wölbung der Stirne und Auswärtstellung der Schläfenbeine hinlänglich die abnorme Vergrösserung erkennen lassen, belehrend jedoch können

sie für das Studium des Verlaufes werden: denn es stellt sich hiedurch augenfällig heraus, dass die Ausdehnung des Schädels nicht gleichmässig und gradatim, sondern rückweise nach längeren Intervallen des Stillstandes geschieht.

Ist die grosse Fontanelle noch nicht geschlossen, wie diese in den meisten Fällen vorkommt, so dehnt sie sich zu einer grossen Wölbung von einem Durchmesser bis zu mehreren Zollen aus, fluktirt deutlich und füllt sich prall an. Diese Wölbung und Gespanntheit besteht immer fort bis zum Tode, wenn auch der Körper im übrigen noch so sehr abgemagert ist. Die dem Arterienpuls synchrone Erhebung der Fontanelle ist sehr deutlich zu erkennen, während ihr Heben und Senken bei der In- und Expiration sich gänzlich verliert.

Man hat vor einiger Zeit auf die Auscultation der grossen Fontanelle mehrfach aufmerksam gemacht, und es hat sich in der That herausgestellt, dass man an verschiedenen Stellen des Schädels, namentlich an der grossen Fontanelle rachitischer Kinder, ein helles bruchendes oder bläsendes Geräusch vernimmt, das bei hydrocephalischen Kindern aber niemals gehört wird. Da diese Blasegeräusche höchst wahrscheinlich in den unebenen Blutleitern der harten Hirnhaut entstehen, so ist es leicht erklärlich, dass sie verschwinden, wenn letztere durch die zunehmende Wassermenge stark comprimirt werden.

Der beste Anhaltspunkt ist die Lagerung der Schläfenbeine. Während dieselben bei einem gesunden Kinde senkrecht nach aufwärts gehen, sind sie bei Hydrocephalus stark nach auswärts gewendet, so dass man in exquisiten Fällen, von oben betrachtet, nicht einmal die Orientscheit zu sehen bekommt. Bei längerem Bestande verflacht sich durch den anhaltenden Druck des Gehirnes die obere Wand der Orbita, in Folge dessen treten die Bulbi mehr nach vor- und abwärts, und man bekommt gewöhnlich die ganze Cornea und noch etwas von der nach oben gelegenen Sclera zu Gesicht, was den Kindern einen eigenthümlich stieren, glänzenden Blick verleiht.

Aus demselben Grunde, gesteigerter Druck im Innern der Schädelhöhle, entsteht zuweilen auch ein mächtiger Collateralkreislauf der Kopfschwarze und der Stirnhaut, welche letztere mit dicken, bläulichen Strängen nach verschiedenen Richtungen durchzogen ist und durch diese Färbung einen höchst sonderbaren Anblick gewährt.

Das Gesicht erscheint gegen die Dimensionen des Schädeldaches ausserordentlich verkleinert, hat übrigens ganz seine normalen Proportionen. Bei kleinen Kindern mit angeborenem Hydrocephalus ist es meist mager, spitzig und greisenhaft, während es bei grösseren Kindern bis zum Tode voll und rund bleiben kann.

Die funktionellen Störungen sind mehr mannigfach und fast bei jedem Hydrocephalus verschieden. Beim Erwachen stellen sich diese Symptome entweder ganz allmählig ein oder werden mit Fieber und einigen Erscheinungen, wie sie bei Hydrocephalus acutus vorkommen, als Aufschreien, Brechen, Kopfwack, Zähneknirschen und Delirien, eingeleitet.

Die geistigen Fähigkeiten bleiben zuweilen merkwürdig lang intact, und es macht einen sonderbar traurigen Eindruck, wenn solche Kinder mit monströsen Köpfen und unwillkürlichen Entleerungen gelähmt oder contract in Bette liegen und doch noch ganz vernünftige Antworten

gehen, ja sogar noch hysterische Entfälle haben. In einzelnen Fällen tritt allerdings bald Stumpfheit und endlich Blödsinn ein.

Von den Sinnen schwindet zuerst und am häufigsten das Gesicht, wobei die Pupille mäßig erweitert und starr wird und die Lichtempfindung so total verloren gegangen ist, dass die Kinder lange Zeit und mit Vorliebe in die Sonne sehen. Strabismus kommt hier seltener vor als beim acuten Hydrocephalus, häufiger wird ein Nystagmus der Augäpfel oder nur eines einzigen Bulbus beobachtet, und auch die Pupillen sind zuweilen ungleich contractirt oder erweitert. Die übrigen Sinne erhalten sich meist bis kurze Zeit vor dem Tode, was namentlich vom Gehör gilt, die Sensibilität der Haut verliert sich hauptsächlich in den vor Lähmung befallenen Extremitäten.

Hemiplegien sind seltener als beiderseitige Lähmungen, unter welchen die gewöhnlichste die der unteren Extremitäten ist. Auf dieselbe folgt absteigend eine Unempfindlichkeit, dann eine Lähmung der Sphincteren der Blase und des Mastdarmes und erschwert die Pflege der fortan auslaßf riechenden Kinder ausserordentlich. Der daraus entstehende, unvermeidliche Decubitus beschleunigt meistens sehr das lethale Ende, auf welches sonst oft Jahre lang vergeblich gewartet werden muss. Contracturen sind eine gewöhnliche Erscheinung. Convulsionen werden nicht gar häufig beobachtet, der Tod kann während derselben leicht eintreten.

Die übrigen des Hydrocephalus acutus so sehr charakterisirenden Erscheinungen fehlen hier in der Regel. Die Respiration, im ersten Falle durch den Mangel des Rhythmus ausgezeichnet, geht ganz normal von Statten, ebenso ist eine Palverlangsamung hier gewöhnlich nicht vorhanden. Die Verdauung kann ganz normal bleiben, kein Erbrechen, keine Verstopfung tritt ein oder wird nur vorübergehend beobachtet, wodurch sich die Jahre lange Fortdauer eines guten Ernährungszustandes leicht erklären lässt.

Die Ernährung geht, wenn keine anderen Krankheiten, Tuberculose oder Darmcatarrh, concurren, vortreflich vor sich, der Appetit artet oft in eine wahre Gefräßigkeit aus und die Fettpöster nehmen dabei in krankhafter Weise zu.

Kopfschmerzen werden nur vorübergehend geklagt und Fieberbewegungen haben öfter ihren Grund in andern zufällig sich dazu gesellenden Erkrankungen als im Hydrocephalus selbst. Acute Nachschübe können auf einige Tage ganz das Bild eines acuten Hydrocephalus erzeugen, doch geht die Verschlimmerung nicht wie bei diesem unauflöslich vorwärts, sondern es kommt gewöhnlich zu einem Stillstand und Wiederverschwinden der bedenklichsten Symptome.

Der Verlauf ist, wie sich schon aus der Beschreibung des Uebels ergibt, immer ein chronischer. Am schnellsten sterben die angeborenen grossen Wasserköpfe, welche schon durch die Geburt selbst dem schädlichsten Drucke ausgesetzt sind und nur ausnahmsweise den Geburtsart aushalten. Einzelne später erworbene, sehr massige Ergüsse werden aber viele Jahre ertragen, so dass solche Menschen ein mittleres Lebensalter erreichen können und in der Literatur sogar von einem erst im 54. Jahre verstorbenen Wasserköpfe berichtet wird.

Der Tod kann eintreten als unmittelbare Folge der Gehirnerkrankungen, unter Convulsionen oder fort und fort zunehmendem Coma und

Collapsus, wo man dann in der Leiche noch frische Meningitis oder Meningealblutung finden kann, oder der Decubitus und seine Consequenzen, Pyämie und Entkräftung, können die nächste Veranlassung abgeben. In der Mehrzahl der Fälle sterben aber die Kinder an anderen intercurrenten, selbstständigen Krankheiten, vor allem an Darmstarrheit und Enteritis folliculosa während der Dentition, an Bronchitis, Pneumonie, Meningitis oder an acuten Exanthemen, welche Erkrankungen sämmtlich bei chronischen Wasserköpfen viel öfter tödtlich verlaufen, als bei vorher gesunden Kindern.

Die Differentialdiagnose hat in ausgesprochenen Fällen natürlich keine Schwierigkeiten, ein diagnostischer Irrthum ist gar nicht denkbar. Kleine Wassercysten hingegen bieten keineswegs schlagende Symptome und können recht wohl mit Schädelrachitis oder mit einfacher Hypertrophie des Gehirns und der Knochen verwechselt werden.

Der Hauptunterschied zwischen Hydrocephalus chronicus und Schädelrachitis besteht darin, dass bei ersterem die Schläfenbeine immer noch auswärts sich richten, während sie bei letzterem gerade nach aufwärts stehen, mag die grosse Fontanelle auch noch so gross geworden sein. Uebrigens fehlen hier alle hydrocephalischen, functionellen Symptome, am Schlüssel selbst findet man die Verdünnung nicht allgemein verbreitet, sondern nur auf die hinteren Parthien beschränkt, während die Stirnbeine die gewöhnliche rachitische Verdickung zeigen, und die übrigen Theile des Skeletes, Thorax und Extremitäten, ebenfalls von der Rachitis ergriffen sind.

Die Hirnhypertrophie ist ebenfalls von gar keinen hydrocephalischen Symptomen begleitet, entsteht meist in Folge von Schädelrachitis und der Knochen verdickt sich hierbei beträchtlich. So lange übrigens nicht genaue Wägungen des Gehirns im Verhältnisse zum Körpergewicht angestellt und eine mittlere Normalzahl fixirt ist, hat man noch gar kein Recht, dem blossen Augensinn nach von Hypertrophie des Gehirns zu sprechen.

Therapie.

Ich kenne wohl Kinder mit chronischem Hydrocephalus, bei denen seit mehreren Jahren keine Zunahme des serösen Ergusses stattgefunden hat, und welche in einem leidlichen Zustande ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung sich befinden, eine wirkliche Heilung aber, so dass man Aussicht hätte, ein für die menschliche Gesellschaft brauchbares Mitglied zu schaffen, ist nie nicht bekannt. Das wesentlichste bei der Conservirung dieser Kinder scheint eine sorgsame Pflege und gute, genau regulirte Diät zu sein. Aus der Classe der Diuretica, deren Wirkung auf die Resorption der hydrocephalischen Flüssigkeiten eine höchst problematische ist, dürfen nur solche gewählt werden, welche keinen allgemein schwächenden Einfluss üben, Roob Juniperi, oder etwas Digitalis, Kali aceticum. Zu vermeiden sind Jodkalium, Quecksilber, Brechweinstein, Drastica. Eine tonische, robormende Behandlung kann keinesfalls schaden, namentlich dann nicht, wenn immer auf gehörigen Stuhlgang Rücksicht genommen wird.

Oertlich hat man die verschiedensten Salben und Bähungen angegeben, wegen, so lange die Kinder nicht damit gequält werden,

nichts einzusetzen ist. Die von Engelmann vormalig empfohlene Einwicklung mit Heftpflasterstreifen, welche Jahre lang unauflöslich festgesetzt werden soll, wie die von einigen operationslustigen Chirurgen versuchte Punktion und Entleerung der Ventrikel bei noch nicht geschlossenen Fontanellen hat man aus verschiedenen Gründen, vornehmlich wegen gänzlich mangelnden Erfolges, wieder vollständig aufgegeben.

6) Encephalocele, der angeborene Gehirnbruch.

Der Gehirnbruch ist immer angeboren und durch eine übermäßige Ausdehnung des Gehirns bedingt, in Folge deren die gehörige Entwicklung des Schädelsknochens gehemmt wird. Man findet alsdann noch der Geburt an irgend einer Stelle des Schädels, am häufigsten an der Nasenwurzel und in der Gegend des Occiput eine Geschwulst, welche bei genauerem Zufühlen einen ringförmigen Defect des Knochens erkennen lässt. Die Grösse dieser Geschwulst schwankt zwischen der eines zweiten Kindskopfes und einer kleinen Nuss, was hauptsächlich von der Menge des Wassers herrührt, welches in allen Fällen das verfallene Stück Gehirn umgibt. Zuweilen findet sich in der Geschwulst gar kein Gehirn, sondern nur Meningealwasser, die von Spring ausführlich beschriebene Meningeocele. Je enger die Knochenlücke, um so gestielter ist die Geschwulst, je weiter, um so flacher.

Ihre Hülle ist gebildet durch eine atrophische, haarlose Cutis, die mit dem Pericranium und den Gehirnhäuten verwachsen ist, und bei grossen Gehirnbrüchen kann die Haut so atrophisch sein, dass der Sack während der Geburt beim Durchgang des Schädels durch das Becken platzt, worauf natürlich bald der Tod eintritt.

Der Hirnbruch zeigt sich am häufigsten am Hinterhaupt, an oder unterhalb der kleinen Fontanelle, ausserdem an der Nasenwurzel oder einem Augwinkel oder an der grossen Fontanelle, am seltensten seitlich an den Schläfenbeinen. Wenn er an der Nasenwurzel heraustritt, so werden die Nasenbeine auseinandergedrängt und die Augen stehen weiter von einander ab.

Durch Congestion kann auch die Geschwulst ganz reponiren oder wenigstens beträchtlich verkleinern, erzeugt aber dadurch beträchtliche Schmerzen und bei fortgesetztem Drucke auch Gehirninfälle, Convulsionen, Starrkrampf, Betäubung, Ohnmacht. Bei kleinen Geschwülsten und dicker Hülle ist ein früher Tod durchaus keine notwendige Folge. Die Geschwulst wächst aber im Verhältnisse zu den übrigen Körpertheilen mit, die fast unvermeidlichen Quetschungen und Beschädigungen aller Art veranlassen bald chronische Meningitis, und so kommt es, dass ein Erwachsener oder selbst nur ein grösseres Kind mit einem Hirnbruch zu der grössten Seltenheit gezählt werden muss. Wenn das Leben auch einige Jahre durch sorgsame Aufsicht erhalten werden kann, so bleibt die geistige Entwicklung doch sehr zurück, und Blödsinn stellt sich ein.

Behandlung.

Bei ganz kleinen, vollständig reponibeln Hirnbrüchen, namentlich Meningocele, soll schon Radicalheilung gelingen sein, indem durch continuirliche Zurückhaltung des Sackes Kalkablagerungen sich in der

tauche gebildet haben, und so ein knöcherner Verschluss zu Stande gekommen ist. Gelingt, wie dies in der Regel der Fall ist, die Reposition nicht vollständig, oder entstehen durch dieselbe schwere Hirnsymptome, so bleibt nichts anderes übrig, als durch eine hölzerne Bleiplatte oder ein geeignet geformtes Leder die gefährliche Stelle vor äusseren Unbilden möglichst zu schützen. Es kann auf diese Weise ein ziemlich hohes Alter erreicht werden, und in der Münchener anatomischen Sammlung wird der Schädel eines Erwachsenen aufbewahrt, an dessen Hinterhaupt eine grossengrösse, überall abgerundete Oeffnung sich findet, aus welcher bei Lebzeiten ein Hirnbruch hervorgeragt hat.

Die Abtragung oder Ablösung soll nach Bouchut immer eine tödtliche Meningitis veranlassen und ist deshalb gänzlich aufgegeben. Anders verhält es sich mit den Punctionen. Wenn man mit einem Explorativtroikart, oder noch besser, durch einfache, oft wiederholte Nadelstiche den flüssigen Inhalt des Bruchs entleert, so gelingt es, die Geschwulst bedeutend zu verkleinern, und es kann ein schützender Verband angelegt werden, was ohne diese Behandlung fast unmöglich gewesen wäre. Allerdings sammelt sich nach den ersten Punctionen das Secret wieder an, nach mehrmaliger Wiederholung aber kommt eine bleibende Verkleinerung und somit eine beträchtliche Besserung des ganzen Leidens zu Stande.

7) Sclerose des Gehirnes.

Verhärtung des Gehirnes findet sich bei Kindern ausserordentlich selten, nur Billiet und Barthex, dann F. Weher haben einzelne Fälle bekannt gemacht. Die Sclerose nimmt, wie bei Erwachsenen, entweder das ganze Gehirn ein, oder nur einzelne kleinere Theile, totale oder partielle Verhärtung. Die Vermehrung der Consistenz schwankt zwischen einer leichten, unmerklichen Härte und einer knorpelartigen Resistenz, und ist in letzterem Falle immer mit Atrophie, mit Schwund und Texturveränderung verbunden. Am häufigsten kommen noch vor die leichteren Grade totaler Verhärtung, die man bei Scharlach- und Typhusleichen zuweilen findet, während die Seltenheit der partiellen sich daraus leicht erklären lässt, dass Gehirnplexien im Kindesalter ausserordentlich selten sind und die Rückbildung derselben die Hauptveranlassung zu diesem Befunde abgibt.

Bei einer grösseren Meningealblutung oder einer eitrigen Meningitis theilnehmen sich gewöhnlich die nächstgelegenen Gehirnpartien, und den Schluss dieser Veränderungen bildet dann die Sclerose. In diesen Fällen charakterisirt sie sich durch eine fast knorpelige Härte und eine schmutzig grangulöse Farbe, welche zwar hauptsächlich die graue Substanz ersetzt, aber auch die weisse nicht unberührt lässt. Mit der Induration des Gehirnes darf nicht verwechselt werden der Krebs, dessen Eigenschaften im folgenden Abschnitt erörtert werden sollen.

Es hat diese Hirnsclerose fast nur pathologisch-anatomisches Interesse, indem die dadurch erzeugten Symptome keineswegs charakteristisch sind und also am Krankenbette die Diagnose nicht möglich ist. Die dadurch bedingten Erscheinungen können sein: Epilepsie, Convulsionen, Lahmungen, Idiotismus und Neuralgien der verschiedensten

Art, ohne dass man bei solchen Vorkommnissen deshalb zur Annahme einer Gehirnverhärtung geneigt wäre.

Die Behandlung muss natürlich eine symptomatische sein, denn eine Heilung der verhärteten Stellen gelangt meines Wissens niemals. Narectica, Nerrina und Roborantia werden je nach Umständen die Mittel sein, welche möglicher Weise noch einigen Nutzen schaffen könnten.

8) Neoplasmen des Gehirns.

Aufbildungen sind im Kinderhirne keineswegs eine seltene Erscheinung, was namentlich für den Tuberkel gilt. Ihre Folgen sind um so beträchtlicher, je grösser sie sind und je schneller sie wachsen. Durch den auf diese Weise entstehenden Druck auf die umgebenden Gehirnpartien werden im Allgemeinen Volumszunahme der erkrankten Hemisphäre und Kreislaufstörungen, welche endlich zu Gehirnödemen oder Wassereerguss in die Ventrikel führen, sethlich aber Erweichung oder kleine Apoplexien der nächsten Umgebung veranlasst. Die verschiedenen Neoplasmen des Gehirns sind nun ihrer Häufigkeit nach:

a) Der Tuberkel.

Die Zahl der grossen Tuberkel im Gehirn ist eine sehr beschränkte, indem deren gewöhnlich nur 2 oder 3, selten mehr als 5 oder 6 vorkommen. Je nach ihrer Zahl ist die Grösse verschieden, sie schwankt gewöhnlich zwischen einer Hasel- und einer Wallnuss. Wenn eine grössere Anzahl von Tuberkeln sich ausnahmsweise findet, so übersteigen sie die Grösse einer Erbsen nicht mehr. Die Gestalt nähert sich immer der runden oder ovalen, eine Lappung und Auszackung wird nur selten beobachtet, woraus hervorgeht, dass der Tuberkel wahrscheinlich schon im Entstehen einen gewissen Raum einnimmt und sich nachträglich nicht mehr vergrössert.

Man hat schon an allen Stellen des Gehirns Tuberkel gefunden, doch ist nicht zu verkennen, dass er häufiger in der grauen Substanz sitzt als in der weissen, also entweder ganz an der Peripherie oder tief im Centrum, wo in den Streifen- und Schlägeln viel graue Substanz vorhanden ist. Am seltensten kommt er vor in der Medulla oblongata, in der Scheidewand und in den Gehirnschenkeln. Der periphere Tuberkel kann so oberflächlich gelagert sein, dass er die Gehirnhäute berührt und mit der Dura mater verwächst, wodurch eine Verwachsung mit Tuberculo sis der Gehirnhäute, welche aber in dieser Weise gar nie vorkommt, möglich wird.

Untersucht man zum den Tuberkel selbst genauer, so zeigt er keine Verschiedenheit von den grossen käsigen Tuberkeln in den Bronchien oder auch in den Lungen. Auch hier besteht er wieder aus einer gelben, speckig-käsigen, dicken, brüchigen Masse, die unter dem Mikroskop durchaus keine Zellenebildung, sondern nur amorphe Körnchen und Klümpchen, kurz lauter Detritus, erkennen lässt. Die nächste Umgebung ist stärker vascularisirt, die Verwachsung zwischen Tuberkel und Gehirnmasse ist keine innige, und man kann ohne besondere Geschicklichkeit und Mühe den ersteren vollkommen auflösen.

Die Art der Entstehung ist keineswegs klar, da man immer nur den fertigen gelben Gehirntuberkel findet und niemals graue, erble-

kaltdurchscheinende Granulationen, wie dies fast an jeder tuberculösen Lunge demonstrirt werden kann.

Rokitansky hat zwar bisweilen einzelne Portionen des Tuberkels in diesem cruden, gallertartigen Zustand gefunden, glaubt aber, dass die Umwandlung jedenfalls sehr rasch vor sich gehen muss.

Gewöhnlich bildet der ganze Tuberkel eine homogene Masse ohne allen Unterschied in Consistenz und Farbe, doch kann man manchmal den Anfang einer Erweichung erkennen, wobei das Centrum verflüssigt oder selbst der ganze Knoten eine abgekapselte Caverne mit breiigem, eiterähnlichem Inhalt darstellt. Die hier vorkommende eiterige Masse unterscheidet sich mikroskopisch von wirklichem Eiter durch das Fehlen aller zellenähnlichen Gebilde und die Gegenwart von einfachen Detritus. Da zur Verkieselung grösserer Tuberkelmassen stets ein Zeitraum von vielen Jahren gehört, so findet sich bei Kindern natürlich niemals ein verkieselter Tuberkel. Die gewöhnlichste Complication und zugleich nächste Todesursache ist acute, miliäre Tuberculose der Meningen mit acutem Hydrocephalus, welche durch eine directe Resorption vom ursprünglichen Tuberkel aus zu entstehen scheint. In zweiter Reihe sind Tuberculose der Bronchialdrüsen und Lungen zu erwähnen. Der Grund, warum bei Kindern grosse gelbe Gehirntuberkel öfter vorkommen als bei Erwachsenen, liegt darin, dass die höchst wahrscheinlich angeborenen oder bald nach der Geburt erworbenen Neubildungen wohl einige Zeit, selbst einige Jahre, ohne ausgesprochene Symptome verborgen bleiben können, dass aber der Tod eben doch gewöhnlich in den Kinderjahren noch erfolgt und also nur ganz ausnahmsweise bei einem Erwachsenen dieser anatomische Befund vorkommt. Die Gehirntuberkel machen entweder gar keine oder doch keine anderen Symptome als die übrigen Neoplasmen des Gehirns, und es sollen, um Wiederholungen zu vermeiden, die sämtlichen hier vorkommenden Symptome am Schluss dieser pathologisch-anatomischen Darstellung gegeben werden.

16. Krebs.

Gehirnkrebs ist, wie Krebs überhaupt, bei Kindern sehr selten; ich selbst habe erst in zwei Kinderleichen denselben gefunden. Nach Angabe aller Autoren ist die medulläre, zellige Form, der Markschwamm, vorherrschend, und der harte Faserkrebs kommt so gut wie gar nicht vor. Die Gehirnkrebse infiltriren entweder das Gehirn und gehen allmählig in die normale Gehirnmasse über, oder sie sind scharf abgegrenzt, von runder oder ovaler Form und lassen sich in diesem Falle vollkommen ausschälen. Gewöhnlich ist es eine Masse von ziemlichem Umfange und nur in einer Hemisphäre, doch werden auch Beispiele erzählt, wo zerstreute Knoten im ganzen Gehirn vorgekommen sind. Eine Vorliebe für die graue Substanz, wie beim Tuberkel, existirt hier nicht. Diese Krebse wachsen gewöhnlich sehr schnell, platten sich, am Schädelknochen angehängt, etwas ab, können aber selbst den Knochen zum Schwund bringen und an der Kopfschwarte zum Vorschein kommen, oder sie wachsen längs der Schläfen in die Ohren und ergreifen den Bulla. Sie sind häufig im Gehirn primär und bleiben in demselben isolirt, ohne gleichzeitig in anderen Organen vorzukommen.

c) Entozoen.

In der Literatur finden sich einige vereinzelte Beispiele von Blasenwürmern im Gehirn der Kinder. So wurde schon Echinococcus in Gestalt von kleinen und größeren Blasen in der Hirnsubstanz gefunden, etwas häufiger kommt Cysticercus cellulosus vor, der meist auch zugleich in den Muskeln massenhaft vorhanden ist. Der Cysticercus findet sich nach Rokitzansky fast ausschließlich in der grauen Substanz, und zwar vorzüglich in deren peripherischen Lagen, wo die Blasen dann über das Gehirnniveau vortragen und zum Teil die Meningen emporheben. Die Tiere können absterben und die Blasen verkümmern, worauf man eine Kreideconcrement in einem Balge eingeschlossen findet, das nur schwer von einem verkümmerten Tuberkel unterschieden werden kann.

Symptome.

Es ist eine der merkwürdigsten Erscheinungen in der ganzen Pathologie, dass die Symptome dieser Gehirnneoplasmen durchaus nicht constant sind, ja noch mehr, dass in einer grossen Zahl der Fälle gar keine Symptome beobachtet werden. Sehr häufig erkranken scheinbar ganz normale Kinder an einem Hydrocephalus acutus der gewöhnlichen Art, erliegen denselben in 2—3 Wochen und man findet nun im Gehirn eine oder mehrere grosse, gelbe Tuberkel, die sogar in Erweichung begriffen sein können, und jedenfalls viele Monate, vielleicht Jahre bestanden haben mögen. Kein einziges, auch nicht das leiseste Zeichen dieser grossen Veränderungen braucht bemerkt worden zu sein. In anderen Fällen freilich dauert ein deutlich ausgesprochenes Vorstadium ausserordentlich lange und es stellen sich überhaupt die Zeichen eines chronischen Gehirndruckes ein. Die Kinder verlieren den Appetit, erbrechen und bekommen halbseitige und doppelseitige Lähmungen. Die Sinnesorgane schwinden, es tritt Amaurosis oder Taubheit ein, heftige Kopfschmerzen, Krämpfe und Contracturen, die Symptome einer Meningitis machen gewöhnlich dem Leben ein Ende.

Bei den verschiedenen Carcinomen stellt sich meist starkes Kopfweh, dann Unruhe, Stottern, Schwächung der Sinnesorgane, weitstanzähnliche Bewegungen, Oramie, Krämpfe, Schlafsucht, Lähmungen und Erschöpfung ein. Bei den Blasenwürmern werden namentlich oft Epilepsie, Chorea und ausserdem die eben geschilderten Symptome beobachtet. Mit Bestimmtheit kann bei vorhandenen Gehirnsymptomen die Diagnose auf Cysticercus gestellt werden, wenn sich zugleich im übrigen Körper, in den Muskeln, im Auge, solche Blasen finden.

Die Neoplasmen des Gehirnes liegen ausser dem Bereiche der Therapie und können höchstens eine momentane, symptomatische Behandlung erheischen.

9) Angeborene Bildungsfehler.

Ausser dem angeborenen Wasserkopfe und dem Gehirnbruch, welche schon abgehandelt sind, kommen noch einige andere Hemmungsbildungen vor, welche jedoch fast blos aus Interesse für den Anatomen und Embryologen Interesse haben.

Bei gänzlichem Mangel des Gehirnes haben wir die Ace-

phalie, wovon man ein kopfloses Monstrum, meist mit Spina bifida, Ectopia des Herzens, Defect der Lungen, Mangel einzelner Baucheingeweide und verkümmerten Extremitäten versteht.

Hieran reiht sich der partielle Mangel des Gehirns, welches entweder im Längs- oder Querschnitt defect sein kann. Hemicephalie. Es gibt verschiedene Grade dieses Zustandes. Es kann fast das ganze Gehirn fehlen und nur an der Schädelbasis ein kleines Rudiment sich finden, von welchem aus die Kopfnerven entspringen, oder es sind einzelne Gehirnthelle vollständig entwickelt, die Hemisphären fehlen aber gänzlich, dabei sind die Kopfknochen defect oder höchst rudimentär gebildet und die Hirnhäute, ursprünglich zu einer wasserhaltigen Blase ausgebreitet, welche jedoch frühzeitig geplatzt ist, hängen als atrophische Fetzen über den ansehnlichen Hirnmassen. Oder es fehlen nur kleinere Gehirnthellen, z. B. die vorderen Lappen und die Riechkolben, die Schlägel mit den Sehnerven, der Balken etc., mit einer entsprechenden Kleinheit oder Missbildung jener Gesichtstheile, welche zur Aufnahme der Sinnesindrücke gehören. Die Schädelknochen können in diesen Fällen, natürlich verhältnissmäßig klein, vorhanden sein.

Von den Defecten im Längsdurchschnitte ist der bedeutendste die Einfachheit des Grosshirns, verbunden mit Cyclopie, mit mangelhaftem Gesichte oder totalen Mangel desselben. Ferner kommt eine Verschränkung der beiderseitigen Seß- und Streifenhügel und dem entgegengesetzt ein Mangel der Caudataren und die daraus hervorgehende Spaltung des Gehirns vor. Die Bildung des kugelförmigen Gehirns kann in diesen Fällen normal von Statten gegangen sein, es entsteht jedoch immer Idiotismus und mangelhafte Körperentwicklung.

Ausser dem Fehlen einzelner Gehirnthelle kommt noch eine Kleinheit des gesammten, übrigen normal gebildeten Hirns vor. Microcephalia. Das Schädeldach ist sehr niedrig, die Stirn flach und der Kopf spitz. Diese Kinder sind lebens- und entwicklungsfähig und bleiben, was sehr auffallend ist, auch in ihrer geistigen Entwicklung nicht besonders zurück.

Bildungsexcess sind im Gehirn äusserst selten, und die mehrfache Spaltung der Lappen, welche hier und da vorkommt, ist auch vielmehr als Formanomalie, denn als Bildungsexcess zu betrachten.

B. Rückenmark.

- * 1) Entzündung des Rückenmarkes und seiner Häute. Meningitis spinalis und Myelitis (es sei denn, das Mark).

Die Krankheiten des Rückenmarkes sind ein sehr dunkles Gebiet und das positive derselben, wenn man sich nur an die deutlich nachweisbaren pathologisch-anatomischen Veränderungen hält, in wenigen Zeilen wiederzugeben. Vor allem müssen bezüglich der viel missbrauchten Hyperämie alle jene Sectionsbefunde als ungültig ausgeschlossen werden, bei welchem die Leichen nicht bald nach dem Tode auf das Gesicht gelegt worden sind, und die Sectionen später als 24 Stunden nach dem Tode angestellt worden ist. Im entgegengesetzten Falle

findet man nämlich bei jedem, auch dem normalsten Kinde, ausgeglichene Leistenhypostase, Inhibition von Blutfarbstoff und Faserinverweicherung, wodurch eine Constatazion wirklicher Rückenmarkskrankheiten geradezu unmöglich gemacht wird.

Obgleich der pathologisch-anatomische Befund ein verschiedener ist, kann doch die Entzündung des Rückenmarkes und seiner Hülle in einen Symptomencomplex zusammengefasst werden, indem die Erscheinungen bei beiden Processen nahezu identisch sind und vom klinischen Standpunkte aus eine Differentialdiagnose demnach höchst schwierig und problematisch wird.

Pathologische Anatomie.

Der von der harten Hirnhaut gebildete Sack füllt den Kanal der Wirbelsäule nicht vollständig aus, sondern wird durch Fett, das sich mehr gegen die Wirbelbogen anhäuft, auch vorne gegen die Wirbelkörper durch lockeres Zellgewebe und rings herum durch Venengeflechte in dem Wirbelkanale fixirt. An der Innenseite dieses Sackes der Dura mater ist das äussere Blatt der Arachnoidea fest angewachsen, während deren inneres Blatt locker mit der Pia mater zusammenhängt. Zwischen diesem äusseren und inneren Blatt befindet sich um die Cerebrospinalflüssigkeit, welche mit der der Gehirnhäute und Gehirnventrikel communicirt und bei kleinen Kindern schon gegen 4 Grm. betragen mag. Die Pia mater ist gefässreicher als die der Gehirne und lässt sich bei Neugeborenen leicht abheben.

Nach dieser Recapitulation des normalen Verhaltens der Markhäute soll uns die Untersuchung der Hyperämien und Blutungen folgen. Die weichen Gehirnhäute, sowie die Venen an der Innenseite des Wirbelkanals sind bei kleinen Kindern immer strotzend von Blut, wenn man auch die Vorsicht gebraucht hat, sie bald nach dem Tode auf den Bauch zu legen, und es konnten auch gar nicht selten Extravasate vor, über deren genaueres Verhalten wir Weber in Kiel die meiste Aufklärung verdanken.

Es ist nicht immer leicht zu unterscheiden, ob ausserhalb der Dura mater befindliches Blut bei Lebzeiten extravasirt sei, oder ob es erst bei Hinwegnahme der Wirbelbogen aus durchschnittenen Venen sich auf die Dura mater ergossen habe. Vor Täuschung kann man sich dadurch am besten hüten, dass man keine langen Strecken der Wirbelbogen von oben bis unten auf einmal wegnimmt, sondern erst an verschiedenen Stellen des Rückgrates kleine Parthien abnimmt, und dass man einen sanften Wasserstrahl auf die blassegelegte Dura mater wirken lässt. Das aus den Venen nach dem Tode ergossene Blut lässt sich ganz leicht weggeschwemmen, während das bei Lebzeiten extravasirte immer etwas geronnen ist und einigermaßen an der Dura adhärirt. Diese Blutungen finden sich am häufigsten am Halse und in der Lendengegend, erstrecken sich bald auf kurze Strecken, bald sind sie so mächtig, dass der ganze Wirbelkanal von oben bis unten und rings herum mit einer Schichte geronnenen Blutes bedeckt ist. Kleinere Extravasate sieht man zuweilen deutlicher an den abgehobenen Wirbelbogen als auf der Dura mater, weshalb immer auch die Innenseite der ersten genau untersucht werden muss.

Ähnliche Blutungen, wie ausserhalb der Dura mater, kommen

auch innerhalb dieses Sackes, zwischen Dura mater und Arachnoidea oder zwischen letzterer und Pia mater vor. Auch hier schwankt die Grösse des Extravasates zwischen der eines Stecknadelkopfes und einer solchen Masse, dass das ganze Rückenmark von Blut umgeben ist. Da die Dura mater keine grossen Venen hat, so ist auch hier der Irrthum einer erst bei der Section entstandenen Blutfärbung weniger leicht möglich.

Ausser diesen Blutungen, die, als höchste Grade der Hyperämie, gleich bei der Betrachtung der Entzündung eingeschaltet werden sind, kommen auch wirkliche Exsolationen auf und unter der Hirnhaut vor.

Zwischen Dura mater und knöchernem Wirbelkanal findet sich schon im Normalzustand in dem lockeren Zellgewebe etwas Serum, dasselbe kann aber pathologisch beträchtlich zunehmen und als zulige Masse grosse Strecken der harten Hirnhaut bedecken, sowie auch an der Innenfläche der abgenommenen Wirbelbogen adhären, bei grossen Kindern findet sich nach Traumen oder bei Spontylitis auch eine sichtlich Trübung und Verdickung dieser Haut und Auflagerung eines plastischen, fibrinösen Exsudates.

Nach Eröffnung der harten Hirnhaut findet sich bei allen Kindern eine ziemlich Menge von Cerebrospinalflüssigkeit, welche normal von hellgelber Farbe und vollkommener Klarheit ist, bei Erkrankung der weichen Haute aber trüb, flockig oder blutig wird. Eine häufige Färbung findet sich namentlich bei Kindern, welche während einer Puerperalfieber-epidemie an Pyämie zu Grunde gegangen sind. Diese flüssigen Exsudate folgen natürlich immer dem Gesetze der Schwere und finden sich an der am tiefsten gelagerten Stelle, wie bei geschlossenem Sack der Dura mater durch Auf- und Abwärtsheben der Leiche demonstrirt werden kann. In seltenen Fällen kommt auch hier neben flockiger Cerebrospinalflüssigkeit eine fibrinöse Ablagerung auf der Pia mater vor, welche entsprechend der eitrigen Meningitis auch eitrig verfallen kann.

Das Rückenmark selbst ist bei diesen Veränderungen seiner Hülle gewöhnlich erweicht oder erodirt. Uebrigens ist es sehr schwierig, das Rückenmark eines Kindes zu untersuchen und je nach dem Widerstande, welcher der Messerklinge begegnet, eine Erweichung oder Schwellung zu diagnosticiren, indem das Rückenmark überhaupt so weich und dünn ist, dass nur ein Minimum von Kraft dazu gehört, es zu schneiden. Wo die oben beschriebenen Veränderungen der Rückenmarkshäute zu Stande gekommen sind, da wird in der That an einzelnen Stellen des Markes selbst die rothe Erweichung beobachtet. Die auffälligste Veränderung des Markes findet man bei einem gebildeten Pottischen Buckel, wo in Folge der Zerstörung mehrerer Wirbelkörper eine Wirbelknickung des Wirbelkanals und Rückenmarkes selbst sich ereignet hat. An der geknickten Stelle ist das Mark abgeflacht, derb und in der Regel etwas gelber oder röthlicher gefärbt als die übrige Substanz, selbst völlige Unterbrechungen desselben sind schon beobachtet worden.

Symptome.

Die Blutungen und Entzündungen im Innern des Wirbelkanals hielten bei Neugeborenen keine charakteristischen Symptome, indem die

tanischen und klonischen Krämpfe, welche hierbei beobachtet werden, noch viel häufiger ohne alle nachweisbaren Veränderungen des Rückenmarkes vorkommen. Am deutlichsten kann man die hierher gehörigen Symptome bei Kindern mit Spina bifida, deren Sack geplatzt oder brandig ist, beobachten. Solche Kinder bekommen intermittirende Krämpfe der Rückenmuskeln, welche bald vorübergehend sind und in leichter Steifheit der Muskeln bestehen, bald zu dem heftigsten, anhaltenden Opisthotonus ausarten. Dabei ist die Berührung der Wirbelsäule immer schmerzhaft und erzeugt neue Krämpfe, weshalb man gut thut, solche Kranke stets auf die Seite zu legen. Auch die Berührung bei noch nicht gelähmten unteren Extremitäten verursacht Schmerzen, welche auf Bewegungen noch zunehmen. Endlich tritt Lähmung der unteren, dann auch der oberen Extremitäten ein, die zuweilen noch mit convulsivischen Erschütterungen abwechseln, und nach einigen Tagen erfolgt unter Trismus und Tetanus der Tod.

Bei älteren Kindern sieht man deutlich ausgesprochene Spinalsymptome nach Caries der Wirbelsäule mit ihren consecutiven Kriechungen und nach Scharlach oder Typhus, auf welche Krankheiten zuweilen complete Lähmungen der unteren Extremitäten zurückbleiben. Die Kinder beschreiben ganz deutlich zuerst ein Pochenwerden und verminderte Empfindlichkeit, klagen übrigens zu gleicher Zeit über heftige Schmerzen bei stärkerer Berührung oder Bewegung, worauf sich zuweilen convulsivische Zuckungen, bald aber totale Lähmung der Beine folgen. Zu Anfang verläuft der Process fieberhaft mit frequentem Puls und Temperaturerhöhung, die besonders am Rücken deutlich bemerkbar ist. Das Fieber lässt gewöhnlich bald nach, die Lähmung besteht aber viele Monate, ja das ganze Leben hindurch fort. Seltener Ercheinungen hierbei sind: Störungen der Haarsensibilität, Schlingbeschwerden, Herzklopfen, Anfälle von Dyspnoe, Singultus, Præpennis etc.

Wir handeln hier von den Krämpfen und Lähmungen abtödtlich kurz, weil diese Symptome ohne alle nachweisbaren Veränderungen des Rückenmarkes noch viel häufiger sind und bei ihrer praktischen Wichtigkeit noch in einigen Abschnitten besprochen werden sollen.

Das Vorkommen der Rückenmarksentzündung ist fast lediglich sporadisch, doch kamen nach West auch Epidemien vor. West spricht namentlich von solchen in einzelnen Gegenden Frankreichs während der Jahre 1842 bis 1844 und in neuerer Zeit in den Spinnern und Arbeitshäusern Irlands. In den letzten Jahren trat sie in Süddeutschland ziemlich häufig auf und wurde unter dem Namen Meningitis cerebrospinalis oder Genickkrampf vielfach beschrieben. Obwohl sich in den Leichen bedeutender seröser Ergüsse zwischen den Rückenmarkshäuten fand, so war das Rückenmark selbst doch selten und nur wenig verändert. Die Krankheit verlief sehr acut und stöhete in 1–4 Tagen.

Bezüglich der Differentialdiagnose zwischen Entzündung des Rückenmarks und der seiner Hülle hat man geltend gemacht, dass die erstere chronisch, fieberlos und mit vorwiegender Lähmung verlaufe, während die letztere mit stürmischen Symptomen, heftigem Fieber und allgemeinen Convulsionen begins, worauf dann erst später Lähmung sich einstelle. Wie schon oben bemerkt, verlaufen fast regelmäßig beide Erkrankungen, mehr oder weniger ausgebildet, neben einander, und es

ist deshalb unmöglich und wohl auch nutzlos, differentialle Zeichen aufzusuchen.

Therapie.

Eine antiphlogistische, schulgerechte Behandlung dürfte nur in den seltensten Fällen anwendbar sein. Entweder sind die Kinder zu klein, indem gerade Neugeborene an Myelomachitis leiden, oder sie sind, wenn auch an Jahren vorgerückter, durch die vorausgegangenen, die Rückenmarkskrankheit bedingenden Prozesse, als Spondylarthrosen, Scharlach oder Typhus, in einem Ernährungszustande, der ebenfalls eine Antiphlogose nicht zulässt. Fieber und Convulsionen werden zu Anfang der Krankheit am besten mit kleinen Dosen Calomel behandelt. Sind die ersten stürmischen Symptome beseitigt, so gibt man häufig ein Inf. Fer. Arnicae, ohne dass jedoch eine deutliche Wirkung davon gerühmt werden könnte; die gewöhnlich zurückbleibenden Lähmungen bieten keine sehr ungünstige Prognose, indem bei zunehmenden Körperkräften wenigstens Besserung, wenn auch nicht vollkommene Heilung eintritt. Ein wichtiges Adjutans ist die kalte Douche auf den Rücken und die vorsichtige Darreichung von *Strychn. nitric.*; mit welchem Mittel man auch bei grösseren Kindern nie über 0,006 höchstens 0,010 pro die steigen soll, indem sonst plötzlich ernstliche Vergiftungssymptome, tetanische Zuckungen und Delirien eintreten können. Die Urinausscheidung muss stets genau überwacht werden, und der Catheter in Anwendung kommen, wenn länger als 12 Stunden kein Urin entleert worden ist.

2) Spina bifida. Hydrorrhachis. Hiatus spinalis congenitus.

Unter Hydrorrhachis versteht man eine angeborene Geschwulst, welche sich an der Wirbelsäule und zwar meistens an deren Sacraltheil zeigt und von einer Ausstülpung der Rückenmarkshäute durch eine Knochenlücke des Wirbelkanals herrührt.

Pathologische Anatomie.

Man kann mehrere Grade dieses Bildungsfehlers unterscheiden, welche sich am Knochen folgendermassen charakterisiren:

Es ist entweder die ganze Wirbelsäule gespalten oder es findet sich der Bildungsfehler nur an einem oder einigen Abschnitten derselben. Eine totale Spaltung der Wirbelsäule kommt nur bei Menschenaffen, Hemicephalen u. dgl. vor und gehört deshalb nicht in das Gebiet klinischer Untersuchung, die mangelhafte Beschaffenheit einzelner Wirbel jedoch bedingt keine absolute Lebensunfähigkeit und muss deshalb näher erörtert werden. Auch hier sind wieder gewisse Abstufungen der Knochendefekte zu bemerken. Bei dem geringsten Grade des Uebels sind die Bogenhälften des Rückgrates vollkommen entwickelt und nehmen auch eine fast normale Stellung ein, nur sind die *Processus spinosi* nicht vereinigt und lassen eine enge Spalte zwischen sich. In einem höheren Grade sind die Bogenhälften unvollkommen, indem einige Dornfortsätze ganz fehlen und so eine breite Spaltung bedingen. In einem noch höheren Grade sind auch die Wirbelkörper getrennt und es findet sich dann eine durch die ganze Dicke der

Wirbelsäule durchgehende Spalte. Im höchsten Grade endlich haben wir neben einer durchgehenden Spalte einen Defekt einiger Wirbelhälften, so dass von einzelnen Wirbeln nur Rudimente vorhanden sind.

Untersucht man die Geschwulst selbst, so findet man den Sack gebildet entweder aus Dura mater und Arachnoidea oder es ist die erstere Haut nur durchbrochen, und es stülpt sich die letztere als ein Sack aus dieser so entstandenen Oeffnung der harten Haut heraus. Die darüber liegende Cutis ist entweder von normaler Beschaffenheit oder sie ist atrophisch, halb durchscheinend, oder sie fehlt gänzlich, wobei natürlich die dünne Arachnoidea schon im Uterus oder während der Geburt platzt und in loose, schwarzen Fetzen an der Peripherie der Spalte hängt. Die Geschwulst ist bei erhaltenen Hüllen im Leben ziemlich prall und inkurirt, in der Leiche collapsirt sie und der Sack wird schlaff. Ihr Inhalt ist reiner Liquor cerebrospinalis. Die Grösse und Form der Geschwulst ist sehr verschieden, bald ist sie so klein, dass sie nur dem Gefühle, nicht dem Gesichte erkennbar ist, bald erreicht sie die Grösse eines Hühnerendes. Die gewöhnlichste Stelle für die Spina bifida ist die Lendengegend, doch hat man schon an jedem Wirbel Spaltung beobachtet. Das Rückenmark ist dabei entweder ganz intakt, oder es kann auch, wenn die Geschwulst tief unten an den Lendenwirbeln sitzt, sich buschelförmig in den Wandungen des Sackes verbreiten.

Symptome.

Mit der Schilderung des pathologisch-anatomischen Befundes sind auch die Symptome schon ziemlich erschöpft. Die Gestalt der Geschwulst ist ei- oder kienförmig, zuweilen kann man einen dünnen Stiel untersuchen. Die Haut darüber ist meist marmarig, endlich violett, auch findet man deutliche, sternförmige Narben in Mitte der Geschwulst, wobei dieselbe mehr abgeflacht ist. Diese Narben rühren höchst wahrscheinlich von einer Zerreissung des Sackes während des Fötallebens her. Das flüssige Medium, in welchem sich der Fötus befindet, ermöglicht nach Abnahme der Spannung eine Wiederverwachsung der gebersteten Stelle und daher die vorläufige Einstülpung.

Drückt man mit den Fingern auf die Geschwulst, so wird sie etwas kleiner; wenn noch ein zweiter Sack an der Wirbelsäule oder ein gleichzeitiger Hydrocephalus congenitus externus besteht, so bemerkt man dafür ein Festwerden an diesen Theilen. Uebrigens ist jeder Druck, sogar schon die Berührung der Geschwulst schmerzhaft und veranlasst sehr gewöhnlich tetanische Zuckungen. An grossen Geschwülsten mit atrophischer Hautdecke ist zuweilen auch die Respiration sichtbar, die Geschwulst nimmt bei der Expiration zu und bei der Inspiration wieder ab. Untersucht man die Ränder der Geschwulst mit dem Finger genauer, so findet man deutlich die Spaltung der Wirbel, den oberen und unteren Winkel der Spalte und die myrthenblattförmige Erweiterung gegen ihre Mitte.

Was die übrigen körperlichen Verhältnisse betrifft, so werden diese Kinder meist lebend geboren, bleiben aber nur in ganz seltenen Fällen länger als einige Tage am Leben. Die Geschwulst platzt oft schon während der Geburt, zuweilen wird sie ohne geplatzt zu sein

beendig und nur ganz ausnahmsweise bleibt die über ihr befindliche Haut normal und verdickt sich nach und nach. Kommt Luft in die Geschwulst, also namentlich wenn der Sack platzt oder brandig wird, so tritt eiterig jauchige Meningitis und in kurzer Zeit der Tod ein. Wenn die Haut normal bleibt und die Geschwulst ursprünglich nicht sehr voluminös war, so können die Kinder möglicher Weise gedeihen, doch treten auch hier nach später Lähmungen der Beine, des Mastdarmes oder der Blase und in Folge davon ein frühzeitiger Tod ein. Einzelne Fälle werden in der Literatur erzählt, wo solche Individuen mit verhältnissmässigem Wohlbefinden 20—30 Jahre gelebt haben. Bei den höheren Graden besteht übrigens dieser Bildungsfehler nur selten isolirt, gewöhnlich sind damit andere bedeutende Fehlbildungen, als Hydrocephalus congenitus, Ectopia der Blase, des Herzens, Klumpfüsse etc. verbunden.

Was die Häufigkeit betrifft, so hat sich herausgestellt, dass nach einer statistischen Zusammenstellung von Chaussier in der Pariser Maternité auf 1000 Kinder eines mit Spina bifida kommt.

Verwechslungen mit anderen ähnlichen Geschwulsten sind nicht leicht möglich, weil man die nicht geschlossenen Wirbelsäugen bei jeder wahren Spina bifida leicht durchfühlen kann. Als einzelne Raritäten werden in der Literatur Fälle von angeborener Hernia dorsalis, von Cysten, Fett- und Honiggeschwulsten, welche auf der Wirbelsäule aufliegen und allenfalls zur Annahme einer Hydrochachis verleiten konnten, erzählt. Die überaus seltene Intraforatio, foetus in foetu, wo am Kreuzbein eine unförmliche grosse Geschwulst mit einzelnen Knochen und grossen Gefässen sitzt, hat natürlich mit unserem Zustande gar keine Ähnlichkeit.

Therapie.

Die Chirurgen haben schon die verschiedensten Methoden versucht, die Geschwulst zu verkleinern und den Wirbelkanal zum Verschluss zu bringen. Das fast regelmässige Mislingen dieser sämtlichen chirurgischen Eingriffe hat seinen Grund darin, dass eben die Innenwand des zu operirenden Sackes die Arachnoidea spinalis ist und dass alle Reizungen derselben eine Meningitis veranlassen, deren Localisation auf den Sack durch kein Mittel erzielt werden kann.

Man hat die Geschwulst mit dem Explorativtroikart und mit vielen Nadeln verschiedener Art unter Verschiebung der Cutis punktiert. Gaupp stellte erst vor Kurzem einen 7jährigen Knaben vor, dessen kindskopfgrosse Hydrochachis er in den ersten Lebenswochen durch 8maliges Punkturen geheilt hat. Nach der ersten Punktion war die Spaltung der Wirbelsäule deutlich zu fühlen; dieselbe schloss sich jedoch sehr rasch, so dass nach 10 Wochen ein vollständiger Verschluss eingetreten war. Alle den Wirbel constituirenden Theile sind bei dem Knaben nun vorhanden, nur sind die Dornfortsätze an den betreffenden Wirbeln etwas platter. Man hat die Excision mit darauffolgender umschlingender Naht gemacht und auch die stützliche Compression durch zwei Federkiele oder hölzerne Stäbchen versucht. Chaussaigne hat die Hydrochachis mit Punktion und darauffolgender Jodinjektion nach Art der Hydrocele behandelt und bei gestieher Geschwulst hat man auch schon die Abbindung unternommen. Endlich hat man einen anhaltenden Druck auf

die Geschwulst mittels eines Harkissens ausgeübt, wodurch wohl heftige Schmerzen und convulsivische Zuckungen entstehen, aber keineswegs Heilung erzielt wird.

Simultliche Experimentatoren gestehen, dass alle ihre Bestrebungen mit ganz wenigen Ausnahmen erfolglos blieben, ja noch mehr, dass unmittelbar nach dem chirurgischen Eingriff die meningitischen Symptome eintraten, die alsbald den Tod zur Folge hatten. Allerdings ist die Prognose bei Hydrocephalus sehr ungünstig und es sterben auch die meisten Kinder, die keine chirurgische Behandlung erfahren, doch fehlen noch statistische Zusammenstellungen hierüber, was bei der Seltenheit des Uebels leicht erklärlich ist.

Man scheint eine mögliche Schonung der den Sack bildenden Cutis das rationellste zu sein und es ist in dieser Beziehung zu gerathensten, den Sack mit einer gepöberten mit mit den Rändern aufliegenden Hohlkugel von äusseren Verletzungen zu schützen und diesen Schild mittels weicher Kautschukbänder zu fixiren. Ist der Hydrocephalus mit Hydrocephalus congenitus combinirt, wie dies eben häufig vorkommt, so darf gar kein anderes Verfahren, als das letzte beschriebene eingeschlagen werden, indem durch jede Verkleinerung und Compression am Rücken eine grössere Spannung im Innern des Kopfes erzeugt würde.

C. Störungen der Nervenleitung.

Es kommt hier eine Reihe von Nervenkrankheiten in Betracht, welche höchst wahrscheinlich ebenfalls nur Symptome gewisser Veränderungen des Gehirns und Rückenmarkes sind, wie aus der Analogie der einzelnen Erscheinungen ziemlich bestimmt hervorgeht. Die entsprechenden morphologischen oder chemischen Veränderungen der Centralorgane konnten aber bisher noch nicht nachgewiesen werden, was auch dadurch erschwert ist, dass die meisten dieser Nervenkrankheiten durchaus nicht tödtlich endigen, sondern nur hier und da einmal zufällig eine Section ermöglicht wird.

Da der Nachweis der centralen Prozesse noch nicht gelungen ist, so bleibt nichts anderes übrig als Gehirn und Rückenmark vorübergehend als normal anzunehmen und die einzelnen Nervenerscheinungen mit ihren beigebrachten Bezeichnungen symptomatisch zu schildern.

1) *Eclampsia infantum*. Die Fräsen.

Die Fräsen spielen in der Pädiatrik von jeher eine grosse Rolle und sind auch den Laien sehr bekannt, wober es auch kommt, dass sie mit einer Menge Namen bedacht worden sind. Die Kopffräsen, die stille Fräse, der stille Jammer, das Gefräsche, die Krämpfe, die Schauerzehen, die Gichter sind huter populäre Bezeichnungen für ein und dasselbe Uebel, nämlich für allgemeine oder partielle, chronische Muskelzuckungen, welche entweder nur einmal oder öfter nach einander auftreten und fast immer durch eine andere, fieberhafte Krankheit bedingt sind oder eine solche einleiten. Das Bewusstsein ist vollständig oder nahezu verschwunden, besonders wenn die Convulsionen allgemein sind. Der einzelne Anfall kann von einem epileptischen nicht unter-

schieden werden, nur der chronische Verlauf und die unerwartete, fieberlose Wiederkehr charakterisirt die Epilepsie. Von der Chorea unterscheidet sich die Eclampsie dadurch, dass bei der erstern die Muskelcontractionen den ganzen Tag durch unangestrichelt währen, dass immer mehrere Wochen vergehen, bis dieses Uebel gehoben wird und das Allgemeinbefinden dabei nicht getrübt ist.

Was den Zeitraum betrifft, in welchem die Fäulen am häufigsten auftreten, so ist die erste Kindheit bis zur Vervollendung der ersten Dentition das gewöhnlichste Alter hierfür, doch bekommen auch noch ältere Kinder, welche schon in dieser Zeit an Eclampsie gelitten hatten, bei dem Beginne eines akuten Exanthemes, selbst einer Angina oder gar einer einfachen Magenüberladung heftige Convulsionen. Die leichteren partiellen Zuckungen sind meist mehrere Tage anhaltend und kommen besonders bei ganz kleinen Kindern in Folge von Verdauungsstörungen vor, die allgemeinen Convulsionen, für welche allein eigentlich der Name Eclampsie gebraucht werden sollte, sind natürlich nicht anhaltend, sondern die ganze Affektion ist entweder mit einem einzigen Anfälle beschlossen, oder es ist zwischen den einzelnen Paroxysmen doch stets ein längeres Intervall.

Die leichtere Form, wie sie hauptsächlich bei Kindern unter einem Jahre beobachtet wird, ist durch folgende Symptome charakterisirt: das Kind schläft mit halb geschlossenen Augenlidern und nach oben gerichteten Augen, so dass man zwischen der Lidspalte lediglich die weisse Sklera vorhellen sieht. Die Gesichtsmuskeln contrahiren sich im Schlaf mannigfaltig, wodurch es den Anschein haben kann, als ob die Kinder lachen (sine risu), oder wie einige beherrschende Wärterinnen auch sagen: „Das Kind spielt mit den Engeln“. Das Athmen geschieht schnell und regelmässig, bald oberflächlich bald wieder in tiefen Saufforen, die Glieder machen leichte Zuckungen, die Händchen sind zu Fäusten mit eingeschlagenem Daumen gehalt und die Beine mit gespreizten Zehen an dem Leih gezogen.

Aus einem der Art unruhigen Schlafe wachen die Kinder zum erschreckt mit Geschrei oder Wimmern auf und suchen aufgeweckt durch Stampfen mit den Beinen, Krümmen und Wenden des ganzen Körpers ihr Unbehagen erkennen zu geben.

Nach Abgang von Blähungen, grosser Menge grünen, schleimigen, übelriechenden Stuhles, oder nach Erbrechen tritt in der Regel Ruhe und allgemeiner Schweiss ein, die Nachtruhe aber kehrt in vielen Fällen für diese Nacht nicht wieder.

Dieser Zustand kann mehrere Tage dauern und sich täglich mehrmals nach kurzen Pausen wiederholen, wobei die Kinder meist fiebern und zum Theil in Folge mangelhafter Ernährung, zum Theil auch wegen des anhaltenden Muskelzuckens im Gesichte sichtlich abmagern, scharfe Gesichtszüge und eine spitze Nase bekommen.

Die schwerere Form, die wirkliche Eclampsia infantum, gibt sich folgendermassen zu erkennen.

Nicht leicht stellen sich die schweren Symptome gleich in ihren ganzen Heftigkeit ein, sondern in den meisten Fällen geht ihrem Ausbruche das oben beschriebene Krankheitsbild voraus, welches sich nach dem vorgeschrittenen Alter der Kinder etwas modificirt. Sonst folgsame, freudliche Kinder werden eigensinnig, unartig, jähzornig, sie bekom-

nen leichte Zuckungen im Schlafe, knirschen auch mit den Zähnen und wachen erschreckt mit ängstlichem Geschrei auf. Die Augen werden dabei nach oben gerollt, die Augenlider sind nicht vollkommen geschlossen, die Mundwinkel zu einem unheimlichen rissartigen Vorragen und das Allgemeinbefinden ist immer etwas gestört. Plötzlich werden die Kinder ebenso im Schlafe als im wachen Zustande von einem Paroxysmus befallen, der für sich allein betrachtet in keiner Weise von einem epileptischen zu unterscheiden ist.

Sie verlieren mit einem Male das Bewusstsein gänzlich, der Blick wird starr, zuweilen stellt sich Schielen ein oder die bulbi rollen unruhig umher. Die Gesichtsmuskeln gerathen in die mannigfachsten Zuckungen, wodurch bald eine lachende, bald eine gröffende Maske entsteht, die durch Entblössung der Zähne selbst etwas thierähnliches annehmen kann. An den Kiefern kommen rasende, schnappende Bewegungen vor, von Zähneknirschen begleitet. Auf eingegessene Flüssigkeiten folgen nur höchst unvollständige Schlüßbewegungen und das meiste wird wieder zum Munde herausgeschoben. Die Convulsionen haben sich fast sämtlicher Muskeln des ganzen Körpers bemächtigt. Die Rückenmuskeln sind tonisch contractirt oder befinden sich in tetanischen Zuckungen, an den Extremitäten kommen schlagende, stossende, drehende Bewegungen vor, die Respiration aber wird sehr unregelmässig und kann durch Krampf der Stimmritze auch vollständig stillen. Es tritt dann auf einige pfeifende Inspirationen plötzlich Stillstand der Athembewegungen, beträchtliche Cyanose und, wenn der Krampf sich nicht in wenigen Minuten löst, der Tod ein. Durch die behinderte Circulation entstehen auch Schleimabsonderungen aus Mund und Nase, der bläuliche Schaum jedoch, der sich gewöhnlich vor den Lippen findet, rührt eher von mechanischen Verletzungen der Zunge oder Mundschleimhaut her, als welchen bei den schnappenden, heisenden Kiefferbewegungen und den mannigfachen Versuchen der Umgebung, dieselben zu verlangsamen, Gelegenheit genug gegeben ist. Der Herzmuskel contractirt sich sehr schnell, jedoch unrythmisch. Stuhl und Urin gehen häufig unwillkürlich ab. Die Hauttemperatur ist am Rumpfe normal, an den Extremitäten aber vermindert, gegen Ende des Anfalles leicht gewöhnlich ein Schweiß aus. Die Sensibilität der Haut ist so vollkommen verloren gegangen, dass man auf keine, auch nicht die schmerzhafteste Weise die Kinder zu Bewusstsein bringen kann und sie sich durch ihre convulsivischen Bewegungen oft verletzen.

Es ist hier eine Beschreibung von Symptomen angegeben, die kaum jemals alle bei einem einzigen Anfalle beobachtet werden, sondern von denen immer einige ausbleiben können, ohne dass deshalb der Anfall ein leichter oder unvollständiger genannt werden müsste.

Die Dauer eines solchen eclamptischen Anfalles währt nur einige Sekunden, höchstens Minuten, Anfälle, die diese Zeit um vieles übersteigen, beruhen auf materiellen, grösseren Veränderungen des Gehirns und sind von der Eclampsie zu trennen. Nach Beendigung der Krämpfe tritt durchaus wieder ein Zustand ein, wie nach einem epileptischen Anfalle. Die Kinder bleiben halb comatos, erschläft, das Fieber nimmt zu, die Augen werden injicirt, Gehirnsymptome treten auf, der Appetit ist verschwunden und Säuglinge nehmen nicht einmal die ihnen gebotene Brust.

Früher, wo man mit der antiphlogistischen Behandlung bei Kindern noch beträchtlich freigebiger war, unterschied man aus therapeutischen Gründen eine Eclampsia cum Hyperaemia und cum Anæmia, bei der ersten liess man zu Ader und setzte nach nachträglich Blutegel, bei der letzteren nicht. Jetzt wo die Blutentziehungen viel weniger in Anwendung kommen, hat diese Unterscheidung nur noch insofern Werth, als wir daraus lernen, dass ebenso gut blasse anämische, wie röthlackige blutreiche Kinder von diesen Convulsionen hefallen werden können.

Theoretisch unterscheidet man ferner 1) idiopathische, d. h. direct vom Gehirn ausgehende und 2) deuteropathische oder sympathische, d. h. von einem anderen erkrankten Organ auf das Gehirn reflectirte Eclampsien. Praktisch ist diese Unterscheidung oft unmöglich und man bleibt selbst nach längerer Beobachtung im Unklaren, mit welcher Art von Eclampsie man es zu thun hatte. Die Section allein kann dieses Dunkel heben.

Aetiology.

1) Die idiopathische Eclampsie kann bedingt sein durch mechanische Compression des Kopfes während der Geburt, durch anatomisch nachweisbare Veränderungen im Gehirn, namentlich Tuberculosa, oder durch direct auf das Gehirn wirkende Nahrungsmittel und Medicamente, Spirituosa und Narkotica, auch durch Sonnenstich. Kinder mit weichem Hinterkopf, dessen genauere Beschreibung bei der Rachitis folgen wird, sind mehr als andere zu Erkranken geneigt, welche auch auf einen directen Gehirnerreiz durch Druck von aussen entstehen können. Geistige Ueberanstrengung wird auch unter den Ursachen angeführt, gehört aber jedenfalls zu den allersehesten, über dürfen noch heftiger Schrecken, grosse Angst und Ausbrüche von Jähzorn erwähnt werden.

2) Die deuteropathische oder sympathische Eclampsie ist bei weitem die häufigere Form, und zwar ist der Darmkanal dasjenige Organ, von welchem aus am häufigsten Reflexkrämpfe auftreten. Die enorme Reizbarkeit desselben bietet in allen Lebensaltern hien reichlich Gelegenheit. Schon gleich in den ersten Tagen nach der Geburt kann Zurückhaltung des Meconiums sie veranlassen, wobei jedoch immer auch an mechanische Beleidigungen des Kopfes während des Geburtsaktes gedacht werden muss.

Eine eigenthümliche, chemisch noch nicht erklärte Veranlassung ist ferner die Milch einer Amme, welche kurz vorher einer heftigen Gemüthsbewegung ausgesetzt gewesen ist. Es sind Fälle constatirt, dass vorher ganz gesunde Kinder nach Genuss einer solchen Milch einige kurze aber heftige Zuckungen bekamen, plötzlich starben und bei der Section durchaus keine anderen Ursachen entdecken liessen. Im Verhältnis zu den ausserordentlich vielen Ausbrüchen von Zorn und anderen Gemüthsbewegungen, die grössten Theils in der ungewohnten socialen Stellung der Amme ihren Grund haben, sind diese Fälle jedoch so selten, dass man sie nicht mit Unrecht ganz bezweifeln hat. Nicht zu bezweifeln hingegen sind die durch die künstliche Ernährung gegebenen Schädlckkeiten, wodurch alsbald Darmcatarrhe und in deren Gefolge heftigere und schwerere Hirnreize eintreten müssen.

Am intensivsten werden dieselben zur Zeit des Entwöhrens beobachtet. Solche Kinder leiden zuerst an Flatulenz und Colik, bekommen dann nachlassende Diarrhöe von grüner Farbe, schreien, werden sehr unruhig, fiebern und auch und nach stoßen sich Convulsionen ein. In anderen Fällen geht gar keine Diarrhöe, sondern im Gegentheil Verstopfung und Appetitmangel voraus. Bei älteren Kindern sind namentlich Indigestionen und Wurmrreiz anzufohren.

Eine weitere, wohl zu beachtende Ursache findet sich im Durchbruch der Zähne. Allerdings ist dieser Process in der Regel mit Verdauungsstörungen complicirt und könnten auch diese als nächstes Moment für die Convulsionen angegeben werden. Allein es gibt auch Fälle, wo die Verdauung ganz normal bleibt und durch die Entzündung der Mundschleimhaut allein die Reflexkrämpfe erklärt werden müssen. Zur Einrennung dieser Form müssen die Kinder in einer der zwei Zahnperioden sich befinden, die Mundhöhle ist dabei roth und heiss, die Schleimsecretion ist oft geringer als bei der normalen Zahnung, die eine oder andere Wange ist dunkel geröthet, die Kinder sind sehr unruhig und beißen auf alles, was sie in den Mund bekommen, auch in die Brustwarzen der Amme. Es gehören die durch Zahnreiz entstandenen Eclampsien zu den schweren Formen, welche oft partielle Lähmungen oder Blödsinn zurücklassen.

Eine dritte Hauptveranlassung der Convulsionen findet sich im Ausbruch einer acuten, fieberhaften Krankheit, namentlich eines acuten Exanthemes, wobei die Krämpfe der Kinder als ein Auszug des Fieberfrostes Erwachsener erscheinen. Diese Eclampsien sind mit der geringsten Gefahr verbunden, von kurzer Dauer und kaum jemals von schädlichen Consequenzen. Man kann diese Ursachen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit vermuthen, wenn Anschlagkrankheiten, welche das betreffende Kind noch nicht durchgemacht hat, eben epidemisch herrschen und die Vorboten eines solchen Exanthemes sich eingestellt haben. Es gehören hieher für die Masern: Husten, Niesen, Thränen der Augen, für Scharlach: Angina mit Schlagbeschwerden, für die Blattern: vorherrückender Kreuz- und Kopfschmerz und heftiges Fieber. Häufig aber sind gar keine Vorboten vorhanden, und man kann erst durch den Verlauf erkennen, wodurch die Eclampsie bedingt worden ist. Ausser den acuten Exanthemen sind noch unter den acuten Krankheiten zu erwähnen die Pneumonie, das Weichselieber, die Fieber in Folge von Verwundungen und Operationen und die einfachen Anginen. Ich behandelte einen Knaben, dessen Mutter von schwächlicher Constitution ist und viel an Cephalalgien leidet, jährlich 2–3 Mal an heftiger Angina, wobei sich regelmässig am ersten Tag der Erkrankung ein von Epilepsie nicht zu unterscheidender, eclamptischer Anfall einstellte. Ich extirpirte endlich beide Mandeln und die Eclampsie, oder nach der Meinung der tief bekümmerten Eltern die Epilepsie, ist nun seit zwei Jahren niemals wiedergekehrt.

Endlich sind in der Literatur, namentlich der älteren, auch Fälle verzeichnet, wo nach rascher Heilung stark nässender Anschläge Eclampsien entstanden sein soll. Bei der Behandlung des Hydrocephalus acutus wurde schon auf den Zusammenhang zwischen dieser Krankheit und nässenden Kopfschlägen aufmerksam gemacht, und es ist nicht zu ängsten, dass bei schnell heilender innerer

Eiterungen die inneren Organe, somit auch das Gehirn, in die Gefahr einer Entzündung kommen. Andererseits muss aber freilich auch anerkannt werden, dass viele Hunderte von Impetigo theils spontan, theils durch austrocknende Mittel schnell abheilen und die Kinder nach wie vor vollkommen gesund bleiben.

Die Erbllichkeit spielt eine gewisse Rolle bei der Ätiologie dieser Krankheit. In der Regel haben auch die Eltern schon an Convulsionen gelitten und die Mütter namentlich sind meist hysterisch und leiden an mannigfachen Hyperästhesien. Bouchut erzählt von einer Familie von zehn Personen, welche sämmtlich in ihrer Jugend an Convulsionen gelitten hatten. Ein Mädchen dieser Familie heirathete, gebar zehn Kinder und neun dieser Kinder wurden ebenfalls von Eclampsie befallen.

Verlauf, Ausgänge und Prognose.

Die partiellen Muskelcontraktionen, die selten sog. Fraisen, können viele Tage lang während einer acuten Krankheit fortbestehen, ohne dass deshalb die Gefahr des Uebels an sich besonders vermehrt würde. Die wirklichen Eclampsien aber sind meist mit einem einzigen Anfall besetzt. Dieser einzige Anfall kann schon tödtlich sein, oder es entwickelt sich am folgenden Tage der ihn veranlassende Krankheitsprocess weiter und damit ist die Gelegenheit zu wiederholten sympathischen Eclampsien abgeschnitten. Die durch gastrische Reize bedingten werden durch Erbrechen, durch Abgang von Blähungen oder diarrhöischen Stühlen gehoben, die auf Blutinfection beruhenden kehren niemals wieder, sobald die acuten Exantheme, Scharlach, Blattern, Masern, einmal zum Ausbruch gekommen sind.

Wie schon früher bemerkt, sind diese Arten von sympathischen Convulsionen selten tödtlich, lassen aber immer vermuten, dass die darauffolgende Krankheit stark entwickelt und mit stürmischen Symptomen verlaufen werde. Im Allgemeinen kann der Satz gelten: Je jünger das Kind, um so bedenklicher die Prognose.

Nach meinen Erfahrungen bieten, mit Anschluss der auf wirklichen Gehirnkrankheiten beruhenden Convulsionen, welche fast immer zum Tode führen, die Convulsionen bedingt durch Zahnung und gleichzeitiges Darmliden die schlimmste Prognose. Solche Kinder sterben entweder an einem der Anfälle oder sie bekommen die Symptome von Hydrocephaloid und gehen auf diese Weise zu Grunde oder es bleiben endlich bedeutende Residuen davon im Nervensystem zurück. Fast alle sehenden Kinder, bei denen der Strabismus nicht auf sichtbare Felder der Cornea und der Linse zurückgeführt werden kann, haben in den ersten Lebensjahren an Eclampsie gelitten. Ausserdem können Verlust der Sinnesorgane, Amaurose oder Taubheit, Blödsinn in verschiedenem Grade, Hydrocephalus chronicus und allgemeine oder partielle Muskelähmung die Folge dieser traurigen Krankheit werden.

Therapie.

Man hat hier vor allem zwischen den partiellen Muskelzuckungen (den eigentlichen Fraisen) und den allgemeinen, epileptischen Convulsionen (der wahren Eclampsia infantum) zu unterscheiden. Ausserdem modificirt sich die Behandlung namentlich nach dem Alter

und dem Kräftezustand der Kinder, und es ist hier dringend indiciert, durch ein genaues Examen den wahren Ursachen auf die Spur zu kommen. Man darf sich dabei nicht lediglich auf die Angaben der Umgebung verlassen, sondern muss selbst die ganze Körperoberfläche der Kinder untersuchen. Ein Splinter in der Fußsohle, zwischen den Zehen, ein fremder Körper in der Nasenhöhle, im äusseren Gehörgang können auch die Veranlassung sein und durch deren Entfernung kann eine wunderbar schnelle Heilung bewirkt werden.

Beim Anfälle selbst kann der Arzt nur in den seltensten Fällen direkt thätig sein, indem bis zu seiner Ankunft fast regelmässig schon alle Convulsionen beendet sind, er muss sich deshalb darauf beschränken, der Umgebung fädeliche Instruktionen für den Wiederholungsfall zu geben. Das erste ist immer, dass man die Kinder so schnell als möglich entkleidet, damit durch einschneidende Bänder und Röschen nicht auch noch die Respiration und Circulation beeinträchtigt werde. Dann legt man die Kinder mit etwas erhöhtem Kopfe auf ein grosses Bett, oder, wenn die Convulsionen so heftig sind, dass man Beschädigung der Extremitäten durch die Bettlaken und Herabfallen der Kinder befürchten muss, auf den Boden. Dass solche Kinder keinen Augenblick allein gelassen werden dürfen, versteht sich von selbst. Durch Bespitzen des Gesichtes und der entblössten Brust mit kaltem Wasser gelingt es häufig, tiefe, kramphafte Inspirationen zu bewirken, wodurch wenigstens die Gefahr der Erstickung gemindert wird; eine andere auffallend abkürzende Wirkung erreicht man durch Bespitzungen oder Begiessungen mit kaltem Wasser gewöhnlich nicht.

Eine Ventosection, welche von einzelnen Therapeuten vorgeschlagen worden ist, lässt sich, abgesehen von allen übrigen dagegen sprechenden Gründen, schon desshalb während des Anfalles nicht machen, weil durch die Zuckungen des Armes der Einstich sehr unsicher würde und auch gelingener Eröffnung der Vene durch oben dieselben jedenfalls reglicher Verschiebung der Hautwunde und somit Stillstand der Blutung eintreten müsste. Zu erwähnen ist noch die von Grantham vorgeschlagene gleichmässige Einschnürung des Schädels bei Kindern, deren Fontanelle noch nicht geschlossen ist. Ich habe dieses Bandagiren des behaarten Schädels schon zweimal, in beiden Fällen ohne Erfolg, versucht und bei längerem Gebrauche der Binde, welcher nach von diesem Autor als Prophylacticum empfohlen wird, eine solche Ursache entstehen sehen, dass die Binde nach wenigen Tagen entfernt werden musste.

Was nun nach überstandnem Anfälle die ärztliche Wirksamkeit betrifft, so ergiebt sich dieselbe zunächst in ableitenden Mitteln. Man legt Senfteige oder bei ganz kleinen Kindern Sauerkeige auf die Waden oder reibt diese Theile mit Senfspiritus, wodurch fast monoton eine tiefe Röthung der geriebenen Stellen erzielt wird. Wenn irgend ein Verdacht auf gastrische Reizung vorhanden, so muss auch eine Ableitung auf den Darканал veranstaltet werden. Dieselbe ist nur zu unterlassen bei Kindern, welche schon vor und während des Anfalles Diarrhöe und Abgang von Blähungen hatten. Grösseren Kindern, die noch kurz vor dem Anfälle beträchtliche Mengen von Nahrungsmitteln zu sich genommen, giebt man am besten ein gehöriges Brechmittel aus 0.00 Tartar. stibiat. gelöst in einem starken Ipecacuanhaufus, wodurch

alsbald stündlicher Mageninhalt entleert wird. Wo aber keine bedeutende Magenüberfüllung und Indigestion zu ermitteln ist, da ist das Calomel dem Brechnmittel vorzuziehen. Man gibt den Kindern stündlich 0.03—0.06 Calomel so lange fort, bis einige Ausleerungen erfolgt sind. Ist Obstruction die mathematische Ursache der Eclampsie, so kann man schon während des Anfalles ein Clystier mit Salzwasser setzen. Zum Creosöl war ich noch nie zu greifen gezwungen.

Unter den Antiquarimodis ist das Zinkoxyd das beliebteste, gebräuchlichste Mittel und zur länger fortgesetzten Darreichung von 0.05 bis 0.10 pro die geeignet; über den Nutzen solcher Prophylactica lässt sich schwer ein Gutachten abgeben, indem eben überhaupt in den meisten Fällen nur Ein eclamptischer Anfall erfolgt. Die Narcotica sind hier nicht indicirt, weil sie, während des Anfalles gereicht, nicht schnell genug zur Wirkung kommen und auch den Anfällen dadurch Gehirncongestionem verursachen werden.

Als Nachkur können, hauptsächlich nach Eclampsien in Folge von gastrischem und Zahneiz, Tanica, Eisen, China, Wein, Bier indicirt sein.

2) Lähmung. Paralysis.

Nachdem schon bei den Krankheiten des Gehirns und Rückenmarkes mehrfach der dadurch verursachten centralen Lähmungen gedacht wurde, erübrigt hier nur mehr, die sog. essentielle Lähmung einer oder einiger Extremitäten bei vollkommener Integrität der Nervencentra, und die ebenfalls periphere Lähmung des Nervus facialis zu besprechen.

II FACIALISLÄHMUNG.

Was die Facialislähmung betrifft, so kommt dieselbe zumeist unmittelbar nach der Geburt zur Beobachtung, ist aber bei der Unbeweglichkeit der Gesichtsmuskeln der Neugeborenen hier schwerer zu erkennen als bei Erwachsenen. Auffallend wird die Veränderung nur, wenn das Kind anhebt zu schreien, wodurch der Mundwinkel der gesunden Seite nach aussen gezogen und überhaupt die ganze gesunde Gesichtshälfte fähig wird, während die Unbeweglichkeit der gelähmten Hälfte vor wie nach derselbe bleibt. Ist der Grund der Lähmung ein centraler, so wird man auch die Uvula schief stehend finden, da die Veranlassung aber gewöhnlich im Verlaufe des N. facialis liegt, so ist auch meistens keine Veränderung am Gaumensegel und Zäpfchen wahrzunehmen. Für die Lähmungen der Neugeborenen liegt die häufigste Ursache in der Geburtswunde; dann kommt auch noch eine angeborene Kleinheit und Verkümmung des Felsenbeins vor. Später sind Caries dieses Knochens, Drüsenanschwellungen oder zerrissene Narben in der Nähe des Facialis die gewöhnlichsten Veranlassungen.

Die Therapie der Facialislähmung richtet sich nach deren Ursache und hat nur dann Erfolg, wenn die Entfernung derselben möglich ist. Entfernen kann man zerrissene Narben, die meist von aërophobischen Geschwüren herrühren, und Drüsenanschwellungen, hingegen ist die Lähmung in Folge von Caries des Felsenbeins in der Regel eine für das ganze Leben bleibende.

b) Essentielle Lähmung. Spinale Kinderlähmung.

Die sog. essentielle Lähmung wurde zuerst von Underwood in London beschrieben und ist im Laufe der letzten Jahrzehnte, namentlich unter dem Einflusse der Elektrotherapie, ein Lieblingsstemma der Nervenpathologen geworden.

Man versteht hierunter eine Lähmung, welche gewöhnlich keinen ausgesprochen centralen Charakter hat, und weder auf das Gehirn als Hemiplegie, noch auf das Rückenmark als Paraplegie bezogen werden kann, indem meist nur eine Extremität oder gar nur einzelne Muskelgruppen desselben befallen werden. Durch die Bezeichnung „essentiell“ soll das Fehlen des Nachweises eines centralen Leidens angedeutet werden.

Da die Krankheit niemals direkt tödlich ist, so sind auch die Sectionsergebnisse sehr vereinfacht. Nach A. Eslenburg haben einige Autoren in den Centralorganen des Nervensystems gar nichts Pathologisches gefunden, andere sprechen wohl von Verdickung der Gehirnhäute, Sklerose oder Tuberculose des Rückenmarkes, jedenfalls aber sind keine einheitlichen charakteristischen anatomischen Zeichen bis jetzt erwiesen. Dass die anatomischen Prozesse, wenn solche überhaupt vorhanden, sehr wandelbar und rückbildungsfähig sein müssen, geht schon aus der häufig beobachteten raschen Genesung im Verlaufe weniger Tage hervor.

Symptome.

Fast ausschließlich befällt diese Lähmung Kinder, welche sich im Dentitionsalter von $\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ Jahren befinden. Häufig gehen einige Tage Fieber und Convulsionen voraus, doch sind nur auch Beispiele bekannt, wo Kinder sich Abends gesund und munter Einlegten, Nachts unruhiger als gewöhnlich schliefen und am andern Morgen schon die vollständig entwickelte Lähmung hatten. Ein Arm oder ein Bein hängt entweder vollständig schlaff herunter, oder es sind nur einzelne Muskelgruppen, meistens die Schultermuskeln oder die des Unterschenkels, oft allein die Mm. peronei gelähmt und sodann nur einzelne Bewegungen gebannt. Manchmal erstreckt sich die Lähmung in den ersten Tagen auf die Gesamtmuskulatur aller Extremitäten, verschwindet aber bald an den meisten Partien und bleibt nur für einzelne Gruppen Zeit Lebens stationär. Am häufigsten werden ergriffen: die Muskeln des Unterschenkels und unter diesen wieder die vom M. peroneus versorgten, am Arme der Deltamuskeln und die Extensoren der Hand. Der Arm hängt dann schlaff herab und fällt, eingezogen, sofort wieder nieder. Sind nur die Oberarmmuskeln gelähmt, so sind die Kinder wohl noch im Stande, mit der Hand etwas zu fassen, aber nicht es zum Munde zu führen. Größere Kinder geben sich viel Mühe, das Glied dennoch zu gebrauchen und helfen mit dem gesunden Arme dem kranken nach. Die einzige Formveränderung, die schon gleich zu Anfang bemerkbar wird, ist eine Abdachung der äußeren Contur der Schulter, welche durch die Lähmung des Deltamuskels und die eigene Schwere des herabhängenden Armes bedingt wird.

Die essentielle Lähmung einer unteren Extremität erstreckt sich selten über alle Muskeln des Fusses, trifft oft nur die des Unterschenkels und von diesen nicht immer alle, wodurch der Fuss vorwiegend nach ein- oder auswärts sich stellt. Die Erkennung dieses Uebels ist ausserordentlich leicht: kleine Kinder, welche noch nicht stehen können, lassen beim Schreien das gelähmte Bein flach liegen, während sie das andere an den Leib ansetzen; wenn sie sitzen und die Unterschenkel über den Stuhl herabhängen lassen, so hängen der gelähmte willenlos herunter; konnten sie aber schon gehen, so machen sie gar keine Gehversuche mehr, oder schleifen nur bei partieller Lähmung einzelner Muskeln den Fuss nach und versuchen wohl auch, auf dem gesunden Fusse allein zu humpeln.

Sind beide Füsse befallen, so bleiben sie unbeweglich im Bette liegen, lernen jedoch bald sitzen und die wieder erwachende Funktionsfähigkeit geht von oben nach unten, so dass zuerst der Oberschenkel, dann der Unterschenkel und endlich der Fuss bewegt werden können. Eigenthümlich ist, dass niemals die Blase noch der Mastdarm gelähmt werden, was bei anatomischen Gesehensveränderungen des Rückenmarkes doch sonst gewöhnlich der Fall ist.

Muskeln, welche nicht in wenigen Tagen, längstens 3—4 Wochen, ihre Thätigkeit wieder erlangt haben, bleiben für immer gelähmt. Die Lähmung der Arme geht häufiger und rascher in Genesung über als die der Beine, in deren Muskulatur sich bald bedeutende Ernährungsstörungen, Verfettung und Schwund, geltend machen.

Charakteristisch für die Kinderlähmung ist, dass die Sensibilität der entsprechenden Haut niemals gestört ist, und dass auch die Reflex-erregbarkeit unverändert bleibt. Gegen Electricität verhalten sich die ergriffenen Muskeln Anfangs ganz unverändert, mit dem Beginn der Muskelatrophie aber nimmt natürlich die elektro-muskuläre Contractilität für den Induktionsstrom mehr und mehr ab. Nach wenigen Monaten ist dieselbe meist vollständig verschwunden, während die galvanische Contractilität, wenn auch nur mehr träge, noch erregt werden kann. Nach längstens einem Jahre ist die Erregbarkeit für beide Stromarten total und auf Lebensdauer erloschen. Die trophischen Störungen nehmen sichtlich überhand, die Fettpolster des betroffenen Gliedes schwinden und die Temperatur sinkt. Durch den Schwund der Fettpolster und der Muskulatur, verbunden mit dem Zuge, welche die Glieder durch ihre eigene Schwere auf die Gelenkkapseln ausüben, treten die Vorsprünge der Knochen und Gelenke mehr und mehr hervor und liefern schliesslich das Bild der sog. atonischen Luxation. Selbst die Knochen bleiben in ihrem Längswachsthum etwas zurück, doch erreicht diese Verkürzung niemals einen hohen Grad, so dass endlich bei dem Erwachsenen der Unterschied zwischen der gelähmten und normalen Extremität kaum 1—2 Ctm. beträgt.

Die Deformitäten, welche die essentielle Lähmung im Gefolge hat, sind natürlich sehr mannigfaltig. Die gewöhnlichsten sind: Pes varus oder varo-equinus, seltener valgus und calcaneo valgus, an den oberen Extremitäten permanente Contractur der Hand und Finger, am Rumpfe Verkrümmungen der Wirbelsäule, Abstehen der Scapula und Caput obstipum.

Ätiologie.

Der Anschauung von Müller und Bartholin, welche zuerst die Bezeichnung „essentiell“ gegeben haben, wurde von Heine die spinale Kinderlähmung entgegengestellt. Heine nimmt eine anatomische Grundlage und zwar einen entzündlichen Process in Rückenmark und seinen Häuten an, welcher allerdings bis auf den heutigen Tag noch nicht erwiesen ist. Vogt und Duchenne schlossen sich dieser Anschauung an. Wenn nun auch nicht geleugnet werden kann, dass der häufige Beginn des Leidens mit allgemeinen Symptomen und Convulsionen, das tödtliche Auftreten derselben, ihre anfängliche Ausdehnung und spätere Beschränkung auf einzelne Muskelgruppen eine centrale Entstehung sehr wahrscheinlich machen, so ist jedenfalls die Bezeichnung „spinal“ nicht gerechtfertigt, indem die vorausgehenden Convulsionen und Coma ebenso gut auf das Gehirn als auf das Rückenmark bezogen werden können. Nicht man ja häufig genug bei Herderkrankungen des Gehirns, z. B. Neoplasmen und Schrosen, lange Zeit nichts als partielle Paresen einzelner Muskelgruppen.

Die essentielle Lähmung ist eine Krankheit des ersten Kindesalters und hängt entschieden mit dem Zahnburchbruche zusammen. Nach vollendeter erster Dentition tritt das Uebel nur ausserst selten mehr auf. Nach meinen Erfahrungen erkranken mehr Knaben als Mädchen daran, was jedoch auch Zufall sein kann, indem die neueren Autoren dieses Missverhältnisse nicht betonen.

Die Constitution scheint ohne Einfluss zu sein, denn die meisten davon ergriffenen Kinder sind bisher kräftig gediehen, und wenn scrophulöse von der Krankheit nicht verschont werden, so geht bei der Häufigkeit dieser Dyskrasie daraus noch lange nicht hervor, dass dieselbe eine besondere Disposition abgibt. Die einzigen ziemlich constanten Vorboten sind Gehirncongestion und Verstopfung während des Zahnens. Unter den Gelegenheitsursachen wird mit besonderer Vorliebe stets der Erkältung gedacht, übrigens immer nur ein und derselbe Fall citirt, nämlich der eines Kindes, welches auf einem kalten Stein gesessen und hierauf Lähmung eines Fusses bekommen habe. Viele tausend andere Kinder, welche ohne nachfolgende Lähmung auch auf kalten Steinen gesessen hatten, müssen bei dieser Gelegenheitsursache natürlich mit Stillschweigen übergangen werden.

Prognose.

In den ersten Tagen ist es unmöglich, sich bestimmter auszusprechen, indem einerseits ausgedehnte Lähmungen mit schweren Anfangssymptomen rasch heilen, andererseits circumscribte Lähmungen Zeit Lebens bestehen können. Erst nach 1—2 Wochen entscheidet es sich, ob die Lähmung den gutartigen, transitorischen oder der bösartigen, permanenten Charakter annimmt. Reagiren die Muskeln auf faradische und galvanische Reizung nicht mehr, und beginnt ihre Ernährung zu leiden, so kann mit Bestimmtheit die Lähmung für unheilbar erklärt werden.

Was die Beschwerden des einzelnen Kranken betrifft, so richtet sich die Prognose sehr nach dem Sitze der Lähmung. Die Differenzität der Glieder wird durch Lähmung einzelner Muskelgruppen und den

dadurch aufgehobenen Antagonismus ist grösser als durch Lähmung ganzer Extremitäten. Am Arme gestattet die Lähmung der Schultermuskeln noch einen ergiebigen Gebrauch der Hand, während die Paralyse der Vorderarmbeuger und Daumenmuskel die ganze Extremität unbrauchbar macht.

Therapie.

Man hat, wie fast bei allen krankhaften Veränderungen, auch gegen die Lähmung die Antiphlogose, örtliche Blutentziehungen und graue Salbe versucht, ohne dass dadurch eine schnellere Besserung als durch expectative Behandlung erzielt werden wäre. Ebenso verhält es sich mit den Purgirmitteln und überhaupt mit allen andern hier empfohlenen Medicamenten. Viele dieser Mittel haben begeisterte Lobredner, weil eben die meisten essentiellen Lähmungen überhaupt in einer oder einigen Wochen verschwinden, gleichviel ob und welche Mittel gebraucht wurden. Da aber einzelne essentielle Paralyse, über deren Prognose kein Zweifel besteht, jeder Behandlungsweise, auch der mit Electricität, widerstehen, so kann natürlich von einer specifischen Wirkung der empfohlenen Mittel nie die Rede sein.

Das rationellste und einfachste scheinen für die ersten Wochen der Lähmung die ständige Application einer kalten Douche, dann Warmhalten des gelähmten Gliedes, häufige passive Bewegungen und spirituose Einreibungen zu sein. Mit dieser Behandlung allein heilen schon viele essentiellen Paralyse. Stellt sich auch längstens vier Wochen keine Beweglichkeit ein, so ist es zu der Zeit, durch inducirte Electricität, welche täglich einmal 5–10 Minuten lang angewendet wird, der consecutiven Atrophie der Muskeln vorzubeugen.

Wenn wieder nach einigen Wochen keine Besserung erreicht worden ist, so geht man über zum innerlichen Gebrauche des schwefelsauren Strychnins 0,003–0,01 pro die, welches der Tinct. muris vinicae wegen deren wechselnden Strychningehaltes vorzuziehen ist. Man muss mit dem Strychnin sehr vorsichtig zu Werke gehen, die Angehörigen belehren über seine Giftigkeit, und ihnen Verhaltensmassregeln geben, wenn plötzlich heftige, tetanische Anfälle sich einstellen sollten. Das beste ist in dieser Beziehung eine rasche kalte Begiessung und die Darreichung von schwarzem, starkem Kaffee.

Verkürzten Extremitäten muss ihre normale Form durch orthopädische Behandlung wieder verschafft werden, und gegen die unheilbaren Paralyse kann ebenfalls die mechanische Orthopädie mit ihren mannigfach sinnreichen Apparaten in Anwendung kommen.

3) Chorea minor. Der kleine oder englische Veitstanz, Muskelunruhe, unwillkürliche Muskelbewegung, Ballismus, Scola-tyrie. (zappeln Tanzen, Hüpfen.)

Die beste Beschreibung des kleinen Veitstanzes gibt HALLER in seinen Krankheiten des Nervensystems (Virchow's Pathologie und Therapie), welche bei der nun folgenden Charakteristik auch mehrfach benutzt wurde.

Unter Chorea minor versteht man fortwährende unwillkürliche Bewegungen fast aller animaler Muskeln, welche durch die vom Willen

intendirten Bewegungen an Heftigkeit zunehmen, und nur bei aufgehobenem Bewusstsein, im Schlafe anlösen. Sie unterscheidet sich genau dieser Definition hinlänglich, von anderen früher damit zusammengeworfenen Zuständen, dem grossen Veitstanz, der Tancreath, den imitatorischen Volkskrankheiten und der Tarantelkrankheit.

Symptome.

Die anhaltenden unwillkürlichen Bewegungen zeigen sich entweder an allen animalen Muskeln des ganzen Körpers oder nur an einzelner Körpertheilen, an der oberen Körperhälfte oder halbseitig auf einem Arm und das entsprechende Bein beschränkt, wodurch unwillkürliche Bewegungen zu Stande kommen, oder es sind in ganz seltenen Fällen der eine Arm und das entgegengesetzte Bein von der Muskelruhe ergriffen. Auch erkranken nicht immer alle Extremitäten gleichmässig stark; während der eine Arm keine Secunde zur Ruhe kommt und fortwährend grosse Zuckungen macht, kann der andere sehr wohl Minuten lang ruhig gehalten und nur durch kleine, kaum sichtbare Muskelcontractionen gepflegt werden. Derselbe Ungleichheit der Erkrankung wird auch an den unteren Extremitäten beobachtet. Die Muskeln des Gesichtes können möglicher Weise auch gänzlich verschont bleiben, während die Extremitäten in fortwährender Unruhe sich befinden.

Was von die einzelnen Zuckungen betrifft, so sind in der Regel am augenfälligsten die der oberen Extremitäten. An den Armen bemerkt man die sonderbarsten Verdrehungen und Zuckungen, die Schultern werden ruckend in die Höhe geschoben, als wenn die Kinder sich daran jucken wollten, die Finger werden bald geschlossen, bald auseinander gespreizt oder zupfen fortwährend an den Kleidungsstücken. Die Füsse können keine Secunde ruhig bleiben, denn durch die verschiedenen unwillkürlichen Contractionen entsteht ein anhaltendes Getrippel. Wenn die Kinder liegen, so spreizen sie wohl auch die Zehen auseinander und bekommen Contractionen im Kniegelenke. Der Gang wird unsicher, stolpernd, in den höchsten Grade selbst ganz unmöglich; wenn das eine Glied stärker betroffen ist als das andere, auch nachschleppend. Am Kopfe können die eigenenthümlichsten Bewegungen zu Stande. Er wird gedreht, geschüttelt, bald auf die eine, bald auf die andere Seite krampfhaft hingezogen. Die Contractionen der Gesichtsmuskeln verursachen das sonderbarste Mimenspiel, welches zu Fratzenhaften Verzerrungen ansetzen kann. Die Augen glänzen oder es stellt sich vorübergehender Strabismus ein. Die Augenlider blinzeln gewöhnlich.

Auch die Kau- und Schlundmuskeln werden von der Unruhe ergriffen, die Kinder beißen sich während des Kauens auf die Zunge oder in die Wangenschleimhaut; wenn der Mund leer ist, kommt es sogar zum Zähneknirschen. Das Schlucken geht nicht immer nach Wunsch von Statten und sich die Zunge entzieht sich dem freien Willen, weshalb die Kinder oft stammelnd, mitten in der Rede stecken bleiben, und sich so oft auf die Zunge beißen. Der Rumpf wird auch allen Seiten hin gedreht und gewendet. Die Respirationsmuskeln betheiligen sich nicht auffallend an der Unruhe, wenigstens gehen die Inspirationen nicht unregelmässig von Statten.

Es entstehen hiernach natürlich mannigfache Störungen der willkürlich vorzunehmenden Bewegungen, zumal die letzteren eine sichtlich Steigerung der unwillkürlichen veranlassen. Die Kinder können nicht mehr ordentlich essen, sie bekommen, während sie den Löffel zum Munde führen wollen, eine Zuckung und beschütten sich, oder stecken sich, wenn man ihnen unvorsichtiger Weise eine Gabel gestattet, wohl gar in das Gesicht. Beim Schreiben machen sie plötzlich lange Haken auf das Papier oder stossen die Feder so gewaltsam auf, dass sie mehrere Blätter des Schreibheftes durchstechen. Wenn sie ihre Kleider ausziehen wollen, so entstehen in Folge der hierzu notwendigen grösseren willkürlichen Bewegungen so heftige Zuckungen, dass die Kleider zerrissen werden. Sobald man die Kinder ermahnt, doch etwas ruhig zu stehen, so wird das Getrippel bei den aufrichtigsten Bemühungen, dieser Ermahnung Folge zu leisten, nur noch viel stärker. Auf das Gebiss, die Zunge ruhig herauszustrecken, wird dasselbe unter eigen thümlichen queren Bewegungen herausgerollt und kann in keinem Falle längere Zeit ruhig vorgestreckt bleiben.

Noch mehr als durch eigenmächtig unternommene, willkürliche Bewegungen wird die Unruhe gesteigert, wenn man die erkrankten Theile festzuhalten versucht. Es kann hiernach selbst eine anhaltende Verschlimmerung des ganzen Zustandes verursacht werden.

Die Sensibilität der Haut ist bei der Chorea nicht vermindert, und auf Hautreize, wie Stichen, Kratzen, Brennen etc. stellen sich die gewöhnlichen Reflexbewegungen ein. Auch Husten, Niesen und Gähnen geht ungehindert von Station und auf die Entfernung des Stuhles und Urinaes. Nicht die Krankheit gleichfalls ohne Einfluss. Sehr eigenthümlich ist, dass die Kinder auch in den heftigsten Fällen, wo sie den ganzen Tag über in grösster Unruhe sich befinden, niemals über Ermüdung klagen, und dass die Contraktionen desshalb auch am Abend durchaus nicht schwächer, oft sogar stärker werden. Constante Zeichen einer Erkrankung der Centralorgane sind nicht zu entdecken, auch das von Stiebel angegebene Zeichen, dass fast immer die eine oder andere Stelle der Wirbelsäule auf Druck schmerzhaft sein solle, hat sich keineswegs bestätigt.

Off ändert sich bei Chorea kranken die Gemüthsstimmung, sie werden weinerlich, jähzornig, und früher freundliche, gutmüthige Kinder bekommen hochafte, schadenfrohe Launen. Bei längerem Dauer erweist auch das Gedächtniss etwas ab. So mannigfach auch und sehr bemerkbar diese Symptome im wachen Zustande sein mögen, im Schlafe sind sie insgesamt wie abgeschnitten. Wenn die Kinder Abends schlafig werden und sich legen, nehmen die Zuckungen mehr und mehr ab und hören vollständig auf, sobald das Bewusstsein verschwunden ist. Der Schlaf ist gewöhnlich weniger ruhig als bei gesunden Kindern, bei schweren Träumen werden sogar einzelne leichte Choreaebewegungen gemacht, mit dem Erwachen aber stellen sich sofort die sämtlichen Symptome in ihrer früheren Stärke wieder ein.

Die Chorea ist eine durchaus fieberlose Krankheit und verläuft ohne sichtliche Störung des Allgemeinbefindens, man hat im Gegentheile bemerkt, dass durch eine intercurrende acute Krankheit, z. B. ein zartes Exanthem, die Anfälle entschieden schwächer wurden und abhald bleibende Besserung und rasch vollkommene Heilung eintrat. Der Puls

ist bei der einfachen Chorea weder beschleunigt noch unregelmäßig, die dem widersprechenden Angaben einzelner Autoren beruhen wahrscheinlich auf der Schwierigkeit, den Radialpuls während des anhaltenden Schenklähmens zu fixiren. Auscultirt man aber fleissig das Herz, so wird man sich stets überzeugen, dass Rhythmus und Frequenz der Herzscontractionen normal bleiben.

Bei längerer Dauer bildet sich bald da die Ernährung etwas, die Kinder werden mager und mager, und es machen sich namentlich bei älteren Mädchen anämische Herzgeräusche und überhaupt chlorotische Symptome geltend.

Der Verlauf ist immer ein chronischer, und kann niemals bei einer gehörig ausgeheilten Chorea vor 2—3 Monaten, andere dauern ein halbes, selbst ein ganzes Jahr und Romburg erzählt sogar von einer 76jähr. Frau, die seit ihrem sechsten Jahre, also gerade 70 Jahre lang, an Chorea litt und wohl mit in's Grab genommen haben wird. Man spricht auch hier von Stadien: 1) Stadium der Vorläufer, 2) der Zunahme, 3) der Höhe und 4) der Abnahme. Doch haben dergleichen Stadieneintheilungen in Krankheiten, bei denen die Uebergänge so allmählig und nicht unter bestimmten Symptomen sich einstellen, nur unbedeutenden Werth. Der Anfang ist in allen Fällen allmählig. Die Kinder werden auffallend ungeschickt, lassen viel fallen, zerbrechen fast alles, was man ihnen in die Hand gibt, stolpern häufig und werden durch die harte Behandlung, die sie deshalb erfahren müssen, sehr angeekelt und eingeschüchtert. Gewöhnlich nach einer Gemüthsanregung, Schreck, Zorn, Furcht etc. stellen sich die ersten unwillkürlichen Bewegungen zuerst nur an einzelnen kleineren Muskelgruppen ein, verallgemeinern sich aber ziemlich rasch, so dass nach 2—3 Wochen die Höhe der Krankheit erreicht ist. Auf dieser Höhe können die Symptome mindestens 4—6 Wochen stehen, ohne im geringsten zu noch abzunehmen, worauf endlich eine ganz unmerkliche, schleichende Besserung eintritt. Recidive sind häufig. Sós zählte unter 158 Fällen deren 37. Schließlich aber tritt doch fast immer vollständige Genesung ein, nur sehr ausnahmsweise bleiben Jahre lang oder das ganze Leben hindurch Zuckungen einzelner Muskelgruppen, namentlich des Gesichts zurück. Wicke und Landolt beschreiben auch einzelne Todesfälle. Die Krankheit steigerte sich rasch zu dem höchsten Grade, worauf dann alsbald Coma, unwillkürlicher Abgang von Stuhl und Urin, Collapse, unregelmässige Respiration, kleiner Puls, tiefe Bewusstlosigkeit und der Tod eintrat.

Aetiologie.

Die Chorea ist fast ausschliesslich eine Kinderkrankheit, und wenn Erwachsene an derselben leiden, so haben sie dieselbe doch immer in der Jugend schon acquirit. Sie befällt die Kinder am häufigsten zwischen dem 6.—15. Jahre, weshalb man ihren Ursprung bald in der zweiten Zahmung, bald in der bevorstehenden Pubertät gesucht hat. Wenn diese Prozesse auch eine Disposition dazu abgeben mögen, so ist doch ihr Zusammenhang mit Chorea kein sehr enger, indem dieselbe sehr häufig wieder aufhört, ohne dass ein neuer Backenstich durchgebrochen oder die Menstruation eingetreten ist.

Die Chorea ist eine von den wenigen Krankheiten, welche die

beiden Geschlechter numerisch entschieden ungleich befallen. Nach einer Zusammenstellung von Dufossé gehörten von 250 Kranken 79 dem männlichen und 171 dem weiblichen Geschlechte an und Sée hält das Erkrankungsverhältniß der Knaben zu den Mädchen ebenfalls wie $\frac{1}{4}$ zu $\frac{3}{4}$. In München scheint dieses Verhältniß ein noch schrofferes zu sein, indem unter den zehn Chorea-kranken, die in meinem Tagebuch aufgezeichnet sind, ein einziger Knabe sich befindet.

Eine besondere Erblichkeit existirt nicht, und es kommt nur ganz ausnahmsweise einmal vor, dass das Kind einer in der Jugend chorea-kranken Mutter wieder kievon befallen wird. Hingegen ist nicht zu verkennen, dass meistens die Mütter solcher Kinder ein reicheres Nervensystem haben und an den verschiedensten Formen von Hysterie leiden. Vorausgegangene fieberhafte Krankheiten disponiren ebenfalls zur Muskelzucke.

Ein deutlicher Einfluss der Jahreszeiten ist bei uns nicht wahrzunehmen, obwohl in den Tropen die Krankheit fast gar nie vorkommt, in den nördlichen Gegenden hingegen häufiger sein soll. Ob sie auch epidemisch sein könne, wie von den medicinischen Geschichtsforschern behauptet wird, ist immer noch nicht gehörig constatirt, wahrscheinlich sind diese sog. Epidemien auf einfache Imitation zurückzuführen. Dass in Mädchenschulen durch Nachahmung Chorea entstehen könne, wird von vielen glanzwürdigen Beobachtern berichtet und sind in neuerer Zeit Beispiele in einem Dorfe Tyrols und in einem Pensionat in Eisenach vorgekommen.

Eine Analogie hierfür haben wir in der Entstehung hysterischer Krämpfe allein durch den Anblick einer in solchen Krämpfen liegenden Person, wie dies in den weiblichen Abtheilungen grösserer Spitäler oft genug beobachtet wird.

Unter den physischen Ursachen wird namentlich oft der Schreck erwähnt. Es mag allerdings bei einem zu beginnender Chorea leidenden Kinde den Ausbruch des Uebels beschleunigen, da es aber doch sehr viele furchtsame Kinder gibt, welche durch jede Kleinigkeit in den grössten Schrecken versetzt werden, so müsste die Chorea viel häufiger vorkommen, wenn der Schrecken sie wirklich bei einem sonst gesunden Kinde veranlassen könnte.

Sée legt grosses Gewicht auf den von ihm entdeckten Zusammenhang des Rheumatismus mit der Chorea. Es scheint jedoch dieser Zusammenhang sehr lose zu sein; denn, wenn auch zugestanden werden muss, dass auf Rheumatismus acutus Chorea folgen kann, so ist die Häufigkeit dieses Zusammentreffens doch sehr übertrieben worden. In Städten, wo viel rheumatische Erkrankungen vorkommen, müsste auch die Chorea häufiger auftreten und umgekehrt, denn ist aber nicht so; in Grief z. B. gibt es nach Billiet's Angabe viel Rheumatismen und fast gar keinen Veitstanz. Auch müssten, wenn hier wirklicher Connex bestünde, die Mädchen viel öfter an Rheumatismus leiden, als die Knaben, da sie doch notorisch in der Chorea überwiegen. Gerade das umgekehrte Verhältniss aber findet für den Rheumatismus statt, an welchem bekanntlich mehr Knaben als Mädchen erkranken.

Die pathologische Anatomie liefert in dieser Krankheit durchaus negative Resultate, was zum Theil auch von der grossen Seltenheit der Todesfälle, welche immer nur als zufällige eintreten, herrühren

mag Ferrius's in fünf Fällen beobachtete Anschwellung des Zahnfestsatzes des Epistropheus, welche er als einfache Hypertrophie der Knochenmasse beschreibt, nicht viel zu vereinzelt da, als dass daraus weitere Schlüsse gezogen werden dürfen. Die wahre Ursache der Chorea ist eben bis jetzt noch nicht ergründet trotz der mannigfachen Hypothesen, die in dieser Beziehung aufgestellt worden sind, und auch der Zusammenhang mit Wurmkrankheiten, auf welchen man früher grosses Gewicht gelegt hat, existirt in Wirklichkeit nicht, indem sonst die Chorea in Warmgegenden viel häufiger sein müsste und durch Wurmmittel beseitigt werden könnte, was aber nicht der Fall ist.

Diagnose und Prognose.

Die Erkennung dieser Krankheit ist gewöhnlich so leicht, dass sie jeder Laie, der sie nur einmal gesehen hat, auf dem ersten Blick wieder erkennt, und sie unterscheidet sich durch die unangenehme, viele Wochen anhaltende Dauer der Symptome von allen anderen Krämpfen, die man unter der nicht ganz passenden Bezeichnung der choreartigen zusammengefasst hat. Zu letzteren rechnet man das Stottern, das Binneln, die Verzerrung des Mundes, das sogenannte Wehern und den Schreckkrampf, über welche insgesamt der Wille einen, wenn auch vorübergehenden Einfluss hat, und die ausserdem nur anfallweise oder höchstens tagweise und durchaus nicht so continuirlich wie die Chorea auftreten. Eben so wenig gehört hierher die von Duhini beschriebene und nicht sehr treffend als Chorea electrica bezeichnete Krankheit. Nach Hasse stellen sich hier Kopf- und Rückenschmerz, dann elektrische Zuckungen der Extremitäten, welche zuerst halbseitig sind, dann über den ganzen Körper sich erstrecken, ein. Darzwischen kommen allgemeine Convulsionen mit Sch weiss und Fieber vor und die Kinder gehen nach einigen Wochen paralytisch zu Grunde.

Die Prognose kann für die grosse Mehrzahl der Fälle vollkommen günstig gestellt werden, in $\frac{1}{4}$ längstens $\frac{1}{2}$ Jahr heilen die meisten Kinder bei einer einigermaßen rationellen Behandlung vollständig. Die Chorea, welche nach einzelnen Autoren in Epilepsie und Blödsinn übergeht, beruht eben auf materieller Erkrankung der Centralorgane und ist demnach nicht zum reinen Veitstanz zu rechnen.

Recidive sind nicht selten; wir wurden schon zweimal Kinder beobachtet, welche vollkommen genesen, mehrere Monate ganz verschont geblieben waren, hierauf aber von neuem von einer langwährenden Chorea befallen wurden. Entschieden bleibt bei diesen Kindern eine grosse Neigung zu Neuralgien der verschiedensten Art zurück. Merkwürdig ist, dass nach statistischen Zusammenstellungen bei Knaben die Heilung viel langsamer erfolgt als bei Mädchen, bei jenen dauert die Behandlung 74—81 Tage, bei diesen nur 33—37 Tage. Der letztere Durchschnittstermin scheint übrigens etwas gar zu kurz gegriffen zu sein.

Therapie.

Eine causale Behandlung kommt schon deshalb fast unvollständig in Betracht, weil, wie bei der Aetiologie gezeigt worden, eine wirkliche Ergründung der Ursachen bisher noch nicht gelungen ist. Zu berücksichtigen sind in dieser Beziehung der Aufenthalt in einer feuchten

Wuthung, freiwilliger Abgang von Würmern, Ovarie, Beginn der Menstruation und die rheumatischen Complicationen.

Die medicamentöse Behandlung mit einer Unmasse von Mitteln kann nur dann gehörig gewürdigt werden, wenn man sich die spontane Heilung der Chorea stets in's Gedächtniss zurückruft. Es erfolgt oben auf jedes Mittel und trotz jedes Mittels, wenn es nicht gar zu absurd und intensiv toxisch ist, nach einigen Wochen, längstens Monaten Genesung. Dieser Ueberfluss an Heilmitteln findet sich nur bei zwei in ihren Ausgängen ganz entgegengesetzten Krankheitsklassen, nämlich bei denen, welche spontan heilen und bei denen, welche fast regelmäßig unheilbar sind. Als Prototyp der letzteren mag die Epilepsie gelten. —

Wenn die Krankheit mit Gefässerregung in kräftigen Individuen auftritt, so hat man Blutentziehungen für rathlich befunden, und Sydenham als Gewährsmann angeführt. Mir scheint jedoch eine jede Antiphlogose unnütz, wenn nicht gar schädlich, indem die besprochene Gefässerregung durchaus keinen bedenklichen Charakter hat und bei längerem Bestehen der Krankheit sich ziemlich häufig ein nützlicher Zustand einstellt, der durch vorausgegangene Blutentziehungen nur beschleunigt wird. Die ableitenden Mittel auf den Nacken und längs der Wirbelsäule applicirt, wozunter besonders die Salben mit Tartarus embiatus und Schlimat, die Vesicantien und das Crotonöl gerühmt werden, sind nutzlose Quälereien, welche den armen Mädchen bleibende, zum Theil entstellende Narben zurücklassen und für späterhin ihre gestillten Vergnügungen, den Besuch der Bälle etc., verkürzen können.

Weniger bedenklich sind die Ableitungen auf den Darmkanal, die man durch Mittelsabes, Ricinusöl, Rhabarber, Senne oder Aloe erzielen und bei Verdacht auf Eingeweideschmerzen ganz passend mit Wurmmitteln verbinden kann. Calomel und Brechweinstein sind wegen ihrer nachtheiligen constitutionellen Wirkungen sowohl in grossen wie in kleinen Dosen zu vermeiden, was um so leichter geschehen kann, als der spezifische Einfluss der letztgenannten Mittel auf die Chorea durchaus kein deutlicher ist.

Fehlt die Gefässerregung schon zu Anfang der Krankheit, so kann man sogleich zu den empirischen Mitteln greifen, unter welchen jedenfalls das Eisen das rationellste ist, zumal wenn die Kinder anämisch sind und an beginnender Chlorose leiden. Die Eisenpräparate und eisenhaltigen Mineralwässer werden von den meisten und besten Therapeuten als nützlich empfohlen und können ohne allen Schaden viele Wochen lang auch nach Ablauf der Muskelnruhe fortgegeben werden. Stellt sich hiedurch eine zu beträchtliche Obstipation ein, so muss derselben durch obengenannte mildere Abführmittel abgeholfen werden. Welches Präparat gewählt werden soll, ist bezüglich der Wirkung auf das Nervenleiden ziemlich gleichgültig, es richtet sich diess mehr nach der Verdaulichkeit und dem Geschmacke zum Einnehmen. Zum Verschlucken von Pillen verstehen sich Kinder, namentlich kleinere, sehr schlecht; obwohl sie mit grösster Leichtigkeit einige Dutzend Kirschkerne verschlucken, und immer eigens dazu angehalten werden müssen, sie nicht mit zu verschlucken, so kann man sie oft nicht dazu bringen, ein gleiches mit harten Pillen zu thun. Sie lassen auf dieselben und behalten die Stücke so lange im Munde, bis sie weich werden, wodurch

natürlich der Zweck der Füllen, das Medicament geschmacklos in den Magen zu bringen, total verfehlt wird. Die Darreichung von Pulvern ist auf die Länge un bequem, sie müssen oft in der Apotheke repetirt werden und werden gerne an der Luft feucht. Ich ziehe desshalb die Eisentinkturen vor und bediene mich fast immer der Tinct. ferr. pomati, die am leichtesten assimiliert zu werden scheint. Romberg empfiehlt das Ferrum cyanatum, andere das schwefelsaure oder kohlensaure Eisenoxyd. Nach meinen Beobachtungen wirken gross Dosen der Eisentinktur durchaus nicht günstiger auf den Verlauf der Chorea als kleine, machen aber leichter Verdauungsstörungen und Verstopfung, weshalb ich niemals für nöthig finde, über 20—30 Tropfen pro die zu steigen. In der Convalescenz können übrigens auch China, Chinin und andere Tonica mit Vortheil gegeben werden.

Ausserdem gibt es nun eine Menge von empirischen Mitteln, denen allen es weniger an Lobsprüchen als an constatirter Heilkraft mangelt. Zuerst sind hier zu nennen die metallischen Mittel, Zink, Kupfer und Arsenik. Unter den Zinkpräparaten ist das beliebteste das Zinkoxyd — bis zu 1.0 3mal täglich gegeben, — dann das schwefelsaure Zink, — 0.05—0.5 in steigender Dosis — das Cyanzink — täglich zu 0.2 — und endlich das Ferrocyanzink. Escolas räth das halbrhaische Zink zu 0.1—0.8 pro die.

Der Kupfercolchik und das schwefelsaure Kupfer sind wegen ihrer namenssen Wirkung mit Recht verlassen. Ein gleiches sollte wegen nachträglicher Intoxication mit der Tinct. arsenic. Fowler. geschehen, für welche Henoch wieder aufgetreten ist.

Die Narcotica zu versuchen, liegt bei der Muskul paralise sehr nah. Man hat mit denselben mannigfach experimentirt. Opium, Belladonna, Hyocyamus, Haschisch, Blausäure, Aconitin, Atropin, sind langsam wieder verlassen, auch das Strychnin von Treutson vorgeschlagen, ist von allen züchtenden Aerzten verworfen worden.

Vorübergehende Erleichterung verschafft bei sehr heftiger Chorea, bei der die Kinder Nachts nicht zur Ruhe kommen können, das Chloroform. Ofter repetirte Inhalationen nehmen aber den Kopf ein und stören die Verdauung. Chloralhydrat wirkt auch hier sehr zweckmässig, beruhigend ohne unangenehme Folgen.

Ebenso zahlreich wie die Narcotica hat man auch schon die vegetabilischen und animalischen Nervina angewendet. Baldrian, As foetida, Campher, Muschus, Castoreum, Arnica, Celandinum etc. Von dunkelbarer Wirkung sind die kalten Bäder und die Begiessungen in trockener Wunde, welche, da sie den Kindern meistens sehr unangenehm sind, wenigstens das bezwecken, dass die Willenskraft so gut als nur immer möglich angeregt wird, den unwillkürlichen Bewegungen zu widerstehen. Dupuytren ist ein begeisterter Lobredner der kalten Bäder und Begiessungen und läst bei deren consequentem Gebrauch eine jede Chorea für heilbar, wogin er doch vielleicht etwas zu weit gehen dürfte.

Da manche Mädchen kalte Begiessungen und Bäder durchaus nicht vertragen, so kamen auch die warmen in Anwendung und offer diesen namentlich die Schwefelbäder. Man gibt zu diesem Zwecke in jedes Bad 1200 Kalischwefelleber und lässt die Kinder täglich eine Stunde lang im Bade sitzen. Rutz ist der Meinung, dass die Krank-

höchstens höchstens auf 24 Tage abgekürzt wird, Kähler aber bemerkt hien, dass es auch Fälle gibt, wo die Verschlimmerung der Krankheit den Fortgebrauch der Schwefelbäder verbietet.

Was die psychische Behandlung der Chorea-kranken betrifft, so wird mit Strenge viel häufiger geschadet als genützt, wozu jedoch nicht gesagt sein soll, dass die Anregung der Willenskraft ganz ausser Acht gelassen werden sollte. Man muss durch Güte und Versprechen kleiner Geschenke die Kinder veranlassen stille zu halten, bis 10 oder 20 mal sofort gezählt werden, man muss sie kleine leichte Hand- und Fuszbewegungen machen lassen und sie nach gelungener Ausführung belohnen etc.

Das Festhalten, Binden und Schienen der Kinder hat man bisher für nothwendig gehalten, in neuerer Zeit sind jedoch wieder einzelne Fälle bekannt gemacht worden, in denen die Anlegung von Schienen — zuerst nur des Nachts, wo wegen Heftigkeit der Chorea die Kinder nicht zur Ruhe kommen konnten, dann auch Tag und Nacht mehrere Tage lang fortgesetzt — eine auffallende Besserung und sofortige Heilung zu Wege brachten (Moushan in Dublin). Es wird bei dieser Behandlung wohl nur für eine sanfte Fixierung der Extremitäten durch passend gebogene und gepolsterte Schienen gesorgt werden dürfen, während den Bewegungen des Rumpfes kein Einhalt gethan werden könnte. Jedenfalls ist diese Methode gesünder Prüfung würdig.

Die oben empfohlenen, kleinen, willkürlichen Bewegungen hat die schwedische Heilgymnastik systematischer ausgebildet, indem zuerst passive, dann die sog. duplicirten und endlich active complicirte geführt werden.

Die diätetische Behandlung ist von keiner besonderen Wichtigkeit. Die unregelmässig und schlecht genährten Kinder der Armen heilen ungefähr ebenso schnell als die der wohlhabenden Klasse, wo jedes Stückchen Brod und Fleisch erst nach Einholung des ärztlichen Consensus gereicht wird. Eine gesunde trockne Wohnung und Aufenthalt in frischer Luft beschleunigt die Heilung, geistige Anstrengung verzögert sie, bei Onanisten gelingt sie häufig gar nicht.

Fassen wir die ganze Therapie zusammen, so besteht sie im Wesentlichen in kalten Begiessungen und Bädern, Darreichung von Eisen und vorzüglich psychischer Willensstärkung. Bei den heftigsten Formen ist Chloralhydrat des übrigen Narkotikis vorzuziehen, auch wäre ein Versuch mit den Schienen nicht contraindicirt.

4) Chorea major. Der grosse Veitstanz. Chorea Germanorum.

Ein ausserordentlich seltenes Uebel, unter welchem man auch wieder Krampfkrankheiten verschiedener Art versteht. Die Chorea major befällt fast nur Mädchen, und zwar nur solche, welche sich der Pubertät nähern. Das Wesentliche der Krankheit besteht darin, dass die Kinder Paroxysmen von grandiosen, scheinbar mit Bewusstsein und eigenem Willen ausgeführten Bewegungen bekommen, wobei sich eine eigenthümliche Potenzirung der geistigen Fähigkeiten einstellt. Der Uebergang zum Somnambulismus, Metallföhlen, thierischen Magnetismus, zur Wundformel und wie diese räthselhaften Zustände sonst noch

lassen mögen, liegt sehr nahe, und es bedarf des ganzen kritischen Scharfsinnes, hier die richtige Grenze zwischen Betrug, Schattenspiel und wirklichen pathologischen Processen zu treffen.

Symptome.

Die Erscheinungen sind bei den einzelnen Kranken so mannigfaltig, dass es schwierig ist, ein für alle Fälle passendes Krankheitsbild zu entwerfen. Dem Ausbruch der Paroxysmen gehen fast immer psychische und körperliche Vorboten voraus. Zu den ersteren gehören Traurigkeit, grosse Zerstretheit, ängstliches Wesen, Gespensterfurcht, lebhaften Träume, unruhiger Schlaf, zu den letzteren Herzklopfen, Cardialgie, Verdauungsstörungen, Appetitmangel, Kopf- und Rückenschmerzen.

Endlich kommt es zu wirklichen Paroxysmen. Die Kranken beginnen scheinbar willkürliche, bald einfache, bald complicirte Bewegungen zu machen, die sie mit unnatürlicher Kraft, Sicherheit, Schelligkeit und Ausdauer ausführen. Man sieht die Kranken schwimmen, klettern, springen, tanzen, kriechen und die merkwürdigsten Körperverrenkungen versuchen.

Bei anderen kommt es wieder mehr zur rein psychischen Alienation oder Exaltation, sie fangen an zu dichten, zu predigen, zu singen, mit grosser Zungenfertigkeit oder gesteigertem Pathos Unsinn zu schwätzen, oder Thierlaute zu imitiren.

Der Willenseinfluss ist nicht immer vollkommen aufgehoben, die einen können durch kein Hinderniss und keine Schmerzreizung aus ihrem Paroxysmus gebracht werden, während andere durch ein einziges Glas Wasser, auf einmal in's Gesicht gegossen, wieder zur Vernunft gebracht werden.

Am besten lässt sich dieser Zustand mit einer nicht vollkommenen Chloroformnarkose vergleichen, in der die Kranken eben auch in einer angewohnten Aufregung sich befinden. Diese Paroxysmen dauern bald nur einige Minuten, bald mehrere Stunden und enden entweder, indem die Kranken ruhiger werden, sich verwundert umsehen und wie aus einem Traum erwachen, oder indem sie in einen tiefen, oft viele Stunden dauernden Schlaf verfallen. Die Erinnerung an den Zustand ist verschieden. So erinnern sich an das, was im Anfalle gesagt und geschehen ist, entweder so, wie man sich eines Traumes erinnert, oder es läuft gar nichts davon im Gedächtniss.

Reflexbewegungen auf äussere Reize bleiben während des Anfalles ganz aus oder kommen nur auf einzelne derselben zu Stande, wodurch immer der Verdacht auf Betrug sich regen muss. Wenn z. B. ein Mädchen Kacipen, Stechen, Schlagen unbeschadet erträgt, auf Kitzeln der Nasenlöcher aber niest, auf kaltes Begiessen momentan zusammenfällt und durch Brennen unter Wehklagen zu sich kommt, so liegt gewöhnlich keine wirkliche Erkrankung, sondern vielmehr eine Geistesverwirrung zu Grunde, in Folge deren die exaltirten Kinder um jeden Preis Aufsehen erregen wollen.

Der Verlauf der ganzen Krankheit ist wieder ein sehr verschiedener. Es kann mit einem einzigen Anfalle alles beendet sein, oder es folgen viele Anfälle in kleinen oder grossen Intervallen von einigen Stunden bis zu vielen Tagen aufeinander. Ist die Zwischenzeit zweier Paroxysmen eine kurze von nur einigen Tagen, so wird das Allgemein-

befinden kaum jemals normal, indem immer Muskelschwäche, wunderliches, verstörtes Wesen und Verdauungsstörungen zurückbleiben. Die ganze Krankheit dauert nur einige Wochen oder Monate, und geht mit Eintritt regelmässiger Menstruation in vollkommene Genesung über. Es sind auch Recidive beobachtet worden, wobei die Periode von neuem zurückblieb oder unregelmässig wurde. Nach der Genesung stellt sich bei den meisten dieser Mädchen, namentlich den sog. Heilseherinnen, eine ausserordentliche Fruchtbarkeit und Neigung zur Fettseligkeit ein.

Was das Geschlecht betrifft, so befiel die Krankheit nach einer Statistik von Wicke, der 126 Fälle gesammelt hat, 88 Mädchen und 38 Knaben. Von 107 Kranken, bei welchen der Anfang der Krankheit ermittelt werden konnte, standen 84 zwischen dem 10.—20. Lebensjahre und unter diesen wieder 62 zwischen dem 10.—16. Jahre. Erbliche Anlage ist öfter nachzuweisen, fast immer wurde die Erziehung dieser Kranken von hysterischen, überspannten Müttern geleitet.

Ueber die materielle Basis dieses Zustandes im Gehirne lassen sich nur Vermuthungen angeben. Keines Falls sind einzelne bestimmte Theile desselben erkrankt, sonst müssten die Symptome constanter und gleichmässiger sein, und keinesfalls wird hier ein entzündliches Exsudat oder überhaupt eine bleibende räumliche Veränderung im Gehirne angenommen werden dürfen, weil die Krankheit fast immer in Genesung endigt und nur ausnahmsweise in Paralyse oder Epilepsie übergeht. Die Gesamthatigkeit des ganzen Gehirnes ist eben in erhöhtem Maasse gesteigert und diese Steigerung macht sich bald mehr in einer grösseren Reizbarkeit des motorischen Nervensystemes, bald mehr in einer Exaltation der psychischen Richtung des Gehirnes geltend. Hasse sagt sehr treffend: „Es gibt nur einen Zustand, welcher zur Erklärung dieser wunderbaren Krankheit benutzt werden kann, der Schlaf und das Träumen. Denkt man sich das so mannigfaltige, bald düsternisse, bald wechselvolle Spiel der Träume in wirkliche Aktion übersetzt, so hat man eigentlich alle Vorgänge des grossen Verstandes beisammen.“

Zur Vervollständigung dieser Analogie kommt noch, dass der Paroxysmus mit einer Art von Einschlafen, von Versinkensein beginnt und mit einem Erwachen, wie aus einem Traume, wieder aufhört, so dass wir nach dieser Anschauung in der Clera major nichts als einen potenzirten lebhaften Traum mit grosser Reizbarkeit des Sensoriums vor uns hätten.

Die Prognose ist wohl in so fern günstig, als die Krankheit nicht tödtlich ist und die Anfälle fast immer, wenn auch erst nach langer Zeit, sistiren; hingegen bleibt diesen Individuen lebenslanglich etwas wunderliches, bizarres zurück, das den ruhigen Umgang mit ihnen nicht wünschenswerth erscheinen lässt. Bald verfallen sie religiöser Schwärmerei, bald exaltirten Liebeshandeln, und fast niemals stehen sie im Rufe einer ruhigen, vernünftigen Frau.

Behandlung.

Es gibt keine Medicamente, welche mit Sicherheit die Anfälle vermeiden, nicht einmal solche, die die Krankheit abkürzen können.

Hingegen bietet die übrige Beschaffenheit des Körpers häufig Gelegenheit zu therapeutischen Eingriffen. In der Regel leiden diese Mädchen an Chlorose und hartnäckiger Obstipation, weshalb Eisen und dazwischen Laxantien gewöhnlich indicirt sind. Meistens ist die Verstopfung so schwer zu beseitigen, dass man endlich zu starken Drastica greifen muss, auf welche dann schliesslich einige copiose Ausleerungen folgen.

Die Hauptsache bleibt immer die psychische Behandlung. Wenn die Anfälle einmal zum Gegenstand allgemeiner Bewunderung und des Stadtgesprächs geworden sind, so hören sie Jahre lang nicht mehr auf. Es ist deshalb vor Allem nöthig, den Kindern eine passende Umgebung zu schaffen und bei exaltirten Angehörigen ist es am besten, wenn sie sofort zu anderen Leuten gebracht werden. Die Anfälle müssen ruhig abgewartet, und wenn sie vorüber sind, vollkommen ignoriert werden.

Im übrigen hat man dafür Sorge zu tragen, dass sie sich keinen Schaden durch die unbändigen Bewegungen zufügen.

Niemals darf man den Kindern wieder erzählen, was sie während der Anfälle gethan und gesprochen haben.

Alle aufregende Lektüre und Gesellschaft ist strenge zu meiden, angemessene körperliche Bewegung und selbst Anstrengung hat den doppelten Vortheil, dass dadurch die Verdauung angeregt und der Geist von schädlichen Phantasien abgehalten wird. Hasse hält die Versuche mit dem animalischen Magnetismus und überhaupt alles Experimentiren für verwerflich. In dem einzigen Falle, der mir aus eigener Praxis zu Gebote steht, war das kalte Wasser von entschiedenem Nutzen. Nachdem das höchst überspannt erzogene 12jährige Kind endlich einmal von seiner halbverrückten Mutter getrennt und zu dem vernünftigen Grossvater gebracht worden war, hörten die Anfälle nach wenigen kalten Begiessungen gänzlich auf. Die Anfälle bestanden darin, dass sich das Mädchen plötzlich auf den Boden setzte, ein eigenthümliches, grunzendes Geschrei erhob und sich blitzschnell dabei um sich selbst drehte. Einige Gläser kalten Wassers mit Vehement ihr ins Gesicht geschüttet brachten sie alsbald wieder zu sich, und nachdem diese fünfmal wiederholt worden, blieben die Paroxysmen vollständig aus.

5) Epilepsie, Morbus sacer, comitialis, caducus. Fallsucht, die hinfällende Krankheit.

Unter Epilepsie versteht man convulsivische Paroxysmen, die sich öfter wiederholen und von plötzlicher, vollständiger Unterbrechung des Bewusstseins und der Sinnesfunktionen begleitet sind.

Die Handbücher der speciellen Pathologie handeln alle so ausführlich von der Epilepsie, ihren Ursachen, der Art der Paroxysmen und deren Folgen, dass es unnöthig erscheint, hier ebenfalls eine erschöpfende Besprechung zu geben, und füglich auf die vortheilhaften Schilderungen von Canstatt, Romberg und Hasse in deren Lehrbüchern verwiesen werden kann. Nur einige den Kindern inkompetente Eigenthümlichkeiten seien hier erwähnt.

Symptome.

Bei Erwachsenen bemerkt man häufig entfernte und fast immer nahe Vorboten (Aura). Die ersten bestehen in veränderter Gemüthsstimmung, grosser Reizbarkeit, Kopfschmerz, Schwindel, Müdigkeit; die letzteren, welche unmittelbar dem Anfalle vorausgehen und oft so kurz sind, dass die Kranken kaum Zeit haben, sich in ihrer Lagerung vorzubereiten, geben sich kund als Kopfschmerz, Schwindel, Ohrensausen, Schwarzwerden vor den Augen, Wahrnehmung übler Gerüche, Zittern, Frost, Beklemmung und Herzklopfen. Von den entfernten Vorboten bemerkt man bei Kindern schon deshalb nichts, weil die Anfälle bei diesen viel häufiger sind, sich täglich oder wenigstens wöchentlich wiederholen und es deshalb gar nicht zu sehr entfernten Prodromen kommen kann, und die nahen Vorboten, die Aura, werden von den Kindern auch meistens nicht berücksichtigt, weil sie weniger auf sich achten und der Anfall in der That auch so blitzschnell die ruhig spielenden Kinder ergreift, dass überhaupt fast gar keine Aura angenommen werden kann.

Was nun den Paroxysmus selbst betrifft, so beginnt er fast regelmäßig mit einem unarticulirten, ungewohnten Schrei oder Stöhnen, auch fassen wohl Thränen über die Wangen, woraus man schliessen will, dass der Beginn des Anfalls schmerzhaft sein müsse, die fernere Schmerzempfindung aber durch die rasch eintretende Bewusstlosigkeit aufgehoben wurde. Während oder unmittelbar nach diesem Schrei stürzen die Kinder gewaltsam nieder, sie sinken nicht einfach in die Kniee und so zu Boden, sondern sie fallen mit solcher Vehemenz hin, als wenn sie durch einen plötzlichen heftigen unsichtbaren Stoss von oben und seitwärts niedergeschleudert würden. Die Richtung, nach welcher sie fallen, wird lediglich bestimmt durch die Stellung des Körpers im Momente des Anfalles und hat keine pathognomonische Bedeutung. Der Fall ist so heftig, dass durch das Niederschlagen schon bedeutende Verletzungen, die selbst den Tod zur Folge hatten, entstanden sind. Es kann mit ziemlicher Bestimmtheit angenommen werden, je plötzlicher der Beginn und jeher der Sturz, um so heftiger und länger wird der Anfall währen.

Nachdem die Kinder hingefallen sind, beginnen die mannigfachsten Convulsionen, bald tonische, bald klonische, bald beide miteinander abwechselnd. Durch Ungleichheit in der Form der Krämpfe zeichnet sich die Epilepsie der Kinder vor der der Erwachsenen besonders aus. Während bei Erwachsenen, namentlich Männern, immer ein Anfall gerade so verläuft wie der andere, ist bei Kindern die Dauer und die Art der Krämpfe oft eine verschiedene und es sind nicht immer die nämlichen Muskelgruppen bei der Contraktion theilhaftig. Die häufigsten Erscheinungen sind Zuckernischen, tetanische Salae und Verkrümmungen der Extremitäten, Einschlagen der Daumen, Rückwärtskrümmung des Kopfes und die mannigfaltigsten Verzerrungen der Gesicht- und Augenmuskeln. Doch ist keines dieser Symptome so constant, dass sein Fehlen die Diagnose der Epilepsie schwankend machen könnte, wenn die übrigen diagnostischen Merkmale hierauf passen. Namentlich ist ohne Begründung die im Volke verbreitete Ansicht, dass Krämpfe, bei denen die Daumen nicht eingeschlagen sind,

nicht zu den epileptischen gerechnet werden dürfen. Es fehlt diesen allerdings häufige Symptom bei einer beträchtlichen Anzahl sonst ganz ausgesprochener Fälle.

Bei stärkeren Anfällen betheiligen sich auch die Respirationsmuskeln, wodurch das Athmen nicht mehr gehörig rhythmisch von Statten geht und besonders die Expiration wegen der fortwährenden Contraction der Muskeln, welche hierbei zur Relaxation kommen sollten, mangelhaft wird. Der Thorax erweitert sich in Folge dessen nach allen Richtungen und das Athmungsgeräusch wird nur mehr schwach gehört, insofern man überhaupt die Lungen auscultiren kann, indem die allgemeine Ursache des Körpers und dann das bald sich einstellende Röcheln, herrührend von dem im Larynx sich ausbreitenden Schäum, eine Untersuchung der Lungen oft unmöglich macht. Die unmittelbaren Folgen dieser Respirationsstörungen sind: Cyanose, Schwellung der Halavenen, Injection der Augen, Anschwellung der Zunge und des ganzen Gesichtes und endlich sogar Blutungen der Conjunctiva, der Nasen- und Mundschleimhaut. Nicht alle Blutungen aus dem Munde jedoch haben ihren Grund in der Respiration, viel häufiger rühren sie von Bisswunden der Zunge her, welche zwischen die kürschenden Zähne gerathen ist.

Der Herzmuskel betheiligt sich fast niemals an den Krämpfen, der Puls wird in Folge der allgemeinen Anstrengung wohl etwas beschleunigt, jedoch nicht unrythmisch und kehrt nach beendeten Paroxysmus sogleich zur normalen Zahl zurück.

Bei Kindern geht häufiger als bei Erwachsenen während des Anfalles Stuhl und Urin ab, und da bei ihnen die Schleim- und Speichelsecretion der Mundhöhle überhaupt eine reichlichere ist, so findet sich auch ziemlich regelmässig der bekannte weisse oder auch blutig roth gefärbte Schaum vor dem Munde. In Folge der grossen körperlichen Anstrengung tritt gegen Ende immer ein profuser Schweiß ein; dabei lassen die starken Verzerrungen nach und die Kinder erwachen wie aus einem Traume und schreien tief seufzend um sich. Die Anfälle dauern fast nie länger als fünf Minuten, die Zeit kommt aber den kükimmerten Angehörigen natürlich viel länger vor und wird ihre Angabe deshalb unwillkürlich sehr übertrieben. Während es erwachsene Epileptische gibt, welche kaum alle Jahre einmal einen Anfall bekommen, werden die leidenden Kinder mindestens jede Woche einmal davon befallen, doch ist durchaus keine Annäherung an eine Regelmässigkeit zu beobachten. Bald entstehen längere Pausen, bald treten wieder alle Tage die Anfälle ein, bald kommen mehrere nach einander zur selben Stunde, so dass man bestimmt einen intermittirenden Charakter annehmen zu dürfen glaubt und deshalb Chinin, natürlich immer vergebens, reicht, bald wieder ein jeder zu einer anderen Tageszeit.

Nicht immer sind die einzelnen Paroxysmen so ausgeprägt entwickelt wie die obige Schilderung angibt, sondern es gibt auch viele leichtere Formen, die man mit dem Namen des epileptischen Schwindels belegt hat. Die Kinder fallen hierbei nicht zusammen, taumeln höchstens etwas, suchen sich niederzusetzen oder setzen im Gehen begriffen mit starr verzerrten Gesichtszügen ihren Weg wie im Traume fort. Dieser Zustand dauert kaum länger als eine Minute, kehrt aber öfter im Tage wieder. Auch gibt es Kinder, die verschiedn

starke Anfälle, bald nur einen leichten Schwindel, bald einen heftigen Krampfanfall mit Zusammenstürzen haben. Von diesem leichten Schwindel bis zu den gröslichsten Paroxysmen mit Muskelzerrung, Knochenbrüchen und Blutungen bestehen nun die mannigfachsten Uebergänge. Nach einem leichten Anfalle werden die Kinder schnell wieder munter, essen und spielen wie zuvor, nach einem schweren aber verfallen sie in einen langen tiefen Schlaf, aus dem sie mit Kopfweh und Mattigkeit, die noch mehrere Tage fortdauert, erwachen.

In den freien Intervallen ist der Gesundheitszustand verschieden je nach der Dauer, der Heftigkeit und Häufigkeit der Anfälle. Manche Kinder, die nur an der leichteren Form leiden, behalten ihr gesundes Aussehen und entwickeln sich körperlich und geistig gehörig fort, andere aber bekommen, besonders nach mehrjähriger Dauer einer heftigen Epilepsie, einen thierischen Ausdruck, werden mürrisch, jähornig, gefräßig, machen in ihrer geistigen Entwicklung stets Rück- statt Fortschritte, bleiben auch körperlich zurück und verdünnen endlich zu vollkommenen Cretins. Ausserdem finden sich am Körper immer eine Menge Narben von Contusionen in Folge des Hinstürzens, die Zähne werden durch das Knirschen abgerieben und die Zunge in Folge der Bisswunden zerklüftet.

Leichtere Formen jedoch werden das ganze Leben hindurch ohne Consequenzen ertragen, wie es ja auch bekannt ist, dass geistig eminent begabte Menschen bis an das Ende ihres Lebens an Epilepsie gelitten haben. Die hervorragendsten Epileptiker sind: Julius Caesar, Mahomet, Carl V., Petrarca, Fabius Columna, Rousseau und Napoleon I.

Der Verlauf der Epilepsie ist exquisit chronisch, indem die Kranken sie ihr Leben lang behalten und mit in's Grab nehmen; der Beginn ein exquisit acuter, denn es gehen meist nur ganz unbestimmte Vorboten voraus und die Krankheit lässt sich erst durch den ersten Anfall diagnosticiren. Je jünger die Kinder, um so häufiger die Anfälle. Mit dem Alter nimmt die Häufigkeit ab, bis zur Pubertät, wo wieder eine Verschlimmerung bemerkt wird, nach Eintritt der Geschlechtsreife nehmen die Anfälle eine constantere Form an und die Intervalle werden gleichmässiger. Eine deutliche Zunahme der Anfälle bemerkt man auf Onanie, Spirituosen und alle geistigen Aufregungen. Mit dem Wachsen und der Abnahme des Monats, der bei den Laien eine grosse Rolle spielt, kann kein wissenschaftlicher Zusammenhang nachgewiesen werden. Hingegen ist das Klima oder vielleicht nur die Temperatur bei einzelnen Fällen nicht ohne Einfluss. Ich kenne einen Mann, der nur in den kalten Wintermonaten an einer leichten Epilepsie leidet, im Sommer ganz frei ist. Seitdem er nun zwei Jahre hindurch den Winter in Algier verbringt hat, ist gar kein Anfall mehr eingetreten.

Während acuter, febrichter Krankheiten pausirt die Epilepsie, durch Verschlimmerung chronischer, krankhafter Zustände, wie Helminthes, Verstopfung, Neuralgien nimmt sie aber zu. Ihr Einfluss auf die Geistesfunktionen wurde oben schon angeführt.

Der gewöhnlichste Ausgang ist eben Fortbestand bis zum Tode. Die Epilepsie hindert die Individuen zwar nicht, gross zu werden und ein Alter von 30—40 Jahren zu erreichen, aus statistischen Berechnungen geht jedoch deutlich hervor, dass sie dieses Alter nur selten

überleben. Heftige Fälle gehen gewöhnlich in andere Gehirnleiden, Hirnapoplexie, Manie oder Blödsinn über, welchen die Kranken allmählich erliegen. Genesung ist ein ganz seltenes Ereigniss, das bei Kindern jedoch noch öfter zur Beobachtung kommt als bei Erwachsenen. Man hat bei Kindern Epilepsie aufhören sehen, nachdem die vier Backenzähne durchgebrochen waren, zuweilen auch auf Ortswechsel. Das Nähere hierüber ist bei der Aetiologie nachzusehen. Die Genesung ist entweder eine plötzliche oder eine allmähliche. Es ist entweder der letzte Anfall noch ebenso stark, als die früheren, oder die Anfälle nehmen gradatim ab und gehen über in einen leichten epileptischen Schwindel, der schliesslich auch ausbleibt.

Aetiologie.

So schwierig es in den meisten Fällen ist, die wahre Ursache der Epilepsie zu begründen; so muss doch gerade hier ein besonders sorgfältiges Examen und eine genaue Inspection des ganzen Körpers vorgenommen werden, weil nur darauf hin eine rationelle Behandlung eingeleitet werden kann. Die Form der Anfälle gibt wenig oder gar keine Anhaltspunkte für die Aetiologie und bei Kindern kann man so wenig auf die Beschreibung einer bestimmten Art von Aura hoffen, als dieselbe überhaupt sehr kurz ist und nach dem Anfälle gleich wieder vergessen wird.

Was das Lebensalter betrifft, so verschont die Epilepsie gar keines. Die kleinen Kinder leiden im Allgemeinen selten an wahrer Epilepsie, wenn, was nöthwendig geschehen muss, die häufigere Eclampsie streng davon ausgeschlossen wird. Die Eclampsie unterscheidet sich von unserer Krankheit deutlich dadurch, dass sie fast nur beim Ausbruche acuter Krankheiten sich einstellt, dass also das Allgemeinbefinden nach Beendigung des Anfalles durchaus nicht in den früheren Zustand zurückkehrt und dass sie ziemlich oft tödtlich ist, während epileptische Anfälle fast regelmässig gefahrlos sind.

Nach einer statistischen Zusammenstellung von Beau vertheilen sich 214 Epileptische dem Alter nach folgender Massen:

Angedorene Epilepsie	17	Beginn von 20—30 Jahren	29
Beginn bis zu 6 Jahren	22	„ „ 30—40 „	12
„ von 6—12 „	43	„ „ 40—50 „	15
„ „ 12—16 „	49	„ „ 50—60 „	5
„ „ 16—20 „	17	„ „ 60—61 „	1

Zwei Dritttheile dieser Kranken also hatten bei Beginn der Krankheit noch nicht das 16. Lebensjahr erreicht.

Bezüglich des Geschlechtes ist es für Erwachsene allgemein angenommen, dass mehr Frauen epileptisch sind als Männer, eine tabellarische Zusammenstellung epileptischer Kinder, nach dem Geschlecht geschieden, ist mir nicht bekannt, aus den Fällen, die mir bis jetzt vorgekommen sind, kann man ein derartiges Verhältniss nicht entnehmen, indem mir mehr Knaben als Mädchen im Gedächtniss sind.

Die Erbllichkeit ist allgemein selbst bei den Laien anerkannt. Es ist durchaus nicht nöthig, dass die erbliche Epilepsie auch eine angeborene, d. h. eine bald nach der Geburt eintretende sei, sie kann lange latent bleiben und erst zur Zeit der Pubertätsentwicklung oder selbst noch später sich einstellen. Die angeborene Epilepsie wird

namentlich beobachtet, wenn epileptische Mütter während der Schwangerschaft häufig an Anfällen zu leiden hatten. Sie ist bei Kindern unter einem Jahr nur sehr schwer von Eclampsie oder allgemeinen Fräsen zu unterscheiden und charakterisirt sich erst durch den chronischen Verlauf und den Mangel aller nachfolgender Krankheiten nach überstandenen Anfall.

Zuweilen überspringt die Epilepsie eine ganze Generation und kehrt bei der zweiten mit früherer Heftigkeit wieder, oder sie befällt nur einen Theil der Nachkommen, bald die weiblichen, bald die männlichen.

Ausser den genannten Ursachen werden in den Lehrbüchern noch viele andere näher aufgeführt, deren Stichhaltigkeit jedoch sehr in Frage gestellt werden muss. So ist es z. B. doch ziemlich willkürlich, grosse Gemüthsbewegungen, namentlich Schreck, Furcht oder Zorn, als wirkliche Veranlassungen anzuklagen. Wenn diess der Fall wäre, so müsste wohl die übergrosse Mehrzahl aller Menschen epileptisch sein. Je nachdem die Aura ihren Ausgangspunkt wählt unterscheidet man eine Epilepsia spinalis — thoracica — abdominalis — nephritica — genitalis — peripherica, also dass bei den Sectionen sich diese Annahmen gewöhnlich bestätigen.

Bei Kindern kommt hauptsächlich eine auf Tuberculos basirte Fallsucht vor. Ein grosser Tuberkel in den Bronchialdrüsen oder im Gehirn, eine hypertrophirte, tuberculöse Lymphdrüse übt auf die umliegenden Nerven einen Druck aus, als dessen Resultat die Epilepsie entsteht. Dasselbe gilt von den seltenen günstigen Fällen, wo der Cryptorchismus die Ursache ist. Diese heilen, wenn der Hode noch nachträglich heruntersteigt, oder, im Falle des Steckhalsbetriffs im Canalis inguinalis, nach dessen Dilatation und Castrirung des Hodens.

Unter den peripheren Veranlassungen ist die häufigste der Durchbruch eines Backenzahnes, auch eines Weisheitszahnes, worauf man auch schon Gesehung hat eintreten sehen. Viel seltener ist die oft wiedererzählte Heilung durch Anschneidung einer Narbe. Seitdem dieses Factum bekannt geworden, sucht man bei den Epileptikern oft nach Narben, findet deren wohl auch und excidirt sie mit den besten Hoffnungen, die Anfälle kehren sich aber gewöhnlich gar nicht an dieses Verfahren, sondern bestehen vor wie nach fort.

Die Sectionen Epileptischer liefern durchaus keine gleichmässigen Resultate. Zuweilen fallen sie ganz negativ aus. In vielen Fällen ergeben sich die mannigfachsten Veränderungen des Gehirns, Atrophie und Hypertrophie, Verhärtung und Erweichung, plastisches und seröses Exsudat der Gehirnhäute, Blutungen, Tuberkel und Abscesse der Substanz, Beule, Exostosen, Caries oder Nekrose der Kopfknochen. Bei den angeborenen Epilepsien findet man ausserdem asymmetrische Schädelknochen, Abflachung der Stirne, breites oder zugespitztes Hinterhaupt, die Schädelknochen bald auffallend verdickt, bald wieder ver dünnt. Elliottson hat vollkommen Recht, wenn er sagt, diese Art der Schädelknochen bedinge nicht nothwendig Epilepsie; nur so viel ist gewiss, dass dieses Uebel bei mangelhafter Entwicklung des Gehirns sich oft genug einstellt. In den älteren Compendien spielen die Gefässinjectionen des Gehirns und Rückenmarkes eine grosse Rolle, in neuerer Zeit hält man mit Recht diese Anomalien der Blutvertheilung

für Erscheinungen, die in der Agone oder gar erst nach dem Tode entstehen. Der Befund in den übrigen Organen kann noch mannigfacher sein als der im Gehirn, d. h. mit anderen Worten, die Epileptiker könnten ausser an den Folgen dieses chronischen Leidens an allen möglichen acuten und chronischen Krankheiten zu Grunde gehen.

Bei genauer Präparation des Nervensystemes hat man schon öfter Neurone gefunden.

Diagnose.

Bei weiblichen Erwachsenen ist die Hauptschwierigkeit der Diagnose, die hysterischen Anfälle von wirklichen epileptischen zu unterscheiden, was namentlich dadurch möglich ist, dass eben bei erstere das Bewusstsein nicht vollständig schwindet, desshalb auch kein Hin- und Herwerfen und keine Bisswunden der Zunge vorkommen können. Bei Kindern handelt es sich nicht um Hysterie, sondern um Eclampsie. Ein eclampsischer Anfall für sich allein kann unmöglich von einem epileptischen unterschieden werden, erst der darauffolgende Zustand liefert Unterscheidungsmerkmale. Nach einem eclampsischen Anfall fühlen sich die Kinder niemals wohl, fiebern immer, bekommen ein acutes Exanthem oder irgend eine andere acute Krankheit oder erbrechen wenigstens unverdaulichen Mageninhalt. Epileptische Kinder sind am selben oder wenigstens am darauffolgenden Tage wieder vollkommen wohl und ohne Spur von Fieber.

Ganz verderbete Kinder kommen zuweilen auch auf den Gedanken, Epilepsie zu simuliren, um sich vor körperlichen Strafen zu schützen, indem sie sehr richtig bemerkt haben, dass wirklich epileptische Kinder niemals strenge bestraft werden. Es wird ihnen diese Simulation hauptsächlich in grossen Instituten und Schulen erleichtert, wo sie häufig Gelegenheit haben, epileptische Anfälle zu beobachten. Die Unterscheidung ist, wenn die Kinder gehörig raffiniert sind und Nachahmungstalent haben, nicht immer leicht und es darf keinesfalls unbedingt Simulation angenommen werden, so lange nicht evidente Beweise vorliegen. Den Lehrern ist anzurathen, solche Kinder jedenfalls für den Anfang mit der den Epileptischen gegebenen Nachsicht zu behandeln und lieber sich das eine oder andere Mal betrügen zu lassen als den Zustand eines wirklich kranken Kindes durch unangelegene Strenge beträchtlich zu verschlimmern. Schwerlich dürfte den Simulanten die Nachahmung der starken Turgescenz des Gesichtes während des Anfalles und noch weniger die darauffolgende abnorme Blässe gelingen. Nach Marc ist es sehr beschwerlich, einem wirklichen Epileptischen den Daumen zu strecken und die Faust zu öffnen, wenn diese aber einmal geschehen ist, so bleibt die Hand geöffnet. Der Simulant wagt von dieser Eigenthümlichkeit nichts und wird die Faust gleich wieder schliessen, sobald er keinen Widerstand mehr fühlt. Es müsste jedoch erst noch eine grössere Reihe Epileptischer auf dieses Symptom untersucht werden, bevor man ihm unbedingte Geltung zuerkennen darf.

Behandlung.

Unter allen Capiteln der speciellen Therapie ist das von der Epilepsie das längste und zugleich unerspriesslichste. Es finden sich hier alle möglichen Mittel vertreten und die ihnen zugeschriebenen

Erfolge sind so brillant, dass eine grosse medicinische School dazu gehört, sie zu bezweifeln. Mag auch bei vielen Mitteln Betrug oder wenigstens Selbsttäuschung und mangelhafte Beobachtung der Grund der vermeintlichen Wirkung sein, so wird eine klare Einsicht durch den Umstand besonders noch erschwert, dass auf alle Mittel, gleichviel welcher chemischen Beschaffenheit sie sein mögen, jedesmal am Anfange deutliche Besserung eintritt. Diese schon von Esquivat gemachte Erfahrung hat sich seitdem unendlich oft bestätigt und zeigt deutlich, dass der psychische Zustand von einigem Einfluss auf den Krankheitsprocess ist.

Die Behandlung selbst umfasst 1) die Prophylaxis, 2) die Entfernung der Ursachen, 3) die Anwendung der Specifica und 4) eine allgemeine körperliche und geistige Hygiene.

ad 1) Die Prophylaxe besteht darin, dass man wegen der anerkannten Erblichkeit Epileptische vom Heirathen abhält und dass man das Kind einer epileptischen Mutter nicht an diese, sondern an eine gesunde Amme legt. Im Uebrigen müssen die Kinder epileptischer Eltern mit möglichster Schonung erzogen werden. Man vermeide jede Ueberreizung des Nervensystemes durch frühzeitiges und angestrengtes Lernen oder durch schreckenerregende Eindrücke, Anschauen, Strafen, Gespenstergeschichten etc.

ad 2) Die causale Behandlung ist, wo die Ursache wirklich ergründet werden, weitaus die günstigste. Leider gelingt die Auffindung der wahren Ursache viel seltener als gewöhnlich angenommen wird, denn die von den Angehörigen gemachten Angaben, von einem Fall, von einem Schreck, von einer überstandenen Krankheit u. s. w. dürfen nur mit grösster Vorsicht aufgenommen werden.

Vor Allem müssen die Kinder ganz entkleidet und sämtliche Körpertheile einer minutösen Untersuchung unterworfen werden, niemals soll die Aussage der Angehörigen, dass der ganze Körper normal gebildet sei, zur Unterlassung dieses Examinens genügen. Man hat hie-durch schon öfter an den Gliedern und überhaupt in der peripherischen Nervenbahn eine auf den Nerven drückende Geschwulst, eine den Nerven zerrende Narbe, einen fremden, eingekapselten Körper gefunden, nach deren Entfernung die Epilepsie nicht wiederkehrte. Sogar durch Ausschneiden eines Hühnerauges und Anreissen carterer Zähne soll sie schon geheilt worden sein (?). Am sichersten wirkt bei dieser peripherischen Epilepsie die Resektion des betreffenden Nerven. Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen natürlich die Zustände des Gehirnes und seiner nächsten Umgebung. Die Kopfknochen sind sorgfältig auf Narben, Eindrücke, Oertboen, syphilitische Exostosen etc. zu untersuchen, chronische Congestivaustände des Gehirnes sollen durch Ableitung auf den Duralkanal oder ableitende Hautreize, wie Vesicatoire, Pestbalben, Haarseile in den Nacken und selbst Moxen beseitigt werden. Zu diesem Zwecke wurden sogar schon die Carotiden unter-bunden, später machte man auch Versuche sie zu comprimiren, die bisher negativ ausgefallen sind. Wenn nach Ausschneidung von Narben der Kopfschwarte die Anfälle nicht nachlassen, so ist die Trepanation des früher beschädigten Knochen indicirt, welcher Operation Tissot so sehr das Wort redet, dass er sie in allen aufgetretenen Fällen versucht wissen will.

Sind Wunden zugegen, so müssen sie durch *Es.* bei dem Capitel „Eingeweidenformer“ angeführten Methoden entfernt werden. Neigung zu Verstopfung ist durch öftere Clystiere oder ein abführendes Wasser zu bekämpfen. Die Genitalien sind genau auf Onanie zu untersuchen, Schnell abgeheißte Hantansschläge und sistirte habituelle Schweisse können zuweilen wieder hervorgerufen werden.

Die Behandlung der Anfälle selbst besteht wesentlich im Schutze vor Verletzungen. Die Möbel seien abgerundet, der Ofen vergittert, der Boden mit Teppich belegt und die Lagerstätte niedrig, damit die Kranken bei nächtlichen Anfällen durch Sturz aus dem Bette sich nicht zu sehr beschädigen. Die Kranken dürfen nie ohne Aufsicht bleiben. Alles Fixiren bei Beginn des Anfalles ist schädlich, beengende Kleidungsstücke sind zu öffnen. Alle während des Anfalles vorgenommenen Prozeduren, Reiben, Begießen mit Wasser, Compression der Carotiden, Magnetsiren, Einathmen reizender Gasarten, Öffnen der Daumen, Zubinden des Gesichtes und wie immer diese medicinischen und Volksmittel heissen mögen, sind entweder nutzlos oder bringen zum Theil auch wirklichen Schaden.

Die Versuche, bei einer länger dauernden Aura den Anfall selbst zu verhindern, sind bisher noch nicht sehr gelungen. Es können überhaupt nur die Anfälle möglicher Weise aufgehalten werden, welche peripherischen Ursprungs sind. Man unterbindet dann das betreffende Glied fest und nimmt die Binde erst nach mehreren Stunden allmählig lösend wieder ab. Auf diese Weise gelingt es allerdings in einzelnen Fällen, den Anfall gänzlich zu verhüten, in anderen aber wirkt dieses Verfahren so beengigend, dass die Kranken dringend um schonige Entfernung der Binde bitten und lieber den Anfall aushalten. Nach dem Anfälle erholen sich die Kinder gewöhnlich sehr schnell, so dass von einer Nachbehandlung nicht die Rede sein kann. Bleibt längere Zeit Sopor, Müdigkeit oder Brechreiz zurück, so genügt ein Senfteig oder ein ableitendes Purgad zu deren Beseitigung.

ad 3) Die anti-epileptischen Specifica haben sich seit langer Zeit so gewaltig vermehrt, dass die noch immer übliche Bezeichnung „Specifica“ als wahrer Hohn der Aerzte betrachtet werden kann. Es wäre unmöglich, das ganze Register der im Gebrauche gewesenen und noch gebräuchlichen Antiepileptica hier wieder zu geben, nur die bekanntesten seien kurz erwähnt.

Für die Behandlung frischer Fälle eignen sich nach Köhler folgende mild wirkende Stoffe.

- 1) Rad. Artemisiae vulg. 0,5–2,0 des frischen Pulvers möglichst kurz vor dem Anfälle gegeben.
- 2) Rad. Valerianae täglich 0,5–1,0 des frischen Pulvers.
- 3) Flores Zinci von 0,05–1,0 überhaupt in möglichst grosser Dosis, von vielen Aerzten, namentlich von Herpin gerühmt. Die Behandlung soll bis zu drei Monaten fortgesetzt werden. Das baldriansaure Zink ist allerdings eine Verbindung zweier Epileptica, die Wirkung des Zinks scheint jedoch durch Baldriansäure nicht verstärkt zu werden. Andere geben lieber das schwefelsaure Zink 0,05–0,3 pro die.

Bei mehr veralteten Fällen, gegen welche die bisher genannten Mittel schon ohne Erfolg versucht worden sind, kommen folgende Mittel in Anwendung.

1) Der Kupfersalmiak und verschiedene andere Kupferpräparate, womit man wegen rauseoser Eigenschaft gewöhnlich nicht höher als auf 0,01 höchstens 0,02 steigern kann.

2) *Argentum nitricum*, von vielen Autoren namentlich von Heims empfohlen, bei Kindern täglich 0,01—0,06 muss Jahre lang fortgesetzt werden. Die Gefahr, dass die Haut sich dabei grau färbt, scheint keine sehr grosse zu sein, indem sie nur bei sehr wenigen Kranken eintritt, nur z. B. ist sie trotz mannigfacher Anwendung dieses Mittels noch niemals begegnet. Die grosse Vorsicht, die man anwendet, um das salpetersaure Silber als solches in den Magen zu bringen, ist wahrscheinlich überflüssig, indem sich bei den stets vorhandenen Chlorverbindungen des Magensaftes im Magen doch jedenfalls gleich Chlorsilber bildet.

3) Das Queckölber, innerlich als Calmel, Sublimat oder Zinnober, äusserlich als graue Salbe im Gebrauch, dürfte nur bei Verdacht auf *Tophi syphilitici* angezeigt, ausserdem aber wegen seiner constitutionellen Nachtheile sehr schädlich sein.

4) Von metallischen Mitteln sind noch zu nennen das essigsaure Blei, das Zinnoxid, das salpetersaure Wismuth, die Eisenpräparate, Mangan, Arsenik und das in neuester Zeit so viel gepriesene Bromkalium.

5) Die Narcotica wurden vielfach gebraucht und finden sich regelmässig in den mannigfachen Geheimmitteln. Vom Opium weiss man keine bestimmte Heilwirkung, wohl aber sieht man bei dessen Gebrauch sehr häufig und rasch sich Röslein entwickeln. Belladonnawurzel, in neuerer Zeit das Atropin zu 0,001—0,005 Chloroform, Aether, Extr. Stramonii, Hyoscyamus, Digitalis, Agaricus muscarius, Narcissus, Pseudonarcissus, Nux vomica und Strychnin (0,002—0,03 pro die) sind mannigfach empfohlen.

6) Schliesslich noch eine Reihe von Vegetabilien und anderen Medicamenten aus den verschiedensten Klassen der Heilmittellehre: *Selinum palustre*, Indigo, *Viscum quercinum*, *Sedum acre*, *Folia aurantiorum*, *Radix Paeoniae*, *Cotyledon umbilicus*, *Scutellaria gericulata*, *Aca foetida*, Moschus, Bibergeil, Campher, Bernstein, Chium und deren Präparate, *Rad. Dictamnus albi*, Pfefferkörner, Terpentinsel, Dippelöl, Phosphor, mineralische Säuren.

ad 4) Die allgemeine körperliche und geistige Hygiene ist von grosser Wichtigkeit. Die Kost darf nicht zu nährend sein und die Alkoholica müssen ganz verboten werden, indem man bei vielen Kranken auf jede Indigestion und noch sicherer auf jeden Schluck alkoholhaltigen Getränkes einen Anfall eintreten sieht. Verstopfung darf niemals geduldet werden. Unterstützung der Hautthätigkeit durch kaltes und warmes Baden und öfteres Transpiriren ist in allen Fällen angezeigt. Körperliche Anstrengung, namentlich im Freien, wie Gärtnerei und Feldbau, ist oft ein complettes Heilmittel. Unter den körperlichen Uebungen dürfen natürlich nur solche gewählt werden, welche keine Gefahr im Falle eines eintretenden Paroxysmus mit sich bringen, so würde z. B. das Reiten und Schwimmen kaum empfohlen werden können. Reisen und Veränderung des Klimas, besonders das Vertauschen eines kälteren mit einem wärmeren, lässt die Anfälle oft vollständig pausiren, wozu die Zerstreung und die angenehme Gemüths-

stimmung, welche den meisten Reisenden eigen ist, nicht wenig beitragen mag. Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Kinder fast niemals während ihrer Spiele oder einer körperlichen Beschäftigung einen Anfall bekommen, sondern nur des Nachts oder wenn sie mürrisch und müsig dazuliegen.

Geistige Anstrengung darf ihnen nicht erlassen werden, es schädmert der Geist, wenn er nicht geübt wird, nur um so sicherer ein. Die Lehrstunden müssen aber so gegeben werden, dass die Kinder daran Interesse haben und gerne lernen, was freilich nicht jeder Lehrer zu erreichen versteht. In öffentliche Schulen sollten solche Kinder wo möglich nicht geschickt werden, denn sie lernen doch meistens schlechter als gesunde und werden wegen ihrer Anfälle von diesen gefürchtet oder gar verspottet. Die geistige Depression wird durch diese Verhältnisse beträchtlich gesteigert und es ist für ein Individuum, das in seiner Jugend an Epilepsie litt, später aber vollkommen genes, ein wesentlicher Nachtheil, wenn die ganze Schrift von der so sehr verabscheuten Krankheit Kenntniss bekommen hat.

Anhang.

Geisteskrankheiten.

Bei Kindern kommt vorzugeweise Blödsinn, Idiotismus vor. Man muss zwischen wirklichem Idiotismus und zurückbleibender, langwieriger Geistesentwicklung unterscheiden, obwohl es allerdings Uebergangsstufen gibt, bei denen diese Unterscheidung schwierig ist. Bei wahren Idioten bleibt immer auch die körperliche Entwicklung sichtlich zurück, während viele Kinder mit äusserst geringen Geistestgaben, sog. *enfants arriérés*, gerade körperlich um so besser gedeihen.

Auch am Schädel der Idioten finden sich immer beträchtliche Abweichungen, die auf angeborener Kleinheit des Gehirnes beruhen. Der Schädelumfang ist gering, der Kopf ist von vorne nach hinten oder von den Seiten zusammengedrückt, zugespitzt, im Gegensatz zu dem endemischen Cretinismus, der am exponirtesten in einzelnen Thälern Tyrols zu finden ist und sich durch grosse, dem Vicerock sich nähernde Schädelform und Verdickung der Knochen zu erkennen gibt. Der auf Gehirnkleinheit beruhende Idiotismus kommt sporadisch und überall vor und scheint durch Verwandtschaft begünstigt zu werden. Nach den statistischen Zusammenstellungen von Bemis in Kentucky stammen von 100 Idioten 15 aus Ehen, welche zwischen Geschwisterkindern geschlossen worden sind. Der Cretinismus tritt nur in engen thälernen Thälern auf und wird in der Ebene fast nie beobachtet. Ob Trunksucht im Beischlaf auch blödsinnige Kinder erzeugt, muss sehr bezweifelt werden, indem dieselben in diesem Falle wahrscheinlich viel häufiger wären.

Symptome.

Die Grade des Idiotismus sind verschieden. Im höchsten Grade mangelt alle geistige Regung und auch die Sinnesorgane funktionieren nur höchst unvollkommen. Taubheit ist häufig. Vom Sprechenlernen

ist keine Rede, nicht einmal der Versuch wird gemacht, durch Laffen sich verständlich zu machen, das Geschrei ist rauk, monoton. Die Kinder lernen spät sitzen, gar nicht laufen, verschlingen gierig die dargereichte Speise ohne alle Prüfung, lassen, so lang sie leben, Urin und Stuhl unter sich gehen und bekommen in Folge dessen atrophische Muskeln und eine rauhe, oft mit Geschwüren bedeckte Haut. Die meisten dieser Individuen sterben glücklicher Weise schon während der ersten Dentition unter Convulsionen und erreichen niemals die Pubertät. —

In einem minder hohen Grade lernen die Kinder lallen, später auch gehen, und stellen sich Regungen des Instinktes ein. Sie begehren Speise und Trank, unterscheiden ihre Umgebung und lassen sich ungefähr wie gekürrte Thiere an Reinlichkeit und zu kleinen mechanischen Verrichtungen gewöhnen. Ihr Gang bleibt aber immer unsicher, der Gesichtsausdruck blöde, die Muskulatur schwach, oft treten Convulsionen und nachträgliche Paralysen ein. Auch diese Kinder überstehen selten die erste und zweite Dentition und erreichen kein hohes Alter.

Im geringsten Grade, der eben als Uebergang zur einfachen Geisteschwäche angesehen werden muss, ist die Kleinheit des Kopfes nicht mehr auffallend, der Körper entwickelt sich, wenn auch langsam, zu fast normaler Beschaffenheit, und nur ein oder der andere Sinn bleibt stumpf, schwaches Gesicht oder Taubstummheit macht auch diese Individuen meistens zu unnützen Gliedern der menschlichen Gesellschaft.

Behandlung.

Mangelhafte Gehirnbildung kann natürlich nie der Gegenstand direkter Behandlung sein, sondern es kann immer nur eine mögliche Weckung der schwachen geistigen Fähigkeiten durch eine passende Erziehung erzielt werden. Die erste Bedingung, welche Kinder möglichst lang am Leben zu erhalten, ist die Gewöhnung zur Reinlichkeit, ohne diese tritt immer Geschwürbildung der Haut und alsbald Atrophie ein. Am besten werden die Kinder aus dem öblichen Hause entfernt, indem die hiesu nöthige Strenge und langjährige Konsequenz selten bei der eigenen Mutter gefunden wird. Dann kommt es darauf an, durch fortgesetzte aufmerksame Beobachtung endlich eine oder die andere Regung zu entdecken und an diese geschickt anzuknüpfen, wobei sich als zwei Hauptschwierigkeiten die Indolenz und die complete Zerstreuung der Ibioten herausstellen. Der Unterricht dieser armen Geschöpfe erfordert eine fast übermenschliche Geduld, die sich nur ausserst selten findet, weshalb es denn auch in den meisten Fällen bei der Gewöhnung zur Reinlichkeit verbleibt. —

Andere Geisteskrankheiten sind bei kleinen Kindern sehr selten, nach vollendeter zweiter Dentition werden sie öfter beobachtet. Nach einer statistischen Zusammenstellung der während drei Jahren in Bicêtre vorgekommenen Fälle trafen durchschnittlich auf 1000 Geisteskranken zehn jugendliche Irre — die Epileptischen und Blödsinnigen nicht mit eingerechnet. Aus der Anamnese ergab sich, dass bei allen Fällen ausser erblicher Anlage und früheren Krankheiten eine verkehrte Erziehung als Hauptursache galt. Le. Paulmier, der Verf. dieser

Statistik, unterscheidet drei Normen von Manie im jugendlichen Alter: 1) die maniakalische Exaltation, 2) die Tobenacht und 3) die Verrücktheit.

Bei der ersten Form ist die Urtheilskraft nicht ganz aufgehoben, jedoch ein mercklicher Mangel an Ueberlegung vorhanden. Die Kranken sind geschwätzig, aufgeregte, eitel und überlassen sich thörichter Verschwendung, sowie schamlosen und gewaltthätigen Handlungen. Im zweiten Grade, der Tobenacht, ist die Ideenverwirrung ausgesprochen, der Kranke springt unablässig von einem Gegenstande zum anderen, von einem Gefühlsextrem in das andere. Bei der dritten und höchsten Form endlich ist jede Ideenassociation aufgehoben; es gesellen sich dann nicht selten Paraphobie und Grössenwahn hinzu, die Zeichen der beginnenden Paralyse und des Blödsinns.

Unabhängig von den eigentlichen Symptomen der Manie complicirt sich die Psychose im jugendlichen Alter oft mit Chorea oder einer Art von Starrsicht, welche in verschiedenen lange andauernden Anfällen auftritt und in unbestimmten Zwischenräumen wiederkehrt.

West spricht von geisteskranken Kindern, die erst 6—7 Jahre alt waren, die Mehrzahl dieser Kranken jedoch hat das zehnte Jahr schon erreicht und nähert sich der Pubertät. Die Prognose ist im Allgemeinen günstiger als bei erwachsenen Irren, nach Delasiauve aber besteht immer eine grosse Neigung zu Rückfällen. Man hat beobachtet, dass, je länger das Stadium der Vorläufer dauert, um so schlimmer die Prognose sich gestaltet. Jedenfalls ist der Schluss gerechtfertigt, dass — wenn auch öfter die Heilung sich als eine andauernde erweist — immerhin eine im kindlichen Alter auftretende psychische Störung als eine sehr ernste Erkrankung zu betrachten ist.

Die Behandlung gelingt im elterlichen Hause nur sehr schwer, und es ist mit aller Energie auf die Transferirung in eine Irrenanstalt zu dringen.

D. Höhere Sinnesorgane.

1. Oculikrankh.

Die Ophthalmologie hat sich jetzt zu einer so ausgebildeten Specialität entwickelt, dass es nicht mehr am Platze ist, die bei Kindern vorkommenden Augenkrankheiten in einem allgemeinen Lehrbuch der Pädiatrik ausführlich zu bearbeiten. Es muss vielmehr auf die speciellen Lehrbücher der Augenheilkunde verwiesen werden und die dem Kindern ganz besonders zukommenden und die angeborenen Augenkrankheiten sollen hier auch nur eine cursörisehe Besprechung erfahren.

1) Epicanthus. Die angeborene Augenwinkelfalte.

Man versteht unter Epicanthus eine ungewöhnliche Anhäufung von Cutis in der Gegend der Nasenwurzel nach den Augenwinkeln zu, wodurch auf beiden Seiten eine halbmondförmige Falte entsteht, die den inneren Augenwinkel taschenartig bedeckt. Die obere Spitze dieser Mondichel befindet sich an der Nasenwurzel, die untere verliert sich in der Wangenhaut. Die Nasenwurzel ist immer sehr abgedacht und die Nasenknochen stehen in einem ganz stumpfen Winkel zu einander, so dass die durch Fettschichtung elevirten Hautfalten in einem Niveau

mit der eingedrückten Nase liegen. Die Tasche geht niemals so weit, dass sie das Gesichtsfeld beeinträchtigt, bedeckt aber vollkommen den inneren Augenwinkel und kann bis zum inneren Rande der Cornea reichen. Die Ursache des Uebels ist nach v. Armon in dem flachen Nasenrücken und einer laxen Anheftung der Cutis auf den Nasen- und Thränenbeinen zu suchen. Ganz genügend ist jedoch diese Aetiology nicht, da es auch Kinder gibt mit eingedrückter Nase und leicht verschiebbarer Haut, welche diese Falte durchaus nicht zeigen.

Der Epicanthus ist immer angeboren und beiderseitig, kann aber auf der einen Seite grösser sein als auf der andern. Wenn man mit zwei Fingern die Haut des Nasenrückens zu einer Falte erhebt, so verschwindet er und es ist dies auch ein deutlicher Fingerzeig für die Richtung des operativen Eingreifens. Da man den Epicanthus nicht gar selten bei Neugeborenen, aber niemals bei Erwachsenen sieht, so geht daraus hervor, dass er bei zunehmendem Wachsthum sich verkleinert und endlich ganz verschwindet. Wo dies nicht frühzeitig geschieht, kann man durch Ausschneidung einer Längsfalte auf der Nasenwurzel und flutige Naht der Wundränder diesem kleinen Uebel leicht abhelfen.

2) Cyclopia, Menophthalmia.

Bei Menostrotiten kommt vollständiger Defekt der Augenhöhlen vor, das Stirnbein geht unmittelbar in den Oberkiefer über und statt der Orbita findet sich nur eine flache Rinne im Knochen. Bei ungelackter Bildung des Gehirns, Hemicephalia, sind die Knochen der Orbita nur rudimentär gebildet, und namentlich ist der obere Rand derselben sehr verkleinert und ganz in der Nähe des Schloches. Die Cyclopia endlich ist ebenfalls nur bei mangelhaften Orbitalknochen denkbar, hier fehlen immer das Siebbein, die Thränenbeine, die Nasenbeine, und auch das Keilbein ist in seiner Form verändert. Es sind dies harte Bildungsfehler, die nur an lebensunfähigen Menostrotiten vorkommen und klinisch kein weiteres Interesse bieten.

3) Bildungsfehler des inneren Auges.

a) Coloboma iridis. Iridoschisma, die angeborene Spalte der Iris, ist ein der Haarscharte analoger Process; die Spalte geht in den meisten Fällen nach unten und das Uebel ist häufiger auf beiden Augen als nur auf dem einen. Ihre Ränder convergiren gegen den Cilarrand zu und sind nur selten parallel oder divergirend, so dass die Pupille meist die Form einer Birne mit nach abwärts gerichtetem Stiele bekommt. In seltenen Fällen beobachtet man eine Spalte im grossen Kreise der Iris allein, so dass eine normale runde Pupille und ausserdem eine periphere, dreieckige, von ersterer durch einen irifarbigen Querbalken getrennt, vorhanden ist. Bei abwechselnder Beschattung und Beleuchtung eines Colobomes sieht man nur an der der Spalte gegenüberliegenden Parthie deutliche Erweiterung und Verengung, die Ränder des Colobomes verkürzen und verlängern sich nur wenig und können auch bei starker Beschattung nicht einander näher rücken. Erblichkeit des Uebels wurde schon mehrmals beobachtet. Als Compli-

kationen kommen vor: Microphthalmus, ovale Cornea, Centrallinsenstau, Hasenscharte, Hypoplasia, Gehirndefekte und das Colobom des oberen Augenlides. Dieses letztere wird nur am oberen Lide beobachtet und besteht in einer engen Spalte des Lidknorpels, wobei die äussere Haut nicht mit gespalten ist. Eine embryologische Erklärung dieses selteneren Bildungsfehlers, wie die z. B. für die Hasenscharte so einfach sich ergibt, ist hier nicht zu finden, da in keiner Zeit des Embryolebens das obere Augenlid aus zwei Theilen besteht.

b) Irideremia. Angeborener gänzlicher oder theilweiser Mangel der Iris wird immer auf beiden Augen zugleich beobachtet, einen einzigen von Morison beschriebenen Fall ausgenommen. Man sieht entweder gar keine Iris oder nur einen schmalen, rudimentären Streifen. Die Pupille ist dabei niemals getrigg schwarz, und bei gewissen Stellungen zum Lichte leuchtet der Augenhintergrund nach Art der Katzenaugen, was auch bei grossen Colobomen zuweilen vorkommt. Die Hornhaut ist gewöhnlich nicht normal, sie ist oblong oder gelaßmäßig in die Sklera über, oder ist, ebenso wie die Linse, zuweilen etwas getrübt.

Solche Kinder sind natürlich immer kurzsichtig und zwicken wegen zu grosser Lichtperception die Augenlider zusammen, wodurch sie sich eine Art von Ersatz ihres Pupillenmangels schaffen.

Wegen dieser Unvollständigkeit der Sehkraft stellt sich auch ein fortwährendes Rollen des Bulbus (Nystagmus oscillatorius und rotatorius) ein.

Nach Arlt hat dieser Bildungsfehler niemals zur Erblindung durch Lähmung der Netzhaut geführt, wohl aber stellen sich häufig Entzündung der Cornea und Conjunctiva und auch allmählig Linsen- trübung ein.

Die Behandlung muss sich darauf beschränken, durch blasser Gläser oder künstliche Diaphragmen den Ueberfluss von Licht zu dämpfen.

c) Der Kernstaar. Cataracta nuclearis ist ein scharf begrenzter, milchkorngrosser, grauweisser Punkt im Centrum der Linse, um welchen zuweilen noch ein leichter Nebelhof gelagert ist. Er kommt meist auf beiden Augen vor und ist oft mit Iris- oder Colobom complicirt. Ausserdem entwickeln sich bei Kindern auch nach der Geburt nach weisse Punkte in der Linse oder deren Kapsel und senden wohl auch radienartige weisse Streifen aus; das Sehvermögen wird hierdurch zwar getrübt, allein nicht vollständig aufgehoben und es kommt nie zu einer allgemeinen Trübung der ganzen Linse.

d) Atresia pupillae congenita. Der angeborene Verschluss der Pupille beruht auf dem anomalen Fortbestand der Pupillarmembran nach der Geburt. Nach Bischoff bilden die Membrana capsulopupillaris und die Membrana pupillaris zusammen einen gefässhaltigen Sack, welcher, von dem hinteren Umfange der Linsenkapsel ausgehend, sich durch die hintere Augenkammer bis gegen die Iris hinzieht, hier mit derselben durch Gefässe in Verbindung steht und durch seine vordere Wand die Membrana pupillaris darstellt. Da nun in früherer Zeit die Linse dicht hinter der Cornea liegt und noch keine Iris vorhanden ist, so scheint dieser Sack ursprünglich nur die Linse und ihre Kapsel zu umhüllen. Wenn die Iris nun sich mehr entwickelt, so ver wächst sie mit den vorderen Partien dieses Sackes, hält bei weiteren

Zurückweichen der Linse nach Entstehung der vorderen Augenkammer die verwachsene Membran zurück, und es entsteht so eine wirkliche Haut vor der Pupille, die Pupillarmembran. Dieselbe sollte vom siebenten Monate an schwinden und bei der Geburt nicht mehr vorhanden sein, sie besteht aber oft als durchsichtige Membran mit wenig oder gar keinen Gefässen noch längere Zeit nach der Geburt fort.

Nach Stellwag von Carion gibt es eine Menge von Fällen, in welchen die Pupillarmembran in völliger Integrität an Neugeborenen und selbst an Erwachsenen beobachtet worden ist. Sie erscheint als ein feines, graues Häutchen, welches, genau im Niveau des Schloches ausgespannt, die Pupille verschliesst, das Sehvermögen bedeutend schwächt und die Iris unbeweglich macht. In einzelnen Fällen ist diese Haut schon durchlöchert oder es hängen nur mehr einzelne Fetzen am Pupillarrande. Stellwag warnt vor der leicht möglichen Verwechslung mit organisierten Exsudaten und Kapselstaaren und hält die Prognose des angeborenen Pupillenverschlusses für günstig. Die Natur heilt mit der Zeit nach, was sie vor der Geburt versäumt hat. Die Membran reißt unter dem Zuge der Irmuskeln ein und die verriesenen Lappen werden allmählig aufgesaugt. Das Uebel ist übrigens ein seltenes und ist einzelnen beschäftigten Oculisten noch nicht vorgekommen.

So viel von den angeborenen Bildungsfehlern des Auges. Zu Augenkrankheiten ist das kindliche Alter überhaupt bedeutend dispensirt und wir müssten ein vollkommenes Lehrbuch der Ophthalmologie geben, wenn alle hier vorkommenden Zustände besprochen werden sollten. Zwei den Kindern speciell zukommende Augenleiden, die Blennorrhöe der Neugeborenen und die ödematöse Conjunctivitis während der Zahnung sind schon bei den entsprechenden Capiteln pag. 67 und 100 besonders abgehandelt worden. Ueber die Augenkrankungen scrofulöser Kinder wird, um die Totalschilderung nicht zu schmälern, bei der Scrofulosis noch Einiges nachgetragen werden. Die übrigen Augenübel unterscheiden sich fast in nichts von denen, die bei Erwachsenen vorkommen, und können somit füglich umgangen werden. Im Allgemeinen ist nur noch zu bemerken, dass bei Kindern namentlich die äusseren Gebilde, Cornea, Conjunctiva, Lider und Muskellapparat erkranken, während Erwachsene häufiger an Veränderungen des inneren Auges, Iris, Linse, Glaskörper, Chorioidea und Retina leiden.

II. GEHÖRORGAN.

1) Bildungsfehler am Gehörorgane.

a) Mangel der Ohrmuschel, *Deafus auritus*.

Es kommt zuweilen eine abnorme Kleinheit, Schrumpfung oder ein vollständiger Mangel der Ohrmuschel auf einer oder beiden Seiten angeboren vor, womit gewöhnlich noch Bildungsfehler anderer Organe complicirt sind. Ausser der sehr auffallenden Defectuität wird hiedurch noch eine wenn auch nur geringe Beeinträchtigung des Gehörs bedingt.

Wenn überhaupt eine Behandlung eingeleitet werden soll und nicht vorgezogen wird, durch die Haare den Defekt zu maskiren, was bei einiger Gewohnheit sehr leicht erreicht wird, so bleibt nichts übrig

als das Tragen eines künstlichen Ohres. Die künstlichen Ohren aus Pappmaché, gepresstem Leder oder getriebenen Metall, mit Oelfarbe angestrichen, werden entweder mittelst einer Klammer an die rudimentäre Muschel, oder wenn gar kein Anhaltspunkt vorhanden ist, mittelst einer über den Kopf gehenden, von den Haaren zu bedeckenden Foder fixirt. Es eignen sich hien zu natürlich nur ältere, vernünftige Kinder. Die Otoplastik, die Ohrbildung aus der benachbarten Haut, hat auch Rau noch niemals ein der Ohrmuschel ähnliches Gebilde zu Stande gebracht und ist deshalb bei der Schmerzhaftigkeit der Operation und den nicht zu vermeidenden Narben ganz zu verwerfen.

Außer dem Mangel kommt noch ziemlich häufig eine fehlerhafte Stellung der Ohrmuschel vor. Sie liegt entweder ganz dicht am Schädelknochen an, *Auricula adpressa*, oder steht im rechten Winkel vom Schädel ab. Gegen die erstere Abweichung wird, obwohl die Feinheit des Gehörs dadurch eingermessen geschwächt ist, fast niemals Hilfe gesucht, was gegen die letztere aus Schönheitsrückichten sehr oft geschieht. Bei Neugeborenen lassen sich stark abstehende Ohren leicht durch Heftpflasterstreifen, die einige Wochen lang angelegt werden müssen, dauernd zurückbringen. Es wurde mir einmal ein Kind gebracht, dessen eines Ohr vollkommen normal stand, während die andere Muschel so nach vorwärts gebeugt oder eigentlich geknickt war, dass man bloß ihre hintere Fläche zu sehen bekam und der Gehörgang ganz damit bedeckt wurde. Auch diese bedeutende Difformität wurde durch mehrwöchentlichen Heftpflasterverband löbend gehoben.

b) Die Verschlössung des Gehörganges. *Atresia, Obstructio, Imperforatio meatus auditorii.*

Es kommt wohl vor, dass in Folge einer Knochenaufnormität der knöcherne Kanal gänzlich fehlt, gewöhnlich aber ist derselbe normal vorhanden und es ist nur seine Mündung membranös verschlossen. Dazu gesellt sich als Complication Defekt oder Verküppelung der Ohrmuschel. Die Mündung des Gehörkanales ist entweder durch eine kleine Vertiefung angezeigt oder die verschliessende Haut ist so glatt darüber gespannt, dass man weder durch Gesicht noch Gefühl den Knochenring mit Bestimmtheit ermessen kann. Selber ist diese Pseudomembran weiter zu fühlen, so dass der Gehörkanal als ein kurzer Rinder Sack erscheint. Die querspannte Membran unterscheidet sich vom wirklichen Trommelfell durch ihre oberflächliche Lage und durch ihre Unempfindlichkeit gegen Berührung mit der Sonde. Das Gehör wird durch diesen Uebel nothwendig aufgehoben, glücklicher Weise jedoch kommt dieser Bildungsfehler gewöhnlich nur auf einem Ohre vor. Der membranöse Verschluss ist wohl zu unterscheiden von der mechanischen Verstopfung des Gehörganges durch *Vernix caseosa* oder bei grösseren Kindern durch Schmutz und fremde Körper aller Art. Es bleibt die Verschlössung des Ohres oft lange verborgen, wenn das äussere Ohr gut gebildet ist, und wird erst nach Jahren von den Kindern selbst bei zunehmender eigener Beobachtung entdeckt.

Behandlung.

Es kann nur durch Operation abgeholfen werden. Dieselbe besteht darin, dass man die verschliessende Membran mittelst eines Krues

schnittes spaltet, die Lappen mit einer feinen Hakenpinzette faßt und mit einem gekrümmten Scheerehen abträgt. Am schwierigsten ist die Nachbehandlung, indem eine grosse Neigung zur Wiederverwachsung besteht, welche man durch eingelegte Charpé, Pressschwamm, Darmseiden und später durch feine silberne Röhrchen bekämpfen muss. Trotzdem verschliesst sich der Gehörgang zuweilen noch nach vielen Monaten. Bei knöchernem Verschlusse, welcher kaum jemals ohne anderseitige grössere Bildungsfehler, Hemicephalie etc. vorkommt, ist natürlich von einer Operation nichts zu hoffen.

2) Die einfache Entzündung des Gehörganges. *Otitis externa.*

Wir übergehen die Entzündungen und übrigen Veränderungen der Ohrmuschel, welche ebenso wie andere Partien der Körperoberfläche von verschiedenen Hautkrankheiten befallen werden kann, und wenden uns gleich zur *Otitis externa acuta und chronica.*

Symptome.

Der Gehörgang stellt einen blinden Sack dar, dessen Basis das Trommelfell bildet. Seine vorderen Partien sind mit Talgdrüsen, seine hinteren, dem knöchernen Kanale entsprechenden, mit Ohrschmalddrüsen versehen. Wenn auch seine Haut, so weit die Talgdrüsen gehen, der äusseren Haut analog ist, so sind doch die Charaktere der Auscheidung des knöchernen Gehörganges davon weit verschieden. Im physiologischen Zustande passt hierfür die Bezeichnung Schleimhaut durchaus nicht, indem das Secret, das Ohrschmalz, nicht die geringste Aehnlichkeit mit Schleim hat. Im entzündlichen Prozesse freilich wird das Secret scheinbar eiterig, mit Ausnahme des Geruches nicht von dem einer Ozoena zu unterscheiden, und es kann dann wohl angenommen werden, dass die so erkrankte Haut die Eigenschaften einer Schleimhaut angenommen hat. Hat diese Umwandlung stattgefunden, so hören die Ohrschmalddrüsen auf zu funktionieren, und es kann als ein Zeichen von eingetretener Besserung angesehen werden, wenn wieder Ohrschmalz zum Vorschein kommt.

Bei der Entzündung des Gehörganges nun kann man eine erythematöse und eine catarrhalische Form unterscheiden.

Bei der erythematösen Otitis findet man bei genauer Untersuchung mit dem Ohrspiegel Rötung des Gehörganges und Vermehrung eines braunen Ohrschmalzes. Nach einigen Tagen desquantiert der ganze Gehörgang in grösseren oder kleineren Schuppen, das massenhaft angesammelte Ohrschmalz trocknet in bröckeligen Krusten ein und fällt bei passender Lagerung von selbst heraus oder wird im Bade herausgespült. Schmerzhaft ist dieser sehr lästige Process fast gar nicht, man kann die Ohrmuschel an allen Seiten drücken und zerrn, ohne dass die Kinder Schmerz äussern. Das Allgemeinbefinden bleibt hierbei ungestört, und es wird die ganze Veränderung meist zufällig bei Kindern entdeckt, welche wegen anderer Erkrankungen vorgestellt werden.

Die catarrhalische Otitis macht viel bedeutendere örtliche und allgemeine Symptome wie die erythematöse. Nach einem Anfangs

juckenden, dann wirklich empfindlichen Schmerz, der mehrere Tage ohne weitere Veränderungen dauern kann, stellt sich gelbweisser, gleichmässig flüssiger oder flockiger Ausfluss ein, der zuerst unbedeutend, später intensiv nach stinkenden Fettsäuren riecht. Der Ausfluss ist nicht fortwährend gleich stark und lässt sich am besten nach den Flecken taxiren, welche sich des Morgens auf dem Kopfkissen der Kinder finden. Diese Flecken erreichen bei profusen Otorrhöen die Grösse einer halben Hand. Nach einigen Tagen oder Wochen hört bei der einfachen, nicht dyskrasischen Otitis externa der Ausfluss auf, er wird sparsam käseartig und die Secretion des Ohrenschmalzes stellt sich wieder ein. Die während der Otorrhöe eingetretene Schwerhörigkeit hebt sich ebenfalls wieder vollkommen. Das gelieferte Secret vertrocknet theilweise in der Ohrmuschel, stützt sie an und es entstehen leichtblühende Erosionen und grössere flache Geschwüre in der Ohrmuschel, an dem Ohrfläppchen und den nächst gelegenen Halsparthien. Zugleich schwillt die Haut des Gehörganges so bedeutend an, dass sich die Wundränder fast berühren und man nach gründlicher Reinigung bei dem besten Lichte kein Tympanum zu sehen bekommt. Die Untersuchung mit dem Ohrenspiegel ist äusserst schmerzhaft, verursacht leicht Blutungen und ist bei ihrer Erfolglosigkeit wegen der Schwellung der entzündeten Theile ganz zu unterlassen.

Bei dyskrasischen, namentlich scrofulösen Kindern wird die Otorrhöe leicht chronisch. Sie setzt oft monatelang in der warmen Jahreszeit aus und kehrt im Winter mit erneuter Heftigkeit wieder. Das Secret ist bald glasig schleimig, bald wieder gelb eiterig und stützt gewöhnlich das Ohrfläppchen auf. Die Schleimhaut ist weniger infiltrirt als bei der acuten Form, bei längerem Bestehen können aber endlich polypöse Wucherungen auf ihr sich bilden, welche eine Zunahme der Schwerhörigkeit bedingen.

Eine chronische Otorrhöe ist selbst bei vollkommener Sistirung des Ausflusses nie als geheilt zu betrachten, wenn man in der Tiefe des Gehörganges kein Ohrenschmalz, sondern nur eine käsig schmierige, übelriechende Masse findet, ein Beweis, dass die Haut noch nicht zu ihrer normalen Funktion zurückgekehrt und die eitrige Secretion nur gemindert ist.

Erst wenn deutliches Ohrenschmalz vorhanden, darf eine vollkommene Genesung angenommen werden. Die chronische Otorrhöe befällt selten beide Ohren zu gleicher Zeit und gleich stark, sondern es findet gewöhnlich ein alternirendes Verhältniss statt.

Die Prognose richtet sich wesentlich nach der Beschaffenheit der Auskleidung des Gehörganges und nach der Constitution des Kindes. Je stärker die Schwellung, die Excoriationen oder gar die Granulationen und polypösen Wucherungen hier sind, um so langsamer wird Heilung erzielt werden. Bei scrofulösen Kindern gelingt die Heilung ebenfalls sehr schwer und das Uebel kehrt bei jeder Erkältung, nach jedem Unwohlsein wieder. Nach Ran und Wilde kommen die gefährlichsten, schlimmen Ausgänge, Perforation des Trommelfelles, secundäre Peritonitis und Gehirnkrankung, normale im Gefolge der einfachen catarrhalischen Otitis externa vor. Es soll diese Anschauung aus ungenauen Diagnosen entstanden sein, welche freilich hier um so verzeihlicher sind, als man eben trotz allen Ausputzens doch mehrere Wochen lang

keine gehörige Einsicht des Gehörganges bekommen kann, wenn die Anschwellung eine bedeutende ist.

Aetiologie.

Es existirt bei vielen Kindern ein inniger Zusammenhang zwischen den Erkrankungen des Mundes und des Ohres, wie sich diess bei der anatomischen Nahebarschaft auch leicht einsehen lässt. So gibt es namentlich Kinder, welche beim Durchbruch eines jeden Zahnes sowohl in der ersten als auch zweiten Dentition Ohrenscherzen und eine kürzer oder länger dauernde Otorrhö bekommen. Besonders häufig tritt dieselbe auch secundär nach Scharlach und Masern auf und gewöhnlich sich zu scrofulösen Kopfausschlägen, wo man dann auch die Hauteruption ganz deutlich im Gehörgang erkennt. Die Otorrhöen kleiner atrophischer Kinder vor Beginn der Zahnung gehören in den meisten Fällen nicht zu den einfachen externen, sondern zu den Entzündungen des mittleren Ohres, deren Beschreibung unten folgen wird.

Therapie.

Die einfache, äussere Otitis verläuft auch ohne Behandlung gewöhnlich günstig. Man quäle die Kinder nicht mit den so sehr beliebten Vesicatoren und Pustelkalben, wodurch zum ersten Uebel nur ein zweites hinzugefügt wird ohne Minderung des ersteren. Am Anfange gestatten täglich 2—3 Einspritzungen mit lauwarmem Wasser und ein leichter Verschluss des Ohres mittels feiner Charpie. Bei grosser Schmerzhaftigkeit und anhaltender Schlaflosigkeit gibt man den Kindern je nach dem Alter Abends 1—4 Tropfen Opiumtinktur. In den ersten Tagen des Ausflusses nützen adstringirende Einspritzungen nichts, sondern verursachen meistens nur Schmerzen und nach kurzer Abnahme eine profuse Vermehrung des Ausflusses, weshalb man sich am besten sehr Tage lang auf Injektionen mit warmem Wasser beschränkt. Unter den adstringirenden Mitteln halte ich für das beste und reinlichste eine Alaunklösung (1 : 10 Wasser), wovon man nach vorgängiger Wassereinspritzung und sanfter Abtrocknung des Ohres bei schiefgehaltenem Kopfe einige Tropfen Morgens und Abends eintrüfelt. Es wirkt diese Lösung ebenso adstringirend als Höllenstein und hat dabei den wesentlichen Vortheil, dass sie weder Haut noch Wäsche schwarz färbt. Nach einigen Wochen sistirt der Ausfluss gänzlich. Wenn kein Ohrenschmalz sich zeigen will, so sind die Eintrüfelungen von Leberthran 10 mit Jod 0,02 am Platze, worauf unter länger dauerndem Jucken die normale Secretion zurückkehrt. —

Bei scrofulösen Kindern ist dabei stets noch eine allgemeine Behandlung mit Leberthran, Eisen, Bädern, Landluft, Gymnastik etc., wie dies weiter unten bei der Scrofulose ausführlicher erörtert werden soll, einzuleiten.

3) Abscess im Gehörgang. Otitis externa phlegmonosa.

Die Symptome der Phlegmona mit Eiterbildung sind viel stürmischer als die der vorigen Form. Da vorzugsweise nur der vordere knorpelige Theil des Gehörganges eine Zellgewebsschichte besitzt, während im knöchernen Theile die Beinhaut mit der Bedeckungshaut

in innigen Zusammenhang steht, so kommen die Abscesse auch lediglich nur in den vorderen, leicht sichtbaren Partien des Gehörganges vor. Der Schmerz ist anfangs erträglich und nichts als allgemeine Rötze und leichte Schwellung zu bemerken.

Nach 24—48 Stunden steigert sich aber der Schmerz zu einer furchterlichen Höhe, die Kinder schreien Tag und Nacht ohne aussetzen, essen und schlafen nicht mehr, und jede Bewegung des Unterkiefers vermehrt den Schmerz nach, weshalb sie nur undeutlich sprechen und vorsichtig schlucken. Selbst kleine Kinder von wenigen Monaten können hiervon befallen werden und machen ihre Umgebung durch häufiges Greifen nach dem Ohre aufmerksam auf den Sitz des Uebels. Nachdem diese Schmerzen 2—3 Tage in gleicher Heftigkeit und endlich klopfend fortgedauert haben und nur durch verhältnissmässig grosse Gaben Morphin auf einige Stunden beseitigt werden konnten, ist der Gehörgang inzwischen vollständig geschwollen, und wenn man nun mit einer Sonde untersucht, so findet man, dass die Geschwulst keine gleichmässige mehr ist, sondern von einem Theile des Gehörganges, gewöhnlich dem unteren, als ein kleiner, erbsengrosser, fluktuirender Eitersack sich erhebt. Sticht man diesen Sack mit einer Stanznadel auf oder öffnet er sich spontan, so sind nach Ausfluss einiger Tropfen Eiter und Blut die Schmerzen plötzlich gehoben, der kleine Abscess eitert nur wenige Tage, schliesst sich dann vollkommen, die Rötze und Geschwulst der Nachbarschaft geht zurück, und in kürzester Zeit ist das ganze Uebel, welches die Umgebung des Kindes fast zur Verzweiflung gebracht hatte, spurlos verschwunden.

Wirkliche unfähbare Ursachen sind mir nicht bekannt. Der Ohrabscess befällt ebenso gut gesunde wie scrofuköse, besonders häufig aber zahnende Kinder. Die Prognose ist ausserordentlich günstig, was dem minder Erfahrenen bei den stürmischen Anfangssymptomen nicht immer wahrscheinlich vorkommt. Fast niemals bleiben Verhärtungen oder Blödigung des Knorpels und Knorpels mit Exfoliation zurück. Die Periostitis im äusseren Gehörgange ist bei Kindern ausserordentlich selten, hingegen rühren die unten folgenden Erkrankungen des mittleren Ohres oft genug von Periostitis her. —

Therapie.

Die Hauptaufgabe ist die Milderung des wirklich höchst quälenden Schmerzes, zu welchem Zwecke die vorsichtige Darreichung von Opium oder Morphin als das zweckmässigste erscheint. Sehr wesentlich ist es auch, den Kranken ein hartes Kopfkissen von Rosshaaren zu geben, wodurch sie leichter im Stande sind, das Ohr frei von der Berührung des Kissens zu halten. Oertlich wird am besten laues Wasser eingebracht, nicht eingespritzt und der Dampf von heissem Chamillenkeee auf den Abscess geleitet, Cataplasmen machen beim Anlegen und Wegnehmen unfehlbar heftige Schmerzen und beschleunigen die Abscessbildung nicht merklich. Die grösste Erleichterung verschafft man den Kranken, wenn man möglichst früh den Abscess öffnet, wozu ein einfacher Einstich vollkommen genügt. Nachdem noch einige Tage hiebei Injektionen gemacht worden sind, ist das ganze Uebel fast regelmässig gehoben.

4) Entzündung des mittleren Ohres. *Otitis interna.*

Bei der Entzündung des mittleren Ohres kann entweder bloss die Schleimhaut allein oder nebst der Schleimhaut auch das Periostr. und der Knochen afficirt sein, weshalb man 1) einen Catarrhus und 2) eine Periostitis auris mediae unterscheiden muss.

a) Catarrhus auris mediae.

Da diese Krankheit gewöhnlich auf beiden Ohren vorkommt, so ist sie auch als die häufigste Ursache der später entstehenden Taubheit zu betrachten. Der Catarrh setzt sich wahrscheinlich von der Eustachischen Trompete in die Trommelhöhle fort, und die einmal catarrhalisch entzündete Trommelföhlschleimhaut verhält sich eben so wie andere chronisch afficirte Schleimhäute. Es kommen bald Besserungen, bald wieder Verschlimmerungen vor, am schlechtesten hören die Kinder bei feuchtem Wetter und wenn sie an Schnupfen oder Angina leiden. Zuweilen stellt sich nach starkem Rüspen, Niesen oder Erbrechen plötzlich ein mässig gutes Gehör ein, das aber nach einigen Stunden regelmässig wieder verschwindet.

Die Diagnose des Catarrhes der Trommelföhle lässt sich bei Kindern nicht so bestimmt und objektiv stellen als bei Erwachsenen, indem erstere sich die Eustachische Trompete nicht gutwillig catheterisiren lassen und damit der objektive Hauptbeweis, die Untersuchung mittelst der Luftsauche, abgeht. Die Untersuchung des äusseren Gehörgangs mit dem Ohrringel liefert negative Resultate, es ist höchst selten etwas abnormes zu entdecken, und die schwachen Farbenveränderungen des Tympanums, auf welche einzelne Otolatriker grossen Werth legen, bieten auch keine hinlänglichen diagnostischen Anhaltspunkte.

Das Hauptsymptom ist eben eine je nach dem Wetter wechselnde Schwerhörigkeit, verbunden mit catarrhalischen Erscheinungen in der Mund- und Nasenhöhle, und ein negativer Befund im äusseren Gehörgange. —

Der Verlauf ist ein sehr trauriger, indem fast in keinem Falle von chronischem Catarrh ein feines Gehör wiederkehrt, sondern die Kranken sehr zufrieden sein müssen, wenn das Uebel sich nicht mehr und mehr verschlimmert und in völlige Taubheit übergeht. Die Ursache ist meistens Erblichkeit und zwar der scrophulösen Dyskrasie, welche bei diesen zur Schwerhörigkeit geneigten Kindern sich auffallend weniger auf andere Theile, den Augen, der Nase und der Haut localisirt.

Behandlung.

Da, wie schon erwähnt, bei Kindern sich der Catheterismus der Eustachischen Trompete und somit die Luftsauche nur selten leicht appliciren lässt, so muss sich die örtliche Behandlung auf Exstirpation der vergrösserten Mandeln, Abschneidung des verlängerten Zäpfchens, Inhalation abstringirender Flüssigkeiten oder Einblasungen von Alantpulver auf die hintere Pharynxwand beschränken. Da die meisten schwerhörigen Kinder scrophulös sind und ich vielfach beobachtet habe, dass gerade diese nur selten und in geringem Masse an Hautausschlägen leiden, so habe ich bis jetzt in drei Fällen Jahre lang einen

Postelanschlag abwechselungsweise hinter den Ohren und an verschiedenen Stellen des Halses unterhalten und kann mit dieser Behandlung nur zufrieden sein, indem zwei dieser Kinder entschieden besser hören, das dritte aber keine merkliche Verschlechterung erkennen lässt. Ich streiche folgendes Pflaster:

Rp. Emplastr. adhaesiv. flav. 4,0

Tactar. stibiat. 1,0

Thaler gross auf Leinwand und lasse es vier Tage lang auf der Haut liegen, worauf dieselbe mit blutigen Pusteln bedeckt ist, die mehrere Tage nicht zur Heilung kommen. Sobald diese Pusteln ganz geheilt sind, wird an einer andern Stelle dasselbe Verfahren wiederholt.

Im Uebrigen hat man die Kinder vor Catarrhen zu wahren, was am besten durch Abhärtung, durch tägliche kalte Waschungen und Landaufenthalt geschieht. Gegen die Scrophulosis ist Leberthran und Eisen indicirt.

b) Die Eihautentzündung des mittleren Ohres. Periostritis. Die eigentliche Otitis interna.

Die Periostritis des mittleren Ohres ist die wichtigste und gefährlichste aller Ohrenkrankheiten, indem durch dieselbe nicht bloss die heftigsten Schmerzen verursacht werden und häufig vollständiger Verlust des Gehörs eintritt, sondern auch das Leben durch eitrige Meningitis im höchsten Grade gefährdet ist. Sie hat deshalb von jeher die ungetheilte Aufmerksamkeit der Otiatriker auf sich gezogen und ihre Symptome und Ausgänge sind ausführlicher beschrieben als die aller übrigen Ohrenkrankheiten.

Symptome.

Die Krankheit beginnt bei Kindern fast immer plötzlich und befällt glücklicher Weise nur ein Ohr, niemals beide zugleich. Es stellt sich ein rasch zunehmender, bohrender, stechender Schmerz in dem erkrankten Ohre ein, der nach den Nachbartheilen, den Schläfen, dem Hinterhaupt, dem Halse und den Kiefern ausstrahlt und in kürzester Zeit so intensiv wird, dass die Kinder sich wie rasend gebärden, unstillbar toben und schreien und sich auf keine Weise beruhigen lassen. Die grösste Intensität erreicht der Schmerz zur Nachtzeit, auch wird er durch alle Bewegungen am Kopfe, Schlucken, Niesen, Husten und besonders auch durch laute Geräusche gesteigert. Die erhöhte Reizbarkeit der Gehörnerven jedoch, die sich durch grosse Empfindlichkeit gegen Lärm und durch fortwährendes Ohrenrauschen zu erkennen gibt, lässt nur zu bald nach und macht einer mehr oder minder vollkommenen Taubheit Platz. Diese so stürmischen örtlichen Symptome verfallen natürlich nicht ihre Rückwirkung auf das Allgemeinbefinden. Es tritt heftiges Fieber, sehr frequenter, harter Puls, heisse Haut, allgemeines Unbehagen, Angstschweiss und grosser Durst ein.

Bei Säuglingen lassen sich die eben aufgezählten Symptome nicht alle eintreten. Dieselben sind ausserordentlich unruhig, vermehren ihr Geschrei bei jedem Lärm, greifen öfter nach dem Ohre, erwachen endlich eingeschlämmt durch das leiseste Geräusch unter schmerzlichen Weklagen und reissen den Kopf fortwährend hin und her. Druck auf das erkrankte Ohr verursacht laute Schmerzensschreie. An

die Brust gelegt, wegen sie nur ganz kurze Zeit und setzen dann schreiend ab, weil die Saugebewegung den Schmerz ebenfalls vermehrt, hingegen nehmen sie aus einem Löffel gereichtes Getränke mit Begierde zu sich. Wie jeder Schmerz und jede fieberhafte Krankheit, so kann auch dieser Zustand partielle oder allgemeine Convulsionen veranlassen, worauf dann die Verwechslung mit anderen Cerebralerkrankungen leicht geschehen kann.

Die Untersuchung des äußeren Gehörganges ergibt in den ersten Tagen der Erkrankung kein positives Resultat, sie ist übrigens namentlich bei Zunahme des Ohrspiegels ausserordentlich schmerzhaft.

Diese heftigen Erscheinungen dauern niemals länger als fünf, höchstens sechs Tage. Es kann bis zu dieser Zeit in Ausnahmefällen der Tod unter Convulsionen und meningitischen Erscheinungen eingetreten sein, es kann wohl auch unter allmähligem Nachlass des Schmerzes eine wirkliche einfache Zertheilung der Entzündung stattfinden, wobei jedoch immer der Verdacht auf einen diagnostischen Irrthum bestehen bleibt, meistens aber setzt diese Entzündung Eiter und das gesetzte eitrige Exsudat bricht sich nun auf verschiedenen Wegen Bahn nach aussen.

Der gewöhnliche Ausgang ist Perforation des Trommelfelles, Abfluss eines blutig gestreiften, höchst stinkenden Eiters, Abgang der Gehörknöchelchen und einzelner Knochenstückchen und endliche Heilung der Periostitis mit vollständiger Taubheit des erkrankten Ohres. Es kommt übrigens auch vor, dass die Gehörknöchelchen nicht mit abgehen, dass das durchlöcherzte Trommelfell sich nach Abfluss des Eiters wieder schliesst und dann nur eine geringe Schwerhörigkeit zurückbleibt.

Für die Entleerung des Eiters durch die Eustachische Trompete existiren in der Literatur einzelne Beispiele. Sie scheinen sich jedoch nur sehr selten zu ereignen und sind übrigens bei Kindern, welche diesen Eiter schlucken und nicht durch Räuspern aus dem Munde entfernen, schwer nachzuweisen.

Der zweite oft zu beobachtende Ausweg des Eiters geht in die Hohlräume des Zitzenfortsatzes. Eine eburneöse Röhre zögert sich dann hinter der Ohrmuschel, es wölbt sich die geröthete Parthie mehr und mehr, fluctuirt immer deutlicher und bricht, sich selbst überlassen, endlich auf. Der Anfangs copulös abfließende, blutgemischte Eiter hat ebenfalls einen penetranten Geruch, führt einzelne Knochenstückchen mit sich und wird nach einigen Wochen schleimig, fadenziehend. Die Untersuchung mit der Sonde ergibt fast immer einzelne rauhe Knochenstellen, zuweilen sind dieselben wegen gekrümmten und winkligen Verlaufes nicht zu entdecken, und der Eiter ist so reich an Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium, dass die silberne Sonde rasch aufläuft. Erst nach vielen Monaten, selbst nach Jahren schliesst sich endlich die Fistelöffnung, die eingesogene Hautnarbe aber bleibt mit dem Knochen verwachsen. Auch hier ist der gewöhnlichste Ausgang: Taubheit, der seltenere günstige: ein geringer Grad von Schwerhörigkeit. Kommt die Caries in das Bereich des Fallopischen Kanals, so entsteht Krampf und später Lähmung der entsprechenden Gesichtsmuskeln wegen Reizung und Druck des hier durchtretenden N. facialis. Nicht in allen Fällen ist diese Lähmung eine bleibende, sondern kann nach

balldigem Abflusse des den Druck ausübenden Eiters wieder verschwinden; wenn sie aber einmal einige Momente gedauert hat, so besteht sie gewöhnlich Zeit lebens fort.

Als das schlimmste Ereigniss ist zu betrachten die Betheiligung des Labyrinthes und Necrose des Felsenbeins mit consecutiver eitriger Meningitis und Encephalitis. Die Eiterherde der Gehirnhautstanz communiciren gewöhnlich mit dem Eiter des inneren Ohrs und können bei Durchbruch des Trommelfelles sich sogar nach aussen entleeren. Es kommen aber auch Abscesse im Gehirne vor, ohne dass das Felsenbein deutlich erkrankt ist, wodurch bewiesen wird, dass die Otitis interna auch ausser direkter, mechanischer Fortsetzung eine consecutuelle Hirnentzündung bedingen kann. Diese Gehirnerkrankungen scheinen regelmässig zum letalen Ende zu führen.

Prognostisch ist, wenn man von der höchst zweifelhaften Zertheilung mit Recht absieht, die Perforation des Trommelfelles mit Abfluss des Eiters nach Aussen als der günstigste Ausgang zu betrachten, zumal wenn das schwere Glück sich ereignet, dass die Gehörknöchelchen erhalten bleiben und die Oeffnung im Tympanum sich wieder schliesst.

Minder glücklich ist schon die Caries des Zitzenfortsatzes, wobei die Schwereitigkeit gewöhnlich bedeutender wird, die Fisten Jahre lang nicht heilen und schmerzhaft, eingezogene Narben entlassen. Bei Caries des Felsenbeins, die sich durch schwere meningitische Symptome, halbseitige Convulsionen und später Lähmung zu erkennen gibt, ist die Prognose fast durchgängig letal zu stellen. Im Allgemeinen ist anzunehmen, dass die an Otitis interna erkrankenden Kinder im höchsten Grade scrophulös sind und dass sich demnach mit grosser Wahrscheinlichkeit nach Eintritt der Pubertät Tuberculose der Lungen entwickeln wird.

Aetiologie.

Scrophulosis und Tuberculosis gehen das Hauptmoment für diese Affection ab. Sie alternirt entweder mit scrophulösen Exanthemen, und die Krankheit localisirt sich nach deren raschem Vertrocknen sogleich im inneren Ohre ohne gleichzeitige äussere Otorrhoe, oder es verursacht ein ebenfalls scrophulöses Ohrendrus des Gehörganges endlich Durchbruch des Trommelfelles und der Eiter gelangt nur in das mittlere Ohr. Auch im Gefolge acuter Exantheme, namentlich des Scharlachs, tritt dieses Leiden auf. Als Gelegenheitsursachen sind zu erwähnen: fremde Körper im äusseren Ohre, die das Trommelfell reizen, chemische, ätzende Flüssigkeiten, die nachtheilig, zufällig oder in verbrecherischer Absicht in das Ohr gebracht werden, und endlich heftigere Verletzungen und Schläge auf die Ohrengegend.

Behandlung.

Die ausserordentliche Heftigkeit der Schmerzen im Anfange der Krankheit veranlasst die Angehörigen des Kindes zu dem Begehren, möglichst rasch Abhülfe zu schaffen, was jedoch in den meisten Fällen nicht so rasch, als es wünschenswerth ist, geschehen kann. Das vorzuziehende unter den schmerzstillenden Mitteln, das Opium, darf nämlich bei kleinen Kindern, die die erste Dentition noch nicht überstanden haben, nicht gereicht werden, weil hierdurch sofort Sepsis und dann

Gehirnreiz entstehen und so die Wirkungen des Opiums und des auf das Gehirn sich fortsetzenden Krankheitsprocesses nicht mehr unterschieden werden können. Man darf zwar auch bei kleinen Kindern vorsichtige Versuche mit Opium anstellen; denn nicht bei allen treten diese gefürchteten Nachwirkungen ein, allein man muss sich dann auf so kleine Dosen beschränken, dass die gewünschte Schmerzlinderung gewöhnlich auch ausbleibt.

Bessere Erfolge hat man bei kleinen Kindern vom Bittermandelwasser und dem Belladonnaextract gesehen. Da fast alle davon befallenen Kinder scrophulös sind, so muss man mit den topischen Blutentziehungen, deren schmerzstillende Wirkung allerdings nicht zu verkennen ist, sehr sparsam sein, indem der Schmerz und das Fieber die Kinder ohnedies schon weit genug herunterbringt.

Man soll den Kindern niemals mehr Blutegel hinter das Ohr setzen, als sie Jahre zählen. Allgemeine Blutentziehungen sind gänzlich zu meiden.

Im äusseren Gehörgang und auf der Ohrmuschel dulden sie meistens gar nichts und der Schmerz ist am leichtesten zu ertragen, wenn das Ohr ganz frei, mit nichts in Berührung steht. Wird der Schmerz nach einigen Tagen klopfend und röthet sich die Gegend des Zitzenfortsatzes, so kann man mit Vortheil in den Gehörgang warme Dämpfe von Chamillenthee leiten und die hintere Ohrgegend cataplasmiren. Mit dem Durchbruch des Eiters durch das Trommelfell oder den proc. mastoideus nach aussen hört plötzlich der Schmerz auf und es handelt sich nun hauptsächlich darum, den Abfluss gehörig zu erhalten. Es ist zu diesem Zwecke dringend nöthig, den Angehörigen eine gute Spritze von Zinn, nicht von Glas zu verschaffen, und ihnen den Gebrauch desselben gründlich beibringen. Noch zweckmässiger ist für diese Fälle der continuirliche, sanfte Wasserstrom, wie er durch die Weber'sche Douche, ursprünglich nur für die Nase bestimmt, erzeugt wird. Fleissige, 2—3stündliche Injektionen mit warmem Wasser bieten die einzige Garantie, dass der Eiterabfluss ohne Störung und schmerzlos von Statten gehe. Das Austreten des Gehörganges mit der zusammengedrehten Ecke eines Schnupftuches ist reizend und deshalb verwerflich. Geschieht aber gar nichts zur Entfernung des Eiters, so bilden sich, besonders am Zitzenfortsatz, Krusten, der Abfluss stockt und es entstehen neue Schmerzen. Wenn das eitrige Stadium schon vor einigen Wochen abgelaufen ist, kann man mit adstringirenden Injektionen beginnen, wozu sich am besten eine Alaunlösung (1:10 Wasser) eignet. Rau empfiehlt bei Caries des Zitzenfortsatzes eine Kupfervitriollösung, (0,1—0,8 auf 30,0 Wasser) zum Einspritzen in die Knochenhöhle.

Innlich gibt man allgemein während des eitrigen Stadiums bis zum Durchbruche des Eiters Calomel in kleinen Dosen, wodurch jedenfalls der Stahl offen gehalten und die Fieberhitzes gemindert, der Uebergang in Eiterung jedoch nicht verhindert wird. Später bedürfen die Kinder einer roborirenden, antiscrophulösen Behandlung, Leberthran, Eisen, China, Bier, Wein, Fleischkost, Seebäder und Landluft.

Indem wir bezüglich der selteneren Entzündungen des inneren Ohres, dann des Ohrnzwanges und der nervösen Taubheit auf die

Specialwerke von Rau, Tröltsch und Erhard verwiesen, bleiben uns nur noch übrig einige Bemerkungen über:

5) Die fremden Körper im Ohre.

Es hängt innig mit der natürlichen Neugierde des Kindes zusammen, dass es an seinem Körper verschiedene Experimente vornimmt und die an die Oberfläche mündenden Höhlen genauer untersucht. Aus diesem Grunde besteht auch eine ganz besondere Neigung, kleine Gegenstände in die Höhlen zu schieben und nach deren Wirkung abzuwarten. Die in den Gehörgang geschobenen Gegenstände lassen sich bei einfallendem Sonnenlicht meistens leicht erkennen, nur wenn schon Anschwellung in Folge des Reizes sich eingestellt hat, kann die Untersuchung schwierig werden. Sondern dürfen nur mit grosser Vorsicht gebraucht werden, da der fremde Körper hierdurch leicht tiefer hineingestossen wird.

Die Symptome, welche durch einen fremden Körper im Ohre erzeugt werden, sind sehr verschieden je nach Form und Beschaffenheit desselben. Glatte, runde Körper, die im Ohre nicht aufschwellen, machen oft lange gar keine Symptome, aber kurz oder lang schwillt jedoch der Gehörgang immer an und es entsteht schmerzhaftes Otorrhoe. Durch die Otorrhoe und besonders auch durch misslungene Extractionsversuche wird das Trommelfell leicht perforirt und es treten nun alle Zeichen der im vorigen Abschnitt beschriebenen *Otitis interna* auf. Unter den eingebrachten Gegenständen sind die gewöhnlichsten: Kirschkerne, Traubenkerne, Erbsen, Bohnen, Linsen, Steinchen, Glasperlen, Papierkügel, Zuckerplättchen. Die bei alten Leuten so häufig vorkommenden Klumpen, aus verhärtetem Ohrschmalz, Baumwolle und Schmutz bestehend, sowie auch die steinigen Concremente, die sogen. Otolithen kommen bei Kindern fast niemals vor. Lebende Thiere machen zwar Anfangs sehr unangenehme Empfindungen, Mehen jedoch bald am Ohrschmalz kleben und sterben ab oder können auch leicht durch einige Tropfen Wasser oder verdünnten Weingeist getödtet werden. Die *Pediculus auricularis*, der vom Volk so gefürchtete Ohrwurm, bringt keine besonderen Gefahren mit sich, sondern verhält sich im Ohre so unschädlich wie alle übrigen lebenden Thiere desselben Calibers.

Am heftigsten sind die Symptome bei ätzenden Stoffen, Höllenstein, Kalilauge und mineralischen Säuren, wodurch das Tympanum in kürzester Zeit zerstört und die ganze schreckliche Symptomenreihe der *Otitis interna* verursacht wird. Von den nicht ätzenden Körpern sind jene die schlimmsten, welche organischer Natur sind und durch die warme Feuchtigkeit des Gehörganges aufquellen, was besonders für Erbsen, Bohnen und Linsen, in geringerem Grade auch für alle Fruchtkerne gilt. Steinchen und Glasperlen werden lange ohne Beschwerden ertragen, wenn sie nicht durch allzu heftige Extractionsversuche fest eingeklebt worden sind. Am günstigsten gestaltet sich das Verhältnis bei eingebrachten, harten Zuckerwaren, welche bald erweichen und zerfliessen, was durch einige Tropfen Wasser natürlich sehr befördert wird.

Behandlung.

Der einzigen und Hauptindication, der Entfernung des fremden Körpers kann nicht immer sogleich Genüge geleistet werden, indem die Schwellung und Schmerzhaftigkeit des Gehörganges zuweilen dieselbe momentan unmöglich macht. Diese Symptome müssen durch Blutegel, Cataplasmen, Entzündungen von Oel und Einspritzen mit lauem Wasser zuerst gemildert werden. Die Methoden, den fremden Körper zu entfernen, sind sehr mannigfach, zum Theil aber auch umständlich und abenteuerlich. Das sicherste und einfachste Mittel, ihn flott zu machen, ist jedenfalls die forcirte Einspritzung eines Warmwasserstromes. Der fremde Körper ist fast niemals genau von der Form des Gehörganges, das Wasser gelangt also hinter denselben und bringt ihn allmählig zum Schwimmen, worauf er am Ausgange des Gehörganges zum Vorschein kommt und leicht herausgenommen werden kann. Gelingt die Entfernung auf diese Weise nicht, so muss man zu den Hebeln greifen. Die Hebel verfertigt man sich selbst, indem man das stumpfe Ende einer feinen Haarnadel nach der Fläche krümmt und damit am besten an der hintern Seite des Gehörganges den fremden Körper zu umgeben sucht. Auch kleine spitze Haken, die man flach einführt und dann von hinten scharf einsetzt, können in verzweifelten Fällen benutzt werden, es ist jedoch dabei grosse Vorsicht nöthig, denn die Spitze des Hakens bricht schnell ab und man verletzt bei einiger Unruhe des Kranken leicht das Trommelfell. Pinetten sind bei runden Körpern, wie bei den Erbsen, Bohnen, Stünchen, Perlen etc. meist nutzlos oder sogar schädlich, indem ihre beiden Branchen zu viel Raum einnehmen und den grössten Durchmesser doch nicht erfassen können. Sie gleiten meist ab und stossen dadurch den fremden Körper nur tiefer hinein.

Eine dritte Methode, welche zwar sehr schonend, allein häufig erfolglos ist, besteht in der Extraction mittelst eines Klebstoffes, den man vorher in passender Weise mit dem fremden Körper in Verbindung gebracht hat. Man schiebt zu diesem Zwecke einen vorne und hinten glatt abgeschnittenen Federkiel in das Ohr und durch denselben auf den fremden Körper ein in Leim getränktes Bändchen. Nach einigen Stunden klebt das Bändchen ziemlich fest an und es gelingt man zuweilen die Extraction in erwünschter Weise. Bei fest eingekleibten Steinen etc. kommt jedoch das Bändchen meist allein zum Vorschein und die ganze Prozedur war vergeblich.

Alle diese Extractionsversuche erfordern eine ausserordentliche Ruhe und Standhaftigkeit des Patienten, die man von einem Kinde nicht erwarten darf. Es muss desshalb in den meisten Fällen eine Chloroformnarkose vorgenommen werden, wodurch die ganze Manipulation ausserordentlich erleichtert wird. Die hierauf sich einstellende Otitis und Otorrhoe muss nach den schon angegebenen Principien behandelt werden, hört aber auch ohne Behandlung viel schneller wieder auf als ein dyskrasischer Ohrenfluss.

6. Capitel.

Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.

A. Nieren.

1) Bildungsfehler der Nieren.

Die Nieren fehlen niemals gänzlich und sind selbst bei den unvollkommensten Mischgurten zum Theile vorhanden. Häufiger ist nur eine Niere vorhanden, wobei Rokitsansky einen Unterschied zwischen der unpaarigen und der einfachen Niere macht. Bei der erstern findet sich an normaler Stelle, links oder rechts von der Wirbelsäule, eine Niere, die sich auch in Gestalt nur wenig von der gewöhnlichen unterscheidet, während auf der gegenüberliegenden Seite keine Spur zu finden ist. Die einfache Niere hingegen ist eine abnorme Verschmelzung zweier Nieren, als deren geringster Grad die Hufeisenniere (ren unguiformis) zu betrachten ist. In diesem Fall existiren noch zwei getrennte Nieren von normaler Gestalt, welche an ihrem unteren Ende mittelst einer platten Substanzbrücke verbunden sind. Je dicker diese Verbindung wird, um so deutlicher tritt die Form der einfachen Niere hervor. Endlich verschmelzen auch die beiden Hilas und es erscheint an der Vorderseite ein Hilus. Die einfache Niere rückt immer weiter nach unten und liegt in der Regel in der Gegend des Promontoriums, sehen gleich der unpaarigen ausserhalb der Mediallinie.

Außerdem kommen noch verschiedene, kleinere Abweichungen der Gestalt vor, wobei zu bemerken, dass die Niere der Neugeborenen auch im Normalzustande eine etwas grubhöckerige bucklige Gestalt hat, im Allgemeinen rundlicher ist und nach oben eine deutliche Abflachung zeigt.

2) Der Harnskureinfarkt der Neugeborenen. Infarktus renalis.

Der Harnskureinfarkt ist eine Entdeckung der Neuzeit, um welche sich besonders Vernois, Engel, Schlossberger, Virchow, Hesselung und Martin in Berlin verdient gemacht haben. Er stellt sich dar als eine scharf markirte, goldgelbe Streifung der Pyramiden, und diese Streifen laufen alle concentrisch in den Papillen zusammen, weshalb sie dort auch am dichtesten gefunden werden. Unter dem Mikroskope geben sie sich als cylindrische Säulchen zu erkennen, welche bei stärkerer Compression zerfallen und nun ein rothes Pulver, bestehend aus amorphen, harnsauren Salzen, ferner Epithelien der geraden Harnkanälchen und kleinen, rhomboidrischen Harnsäurekrystallen, zum Vorschein kommen lassen. Wenn man diese goldgelben Streifen in den Papillen findet, so liegen gewöhnlich auch einzelne derselben als carminrothes Pulver im Nierenbecken und im abhängigsten Theile der Harnblase.

Der Harnsäureinfarkt kommt bei zwei Dritttheilen der Kinder vor, welche nach dem zweiten und vor dem elften Lebenstage gestorben sind. Bei Todtgeborenen zeigt er sich fast niemals, bei Kindern, die nur einen Tag lang geathmet haben, selten, hingegen besteht er häufig länger als elf Tage, so dass man ihn ausnahmsweise sogar noch bei Kindern trifft, welche 4—6 Wochen lang gelebt haben.

Dass wir es hier nicht mit einem pathologischen, sondern einem physiologischen Prozesse zu thun haben, geht schon aus der Häufigkeit, aus dem Mangel aller krankhaften Zeichen bei Lebczotten und aus dem immer zufälligen Befunde bei Kindern, die an anderen Krankheiten gestorben sind, hervor. Es lässt sich dieser Vorgang nach Virchow ganz ungenöthigt auf folgende Weise erklären: Unmittelbar nach der Geburt beginnt in Folge des Athmungsprocesses eine viel raschere Oxydation der Gewebe, als deren Resultat unter anderen Produkten auch die Harnsäure sich einstellt. Dieselbe wird an Basen gebunden in die Niere ausgeschieden, findet aber bei den Neugeborenen noch nicht die hinreichende Wassermenge, um gelöst zu bleiben. Die massenhaft ausgeschiedenen harnsauren Salze schieben sich nun in den geraden Harnkanälchen nieder und erscheinen gelb, indem sie den Farbstoff hiebei binden. Der später in grösserer Menge secretirte und deshalb verdünntere Harn löst sie zum Theil wieder auf, zum Theil schiebt er sie ungelöst vor sich her und führt sie in die Blase und von da nach aussen. Man findet auch in der That bei den meisten Neugeborenen in den Windeln lie und da ein rothes Pulver, das sich bei genauerer Untersuchung als Harnsäureinfarkt charakterisirt. Zu dieser Erklärung passt allerdings das wenn auch äusserst seltene Vorkommen des Harnsäureinfarktes bei Todtgeborenen nicht, und es geht daraus hervor, dass dieselbe nicht vollkommen erschöpfend ist. Der Harnsäureinfarkt ist zwar als ein entschieden physiologischer Vorgang anzusehen, doch gibt er auch Veranlassung zu pathologischen Processen, nämlich zu dem so häufigen Abgange von Gries und zur Bildung von Blasensteinen. Der Kern der Blasensteine besteht bei den Kindern in Wirklichkeit auch immer aus Harnsäure.

Für die gerichtliche Medicin ist der Harnsäureinfarkt nicht ohne Bedeutung, indem er ein jedenfalls ebenso sicherer Beweis für das Gelbthun als der Luftgehalt der Lungen und vor diesem Zeichen noch den Vorrang hat, dass er sich bei beginnender Fäulniss nicht so schnell verändert. Im Uebrigen ist er bis jetzt bloss von pathologisch anatomischem Interesse.

3) Morbus Brightii. Die Bright'sche Nierenerkrankung.

Bei Kindern kommt fast nur die acute Form von Morbus Brightii vor und zwar nur als Nachkrankheit des Scharlachs. Die chronische Form ist so selten, dass ich sie erst ein einziges Mal bei einem tuberculösen Knaben von 10 Jahren beobachtet habe. Die letztere unterscheidet sich in nichts von der bei Erwachsenen vorkommenden Erkrankung, und wir können deshalb in dieser Beziehung auf die neueren Handbücher und namentlich auf die Freerich'sche Monographie, das Prototyp einer feisigen, erschöpfenden Abhandlung, verweisen.

Wir beschränken uns auf eine eingehendere Betrachtung der acuten Form.

Pathologische Anatomie.

Die Nieren zeigen gewöhnlich jene Veränderungen, die Frerichs dem Ende des ersten oder dem Anfange des zweiten Stadiums zuschreibt. Sie sind sichtlich vergrößert und zwar in Folge einer Volumszunahme der Corticalsubstanz, welche dunkelroth gefärbt, mürbe und brüchig ist. Die Schnittfläche ist sehr feucht und lässt ein klebriges, blutiges Serum abstreifen. Auch findet man häufig kleine, stecknadelkopfgrosse Blutextravasate in ihr. Die Pyramiden sind bei weitem weniger verändert und zeigen nichts als stärkere Gefässinjection, die eine allgemeine, dunkle Röthung veranlasst.

Die Vergrößerung der Niere hat ihren Grund in einem Faserstoffexsudate, das die gewundenen Harnkanälchen ausfüllt und in der von der Schnittfläche abgestreiften Flüssigkeit mikroskopisch nachgewiesen worden kann. Es finden sich dann unter dem Mikroskope zahlreiche bräunliche Cylinder, die bald klar, hyalin, bald noch mit Epithelzellen umgeben sind, bald deutliche Blutkörperchen einschliessen. In viel geringerer Menge kommen die Cylinder auch in den geraden Harnkanälchen vor, fehlen übrigens nie im Bodensatz des eiweisshaltigen Urines. Wenn die Kinder gleich zu Anfang dem Process erliegen, so enthält der Urin viele Blutkörperchen und ist davon dunkelroth gefärbt, nach längerer Zeit ist er hellgelb, trübe, Blutkörperchen und Blutfarbstoff sind verschwunden, Eiweiss und Cylinder aber immer noch nachzuweisen. In diesem letzteren Falle zeigt die Corticalsubstanz mehr die Charaktere des zweiten Stadiums nach der Einteilung von Frerichs.

Sie verliert dabei ihre dunkelrothe Farbe mehr und mehr und wird zuerst stellenweise, dann überall blassgelb. Die Blutkörperchen in den verstopften Capillaren zerfallen, werden sammt dem Farbstoff resorbirt oder weiter geschwimmt und das Exsudat innerhalb der Harnkanälchen geht ebenfalls eine Rückbildung ein. Die Cylinder zerfallen zu Fettmolekülen, behalten wohl noch lose ihre Form, verlieren sie aber schon durch den einfachen Druck des Deckgläschens, weshalb dessen Anwendung in diesem Stadium nicht immer thöricht ist.

Die Niere behält ihre Volumszunahme bei, ist sehr brüchig, die Kapsel lässt sich leicht abziehen und die Oberfläche zeigt sich alsdann etwas granulirt. Diese leicht höckerige Beschaffenheit entsteht dadurch, dass die Fettmetamorphose und der darauffolgende Schwund nicht in allen Theilen der Rindensubstanz gleichmässig vor sich geht. Während die eine Partie schon collabirt und zu schwinden beginnt, ist eine andere noch starr von Exsudat und nimmt noch den früheren grossen Raum ein.

Die Menge des Urines in der Blase ist in ganz acuten Fällen eine geringe, bei Kindern, die erst nach mehreren Wochen zu Grunde gehen, kann sie wieder zu ihrem normalen Maasse zurückgekehrt sein.

Ausserdem findet man fast in allen Leichen Anasarca und hydropische Ergüsse im Peritonealsack, im Pleuren, im Hirsnhirn, oft combinirt mit entzündlichen Ausschwitzungen namentlich auf der Pleura. In den übrigen Organen kommen jene so constanten Ver-

änderungen, welche wir bei der chronischen Form Erwachsener finden, steht vor.

Symptome.

Die ersten Zeichen der Nierenkrankung stellen sich gewöhnlich zur Zeit der stärksten Desquamation, am Ende der dritten Woche ein. Die Kinder, schon ganz munter und längst wieder bei gutem Appetit, verlieren denselben plötzlich wieder. Sie bekommen Ueblichkeiten, wohl auch Erbrechen; Fieber und Mattigkeit stellen sich von neuem wieder ein. Zu gleicher Zeit bekommt das Gesicht ein gedunsenes Aussehen, die Haut der unteren Augenlider wölbt sich zu kleinen glänzenden Säckchen und in wenigen Stunden ist die ganze Körperoberfläche von Anasarka ergriffen. Dabei bemerkt man eine sichtliche Sistirung der Harnsekretion, oft lebhaft Schmerzen in der Nierengegend, in den acutesten Fällen lassen die Kinder länger als 24 Stunden keinen Urin und entleeren endlich unter lebhaften Schmerzen einige Tropfen blutig gefärbten, concentrirten Harnes. In vielen Fällen aber ist der Harn nicht so sehr vermindert und nicht blutig gefärbt, sondern von lilafarbener Farbe und klar, so dass die einfache Besichtigung gar keine Veränderung an ihm erkennen lässt.

Die chemischen und mikroskopischen Veränderungen des Harnes sind dieselben, wie bei Morbus Brightii der Erwachsenen. Die Menge des Eiweisses ist in den ersten Tagen, wenn nicht sehr viel Blut beigemischt ist, geringer als später und hält sich zwischen 10 und 30 pro mille. Die approximative Bestimmung des Eiweissverlustes lässt sich anstellen, indem man täglich eine gewisse Menge Harn in einem in Grade eingetheilten Probirröhrchen kocht und das gefällte Eiweiss 24 Stunden lang sich senken lässt. Weiss man nun die Menge der ganzen täglichen Harnmenge, so kann man leicht berechnen, wie viel Centimeter Eiweiss täglich durch den Urin entleert werden. Genauere Resultate werden durch meine optische Eiweisssuche erzielt. Bei Kindern ist jedoch das Sammeln des 24stündigen Urines mit ziemlichen Schwierigkeiten verbunden, indem sie immer bei der Stuhlentleerung auch Urin lassen.

Die Cylinder findet man am sichersten und in grösster Menge, wenn man einen vor mehreren Stunden gelassenen Urin langsam ablassen lässt und den Rest in ein hohes Champagnerglas giesst. In diesem Glase lässt der Urin wieder mehrere Stunden ruhig stehen, hierauf giesst man ihn bis auf einige Tropfen ab und untersucht nun diese letzten Tropfen mikroskopisch. Findet man auf diese Weise keine Cylinder, so kann man sicher sein, dass wirklich keine vorhanden sind. In allen Fällen von acutem Morb. Brightii aber sieht man dieselben dicht gedrängt neben und übereinander liegen und bekommt durch Besichtigung und Vergleich einer grösseren Anzahl dieser Gebilde die gehörige Einsicht in das Wesen der ganzen Krankheit. Je nach der Dauer des Uebels haben die Cylinder die verschiedenen Eigenschaften, von denen schon oben bei der pathologischen Anatomie gesprochen wurde.

Die Harnmenge ist im Allgemeinen vermindert, die Salze sind ebenfalls vermindert, der Farbestoff aber hat in den meisten Fällen zugenommen, im Verlaufe jedoch bekommt der Urin wieder eine normale,

strohgelbe Farbe. Die häufigen Trübungen und Sedimente rühren theils von der Gegenwart sehr vieler Cylinder, theils von reichlichen Epithelien und von harnsauren Salzen.

Besteht die Entleerung eines eitrigenhaltigen Urines einige Tage lang fort, so nimmt das Anasarca mehr und mehr überhand und bald stellen sich auch die Symptome von Höhlenwassersucht ein. Der Unterleib wölbt sich mehr und mehr, percutirt man ihn in sitzender Stellung, so findet man vollkommene Dämpfung an den unteren Partien, in der Rückenlage ergiebt sich deutliche Fluktuation, die übrigens hier nebenbei noch einen zweiten Grund in der Hautwassersucht hat. Noch auffälliger sind die Symptome der Brustwassersucht. Je grösser der seröse Erguss in den Pleurasäcken wird, um so schneller und beschwerlicher athmen die Kinder, der marte Percussionsschall geht weiter und weiter herauf, man hört wenig oder gar kein Respirationsgeräusch mehr, sondern nur durch die Rippen fortgeleitete Rasselgeräusche. Das meistens gleichzeitig eintretende Hydropericardium macht den Puls unregelmässig, aussetzend, klein, die Dämpfung in der Herzgegend nimmt an Umfang zu, ist jedoch wegen des daneben bestehenden Hydrothorax nicht genau zu begrenzen. Dabei steigert sich die Athemnoth der Kinder in erschrecklicher Weise. Sie sitzen nach Art der Krupkranken aufrecht in ihrem Bettchen und schlafen, wenn es überhaupt hienzu kommt, mit vorgebeugtem Kopfe. Sie klammern sich mit den Händen an das Bett an, um die mm. pectorales zu fixiren und zur möglichen Erweiterung des Thorax benutzen zu können, und sehen sich mit kläglich ängstlichen Blicken allwärts nach Hülfe um.

Die Kinder können bei zunehmenden Hydrothorax suffocatorisch, wohl auch durch Glottisödem zu Grunde gehen oder es stellen sich in Folge der tiefen Nierenkrankung urämische Symptome ein. Die letzteren manifestiren sich oft frühzeitig als heftige Kopfschmerzen, Eclampsien, Abnahme des Gesichts, des Gehörs, Sopor und Delirien, auch kann ein Erschöpfungstod durch hartnäckiges Erbrechen und profuse Diarrhöen herbeigeführt werden.

Uebergang in die chronische Form des M. Brightii kommt bei Scharlach fast niemals vor, entweder sterben die Kinder bald unter den oben bezeichneten Symptomen oder es nimmt nach 2—3 Wochen das Eiweiss im Urine ab, derselbe wird in grosser Menge gelassen, die Oedeme und Ergüsse in den serösen Säcken verschwinden wieder und es tritt hierauf eine vollständige Genesung ein. Hievon konnte ich mich einmal durch die Section eines Kindes überzeugen, das ich kein halbes Jahr vorher an acutem M. Brightii behandelt hatte und später durch einen heftigen Typhus verlor. Die Corticalsubstanz der Nieren war hier ganz normal, weder zu gross noch zu klein und unterschied sich auch mikroskopisch in keiner Weise von einer gesunden Niere.

Nicht alle Nephritides, die mit und nach dem Scharlach auftreten, verlaufen mit Hydrops, resp. es kommt in einzelnen Fällen nicht hienzu, indem der Tod zu früh eintritt. Es gehören hieher die meisten Scharlachfieber, welche unter Convulsionen, Erbrechen und Coma rasch tödtlich enden und deren unglücklicher Ausgang oft irrtümlich auf die Heftigkeit des Fiebers, auf ein vorzeitiges Zurücktreten des Exanthemes, auf Hydrocephalus acutus oder noch bequemer auf die Intensität

toxische Wirkung des Contagiums geschoben wird. Die genauere Untersuchung der Nierenrinde ergibt in den meisten dieser rapid verlaufenden Fälle eine deutliche Veränderung und zwar die des ersten Stadiums heftiger Erkrankung.

Umgekehrt kommen aber auch einzelne Fälle von Hautwassersucht nach Scharlach ohne Erkrankung der Nieren, ohne Albuminurie vor. Nach Frerichs wird dieses einfache Anasarca durch Erkältungen während der Desquamationsperiode veranlaßt und beruht auf einer Paralyse der Gefäßnerven der Haut und des Unterhautzellgewebes.

Ueber das Vorkommen und die Häufigkeit der Nephritis nach Scharlach bestehen die widersprechendsten Angaben. Während die einen Autoren $\frac{1}{2}$ und selbst $\frac{3}{4}$ aller Scharlachkinder daran erkranken sehen, beobachten ihn andere nur sehr selten, unter 20 oder 30 Fällen einmal. Die ersteren glauben, es käme nur darauf an, in allen Fällen gründlich und genau den Harn zu untersuchen, die letzteren weisen diesen Vorwurf mit Entrüstung zurück und zeihen ihre Gegner der größten Uebertreibung. Beide aber können möglicher Weise vollkommen Recht haben, denn es richtet sich lediglich nach dem Charakter der Epidemien und nicht nach der Intensität der Erkrankung. In einzelnen Epidemien werden fast alle Scharlachkranken hydropisch, in anderen kaum einige Procent.

Von 100 Scharlachkranken beobachteten Hydropsie:

Haidenhain bei	80 Proc.
James Miller bei	27 „
Wood in Edinburg bei	12½ „
Rösch bei	10 „
Frerichs bei	4 „

Seit mehreren Jahren ist der Scharlach in München endemisch, jedoch nur schwach contagios, und ich habe mindestens 50 bis 60 Fälle beobachtet, erst zweimal kam mir Albuminurie und zwar nur sehr vorübergehend vor.

Behandlung.

Das meiste in dieser Krankheit leistet der Arzt durch eine umsichtige Prophylaxis. Man muss die Localität, in welcher ein Scharlachkind liegt, sorgfältig auf Luftbewegung, Temperaturverhältnisse und Feuchtigkeit prüfen und muss jenem Zimmer den Vorzug geben, in welchem durch Oeffnen der Thür kein unangenehmer Zug entsteht, das gehörig erwärmt und gelüftet werden kann und dessen Wände selbstverständlich trocken sind. Da Fetteinreibungen die Haut ansehnlich gegen Temperaturentschiede weniger empfindlich machen, so sind dieselben jedenfalls anzustellen, wenn sie auch bei weitem nicht jene Garantie bieten, die Schneemann ihnen octroyiren wollte.

Mit diesem Begnue ist fortzufahren, bis die Desquamation vollständig vorüber und das Kind durch einige Bäder wieder zu grösserer Temperaturschwell gewöhnt worden ist.

Ist einmal Wassersucht und Albuminurie eingetreten, so sucht man die Stase in den Nieren durch Anregung anderer Sekretionen, der Haut und des Darmes, zu paralyziren. Aus der Klasse der Laxantien gibt man am besten das Calomel, das Ol. Ricini, später auch Senna, Jalappa und Coloquinten und mischt mit Recht die

salinischen Abführmittel, da die Salze größten Theils resorbiert und dann durch die Nieren ausgeschieden werden. Bei Kindern, welche überhaupt zur Diarrhöe geneigt sind, muss man jedoch sehr vorsichtig sein, indem sonst profuse, bis zum Tode fortbestehende Durchfälle verursacht werden können. Die Hautsekretion, welche bei Anasarca sehr gering ist, kann man durch heiße Bäder und kleine Dosen Tartar. stibiāt. oder, wenn die Kinder sehr unruhig sind, durch kleine Dosen Opium oder Campher anzuregen versuchen. Das Hauptaugenmerk ist immer auf die Urinsekretion zu richten. Kommt diese gehörig in Gang, so genesen die Kinder fast alle bei guter Wart und Pflege, bleibe sie aber vermindert, so muss man sie durch Diuretica vermehren. Als das beste Diureticum, das einzige, das keine unangenehmen Nebenwirkungen hat und längere Zeit ohne Störung der Verdauung gereicht werden kann, ist der Roos Juniperi, möglichst frisch bereitet, zu empfehlen. Die Kinder nehmen ihn gemockert und mit etwas Wasser verdünnt meist gern und man kann ihnen leicht 2—3 Kaffeelöffel in 24 Stunden beibringen. Ich habe mich schon zum öfteren von der augenscheinlich günstigen Wirkung dieses Mittels überzeugt und gebe ihm bei Kindern den Vorzug vor der Digitalis, dem Weinstein und dem Kali acetikum.

Die drohende Urämie muss durch Pflanzensäuren und Laugenbäder bekämpft werden. Gegen profuse Durchfälle zeigt sich der Bleinucker, täglich zu 0,1—0,2, mit Opium verbunden, am wirksamsten. Sollte das Oedem und die Albuminurie nach 3—4 Wochen nicht verschwunden sein, was jedoch gewöhnlich der Fall ist, so ist eine tonisirende Behandlung mit Tannin, China und Eisenpräparaten angezeigt. Gegen die zurückbleibende Anämie genügt die Darreichung guter, leicht verdaulicher Kost und der Genuss einer frischen Luft.

4) Nierensteine, Nierentuberkel, Nierencysten.

Obgleich die Concrementbildung im uropoëtischen Systeme der Kinder häufig ist und ihren Grund in dem schon besprochenen, physiologischen Harnsäureinfarkt hat, so kommt es doch nur sehr selten zu grösseren Steinen, welche beträchtliche Symptome verursachen müssten. Man beobachtet in diesen Fällen entschiedene Nierenschmerzen, einen eiterigen Bodensatz im Urin und Abgang von kleinen Concrementen unter heftigen Schmerzen im Verlaufe der Ureteren und der Harnröhre. Der Eiter im Harn rührt her von einer secundären Entzündung des Nierenbeckens und der gereizten Schleimhaut der Harnleiter und der Blase.

Die Behandlung besteht im Wesentlichen darin, die Kinder möglichst viel Wasser trinken zu lassen, indem hierdurch einerseits die bestehenden Concremente leichter fortgeschwemmt werden und andererseits ein diluierter Urin eher eine Verkleinerung des Gräses als einen neuen Ansatz von Niederschlägen bewirken muss. Wenn grosse Ulcerationen im Nierenbecken entstanden sind, so stellt sich Fieber ein, das bald den Charakter des hektischen annimmt, und es tritt der Tod ein, oder die erkrankte Niere kann endlich ganz atrophisch und es vicariirt für sie die noch übrige gesunde.

Der Nierentuberkel tritt in doppelter Form auf. Das eine Mal

wird die Niere zugleich mit den meisten übrigen, parenchymatösen Organen von Miliartuberculose befallen, welche fast gar keine Nierensymptome macht und erst in der Leiche entdekt wird, das andere Mal ist die Tuberculose bei Knaben mehr örtlicher Natur und erstreckt sich von einem tuberculösen Hoden aus auf die Schleimhaut der Blase, der Ureteren und endlich auch auf die Nieren. In diesem Falle kann ein grosser Theil der Niere von gelbem, käsigem Tuberkel durchsetzt werden und so hypertrophiren, dass die Oberfläche bickrig wird. Es kommt sogar Schmelzung des gelben Tuberkels vor, wodurch zuletzt eine tuberculöse Nierencaverne und endlich Nierenphthise entsteht. Die Behandlung der Nierentuberculose ist sehr tröstlos und muss sich lediglich darauf beschränken, durch roborirende Mittel und Leberthran die Constitution zu verbessern.

Die Cystenformation ist in den Nieren ein sehr gewöhnlicher Process und kommt sogar schon anghoren vor. Es sind in der Literatur Geburtsfälle bekannt, in denen der Leib durch sitale Cystenbildung in beiden Nieren so aufgetrieben wurde, dass dadurch ein Hinderniss der Geburt gegeben war. Einzelne Cysten von der Grösse eines Haisknoens bis einer Kirsche findet man sehr häufig bei den verschiedensten Sectionen. Sie sind immer ganz oberflächlich in der Corticalsubstantia gelagert und meist mit hellem dünnflüssigem Serum gefüllt. Die chemische Untersuchung dieses Serums ergibt einen geringen Eiweissgehalt und nur ausnahmsweise die den Harn charakterisirenden chemischen Körper, Harnstoff und Harnsäure. Als Ursache dieser Cysten nimmt man allgemein Verstopfung einzelner Harnkanälchen durch Harnsäureinfarkt, später auch durch kalkige Concremente, Extravasate und cylindrische Exsudate an. Der Acephalocystensack und die zusammengesetzten Cystoide sind in der Niere der Kinder überaus selten und können deshalb füglich übergangen werden.

B. Harnblase.

1) Bildungsfehler.

A. Völliger Mangel der Blase kommt höchst selten vor und ist immer mit Bildungsfehlern anderer Organe combinirt. Die Harnleiter münden dann in den Nabel, den Mastdarm oder die Scheide. Häufiger wird beobachtet:

B. Spalte der Harnblase, *Protopus*, s. *Defectus*, s. *Ectopia*, *Inversio vesicae urinae*. Man versteht unter allen diesen Bezeichnungen einen Defect der vorderen Blasenwand und des entsprechenden Theiles der Bauchwand, so dass die hintere Blasenwand frei zu Tage liegt. *Tafel III. Fig. 10.*

Man unterscheidet zwei Formen, eine totale und eine partielle. Bei der ersteren erstreckt sich die Bauchspalte vom Nabel bis in das Schambein und die Genitalien, bei der letzteren findet sich ein wohlgebildeter Nabel, normale Genitalien und nur eine kleine Oeffnung in der vorderen Bauchwand. Beim Neugeborenen besteht in der Gegend der Urinblase eine hochrothe Lücke von der Grösse eines Thalers und darüber, welche von einem scharfen Hautringe begrenzt wird. Erst nach der Geburt wird diese rothe Lücke, gebildet aus der hinteren

Blasenwand, durch die Anwendung der Bauchpresse während des Schliessens und der Stuhlentleerung nach auswärts gestülpt und erscheint dann als eine fleischartige, weiche fluctuirende Geschwulst. Dieselbe ist stets feucht und schlüpfrig und zeigt nach unten jeder Seite ein kleines Knöpfchen, die Einmündungsstellen der Ureteren, welche man besonders deutlich erkennt, wenn man die Geschwulst etwas nach oben verschiebt. Bei längerer Beobachtung sieht man den Urin tropfenweise aus diesen Punkten aussickern, und es entsteht bei dieser feinen Vertheilung des Harnes eine sehr rasche Entwicklung von kohlensaurem Ammoniak, das an dem bekannten scharfen Geruche zu erkennen ist.

Nach einigen Jahren wächst der Hamtring unter zunehmender Wulstung etwas über den Vorfall hinüber und verkleinert so die Ansicht der Blaseschleimhaut, immer aber bleibt ein grosses Stück der hinteren Blasenwand unbedeckt. Dieses freiliegende Stück verliert nach und nach den Charakter der Schleimhaut, wird oberhalb der Ureteren ziemlich trocken, callös, unempfindlich, oberhalb derselben exsoriert der Prolaps häufig in Folge des fortwährend abfließenden, ammoniakalischen Harnes und bekommt ein fungöses Aussehen.

Die complete Harnblasenspaltung erstreckt sich immer bis in die Genitalien. Der Penis ist sehr kurz, nahe der umgestülpten Blase, und entweder total oder theilweise gespalten, in letzterem Falle hat er das Aussehen, als wäre er von der Harnröhre aus nach oben gespalten, so dass die Harnröhre keinen geschlossenen Kanal, sondern eine nach oben offene Rinne darstellt. Bei weit gehenden Spalten hängt an beiden Seiten ein längerer Appendix, der gespaltenen Penis, und es kann sich die Theilung bis in das Scrotum erstrecken, wodurch die Unterscheidung des Geschlechtes zweifelhaft werden kann. Diese Unterscheidung wird um so schwieriger, wenn, wie es gewöhnlich der Fall ist, die Hoden noch in der Bauchhöhle geblieben sind.

Beim weiblichen Geschlechte finden sich analoge Spaltungen. Die Clitoris ist getheilt, die grossen und kleinen Labien klaffen und die Scheide fehlt oft gänzlich. Der Damm ist ausserordentlich kurz und der After liegt unmittelbar hinter den Genitalien, er kann sogar so weit nach vorne gerückt sein, dass er in die hintere Blasenwand selbst einmündet und der Koth sich ebenfalls aus dem Blasenroefalle entleert.

Bei so hochgradigen Spaltungen sind die queren Schambeinhäute nur rudimentär vorhanden. Sie hängen in der Nähe des Vorfalles entweder einfach auf, oder hängen hinter demselben durch ein schmales Band mit einander zusammen. Das Becken ist in seinem queren Durchmesser sehr weit, von hinten nach vorne aber vorragt. Das Kreuz- und Steissbein sind stark nach vorne gekrümmt, womit wohl auch die Kürze des Damms und die Mündung des Afters weit nach vorne zusammenhängt. —

Die Folgen dieses Uebels sind je nach seiner Ausdehnung verschieden. In allen Fällen entwickelt die damit befallenen Kranken einen ekelhaften Uringernach und leiden an beständigen Excretionen in der Umgegend der Ureterenmündung. Bei Spaltung des Penis, dem höchsten Grade von Epispadie, oder bei mangelhafter Entwicklung der Scheide wird die Individuen natürlich fortpflanzungsunfähig. Uebrigens sind solche Kinder vollkommen lebensfähig, und man kennt Fälle, in denen das vierzigste Lebensjahr erreicht wurde. Huxham beschreibt

sogar einen sehr merkwürdigen Fall von einer Frau, welche mit Prolaps vesicae congenitus und Cloakenbildung behaftet war, im 23sten Jahre heirathete, concipierte und gebar! Der Gatte eines solchen Weibes verdient fast eine ebenso grosse Bewunderung als dieses selbst.

Ueber die Entstehung der Ectopie der Blase wurden schon mannigfache Hypothesen aufgestellt. Die Erklärung, welche J. Müller giebt, erscheint als die plausibelste.

Nach diesem Autor bildet sich die Harnblase nicht durch Umlegen eines Blattes, sondern nur durch allmähliche Erweiterung des mit dem Urachus vom Sinus urogenitalis sich abschneidenden Schlauches. Der Urachus entsteht aber ebenfalls nicht durch Umlegen eines Blattes, sondern ist nur der Hals der Allantois, welche ursprünglich als Bläschen aus dem Darmkanal hervorwächst. Aus diesen beiden Thatsachen folgert J. Müller, dass wir es hier nicht mit einer Bildungsstörung, nicht mit einem Stöhenbleiben der Harnblase auf einer früheren Entwicklungsstufe zu thun haben. Er ist vielmehr der Ansicht, dass der Mangel der vorderen Blasenwand auf einer Ruptur der Blase beruht, welche zu einer Zeit sich ereignet, wo die Bauchdecken noch nicht vollständig gebildet sind. Die Ruptur muss ihren Grund in einer ständigen oder vorübergehenden Unwegsamkeit der Harnröhre haben, wodurch der in der Blase angesammelte Harn dieselbe so weit ausdehnt, bis sie endlich platzt. Es entsteht hierdurch eine Oeffnung zwischen dem Nabel und den äusseren Genitalien. Der leichteste Grad dieser Missbildung ist Epispadie, Abfluss des Harnes an der oberen Fläche des Penis oder oberhalb der Scham, die gewöhnliche Folge aber ist eine grössere Oeffnung zwischen Nabel und Schambeinen.

Behandlung.

An eine Verschlössung des Defectes durch Anfrischung der Ränder und Vereinigung mittelst Nadeln lässt sich überhaupt nur denken, wenn eine permeable Harnröhre vorhanden ist, aber auch in diesem, übrigens sehr seltenen Falle, wird meines Wissens die Operation regelmässig durch den die Wundfläche berührenden Urin vereitelt. Man muss sich also darauf beschränken, durch möglichste Reinlichkeit und Bestreichung mit Oel die Excoriationen zu verhüten und zu heilen. Wenn die Kinder grösser werden, kann man versuchen, durch den Apparat von Earle den ekelhaften Geruch zu mindern. Derselbe besteht in einem hohlen Silberschild, in welchen eine mit einem Hahne verschlossene Gummiköhre fährt. Er wird durch ein doppeltes Band an die umgestülpte Blase angedrückt. —

C. Cloakenbildung. Communication des Mastdarmes mit der Blase wurde schon bei den Bildungsfehlern des Mastdarmes besprochen.

2) Blasenentzündung, Blasenentzündung, Cystitis.

Eine seltene Krankheit im Kindesalter. Sie kommt vor in Folge äusserer Verletzungen oder rauher Blasensteine, ausserdem nur noch auf Missbrauch von Canthariden, und endlich noch am Schluss schwerer Krankheiten, Typhus, Cholera, Blattern.

Pathologische Anatomie.

Die oben angeführten Ursachen veranlassen fast immer nur die *Cystitis mucosa*, den Catarrh der Schleimhaut, und nur die äusseren Verletzungen können in ganz seltenen Fällen *Cystitis serosa* — Entzündung des serösen Ueberzuges der Blase — oder *Pericystitis* — Entzündung des die Blase locker umgebenden Bindegewebes — verursachen.

Die entzündete Blasen Schleimhaut ist stark injicirt, bei längeren Bestehen braungrau pigmentirt, verdickt, am Boden finden sich grössere Mengen Schleim, auch kommen wohl Excoeciationen, Geschwüre und Divertikelbildungen vor. Die grössten Veränderungen finden sich immer bei Gegenwart eines Steines mit rauher Oberfläche.

Symptome.

Die Blasesymptome können sich in einzelnen Fällen sehr rasch entwickeln, z. B. bei Kindern, welche gegen Cantharidenpflaster empfindlich sind, schon 12 Stunden nach Application des Pflasters, bei Blasensteinen hingegen treten sie sehr schlechend ein, bessern sich oft wieder und recidiviren von neuem.

Die nie fehlenden Symptome sind Schmerz und Empfindlichkeit der Blasegegend, des Damms und der Harnröhre, fortwährender Harndrang und schmerzhafter, tropfenweise Entleerung eines dunkeln, trüben selbst blutigen Urins. In den höchsten Graden, wozu es bei Kindern jedoch fast niemals kommt, vollständige Harnverhaltung, Ausdehnung der Blase, Fieber, typhöse und peritonitische Symptome, Sopor, grünes Erbrechen, Collapsus, Angstschweiss etc.

Der Harn enthält immer grosse Mengen von Blasesepithel, Schleim, und Eiter, wird milchig trübe gelassen, klärt sich auch nach längeren Stehen nicht vollkommen und bekommt einen dicken, zähflüssigen Bodensatz. Er zersetzt sich sehr schnell, entwickelt Ammoniak und färbt endlich auch silberne Instrumente bräunlich. Bei diphtheritischer Cystitis, welche nur in schlecht ventilirten Spitälern mit Diphtheritis anderer Schleimhäute complicirt beobachtet wird, gehen unter heftigem Drängen auch grössere Membranen mit dem Urine ab, die mikroskopisch leicht als Diphtheritis zu erkennen sind.

Der Verlauf der Cystitis ist sehr verschieden nach den Ursachen. Am schnellsten und sichersten vergeht die durch Cantharidenpflaster erzeugte. Nach einigen Tagen wird hier der Urin wieder vollkommen klar, ohne Schmerz entleert, und der ganze Process ist spurlos verschwunden. Länger dauert die Cystitis am Ende schwerer Krankheiten, doch endet auch diese, wenn anders der Körper sich überhaupt wieder erholt und kräftigt, nach einigen Wochen in Genesung. Die Prognose der traumatischen Cystitis richtet sich nach der Schwere der Verletzung, wofür man stets im Auge behalten muss, dass gemäss der grösseren Reproduktionskraft im kindlichen Alter auch grosse Traumen in überraschend kurzer Zeit heilen können.

Am schlimmsten verhält sich die durch Blasensteine unterhaltene Cystitis. Es kann zwar auch hier ausnahmsweise vorkommen, dass trotz der Anwesenheit des Steines der Blascatarrh verschwindet, was vielleicht bei ganz glatter Oberfläche des Steines möglich ist, gewöhnlich

aber darum die entzündlichen Symptome so lange fort, als der Stein in der Blase sich befindet, und schwinden erst gänzlich nach dessen gelungenem Entfernungen. Steinkranke Kinder mit Blasenentzündung entwickeln sich geistig und körperlich sehr schlecht, und man kann, wenn die Diagnose einmal hinlänglich gesichert ist, nicht rasch genug zum Steinschnitt schreiten, wenn diese Operation bei Kindern ungleich leichter und gefahrloser ist, als bei Erwachsenen.

Behandlung.

Die Beseitigung der Ursachen ist der wesentlichste Theil der Cur. Liegt das Cantharidenpflaster noch auf der Körperoberfläche, so muss es natürlich sogleich entfernt werden. Es kommt nicht gerade selten vor, dass langsam wirkende Vesicatore mehrere Tage liegen können, ohne tödtlich besonders zu belästigen, plötzlich stellen sich die Blaseschmerzen ein und die unkluge Umgebung ahnt nicht im Geringsten den innigen Zusammenhang zwischen dem schlechten alten Pflaster und den heftigen, heunruhigenden Symptomen.

Im übrigen hat man durch grosse Mengen Mandelmilch oder Emulsionen den Harn möglichst zu verdünnen und durch blande Diät, Milch und Wasserschoppen ihn möglichst arm an Salzen zu machen.

Die Quantität des gelassenen Harnes muss streng controlirt und die Blasegegend öfters percutirt werden. Sobald sich hier eine Dämpfung zeigt, ist der Urin mittelst des Catheters zu entleeren. Letzterer darf aber niemals in der Harnröhre liegen bleiben, indem der Zutritt der Luft die Entzündung bedeutend vermehrt.

Die interne Behandlung hat auf eine zweckmässige Entleerung des Darmes und Aizregung der Darmsecretion zu wirken, wobei man die salinischen Abführmittel natürlich meiden muss. Am besten wirken hier einige Calomelpulver 0.06 pro dosi. Gegen den Harnswang erweisen sich feuchte warme Tücher auf die Blasegegend gelegt sehr wirksam, bei Schlaflosigkeit sind die Opumpompepate und das Bittermandelwasser zu empfehlen. Bei chronischem Blasenentzündung gibt man Tannin innerlich, täglich bis zu $\frac{3}{4}$ Gram, oder macht adstringierende Injectionen in die Blase. Steinkranke müssen unter allen Bedingungen operirt werden.

3) Enuresis, Incontinentia urinae,* Mictio involuntaria. Das nächtliche Bettpissen.

Beständiges Harnträufeln und ganz unwillkürlicher Harnabgang kommt bei älteren Kindern nur vor, wenn bedeutende Gehirnfelder zugegen sind, bei Idiotismus und chronischem Wasserkopf. Es beruht dann dieser Zustand auf einer wirklichen Blasenlähmung, sowohl der Muskulatur als des Blasenhalbes, wodurch trotz reichlichen Inhalts der Blase doch immer nur einzelne Tropfen abfließen. Dieser Zustand besteht unaufhörlich bei Tag und Nacht fort und ist wohl zu unterscheiden von dem nächtlichen Bettpissen sonst gut entwickelter Kinder.

Letzteres kommt viel häufiger bei Knaben vor als bei Mädchen und dauert meistens bis zum 12. Lebensjahre, in Ausnahmefällen selbst bis zum Eintritt der Pubertät. Es beruht keinesfalls auf grossen örtlichen, noch cerebralen Veränderungen, sonst ginge es nicht regel-

mässig in Genesung über und würde auch am Tage fortbestehen. Es muss hier eine geringere Perceptionsfähigkeit der Blase auf den Harnreiz bestehen, in deren Folge derselbe im Schlafe nicht vollständig zum Bewusstsein gelangt, oder der Schlaf muss so tief sein, dass der gewöhnliche Reiz des Harnes auf die gefüllte Blase nicht hinreicht, die Kinder zu erwecken. Für letztere Anschauung spricht besonders der Umstand, dass viele Kinder bestimmt angeben, sie hätten deutlich geträumt, wie sie auf dem Topf saßen und ihren Harn in der gewöhnlichen Manier entleerten. Gewöhnlich jammern sie nur einmal des Nachts und zwar schon in den ersten Stunden des Schlafes in's Bett. Mit der Erklärung, dass Trägheit, üble Gewohnheit oder Unachtsamkeit die gewöhnliche Ursache der *Fauresis nocturna* sei, kann ich mich nicht einverstanden erklären. Bei den meisten von mir beobachteten Fällen waren die Kinder durch ihr eigenes Ehrgefühl oder mannigfache Strafen lebhaft dafür interessiert, das Uebel zu vermeiden, und doch gelangt ihnen diess ohne passende Behandlung erst nach vielen Monaten oder gar Jahren.

Die Ansicht einzelner Autoren, es möchten chemische Veränderungen des Harnes die Schuld hieran tragen, kann ich ebenfalls nicht bestätigen, indem mich in drei Fällen angestellte Harnuntersuchungen lehrten, dass weder quantitativ noch qualitativ der Harn in irgend einer Weise von seiner normalen Zusammensetzung abweicht. Hingegen ist die Angabe richtig, dass die meisten davon befallenen Kinder sich überhaupt keiner vollkommenen Gesundheit erfreuen und gewöhnlich an scrofulösen Affectionen der verschiedensten Art, an Rachitis oder an Helminthen leiden.

Die Folgen dieses Uebels sind ziemlich unangenehme, indem namentlich die psychische Entwicklung dabei leidet. Das Ehrgefühl der Kinder wird durch die vielen Strafen, die sie erfahren, abgestumpft, sie werden scheu, lügenhaft und bekommen keinen persönlichen Muth. Wenn nicht grosse und deshalb ziemlich kostspielige Keillichkeit gehandhabt wird, so bekommt das Bett nach bald auch das ganze Zimmer einen schwer zu vertilgenden, urtösen Geruch, und es mischen sich der Luft Gasarten bei, die keinesfalls dem Stoffwechsel günstig sind. Endlich bekommen die Kinder durch den Urin tiefe, langsam heilende Geschwüre an den Nates und an den unteren Extremitäten.

Behandlung.

Eine causale Behandlung kann nothwendig werden, wenn sich deutliche Symptome von Eingeweidewürmern, von Scrofulosis oder nervöser Hyperästhesie kund geben. Man gibt in diesen Fällen Anthelminthica, Leberthran, Eisen, China und aromatische Bäder. Die letzteren empfiehlt besonders Lallemand sehr. Er lässt 4—5 Hande voll aromatischer Kräuterspecies in einem bedeckten Gefässe anbrühen, dann dieses Decoct und ausserdem ein Glas Brantwein in's Bad giesen, worauf dasselbe mit einem Tuche bedeckt wird, so dass bloss der Kopf des Kindes heraussteht. Die Kinder bleiben $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde lang in diesen Bädern, und nach einigen Bädern kann die Quantität der Kräuter und des Brantweines verdoppelt werden. Solche Bäder müssen täglich oder jeden zweiten Tag einige Wochen lang fortgesetzt werden, worauf Genesung eintritt.

Die diätetische Behandlung hat darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Kinder schon mehrere Stunden vor dem Schlafengehen nichts Flüssiges mehr bekommen, wodurch die Urinsecretion jedenfalls auf ein Minimum herabgesetzt wird, und, wenn auch Nachts der Harn unwillkürlich abgeht, die Quantität jedenfalls eine ganz geringe ist. Da man zu wiederholten Malen die Beobachtung gemacht hat, dass die Kinder regelmäßig einspiessen, wenn sie auf dem Rücken liegen, und rein bleiben in der Seitenlage, so lässt man sie in letzterer Lage einschlafen. Damit sie im Schlafe nicht auf den Rücken zu liegen kommen, bindet man ihnen ein Tuch um den Leib, in welchem ein harter Knopf sich befindet, der gerade auf die Wirbelsäule gebunden wird. Sobald sie sich im Schlafe drehen und auf den Rücken liegen wollen, weckt sie der alsdann entstehende Schmerz auf.

Es klingt dieser Rath sehr einfach und plausibel, die Ausführung desselben misslingt aber gewöhnlich, weil die Kinder keine so feste Binde um den Leib vertragen, dass der Knopf die ganze Nacht hindurch nicht verrutschte. Die Kinder pissen eben meistens doch ein, und wenn man sie aufhebt, so ist der Knopf nach der Seite geschoben.

Zu psychischen und körperlichen Züchtigungen braucht der Arzt niemals zu rathen. Diese Mittel sind gewöhnlich schon im ausgezeichneten Maasse aber erfolglos angewendet worden, bevor er consultirt wird. Noch weniger sind Schreckmittel, die Androhung des glühenden Eisens nach Boerhave und Casper, zu gestatten oder gar zu empfehlen, indem hiedurch ein sehr schädlicher Einfluss auf das Nervensystem geübt werden kann.

Unter den inneren Mitteln sind namentlich zwei besonders wirksam, die Belladonna und die Nux vomica.

Man gibt das Belladonnaextract, jeden Abend zu 0.005—0.01 und steigt mit der Dosis bis zur Erweiterung der Pupille. Bei dieser Behandlung heilt die Enuresis allerdings einige Tage auf, allein Recidive sind sehr gewöhnlich, und es ist doch nicht rathsam, allzulange mit grossen Dosen dieses Mittels fortzufahren. Eine viel nachhaltigere Wirkung habe ich schon in vielen Fällen von Strychnin. nitric. gesehen. Es ist diesem Präparate der Vorzug vor dem Extr. unguis vomicae spirit. zu geben, indem der Strychningehalt des letzteren durchaus kein constanter ist und eine allmähliche Steigerung desselben viel weniger Garantie gegen Vergiftungssymptome bietet. Man gibt es am besten in Pulverform, einfach mit Zucker abgerieben. Kindern, die über drei Jahre alt sind, lässt man zuerst 0.001, dann 0.002 etc. bis zu 0.008 nehmen und muss immer starken Kaffee verträglich haben, wodurch allenfalls eintretende Zuckungen, die ersten Intoxicationssymptome, am sichersten beseitigt werden. Mit dieser Behandlung kommt man in 8—14 Tagen vollständig zum Ziele, und gewöhnlich hat die Heilung auch Bestand.

Der nahe liegende Versuch, den Penis mit einem Bändchen festzubinden, um so rein mechanisch den Abfluss des Harnes zu vermeiden, ist unausführbar, indem hiedurch rasch Oedem des Penis und Erectionen entstehen. Es ist mir sogar schon der Fall vorgekommen, dass ein Knabe aus Furcht vor den brutalen Züchtigungen, die er wegen seiner Enuresis zu erleiden hatte, sich den Penis so fest zuband, dass er am andern Morgen den Knopf nicht mehr lösen konnte. Es stellte sich endlich partielle Gangrän und eine Harnröhrenfistel ein.

4) Ischuria, Harnverhaltung. *Goysa*, *konnen*, *ré edper*, Harn).

Die Harnverhaltung ist bei Erwachsenen und Kindern nur ein Symptom verschiedenartiger Krankheitszustände, keine selbstständige Krankheit. Man unterscheidet deshalb eine Ischuria paralytica, spastica, inflammatoria, organica und mechanica. Von allen diesen Arten kommt bei kleinen Kindern nur eine einzige vor, Ischuria spastica. Reizbare Kinder, die viel an Blähungen und Colik leiden, lassen zuweilen länger als 12 Stunden keinen Urin mehr, wodurch die sie pflegenden Personen in grosse Angst gerathen. Die Kinder sind dabei sehr unruhig, lassen ein pressendes Geschrei vernehmen, ziehen die Beine an den Leib und sangen zur kurzen Zeit an der Brust. Die geringe Aufnahme von Getränk macht es ihnen nur um so länger möglich, keinen Urin zu lassen. Das Uebel ist übrigens sehr unbedeutend, und wir sind noch nie Fälle vorgekommen, wo wirkliche mechanische Hindernisse zu überwinden gewesen wären. Das einzige, was man bei Kindern von wenigen Wochen zu berücksichtigen hätte, ist der Abgang des Harnsäureinfarctes in Gestalt kleiner, rother, zum Theil scharfkantiger Körnchen.

Behandlung.

Dasselbe ist äusserst einfach, indem die Einführung einer etwas gekrümmten, gelben Sonde in die Blase jedesmal zugleich Urinentleerung veranlasst. Zur Verhütung fernerer Blasenkrämpfe ist die Auflegung eines Camillensäckchens auf die Blasenregion sehr zu empfehlen, wie überhaupt die Camillen in der Kinderpraxis eine viel gefälligere Wirkung haben als bei Erwachsenen.

5) Der Blasenstein. *Calculus vesicae*. Steinkrankheit, Lithiasis.
(*é kítog*, Stein.)

Die Steinkrankheit ist bei Knaben verhältnissmässig sehr häufig. Beinahe 40 Procent sämmtlicher zum Steinschnitt kommender Individuen sind Kinder unter 10 Jahren, wie aus den statistischen Angaben von Prout erhellt, der von 1256 Steinschnitten, die in den grossen Spitälern von Bristol, Leeds und Norwich gemacht wurden, berichtet. Die Gründe dieser merkwürdigen Erscheinung finden sich 1) im physiologischen Harnsäureinfarct, wovon leicht einige Körnchen in der Blase liegen bleiben und den Kern des Steines abgeben können, und 2) in der Menge von Phosphaten, welche sich im Harn rachitischer Kinder finden. Der Harn wird bei der Rachitis so reich an phosphorsäurem und kohlensäurem Kalk, dass, wenn die Kinder auf dem Boden des Zimmers uriniren und der Harn dasselbst verdunstet, eine deutliche Schichte weissen Pulvers zurückbleibt, worauf ich selbst schon von einer gut beobachtenden Kinderfrau aufmerksam gemacht wurde.

Uebrigens kommen bei Kindern alle Arten von Blasensteinen vor, Urate, Oxalate und Phosphate. Die Harnsäuresteine bestehen aus dieser Säure und ihren Salzen, sind ziemlich hart, aber glatt, meist braungelb gefärbt, — weil der Farbstoff des Harnes fast immer zugleich mit den Harnsäureniederschlägen herausfällt — und bilden in der Regel den Kern eines Steines, wenn auch die äusseren Schichten

eine andere chemische Zusammensetzung haben. Die aus phosphorsaurem Kalk und Trippelphosphat bestehenden Steine sind meist weich, heller gefärbt, von geringerer Schwere, aber an der Oberfläche rauh. Die Oxalsäuresteine endlich, welche bei Kindern nur sehr selten sich bilden, sind die härtesten, von brauner Farbe und höckeriger, warziger Oberfläche, weshalb sie auch Maulbeersteine genannt werden. Die Steine aus Cystin, dann die aus kohlensaurem Kalk sind ausserordentlich selten. Die erstgenannten Steine können sich auch combiniren, wobei dann gewöhnlich der Kern aus Harnsäure, die äusseren Schichten aus Phosphaten bestehen.

Gewöhnlich findet sich nur ein einziger Stein in der Blase; kommen mehrere vor, so schleifen sie sich, ähnlich wie die Gallensteine, an einander ab. Glatte Steine sind sehr beweglich, rauhe oder gar stachelige Reiben an irgend einer Stelle des Blasengrundes liegen und verwachsen mit der Schleimhaut. Die Folgen eines Steines sind nach den aufgeführten Umständen verschieden. Es gibt Steinkranke, welche keine Spur von Blasenkatarrh haben und fast keine Beschwerden vom Steine empfinden, bei anderen wieder ist die Entloerung des trüben, fleckigen Urines mit dem grössten Schmerze verbunden und es stellen sich vom catarrhalisch afficirten Blasenhalse aus excentrische Schmerzen in dem Mastdarm, dem Penis und den Oberschenkeln ein.

Symptome:

Es gebieth zumeilen grosse Aufmerksamkeit und Uebung dazu, einen Stein mit Bestimmtheit zu diagnostiziren, zumal die Diagnose so sicher sein muss, das eine eingreifende, lebensgefährliche Operation darauf hin unternommen werden kann. Nach Pitha sind die zuverlässigsten Zeichen:

1) Die subjektive Empfindung von einem schweren, beweglichen Körper in der Blase, welcher nach der Stellung des Körpers seine Lage ändert, ein bei Kindern selten zu beobachtendes Symptom.

2) Schmerzen im Blasenhalse beim Stehen, Gehen, Sitzen, Stuhl-
drang, die durch anhaltend ruhiges Liegen verschwinden, durch forcirte Bewegungen, Laufen, Fahren, Reiten bis in's Unerträgliche sich steigern, worauf dann der bestehende Blasenkatarrh sich beträchtlich vermehrt und endlich sogar blutiger Urin abgehen kann.

Diese Schmerzen werden oft ebenso empfindlich an der Spitze der Eichel und im Verlauf der Harnröhre gefühlt, wodurch die Knaben veranlasst werden, beständig ihren Penis in der Hand zu halten, endlich atrophiren und einen auffallend mächtigen Penis mit langem Präputium bekommen.

3) Schmerz und Beschwerden während des Urinirens. Die Schmerzen werden gegen das Ende zu am heftigsten und dauern noch längere Zeit nachher an. Zumeilen wird der Harnstrahl plötzlich unterbrochen und kehrt erst wieder, wenn das Kind sich zurückgelegt oder irgend eine andere Stellung eingenommen hat. Die Kinder beschreiben dann deutlich das Gefühl eines plötzlich sich vorlegenden fremden Körpers, den sie durch andere Körperlagerung wieder wegbringen können.

4) Das wesentlichste Zeichen liefert immer die Untersuchung mit der Steinsonde. Ein durch die Sonde erzeugter, vernachbarbarer Klang

kann von gar nichts anderem als einem Blasensteine betreffen. Ueberdies kann man durch den mehr oder minder hellen Klang und durch leichtes Berühren des Steines selbst einen approximativen Schluss auf dessen Härte, Glätte und Beweglichkeit machen. Je kleiner der Stein, um so schwieriger natürlich dessen Aufsuchung. Man muss zweilen die Kranken in verschiedenen Positionen, im Stehen, Sitzen in der Bauch- oder Seitenlage, bei voller und halbvoller Blase untersuchen, bis man den Stein deutlich zu percutiren bekommt. In einzelnen Fällen kann man ihn mittelst des in den Mastdarm eingeführten Zeigefingers erreichen. Bei Kindern gelangt dieser Catheterismus mit der Steinsonde nur selten vollkommen ohne Chloroformnarkose.

Der Verlauf der Krankheit ist fast immer derselbe. Nur in ganz seltenen Fällen gehen Steine, welche die Grösse einer Bohne einmal übersteigen, noch durch die Harnröhre ab, noch seltener werden sie in Folge eines Ulcerationsprocesses durch den Mastdarm, die Scheide oder den Darm entleert.

Die Kranken beklagen, wenn keine Kunsthilfe eintritt, ihren Stein bis an das Ende des Lebens, welches jedoch unter beständigen Beschwerden viele Jahre lang fortbestehen kann. Endlich werden sie durch hektisches Fieber, Appetitmangel, Erschöpfung und Schlaflosigkeit atrophisch und gehen elend zu Grunde, oder es stellen sich auch urämische Symptome und Nephritis ein, wobei der Tod rasch erfolgen kann.

Behandlung.

Die einzige Indication ist Entfernung der Krankheitsursache, des fremden Körpers aus der Blase. Dieselbe wurde schon durch die verschiedensten internen Mittel, die sog. Lithotriptica, und durch direkte Injektionen in die Blase versucht; die Wirkung der steinlösenden Mittel ist jedoch immer noch eine höchst problematische. Man empfiehlt verschiedene Bäder, namentlich Vichy, Kreuznach, Eger, Franzensbad etc., unter den Medicamenten die kohlensauren Alkalien, das Phosphorammonium, die *Herba ves. ursi*, endlich noch den Elektromagnetismus und schwache Injektionen von Flüssigkeiten, welche concentrirt den Stein wohl lösen könnten, allein in diesem Verhältniss nicht in die Blase gebracht werden dürfen.

Die mechanische Entfernung des Steines durch die Harnröhre gelingt nur bei ganz kleinen Exemplaren beim weiblichen Geschlechte. Die männliche Harnröhre eignet sich wegen ihrer Enge und Länge fast niemals hierzu.

Es bleibt also nur die chirurgische Hilfe, der Steinschnitt und die Lithotripsie, übrig. Die Beschreibung dieser Operationen gehört in die chirurgische Operationslehre und findet sich trefflich in Pitha's Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane, Virchow's Pathologie und Therapie.

Bezüglich der Wahl der Operation, ob Steinschnitt oder Lithotripsie, sei hier nur erwähnt, dass bei Kindern noch viel mehr als bei Erwachsenen dem Steinschnitte der Vorzug zu geben ist. Die Kinder liefern nach Angabe aller erfahrenen Chirurgen ein ausserordentlich günstiges Genesungsverhältniss. Die Steine sind selten gross, die Reaktion meist gering und die Heilung erfolgt fast in allen Fällen

rasch, während der Lithotripsie besonders die Enge der kindlichen Harnröhre entgegensteht, wodurch eben auch bei jeder Sitzung chloroformirt werden muss und die consecutiven Schmerzen beim Abgang der Fragmente sehr heftig werden.

C. Männliche Genitalien.

I. Penis.

1) Bildungsfehler.

a) Angeborene Phimosis ($\frac{1}{2}$ *phimosis*, Verengung). Man versteht hierunter eine angeborene so bedeutende Verlängerung und zugleich Enge der Vorhaut, dass dieselbe nicht über die Eichel zurückgezogen werden kann. Ein gewisser Grad dieses Zustandes ist bei kleinen Knaben physiologisch, und nur selten kann die Vorhaut bis zur gänzlichen Entblössung der Eichel zurückgebracht werden, in der Regel jedoch so weit, dass man die Mündung der Harnröhre und die nächst gelegenen Parthien leicht zu Gesicht bekommt.

Kann man auf keine Weise das Präputium bis zur Harnröhrenmündung zurückziehen, so nennt man diesen Zustand angeborene Phimosis. Die Folgen hiervon sind gewöhnlich sehr gering. Die Oeffnung in der Vorhaut ist weit genug, dass der Harn in einem Strahle abfließen kann, und bei zunehmenden Jahren bleibt dieser Ueberfluss von Vorhaut in seinem Wachsthum zurück, die Spitze der Eichel wird sichtbar und bei eintretender Mannbarkeit ist das ganze Uebel gehoben.

Zuweilen entsteht theils durch Unreinlichkeit, theils durch äussere Verletzung, theils in Folge einer Balanitis beträchtliche Schwellung der Vorhaut, und nun kann der Urin wirklich die geschwellte Oeffnung nicht mehr passieren. Die Vorhaut dehnt sich blasenartig aus, wird missfärbig, die Kinder sind sehr unruhig und pressen unter heftigen Schreien nur wenige Tropfen Urin aus der fast gänzlich veredlossenen Oeffnung. Man hat sogar schon Gangrän entstehen sehen.

Die zuweilen vorkommenden festen Verwachsungen der inneren Platte der Vorhaut mit der Eichel sind gewöhnlich nicht angeboren, sondern Folge früherer Ulcerationsprocesse dieser Theile.

Behandlung.

Leichtere Grade von Schwellung der überflüssigen Vorhaut kann man durch Bestreichen mit Oel und durch Reinlichkeit heben, bei beträchtlicheren Hindernissen ist es am einfachsten, den unnütigen Hautzipfel mit der Scheere abzuschneiden, worauf die äussere Platte der Vorhaut sich bedeutend weiter zurückzieht als die innere straff gespannte, in welche man deshalb noch einen kleinen Längsschnitt machen muss. Die beiden Wundränder legen sich abdam ziemlich genau zusammen oder können wohl auch durch einige feine Nähte zusammengehalten werden, die Blutung und consecutive Schwellung ist nur gering, und in wenigen Tagen ist die Heilung vollendet.

ß) Angeborene Paraphimosis. Sie kommt mit und ohne Hypospadien vor und beruht auf einer wahren Hemmungsbildung. Die Eichel hat nämlich in frühester Zeit des Embryolebens noch keine

Vorhaut, ist imperforirt und die künftige Harnröhrenmündung ist nur durch eine weisse Stelle angezeigt. Erst allmählig bildet sich hinter der Corona glandis eine Hautfalte, die zukünftige Vorhaut, welche rasch nach vorne wächst und bald die ganze Eichel, in welcher mittlerweile die Harnröhre sich entwickelt hat, bedeckt. Ein Zurückbleiben dieses Wachstums, wobei gewöhnlich auch das rudimentäre Präputium mit der Eichel verwächst, stellt die Paraphimosis congenita, oder richtiger gesagt, den Defectus praeputii congenitus, dar. Häufig ist hienit Hypospadia verbunden und besonders oft ist das Frenulum so verkürzt, dass bei später erfolgenden Erektionen die Harnröhrenmündung nach unten gezerrt wird. Eigenthümlich ist die von Ammon erzählte Beobachtung, dass bei Judenknaben angeborener Defect der Vorhaut gar nicht selten vorkommt, also Fortsetzen eines künstlich erzeugten Formfehlers sich einstellt. Eine Analogie für diese Thatsache weist auch das Thierreich auf, indem bei Hunderacen, welchen man den Schwanz zu stecken pflegt, viel häufiger schwänzlöse Junge geboren werden, als bei anderen Racen, die durch diese Unsitte nicht verunstaltet werden.

Therapeutische Eingriffe gegen diesen Formfehler sind durchaus unnöthig, nur bei so kurzem Frenulum könnte vielleicht in späteren Jahren eine Durchschneidung nothwendig werden, wenn bei eintretenden Erektionen hiedurch die Eichel schmerzhaft verzerrt würde.

2) Angeborene Verwachsung der Harnröhre. Atresia urethrae. Es kann entweder bloss das Orificum urethrae verklebt, häufig verschlossen sein, oder es ist ein grösseres Stück der Harnröhre unwegsam. Im ersteren Falle sieht man beim Uriniren die Harnröhre bis zum Verschlusse sich ausdehnen und kann man durch einen leichten Längsincision mit dem Explorativ-Trocknar das ganze Uebel heben, im zweiten Falle, der jedoch sehr selten ist und fast nur mit Hypo- oder Epispadia complicirt vorkommt, ist die Operation sehr schwierig, und es muss schliesslich, wenn die Auffindung der Harnröhre in keiner Weise gelingt, der Blasensack vorgenommen werden.

3) Anomale Mündung der Harnröhre. Hypospadia und Epispadia. Bei der Hypospadia ist die Harnröhre an ihrer unteren Fläche nicht bis zur Spitze des Penis verwachsen, sondern stellt gegen diese zu eine offene Röhre dar, so dass die Mündung der Röhre nicht am Ende, sondern an der unteren Fläche des Penis sich findet. Bei den höchsten Graden von Hypospadia, wo die Öffnung noch im Verlaufe des Penis ist, haben die Individuen keine andere Unbequemlichkeit, als dass oben der Strahl des willkürlich ablassenden Harnes nicht direkt nach vorne, sondern gerade nach abwärts fliesst, was jedoch grössere Kinder durch Aufwärtsheben des Penis corrigiren lernen. Bei den höchsten Graden aber ist nicht nur die ganze Harnröhre, sondern auch der Hodensack und selbst noch das Perineum gespalten, und die Blase mündet ganz direkt in diese Spalte. Die Verwechslung mit Hermaphroditismus liegt hier sehr nahe, zumal wenn die Hoden in der Bauchhöhle zurückgeblieben sind, was gewöhnlich der Fall ist. Mit Bestimmtheit lässt sich in diesen Fällen das Geschlecht erst in späteren Jahren entscheiden, wenn die Geschlechtslicke erwacht, männliche Stimme, männlicher Körperbau und Bartwuchs sich einstellen.

Ihren genetischen Charakter nach ist die Hypospadie eine echte Bildungsstörung; denn die Harnröhre des Penis ist ursprünglich nicht vorhanden, sondern nur durch eine Rinne angedeutet, und mündet an dem ebenfalls noch gespaltenen Hodensack.

Die Versuche, auf chirurgische Wege eine normale Harnröhre herzustellen und die anomale Oeffnung zu schließen, gelingen wegen der ständigen Eigenschaften des unvermeidlichen Urines nur sehr selten.

Unter Epispadie versteht man Spaltung der Harnröhre nach oben, so dass ihre eigentliche Mündung an der Dorsalfäche des Penis liegt. Die Spaltung beschränkt sich entweder nur auf die Eichel, oder auf den ganzen Penis, und als der höchste Grad dieses Bildungsfehlers ist die Ektopie der Blase anzusehen, deren ausführlichere Schilderung schon oben pag. 405 gegeben wurde. Es ist dieser Zustand viel seltener als die Hypospadie. Wenn die Oeffnung der Harnröhre nahe der Eichel ist, so können die Kinder nach Willkür uriniren und vermögen später dabei den Penis auch so zu halten, dass sie sich nicht verunreinigen. Ist aber die Mündung ganz an der Wurzel des Penis, so besteht gewöhnlich Incontinenz und es stellen sich alle die traurigen Folgen dieses Uebels ein. Zeugungsfähigkeit ist solchen Individuen nur dann direkt abgesprochen, wenn die Mündung so weit nach hinten liegt, dass sie bei der Immissio penis nicht in die Vagina gelangt.

2) Balanitis. Die Entzündung der Vorhaut (ϵ βίλαρις, die Eichel).

Zuweilen häuft sich bei grösseren Knaben das Smegma präputii in beträchtlicher Menge an, wird hart und geht chemische Zersetzungen ein, wodurch die Eichel und die Vorhaut sich entzünden. Dasselbe kann auch durch äusserliche Verletzungen und fortwährendes Spielen mit der Vorhaut, wie dies den Ouzisten und Wärmkranken eigen ist, veranlasst werden.

Man sieht alsdann die Vorhaut geschwollen, an ihrer Mündung verklebt und kann sie nur unter heftigen Schmerzäußerungen zurückziehen. Die Eichel erscheint geröthet, mit Eiter bedeckt und bei ihrer vollständigen Entblössung kommen grössere Klumpen einer käsigen, höchst penetrant riechenden Masse aus der Vorhautfalte zu Tage. Mit Entfernung dieser Massen ist gewöhnlich schon die Ursache des Uebels gehoben, das dann nach wenigen Tagen spontan heilt. Die Heilung wird zweckmässig durch Bäder und Umschläge mit Bleiwasser unterstützt.

Wenn die Vorhaut wegen zu starker ödematöser Schwellung nicht zurückgebracht und so die Hauptveranlassung, das verhärtete Smegma, nicht entfernt werden kann, so dauert die Entzündung bedeutend länger, es kann sogar zu Abscessen und Perforation des Präputiums kommen. Ich behandelte einmal einen Knaben an einer sehr heftigen Balanitis und konnte in keiner Weise die Vorhaut zurückbringen. Einspritzungen von Oel und warme Umschläge, welche sonst das Oedem zum Schwinden bringen, blieben erfolglos. Da zeigte sich am dritten Tage an der Vorhaut in der Nähe des Bündchens eine blauschwarze Stelle, es stellte sich circumscripte Gangrän ein und schliesslich sah man in dieser Gangrän eine hellere Stelle, die sich bei

genauerer Untersuchung als der Knopf eines Fadens zu erkennen gab. Nachdem man diesen Knopf mit der Pinsette möglichst hervorgezogen und durchgeschnitten hatte, kam ein langer Faden zum Vorschein, nach dessen Entfernung die Gangrän sich begreute, die Balanitis schwand und in wenigen Tagen Heilung erlangte. Der unthätige Knabe hatte sich nach zurückgezogener Vorhaut den Faden um die Eichel, welche alsbald anschwell, geknüpft, und konnte am denselben nicht mehr hebrängen. Die Furcht vor Strafe verhinderte ihn am Geständnis seines unglücklichen Experimentes, und so musste er warten, bis sich der Faden diese Bahn gebrochen. Da sich jedoch die Gangrän auf eine erbsengrosse Stelle beschränkte, so blieb der ganze Process ohne weitere Folgen.

Die Behandlung der eitrigen Balanitis beschränkt sich auf Entfernung des Smegma's, Reinlichkeit, adstringierende Bäder und Umschläge. Verwachsungen zwischen Präputium und Eichel sind zumeist zu befürchten.

3) Erworbene Paraphimosis.

Bei Kindern entsteht Paraphimosis wegen des engen Präputiums viel häufiger als bei Erwachsenen. Die Knaben spielen und zerran gern daran, bis sie plötzlich die ganze Eichel frei getraut haben. Der enge Rand der Vorhaut, durch die kegelförmige Eichel allmählig und schmerzlos ausgelehnt, contrahirt sich nun hinter der weitabstehenden Urethra glandis wieder, und es gehört eine viel grössere Geschicklichkeit dazu, die Vorhaut wieder vorzubringen, als zu deren Zurückziehen nöthig war. Die bestürzten Kinder suchen gewöhnlich ihr Missgeschick zu verheimlichen, die Einschnürung verursacht mittlerweile eine beständige Schwellung und Deformität des Penis, und die Eltern, endlich aufmerksam gemacht, erschrecken ausserordentlich über diese ihnen ganz fremde Form des Gliedes. Sich selbst überlassen nimmt die Geschwulst der Eichel mehrere Tage lang zu und gestaltet diese endlich zu einem unförmlichen, klumpen Knopfe um, abdoins aber tritt nach und nach spontane Abnahme des Volums ein, indem der Vorhautrand sich erweitert, und endlich schlüpft die Eichel auch ohne Kunsthilfe wieder hinter die Vorhaut zurück. Gangrän der Eichel sah ich noch niemals durch einfache Einschnürung des Vorhautrandes, wohl aber durch Einschnürung mittels eines Fadens, wie oben schon mitgetheilt wurde, entstehen. Die geringere Gefahr im ersteren Falle rührt eben von der endlichen Ausdehnbarkeit der Vorhaut selbst her.

Behandlung.

Es gibt nicht leicht eine dunklere Behandlung als die der Paraphimosis. Die höchst bestürzte Mutter bringt ein nach ihrer Ansicht schon verstümmtes Kind zum Arzte und verlässt denselben nach einigen Minuten freudestrahelnd, indem durch die gelungene Reposition die normale Form des Gliedes hergestellt werden.

Das Verfahren der Reposition besteht einfach darin, dass man mit beiden Zeige- und Mittelfingern die hinter der Eichel gewulstete Vorhaut fasst und zu gleicher Zeit mit beiden Daumen auf die Eichel von vorns drückt; es entsteht hierdurch an der Vorhaut ein Zug nach

vorne, zu der Eichel eine Bewegung nach rückwärts, und das Resultat dieser Manipulation ist ein Herübergleiten der Vorhaut über die Corona glandis, worauf die letztere in kürzester Zeit wieder ihre normale Form und Farbe annimmt. Bei veralteten, Tage lang bestehenden Fällen kann man durch einen continuirlich über das Glied geleiteten Strahl kalten Wassers das Volumen der Eichel verkleinern und den bei der Reposition untermeidlichen Schmerz verringern. Mir sind schon viele solche Paraphimosen vorgekommen, ich war bisher noch bei einer jeden im Stande, die Reposition zu machen und glaube deshalb, dass die Palliatiker, welche Umschläge mit Eiskwasser und verschiedenen Adstringenzen bis zur spontanen Heilung anstehen, mit obigem Verfahren nicht vertraut sind.

Nachbehandlung ist in keiner Weise nöthig, indem die wieder an Ort und Stelle gebrachten Theile abhalm die normale Form annehmen. Vor Recidiven ist man auch gesichert, indem die einmal so geängstigten Kinder niemals mehr dartzu Verlangen tragen, ihre ganze Eichel entblösst zu sehen.

4) Onanie, Masturbatio.

Kommt zwar auch bei Mädchen vor, bei diesen jedoch viel seltener und in ihrem Folgen unbedeutender als bei Knaben. Man versteht hierunter verschiedene Berührungen des Penis, namentlich Reiben in der hohlen Hand oder Kneten, wodurch derselbe zur Erektion und endlich zu einem vorzeitigen Samenerguss gebracht wird. Mädchen kitseln sich selbst oder gegenseitig mit den Fingern oder anderen länglichen Gegenständen in der Vagina und bringen hiedurch Schmerz, Rötzung und stärkere Sekretion der Vaginalschleimhaut zu Stande, wodurch die Unart für die Zukunft sich von selbst verliert.

Anders verhält sich die Sache bei Knaben. Dieselben bekommen hiedurch ein so gesteigertes Wohlgefühl, dass sie trotz der härtesten Strafen und der besten eigenen Vorsätze Jahre lang von diesen unglücklichen Manipulationen nicht mehr lassen können. Sie saugen hiebei oft stichlich ab, beißen in ihrer körperlichen und besonders auch geistigen Entwicklung zurück, werden unmännlich, bekommen braune oder bläuliche Färbung der unteren Augenlider, einen apathischen Gesichtsausdruck und schlaffe Muskulatur. Früher beliebte Spiele werden ihnen gleichgültig, sie ziehen sich überall schnell zurück und sind am liebsten allein, um ungestört ihrer Neigung zu fröhnen. Der Gang wird unsicher, schleppend mit nach einwärts gezogenen Knien. Die Abmagerung ist am auffallendsten an den unteren Extremitäten und der Lendengegend, während der Penis an Länge und Dicke unverhältnissmäßig zunimmt. Die Vorhaut wird verkürzt und geht so leicht zurück wie bei Erwachsenen; eine kurze Berührung des Penis genügt, eine Erektion zu veranlassen.

Zur wirklichen Tabes dorsalis, welche in populären Schriften gewöhnlich in Aussicht gestellt wird, kommt es nur äusserst selten, indem die eben geschilderten Symptome doch endlich die Kinder zur Besinnung leiten und sie nun selbst sich alle Mühe geben, das Uebel zu vermeiden. Es kommt sehr viel darauf an, in welchem Alter die

Knaben dieses Laster erkennen. Je später sie dazu kommen, je näher der Mannbarkeit sie sind, um so geringere Folgen werden beobachtet. Knaben, die über zehn Jahre alt sind, bringen es durch längeres Onaniren endlich zur Ejaculation einer schleimigen Flüssigkeit; ob dieselben schon Samenfladen erhält, ist meines Wissens noch nicht untersucht worden, es könnte möglicher Weise auch prostaticher Saft sein. Das kleinste Kind, bei dem bis jetzt Onanie beobachtet wurde, war ein elf Monate altes Mädchen. Dasselbe schob sich nach der Schölderung von Krafft beide Händchen abwechselungsweise in die Schamspalte, immer heftiger und hastiger, zog die Beine an den Leib, verzerrte die Gesichtszüge grimassend und liess ein lautes Schreien vernehmen. Es ist dieser Bericht einzig in seiner Art, es fragt sich nur, ob nicht das Kind einen kleinen Ausschlag oder einen fremden Körper in der Vagina hatte, in welchem Falle dann die Bewegungen viel einfacher als juckende zu erklären wären.

Bei weitem nicht alle onanirenden Knaben leiden an den geschilderten Folgen, sondern viele behalten ein blühendes Aussehen und gedeihen geistig und körperlich so gut wie vorher. Hausärzte in grösseren Knabeninstituten versicherten mir, dass die Mehrzahl der constatirten Onanisten keinen körperlichen Nachtheil davon hatten, und viele robuste Männer mit grosser Zeugungskraft, welche mich wegen anderen Unwohlseins consultirten, gestanden mir schon häufig, dass sie in ihrer Jugend Jahre lang onanirten.

Ursachen.

Die gewöhnlichste Veranlassung ist der Nachahmungstrieb der Knaben. Es zeigt ein Onanist seine Kunststücke oder macht sie wohl gar am Penis eines anderen unerfahrenen Knaben, und von dieser Stunde an beginnt der letztere dasselbe Laster. Es kommt deshalb die Onanie bei Knaben, welche in Instituten erzogen werden, viel häufiger vor, als bei solchen, die in der Familie bleiben können.

Alles, was Erektion macht, befördert den Hang zur Onanie. Hierher gehören schwere Federbetten, zu mährische Flüssigkeit, alkoholische Getränke und unsittliche Bilder und Erzählungen. Ausserdem kann das Uebel direkt veranlasst werden durch juckende Ausschläge am Penis, grössere Anlastung von *Smegma praepitii* und durch *Oxyuris vermicularis*, welche vom Mastdarm aus unter die Vorhaut oder in die Vagina kriechen können.

Behandlung.

Nach den Mittheilungen eines erfahrenen Institutsarztes ist medicamentös gar nichts gegen beginnende Onanie zu machen, sondern man kann blos durch strenge Aufsicht die Ausübung des Lasters so viel als möglich erschweren. Zu diesem Behufe müssen in den Schlafsälen beständig Wachen aufgestellt sein, welche die Bewegungen unter der Decke controlliren und die Knaben im Betretungsfall sogleich abdecken und bestrafen müssen. Die Matratzen müssen hart gepolstert sein, die Zudecken sollen nicht aus Federkissen, sondern aus wollenen Decken bestehen durch welche man die Conturen des Körpers viel leichter erkennt. Die Bestrafungen solcher Knaben müssen sehr streng sein, doch vor den übrigen geheim gehalten werden, überhaupt kommt

alles darauf an, dass möglichst wenig Knaben das Laster kennen lernen, weshalb die schnelligste Entlassung eines Onanisten das beste Mittel gegen weitere Verbreitung ist. Für Entfernung der oben angeführten Ursachen muss hauptsächlich Sorge getragen werden. Es ist nicht statthaft, dass Knaben, welche der Onanie verdächtig, jedoch nicht überwiesen sind, ausführlich und öfter am Penis untersucht werden, indem nach unschuldige Höflichkeit aufmerksam gemacht und dazu veranlasst werden können. Gegen die Folgen der Onanie, Abmagerung und mangelhafte Entwicklung gelten kalte Begiessungen und Bäder als das beste Mittel, gegen die zuweilen eintretende Fettsucht solcher Kinder, wodurch ihnen ein höchst auffallendes, keimisches Aussehen gegeben wird, darf unter keiner Bedingung mit Jod noch jodhaltigen Mineralwässern eingeschritten werden, da hierauf gewöhnlich Abmagerung und rasch Tuberkulose sich einstellt.

Sehr ungeeignet sind übrigens die Drohungen mancher Lehrer und Vorstände, es würde dadurch die Gesundheit anfänglich untergraben und der Tod müsse bald eintreten. Die Knaben lassen allerdings hierauf auch oft von der Onanie, verfallen aber in eine tiefe Melancholie, die sie bis in's Mannesalter hinein nicht mehr verlässt. Eine tüchtige körperliche Züchtigung führt ebenso gut zum Ziele, und dieser traurige Seelenzustand wird gänzlich vermieden.

II. Hoden.

1) Cryptorchidia. (κρυπτός verhorgen, ὁ ὄρχος Hoden.)

Im neunten Monat des Fötallebens steigen die Hoden aus der Bauchhöhle in das Scrotum hinunter, und ein ausgetragener Knabe kommt mit beiden Hoden an ihrer normalen Stelle zur Welt. Siebenmonatskinder werden gewöhnlich mit leerem Hodensacke geboren und häufig bleibt auch bei ausgetragenen Kindern der eine oder andere Hoden, selten beide, längere Zeit zurück, so dass ungefähr gegen zehn Procent sämmtlicher neugeborener Knaben in dieser Beziehung Abnormalitäten zeigen. In der übergrossen Mehrzahl dieser Fälle steigt der Hoden in den ersten Lebenswochen ohne alle Symptome herunter und nur selten sieht man grössere Knaben mit nur einem Hoden; noch seltener aber mit ganz leerem Hodensack. Man nennt diese Individuen *Monorchides*, *Testiculidi*, *Cryptorchides*. Die letztere Bezeichnung ist die treffendste, denn sie besitzen keineswegs nur einen Hoden, sondern zwei, die aber nicht an ihrer normalen Stelle sich befinden. Kommt ein Cryptorchis zur Section, so findet man den zurückgebliebenen Hoden nicht an seiner ursprünglich physiologischen Stelle, den Nieren. Er liegt gewöhnlich am Eingange des Canalis vaginalis oder in diesem selbst, oder vor demselben in der Leistengegend, wo man ihn auch bei Lebnissen als harte, elliptische Geschwulst, schmerzhaft auf stärkeren Druck, entdecken kann.

Zuweilen hebt die Natur bei beginnender Pubertät das Herabsteigen des Hodens nach, *descensus testiculæ scrotalis*, was nicht immer unter besonderen Symptomen, sondern ganz unmerkelt geschehen kann. Der Hoden steigt jedoch nie mehr in den Grund des Scrotums, indem der Samenstrang etwas an seinem Längswachsthum eingeblüht hat.

In andern Fällen soll hierbei ein heftiger gewisser Schmerz entstehen, und man will sogar beobachtet haben, dass Menschen hieran gestorben sind. Die mechanische Todesursache ist meines Wissens nicht genau ermittelt und dürfte vielleicht in Gangrän des abgeschnürten Hodens zu suchen sein.

Nach Ammon kann sich der Hoden auch einen falschen Weg bahnen und unter dem Schenkelbogen, wo er mit einer Centralhernie verwechselt werden könnte, oder am Damm zum Vorschein kommen. Weitere unglückliche Folgen der Cryptorchie gibt es nicht, namentlich ist sie nicht die Ursache von Impotenz.

Durch Kunsthilfe lässt sich dieser Bildungsfehler nicht corrigiren. Es gibt kein Mittel, den in der Bauchhöhle zurückgebliebenen Hoden hervorzulocken, und nur direkten Schneiden kann man anstellen, wenn man das Heraussteigen des im Scheidenkanale befindlichen Hodens durch Expulsivverbände beschleunigen wollte. Selbst wenn eine Darmschlinge zugleich mit dem Hoden aus dem Scheidenkanale austritt, sind Compressionsversuche nicht rathsam. Das beste in diesem Falle ist, zu warten, bis der Hoden im Scrotum angelangt ist, dann die Hernie zu reponiren und durch ein gutes Bruchband zurückzuhalten.

2) Hydrocele. Der Wasserbruch.

Ein seröser Doppelsack, die Tunica vaginalis propria, hüllt den Hoden und Nebenhoden ein und enthält im physiologischen Zustande nur wenig Tropfen Serum, um die Schlüpfrigkeit der serösen Flächen zu vermitteln. Eine Vermehrung dieses Serums dehnt den Sack nun aus, seine äussere Fläche berührt nirgend mehr die innere und das Scrotum hat eine sichtlich Vergrösserung erfahren. Wir nennen diesen Zustand Hydrocele.

Bei kleinen Knaben kommt die Hydrocele ausserordentlich häufig vor, gewöhnlich ist nur ein Hoden erkrankt, zuweilen auch beide. Ihre Entstehung verdankt sie in den meisten Fällen einem mangelhaften Verschlusse des Canalis vaginalis, nachdem der Hoden ihn passiert hat. Es senkt sich nun das Sekret des ganzen Peritonäums in den Hodensack und stellt eine Hydrocele dar. Dieselbe ist im strengsten Sinne des Wortes nicht angeboren, sondern entsteht erst einige Tage oder Wochen nach der Geburt. Die Disposition bleibt, der offene Vaginalkanal jedoch ist angeboren und deshalb kann diese auch vom Wasserbruche selbst gesagt werden. Man unterscheidet folgende vier Arten!

1) Hydrocele canalis vaginalis testiculi aperta. Tafel III. Fig. 11. In ihrem ausgesprochenen Grade eine seltene Form. Sie gibt sich zu erkennen als eine längliche Geschwulst, die vom Grunde des Scheidenhautkanales bis unter den Hoden reicht. Der Hoden ist gar nicht oder nur sehr undeutlich zu fühlen, der Samenstrang ist wegen des ihn umfüllenden Wassers zur Dicke eines Bleistiftes ausgehöhlet. Charakteristisch für diese Form ist, dass bei Eintritt der Bauchpresse die Geschwulst bedeutend grösser und praller, bei Nachlass derselben wieder kleiner und weicher wird. Dasselbe geschieht, wenn man den Hodensack in die Höhe hebt, wodurch sein Inhalt in die Bauchhöhle zurückdringt, was zuweilen bei engerer Communication nur auf angebrachten Druck gelingt. Die Verwechslung mit einem äusseren Leistenbruch ist nicht immer leicht zu vermeiden. Die Form ist dieselbe und der

Inhalt lässt sich ebenfalls repartiren. Die Wassergeschwulst jedoch ist gegen Sonnen- oder Kerzenlicht entschieden transparent, der Percussionschall derselben ist matt, während eine Hernie immer sonor klingt, und der Hode ist bei der Hydrocele nicht zu berühren, was bei einer Hernie leicht möglich ist. Dem geübteren Diagnostiker genügt zur Sicherstellung einer Diagnose schon die Art, wie die Geschwulst schwindet. Der Darm tritt auf Druck meist plötzlich und mit einem gurrenden Geräusche zurück, während die Hydrocele nur allmählig, durchaus nicht rückweise sich verkleinert.

2) Hydrocele funi canal. vaginalis testicul. clausa. Tafel III. Fig. 12. Bei weitem die häufigste Form. Sie ist gewöhnlich nicht angeboren, sondern entsteht erst einige Wochen nach der Geburt. Die Geschwulst ist rund, durchscheinend und lässt sich durch Druck nicht verkleinern. Der Hode liegt nach oben und hinten und kann nur dunkel durchgefühlt werden. Der Samenstrang zeigt ein ganz normales Verhalten. Diese Hydrocele ist häufig beiderseitig und wird dann von den Angehörigen wegen der gleichmässigen Vergrösserung beider Hoden weniger leicht bemerkt, als wenn nur ein Hode erkrankt ist.

3) Hydrocele coli canal. vaginalis aperta. Taf. III. Fig. 13. Man findet hier den Samenstrang von seiner Bauchhöhlenumföhrung aus bis hinauf in die Hälfte des Hodensackes erweitert und mit Wasser gefüllt, während ein ganz normaler, nicht vergrösserter Hode in der Tiefe des Scrotums deutlich zu fühlen ist. Die Scheidenhaut umgibt den Hoden allseitig und ist erst oberhalb desselben hydrocephal ausgebeult. Auf Druck verkleinert sich die Geschwulst, das Wasser kann in die Bauchhöhle zurückgedrängt werden, der Samenstrang wird aber wegen der Verdickung der Scheidenhaut niemals so dünn als der der gesunden Seite. Zu dieser Hydrocele und zu der sub 1. beschriebenen können sich, da der Vaginalkanal offen steht, leicht Hernien gesellen. Von einer Hernie sie zu unterscheiden ist oft nicht leicht, die Art, wie die Geschwulst schwindet, ob langsam oder plötzlich mit einem gurrenden Geräusche, ist hier noch der beste Anhaltspunkt. Auch diese Form ist sehr selten.

4) Hydrocele coli canal. vaginalis clausa. Taf. III. Fig. 14. Hier ist der Samenstrang an seiner Austrittsstelle aus dem Inguinalringe von normaler Dicke und verläuft auch in dieser Weise eine kurze Strecke, dehnt sich dann plötzlich zu einer länglichen Cyste aus, die nach unten oben so rasch wieder abnimmt, und der Hode ist ebenso wie bei der vorigen Form von normaler Grösse und Consistenz. Man unterrichtet sich von dem oben beschriebenen Verhältnisse am besten, wenn man zuerst die beiden Hoden aufsucht, sie mit einander vergleicht und dann an dem der fraglichen Seite einen leichten Zug ausübt, wodurch die Untersuchung des Samenstranges wesentlich erleichtert wird. Diese Form ist ebenfalls häufig, gewöhnlich aber monilateral. Sie lässt sich wohl verschleichen, so gut wie ein gesunder Samenstrang, wird aber durch Druck nicht kleiner, indem der Scheidenkanal verschlossen ist.

So viel von den einzelnen Formen. Die häufigste ist die zweite, ebenfalls noch häufig die vierte, während die erste nur selten und die dritte am seltensten beobachtet wird.

Der Inhalt dieser Hydroceles ist, wenn noch keine eingreifendere Behandlung mit ihnen vorgenommen worden, ein dünnflüssiges, klares

hellgelbes Serum von der chemischen Zusammensetzung eines mit etwas Wasser verdünnten Bluterserums. Wenn schon öfter punktiert worden, ein Setaceum durchgezogen oder reizende Salben eingeschmiert worden sind, so wird die dann punktierte Flüssigkeit milchig trübe und zeigt einen ziemlichen Zellenreichtum.

Der spontane Verlauf der sämtlichen Formen ist, wenn auch langsam, fast regelmässig günstig. Die ungünstigste Complication ist eine durch den offen gebliebenen Inguinalkanal mit hervorgetretenem Hernie, wodurch der Verschluss dieses Canales und somit die Resorption der Hydrocele sehr retardirt wird. Fast in allen übrigen Fällen stellt sich mit der Zeit, wenn auch erst nach Monaten, eine spontane Resorption des ergossenen Serums ein und es restirt nur mehr eine Verdickung der Tunica vaginalis propria. Auch in den seltenen Fällen der mit der Bauchhöhle communicirenden Hydrocele tritt Resorption ein, nachdem bei zunehmendem Gebrauche der unteren Extremitäten der Leitenung sich zu schliessen pflegt.

Behandlung.

Da fast alle Hydroceleu bei Kindern, bis das erste Lebensjahr noch nicht überschritten haben, spontan heilen, so handelt es sich nur darum, diese Naturheilung durch zweckmäßige Mittel zu unterstützen; als solche sind beliebt: trockene Wärme, aromatische Bäderungen, adstringirende Poterree aus Salznak und Essig, Wein, verdünnter Jodtinktur etc. und endlich Compression der Geschwulst durch Heftpflaster oder Collodium. Die angeborene, offene Hydrocele heilt am schnellsten, wenn man ihren Inhalt in die Bauchhöhle zurückdrückt und hierauf ein Bruchband anlegt. Das einfachste und sicherste Mittel bleibt übrigens immer die Aepunktur. Dieselbe kann mit jeder beliebigen Nähnadel bewerkstelligt werden. Man spannt sich den Wasserbruch mit zwei Fingern und sticht nun die Nadel mehrmals in die gespannte Haut, wodurch ebenso viele Tröpfchen Serum zum Vorschein kommen, als Einstiche gemacht worden sind. Die äusseren Hautstiche schliessen sich zugleich wieder, die Einstiche in die Scheidenhaut jedoch klaffen länger und es entsteht nun durch Austritt des Serums ein Oedem des Hodensackes, das sich in einigen Tagen spontan resorbirt und mittlerweile das äussere und innere Blatt des Scheidenkanals so auseinandergedrückt hat, dass Verklebung und kein neuer Erguss mehr eintritt. Gelingt auf den ersten Versuch noch keine vollständige Heilung, so kann diese kleine Operation ohne allen Nachtheil öfters wiederholt werden.

Hydroceleu bei älteren Kindern und die des Samenstranges weichen auch ohne alle chirurgischen Eingriffe einer länger fortgesetzten Bepinselung mit Jodtinktur.

B. Weibliche Genitalien.

1) Bildungsfehler.

Die Bildungsfehler der weiblichen Geschlechtstheile sind im Allgemeinen seltener als die der männlichen und werden mit wenigen Ausnahmen erst zur Zeit der Pubertät entdeckt, indem die dadurch

verlassenen Symptome erst mit der Geschlechtsreife sich bemerkbar machen.

Zu einem richtigen Verständnisse dieser Entwicklungsfelder muss die Bemerkung aus der Embryologie vorausgeschickt werden, dass der Uterus mit seinen Eileitern und die Scheide sich in der Weise aus den Müller'schen Gängen hervorbilden, dass der untere Theil der letzteren zum Canalis genitalis verschmilzt und dann eine quere Einkerbung erfolgt, wodurch er in zwei Stücke, die Gebärmutter und Scheide, getheilt wird. Aus diesem Grunde lassen sich nach Velt alle diese Missbildungen in zwei Klassen bringen, die erste entsteht durch eine mangelhafte Entwicklung des einen oder beider Müller'schen Gänge, die zweite durch eine mangelhafte Verwachsung der beiden übrigen vollkommen ausgebildeten Gänge.

1. Classe: a) Die Müller'schen Gänge sind vollständig in ihrer Entwicklung zurückgeblieben und es findet sich demnach weder Scheide noch Uterus, sondern die äusseren Genitalien befinden in einen ganz kurzen Blindsack. b) Die Scheide ist in normaler Länge vorhanden, es fehlt aber der Uterus oder ist nur rudimentär entwickelt. c) Scheide und Vaginalportion sind von normaler Grösse, der Uterus jedoch ist wegen mangelhafter Verwachsung des Anfangsstückes der Müller'schen Gänge getheilt, Uterus bicornis, atrophisch und endigt in zwei atrophische Eileiter. d) Nur der eine Müller'sche Gang ist vorhanden oder fehlt gänzlich, wodurch der Uterus unicornis entsteht. Das entsprechende Ovarium ist in diesem Falle meist normal gebildet, ausserdem sind bei Verkümmern des Uterus auch die Ovarien mit verkümmert.

Diese sämtlichen Missbildungen bleiben bei Kindern ohne alle Symptome, und da sie keine äussere Formveränderung veranlassen, auch unentdeckt. Erst bei Eintritt der Periode stellen sich Störungen ein, es bildet sich irgend eine Menstruatio vicaria aus.

2. Classe. a) Der Uterus ist gut entwickelt, aber seine Hörner sind getrennt, Uterus bicornis. Die Trennung geht durch das ganze Organ, es ragen zwei Vaginalportionen in die eistafte oder auch doppelte Vagina, wobei sogar zwei Hymen bestehen können. b) Es ist ausserlich am Uterus gar keine Formveränderung oder nur eine leichte Furche zu entdecken, seine Höhle aber ist durch eine mittlere Scheidewand in zwei senkrecht nebeneinander gelegte Fächer getheilt, Uterus biseularis.

Auch diese Missbildungen haben durchaus keinen Nachtheil für die Entwicklung des Kindes und werden fast immer nur zufällig bei Sectionen gefunden. Nur die getheilte Scheide oder doppeltes Hymen werden der äusseren Besichtigung nicht entgehen.

Die als Entwicklungsfelder der äusseren Genitalien bezeichneten Zustände sind gewöhnlich nicht wirklich angeborn, sondern bilden sich erst im Verlaufe der Jahre aus ursprünglich normalen Genitalien heraus. Diese gilt namentlich von der vergrösserten Clitoris und den verlängerten grossen Schamlippen, den sog. Hottentottenschürzen. Ein partieller Verschluss der äusseren Labien kommt ausserdem noch bei kleinen Mädchen vor, welche an tiefgehenden, diphtherischen Ulcerationen derselben gelitten haben und nicht mit der gehörigen Reinlichkeit und Sorgfalt behandelt wurden.

2) Catarrh der Genitalschleimhaut. Fluor albus, Leucorrhoea.

Symptome.

Unter Fluor albus versteht man eine derartig vermehrte Secretion der Vagina und Valva, dass das Secret tropfenweise an den grossen Schamlippen zum Vorschein kommt, theils über die Schenkel und den Damm flussend und die Wäsche beschmutzt, theils nach verdunstet und sich als Krusten an den Schamlippen ansetzt. Es entsteht hierdurch eine secundäre Schwellung und Rötzung und bei geringer Reinlichkeit oder in der Sommerhitze auch Excretionen der äusseren Genitalien and benachbarten Theile.

Das Secret ist Anfangs dickflüssig, hellgelb, homogen, später gegen Ende des Processes, oder bei scrophulösen Mädchen gleich im Beginne, schleimig, fadenziehend, zellarm, nach Art des catarrhalischen Nasenschleimes. Wenn es einmal zu Excretionen gekommen, so mischt sich das daher stammende Blut dem Schleime bei und verleiht ihm eine braunrothe Farbe. Ueßer den Ort der Entstehung des Secretes, ob aus dem Uterus oder der Vagina oder aus beiden, kann man bei kleinen Mädchen nicht entscheiden, indem das Hymen stets geschwollen ist und eine Erweiterung der Vagina mittels kleiner Specula mit Recht nur ungern vorgenommen wird. Der raschere Verlauf der kindlichen Leucorrhoe spricht dafür, dass sie von der Schleimhaut der Vagina und nicht von der des Uterus stammt, während bekanntlich die Menorrhöen des Uterus bei Erwachsenen mindestens Jahre lang trotz aller Behandlung fortauern.

Weicht man die Krusten, welche die äusseren Genitalien verkleben, auf und untersucht die kleinen Labien, den Eingang der Vagina und das Hymen, so findet man diese Theile geschwollen, geröthet und schmerzhaft bei Berührung. Urethritis, welche sich durch Ausfliessen eines Tropfens Eiter aus der Harnröhre und lebhaften Schmerz beim Uriniren zu erkennen gibt, ist zuweilen, jedoch nicht häufig zugegen. Grössere Mädchen klagen auch über Schmerzen an den Genitalien und geben, namentlich wenn Excretionen zugegen sind, mit gespreizten Beinen, um jede Reibung möglichst zu vermeiden.

Der Verlauf der Leucorrhoe ist zwar immer ein chronischer, und ich erinnere mich keines Falles, der unter sechs Wochen geheilt wäre, doch steht die Genesung immer viel näher in Aussicht als bei Erwachsenen, indem sie stets nach längstens einigen Monaten eintritt. Nur bei Kindern mit vorgeschrittener Tuberculose und heftigem Fieber sah ich sie bis zum Tode in ungeschwächtem Grade fortauern, worauf sich dann bei der Section jene warzige, granulirte Beschaffenheit der Vagina zeigte, die wir so häufig bei alten Leucorrhöen Erwachsener beobachten.

Ursachen.

Es kann allerdings nicht gelugnet werden, dass auch schon bei Kindern von wenigen Jahren Infection durch Trippergift vorkommt. Ein unglückseliger Aberglaube besteht im Volke, dass der Tripper des männlichen Gliedes schwindet, wenn dasselbe mit einem Hymen in Berührung gebracht wird, und auf Grund des Gerüchtes wird so manche Verführung zur Unzucht begangen. Wer öfter solche unglück-

liche Kinder untersucht und beobachtet hat, wird deutlich den sonderbaren, unkindlichen, befangenen Ausdruck derselben bemerkt haben. Und stellt man nun die einfache Frage, woher denn diese Krankheit komme, so verliert sich der letzte Rest von Unbefangenheit. Die Kinder hütetern entweder gleich mit einer auffallenden verätherrischen Lebhaftigkeit ihre Unschuld, oder sie konnten durch diese Frage in sichtliche Verlegenheit und sagen nur schwächern und leise aus, dass sie nichts darüber wüsten. Ist gar keine Veränderung in dem Betragen der Kinder zu bemerken, so kann man mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen, dass keine Infection stattgefunden hat, und muss dann eine spontane oder mechanische Entstehung für wahrscheinlich halten. Entstehen an den grossen Schamlippen und um den After herum Condylome, so ist gar kein Zweifel mehr vorhanden, dass eine wirkliche Infection stattgefunden hat.

Spontan entsteht die Leukorrhöe besonders oft bei scrophulösen und tuberculösen Kindern in feuchten Wohnungen, mechanisch entweder durch zufällige Einbringung fremder Körper, oder durch Ueberkriechen von *Oxyuris* in die Scheide, oder endlich durch Onanie. Das in der gerichtlichen Medicin so sehr argirte Symptom für stattgehabte Nothzucht, die trichterförmige Beschaffenheit und beträchtliche Schwellung der äusseren Genitalien, ist nur in ganz exquisiten Fällen und häufiger Wiederholung zu verwerthen. Durch eine einfache Berührung der männlichen Eichel mit dem Hymen kann niemals eine bleibende Formveränderung, nicht einmal eine beträchtlichere Quetschung und consecutive Schwellung entstehen.

Behandlung.

Für die Behandlung ist es ganz gleichgültig, ob die Leukorrhöe durch Tripperinfection oder spontan entstanden ist. In beiden Fällen leisten Reinlichkeit und tägliche warme Bäder die wesentlichsten Dienste. Am schnellsten heilen die mechanisch entstandenen. Nach Entfernung eines Stückchen Holz, einer Bohne, einer Glasperle etc., welche Gegenstände hinter dem Hymen sich verbergen und nicht ganz leicht wieder herausgezogen werden können, hört die Röthung und Eiterung in wenigen Tagen auf.

Fast ebenso rasch gelügt die Heilung der durch *Oxyuris* bedingten Leukorrhöe, wenn man täglich mehrmals den Mastdarm mit kaltem Wasser, und wegen grösserer Empfindlichkeit die Vagina mit warmem Wasser gehörig ausspült. Schlimmer schon wird die Prognose, wenn Onanie die Veranlassung ist. Die Mädchen hören wegen des Schmerzes wohl einige Tage lang auf zu coaniren, sobald derselbe aber nachgelassen, beginnt die alte Unart von neuem und erzeugt so fortwährend Recidive, die nur durch die strengste Aufsicht, welche Tag und Nacht unaufhörlich fortzusetzen ist, verhütet werden können.

Die aus Berührung mit Trippersecretarium entstandene Leukorrhöe dauert mindestens sechs Wochen, kann aber auch mehrere Monate währen, die entzündlichen Erkrankungen, Rötze, Schmerz und Geschwulst sind anfangs so bedeutend, dass die Kinder nicht mehr im Stande sind zu gehen, und das Secret exorirt schnell die Labien und Schenkel. Am hartnäckigsten ist das Uebel auch ohne Infection bei sehr scrophulösen oder vorgeschrittenen tuberculösen Individuen. Es

dauert hier Jahre lang und besteht, wenn heftiges Fieber zur Tuberculose hinzutritt, bis zum Tode.

Kräftigen, vorher gesunden, durch Infection erkrankten Kindern reicht man sehr vorteilhaft Laxantien, Jalappa, Senna, Aloë und Mithelhalbe längere Zeit fort, dyskrasische Individuen hingegen müssen gleich von vornherein roborirend mit Eisen, China und Fleischdilat behandelt werden.

Die örtliche Behandlung erstreckt sich bei den ungünstigen Raumverhältnissen der kindlichen Genitalien auf Reizige Injectionen mit kaltem oder warmem Wasser und zur Nachtzeit auf Einlegen eines Charpiekautschuks in die Vulva. Diese Charpie wird sehr passend mit einer Alaunlösung (1:10 Wasser) oder mit einer Tanninlösung (1:30 Wasser) getränkt. Der Eisessig und der Hüllenstein wirken allerdings auch sehr günstig auf die blennorrhagische Schleimhaut ein, verdienen aber die Wunde vollkommen, weshalb sie von ökonomischen Müttern sehr ungern in Gebrauch gezogen werden.

Bei zerfallenen Kindern leiden Sehläder oder jodhaltige Beunnen, Heißbrenn, Kreuzruhr, sowie der Leberthran die besten Dienste. An den äusseren Genitalien bestehende Hautanschläge, Eczem, Impetigo und Prurigo, müssen mit Reinlichkeit und trocknenden Salben möglichst rasch beseitigt werden, indem das Vaginalsecret sie fortwährend bespült und die beiden Uebel nachtheilig auf einander einwirken.

3) Diphtheritis und Gangrän der weiblichen Genitalien.

Diphtheritis kommt fast niemals sporadisch, sondern immer nur in schlecht ventilirten Spitälern, Findel- und Waisenhäusern vor. Sie ist bei uns im Allgemeinen selten und entwickelt sich noch am häufigsten während und nach einer bösartigen Masernepidemie, wo sie dann auch in dicht überfüllten, feuchten Wohnungen des Proletariats sich einstellt. Die Diphtheritis ist keine lokale, vielmehr eine Allgemein-erkrankung, wie dies schon beim Krup constatirt wurde und aus dem Fieber, dem schnellen Collapsus und gewöhnlich tödtlichen Ausgange zur Genüge zu ersehen ist.

Das Uebel beginnt, wie der einfache weissle Fluss, mit Rothung und Schwellung der Vulva, jedoch stellt sich sogleich heftiges Fieber, heisse Haut, frequenter Puls und Zunahme des Durstes ein. Zieht man nun die grossen Labien auseinander, so sieht man die Schleimhaut mit grauweissen Membranen inselförmig bedeckt. Die Gestalt derselben ist bald kreisrund, bald durch Confluiren mehrerer Inseln unregelmässig contourirt. Sie lassen sich Anfangs nur schwer mittelst einer Pinzette abziehen, zerfallen aber bald fetzig und hinterlassen einen grüngelben Grund, auf welchem auch Abfall der ersten Fetzen sich sogleich wieder neue, membranöse Exsudate entwickeln. Die von Membranen freie Schleimhaut ist geschwollen und schmutzig roth. Der Geruch des jauchigen Secretes ist ein sehr intensiver, der Tage lang an den Händen haftet. Das Allgemeinbefinden verschlechtert sich dabei zusehends, das Fieber nimmt einen typhösen Charakter an, collapsative Diarrhöen stellen sich ein, die Jauche riecht endlich brandig, auch die Membranen und ihr Grund werden brandig, und wenige Tage nach Beginn des Uebels tritt der Tod ein.

Die Gangrän der Vulva entsteht entweder aus der eben geschilderten Diphtheritis oder gerade so wie Noma bei Kindern, welche eine fieberhafte Krankheit, Typhus, Blattern, Scharlach, Masern, eben durchgemacht haben. Sie stellt sich zuweilen so rasch und ohne subjective Symptome ein, dass erst der brandige Geruch die Umgebung zu einer aufmerksameren Untersuchung veranlasst. Man findet dann in der Regel an der Intimitätsfläche der grossen Schamlippen einige Brandhasen, welche rasch platzen und eine brandige Jauche entleeren. In anderen Fällen, wo die Gangrän in den tieferen Gewebeschichten der Labien sich entwickelt, beginnen die letzteren ödematös zu schwellen, werden erst nach mehrtägigen Schmerzen an einzelnen Stellen blau und brechen endlich auf, wobei dann eine grössere Brandfläche zum Vorschein kommt. Der Brand ist meistens frucht, schreitet rasch vorwärts und endet gewöhnlich mit dem Tode. In der Leiche findet man ausser den örtlichen Zerstörungen noch einen Catarrh der Schleimhaut und öfters auch pyämische Keile in den Lungen, der Milz etc.

Therapie.

Die Behandlung dieser Prozesse ist eine sehr missliche. Gegen Diphtheritis wird die innerliche Darreichung des kohlensauren Kali's (tägl. 4.0) als specifisch wirkend empfohlen. Gewöhnlich jedoch kann auch dadurch das lethale Fieber nicht aufgehalten werden. Gegen Gangrän ist sogleich eine möglichst reichliche Behandlung einzuleiten. Örtlich macht man Einspritzungen mit concentrirten Mineralsäuren oder einer starken Sublimatlösung. Die letztere übt auf Diphtheritis eine entschieden günstige Wirkung aus, während eine solche in den von mir beobachteten Fällen von Gangrän regelmässig vermisst wurde.

Häemorrhagia vaginæ. Vaginalblutung.

Bei Neugeborenen oder einige Tage alten Mädchen wird in seltenen Fällen eine leichte Vaginalblutung beobachtet. Die Blutung ist gewöhnlich unbedeutend und es sickern täglich nur einige Tropfen zwischen den Labien hervor. Häufig schwellen zu gleicher Zeit die Brustdrüsen etwas an und entleeren auf mässigen Druck einige Tropfen einer milchigen Flüssigkeit.

Die Vaginalblutungen werden niemals profus und als solche gefährlich. In den zwei Fällen, die ich bisher zu beobachten Gelegenheit hatte, trat jedoch nach einigen Tagen profuser Darmcatarrh und Atrophie ein, was sich übrigens viel natürlicher auf den Mangel der Mutterleut als auf die vorausgegangene Blutung zurückführen lässt.

Billard und Ollivier d'Angers haben diese kleinen Blutungen öfter beobachtet und konnten keine nachtheiligen Folgen wahrnehmen.

Therapie.

Bei der Geringfügigkeit der Blutung erscheint es nicht angemessen, sie durch kalte Injectionen oder Einbringung blutstillender Mittel vorzeitig zu stillen. Man wartet am besten, bis sie von selbst sistirt, und setzt nur während ihres Bestehens die warmen Bäder aus.

7. Capitel.

Krankheiten der Haut.

Bei Kindern kommen alle Hautkrankheiten und zwar die meisten noch viel häufiger als bei Erwachsenen vor. Da jedoch bei der Anlage dieses Lehrbuches Kenntniss der spec. Pathologie, somit auch der Hautkrankheiten, vorausgesetzt wird, so können wir uns darauf beschränken, nur jene Veränderungen der Haut zu gehen, welche fast ausschließlich bei Kindern beobachtet werden, oder, wenn sie auch bei Erwachsenen häufig vorkommen, bei Kindern wegen grösserer Zärtheit der Haut eine andere Therapie verlangen. Einzelne Hautkrankheiten wurden schon in früheren Capiteln besprochen, der Giccia pag. 6, die Zellgewebshärtung pag. 61, der Wasserkrebs pag. 89, die Anschläge während der ersten Dentition pag. 98, während des Abdominaltyphus pag. 170, der Naevus vasculosus pag. 306, andere entschieden dyskrasische sollen noch bei den Dyskrasien, Syphilis und Scrophulosis, abgehandelt werden, und so bleiben uns für diesen Abschnitt nur die acuten Exantheme und einzelne wenige chronische Ektosencenzen übrig.

1) Scharlach. *Scarlatina*.

Der Scharlach ist, wie überhaupt alle acuten, contagiösen Exantheme, nicht als einfache Hautkrankheit, sondern vielmehr als eine Allgemeinerkrankung aufzufassen, als deren augenfälligstes Symptom allerdings die Veränderung auf der Haut gelten kann. Er war von jeher der Gegenstand anhaltender Aufmerksamkeit der Autoren, so dass sich bei Canstatt allein bis zum Jahre 1846 eine Literatur von 191 Arbeiten findet, welche bis auf unsere Tage noch um einige Dutzend Nummern vermehrt worden sind. Der Grund dieser Unzahl von Abhandlungen liegt theils in der Leichtigkeit der Beobachtung und dem häufigen Vorkommen, theils in der eigenhümlichen Erscheinung, dass fast jede Epidemie kleine Variationen bietet, welche in den früheren nur wenig und unvollkommen beobachtet wurden. Zur Vereinfachung wird hier zuerst die Beschreibung eines regelmäßigen Scharlachs gegeben werden, worauf dann sämtliche Variationen und Complicationen in einem speciellen Abschnitte folgen sollen.

A. Normaler Scharlach. *Scarlatina legitima*.

Symptome.

Der legitime Scharlach durchläuft drei ziemlich scharf geschiedene Stadien: 1) Die Incubation und die Vorläufer, 2) den Ausbruch und die Blüthe des Exanthemes, und 3) dessen Schwinden mit endlicher Desquamation.

1) Das Incubations- und Vorläuferstadium.

Die Incubation dauert vom Tage der Ansteckung bis zum Auftreten des Fieberfrostes, von wo an man das Vorläuferstadium rechnet. Es ist dieser Zeitraum durchaus nicht bei allen Kindern gleich lang, in den meisten Fällen dauert er 6—8 Tage. Hier von bedeutend abweichende Angaben müssen mit grosser Vorsicht aufgenommen werden, indem es während einer Epidemie nur sehr selten gelingt, den Tag der Ansteckung mit absoluter Bestimmtheit anzugeben. Die Gelegenheiten der Ansteckung durch persönlichen Verkehr, namentlich mit noch desquammirenden Recovalescenten, dann durch Uebertragung von dritten Personen sind so mannigfach und schwer controlirbar, dass man wohl berechtigt ist, an Angaben, die von der gewöhnlichen Mittelzahl 6—8 Tage bedeutend differiren, zu zweifeln.

Wenn man nicht weiss, dass die Kinder infectirt sind, so bemerkt man während der Incubationszeit gewöhnlich keine krankhaften Symptome. Haben die Eltern in Erfahrung gebracht, dass sich ihr Kind einer Ansteckung ausgesetzt hat, so beobachten sie von dieser Stunde an eine Menge von Veränderungen an ihm, welche meist subjectiver Natur einen deutlicheren Beweis elterlicher Sorgfalt als medicinischen Scharfblickes liefern. In der That kommen aber einige wenige Fälle vor, wo vom Momente der Ansteckung an die Kinder sich unwohl fühlen, niedergeschlagen sind, unruhig schlafen und geringeren Appetit zeigen, bis endlich deutlichere Fiebersymptome den Anfang des Vorläuferstadiums anzeigen.

Das wirkliche Vorläuferstadium umfasst einen Zeitraum von 1—3 Tagen. Die Symptome, die während desselben eintreten, sind immer so deutlich, dass die Umgebung sie bemerkt, jedoch keineswegs deshalb stets die gleichen. Gewöhnlich haben sie nicht viel Charakteristisches. Leichtes Frösteln, abwechselnde Hitze und Kälte, oder auch ein wirklicher Schüttelfrost, erhöhte Hauttemperatur, sehr beschleunigter Puls, starker Durst, Appetitmangel, Uebelkeit, bei plötzlichem Eintritt des Fiebers auch Erbrechen, sind die gewöhnlichen Erscheinungen. Ein Symptom macht, namentlich während des Herrschens einer Epidemie, den Ausbruch des Scharlachs mehr als wahrscheinlich, es ist dies eine leichte Angina, verursacht durch allgemeine Rötzung und Schwellung des ganzen hinteren Abschnittes der Mundhöhle, des Gaumensegels, der Mandeln und hinteren Pharynxwand. Wichtige Anhaltspunkte für den Ausbruch eines Scharlachs sind ferner der auffallend heisse Athem, die grosse Pulsfrequenz, die Glühhitze der Haut und die starken abendlichen Exacerbationen, welche sich bis zu Delirien und Convulsionen steigern können.

Nachdem diese Symptome einen, längstens drei Tage gedauert haben, beginnt die Eruption des Ausschlages und hienit das zweite Stadium.

2) Das Stadium der Eruption und Florescenz.

Das Exanthem zeigt sich zuerst am Halse und im Gesichte und breitet sich von da aus rasch über den ganzen Körper aus, in zwölf Stunden ist gewöhnlich der Ausbruch vollendet. Es beginnt in der

Weise, dass sich zuerst kleine, kaum sichtbare noch fühlbare Pünktchen am Halse einstellen, auf welche dann rasch eine deutliche Rötze folgt. Wenn die Rötze nicht gleichmässig den ganzen Körper bedeckt, sondern nur in Form von grösseren, rothen Flecken auf weissem, normalem Grunde auftritt, so bezeichnet man diese Art: *Scarlatina variegata*; ist der ganze Körper geröthet: *Scarlatina laevigata*. Diese beiden Formen lassen sich nicht exact trennen, indem oft an einzelnen Körperparthien die eine, an anderen die andere beobachtet wird und noch häufiger die *Sc. variegata* auf der Höhe des Anschlages zur *laevigata* sich steigert.

Vorher gesunde, gutgenährte Kinder werden im wahren Sinne des Wortes kreberröth; je anmücker, je schwächlicher die Kranken vorher waren, um so weniger intensiv entwickelt sich die Scharlachröthe. Am dunkelsten wird die Rötze bei der abendlichen Exacerbation und bei körperlicher Anstrengung, z. B. Schreien, am schwächsten, wenn die Kinder sich Moslegen und kühl werden.

Der normale, einfache Scharlach steht deutlich vier Tage lang, in den ersten beiden Tagen erreichen die Hautröthe und die allgemeinen Symptome ihren Gipfel, in den zwei letzten Tagen nehmen sowohl die örtlichen als allgemeinen Erscheinungen wieder ab.

Zugleich mit dem Ausbruche des Exanthemes steigern sich die anginösen Beschwerden beträchtlich, doch ist die Scharlachangina nie so heftig und schmerzhaft, als eine einfache Tonsillitis mit bedeutender Anschwellung, wenn sie eben in Eiterung übergeht. Die sog. Scharlachzunge ist auch am charakteristischsten nach der Eruption. Sie ist an der Wurzel und in der Mitte weiss belegt, an den Rändern und der Spitze dunkelroth gefärbt, die Papillae fungiformes sind etwas geschwellt und geben der Zunge ein granulirtcs Ansehen, weshalb man ihr bei der Aehnlichkeit der Farbe nicht misspassend den Namen „Himbeerszunge“ beigelegt hat. Zuweilen ist die Schwellung der Papillen eine so bedeutende, dass sie auch weiter hinten, wo schon der weisse Beleg begrenzt hat, noch als rothe Punkte hervorrageu und somit die weisse Zunge roth gepünktelt erscheinen lassen.

Die Hauttemperatur ist in den ersten beiden Tagen enorm hoch, dem Gefühle nach höher an jenen Hautstellen, welche gehörig geröthet sind. Ich fand sie einmal am ersten Tage der Eruption in der Achselgrube bis auf 41,5 C. gestiegen. Der Puls ist ebenfalls sehr beschleunigt, der Durst gross. Die tiefe, allgemeine Depression, welche vor dem Ausbruche des Exanthemes zuweilen so bedeutend wird, dass die Kinder ganz collabirt wie Sterbende aussehen, lässt nach erfolgtem Ausbruche nach.

Heim gab zuerst an, dass die Scharlachkranken einen eigenthümlichen Geruch verbreiten. Der Geruch wird als sehr intensiv geschildert, indem man ihn mit Haringslauge, altem Käse oder gar mit einem Managriergerüche verglichen hat. Ich bin nun mit einem ausserordentlich feinen Geruchsorgane begabt und untersuchte bei vielen Kranken diesen angeblich specifischen Geruch mit aller Aufmerksamkeit, muss jedoch gestehen, dass mir ein so specifischer Geruch noch niemals vorgekommen ist. Sehr viele Kinder riechen allerdings unangenehm, was eben daher kommt, dass die Angehörigen durchaus die Bett- und Leibwäsche nicht wechseln lassen, die Kinder im Bett selbst

auf den Nachttopf setzen und sie oft über acht Tage lang mit keinem massen Schwamm berühren. Es entsteht dadurch ein Gemisch von Gerüchen, wozu Fäces, Urin und Schweiß die Hauptbestandtheile liefern. Sobald man aber den Anus und die Genitalien ordentlich reinigen, die Wäsche wechseln und die Kinder in ein frisches Bett bringen lässt, verschwindet in allen Fällen der sog. spezifische Geruch.

Es ist möglich, dass zu Heim's Zeiten der Scharlach von einem solchen begleitet war, in unserer Zeit existirt derselbe nicht mehr.

Gegen den vierten Tag zu lassen nun die örtlichen und allgemeinen Symptome bedeutend nach. Die Angina verschwindet spurlos, das Exanthem erblasst, das Fieber beschränkt sich auf immer schwächer werdende abendliche Exacerbationen, die Kinder setzen sich wieder auf, fangen an zu spielen und begehren wieder zu essen.

3) Stadium der Desquamation.

Die Hautröthe erblasst an den Stellen, wo sie zuerst bemerkt wurde, also am Halse und auf der Brust auch wieder zuerst, und schwindet zuletzt von der Leistegegend und der inneren Schenkelfläche, wo die letzten Spuren noch bis zum sechsten und siebenten Tage vom Ausbruche an gesehen werden. Vor der Desquamation stellt sich meist ein profuser Schweiß und anhaltendes, ziemlich heftiges Hautjucken ein, worauf denn die Epidermis rissig wird und sich in grösseren Schuppen stellenweise in ganzen Fetzen ablost. Die neue Epidermis ist in den ersten Tagen schwach rose Roth gefärbt und von besonderer Glätte, nimmt aber bald die Eigenschaften der eben abgeschälten an. Am grossartigsten ist die Abschlupfung an den Fingern und Zehen, wo sich zuweilen die ganze Epidermis in einem Stücke wie ein Handschuhfinger abziehen lässt. Ein ähnlicher Desquamationsprocess geht auch auf den Schleimhäuten vor sich. Die Kinder räuspern und husten ohne Beschwerden einen trüben Schleim aus, die Zunge stösst ebenfalls ihr Epithel ab, der Harn wird trüb und enthält aus dem verschiedenen Abschnitten des uropoetischen Apparates ungeheure Mengen Epithelzellen. Es werden endlich auch einige grosse schleimige Stühle von aschalt penetrantem Geruche entleert.

Die Desquamation beginnt gewöhnlich gleich nach dem Erlöschen des Exanthemes, kann sich aber auch bis 14 Tage später verzögern, was besonders dann stattfindet, wenn die Genesung durch irgend einen andern intercurrenten Process, z. B. die Zahnung oder einen Catarrh der Bronchien, des Darmkanals etc. unterbrochen wird. Je stärker die Röthe, um so schneller und grossläppiger die Abschuppung.

Dieses wäre das Bild des legitimen Scharlachs. Die Variationen davon sind ausserordentlich mannigfaltig und lassen sich niemals ganz erschöpfend geben. Sie können am besten von folgenden Gesichtspunkten aus betrachtet werden: 1) Unvollkommenheit oder förmliche Verschiedenheit des Exanthemes, 2) Modificationen der Schleimhautbetheiligung, 3) Intensität der Allgemeinerkrankung und 4) anomale Localisationen.

8. Variationen des Scharlachs

1) Unvollkommenheit oder formelle Verschiedenheit des Exanthemes.

Zu einem vollkommenen Scharlach gehören als Hauptsymptome Röthung der Haut und Angina; fehlt eines dieser beiden, so haben wir die Variation des unvollkommenen Scharlachs und zwar je nachdem das eine oder andere fehlt: 1) *Scarlatina sine angina* und 2) *Scarlatina sine exanthemate*.

ad 1) Diese Form wird ziemlich oft beobachtet. Das Exanthem kann vollkommen zum Ausbruch kommen, regelmäßig verlaufen, auch die Desquamation sich rechtzeitig und gehörig einstellen, und doch klagen die Kinder nie über Schlingbeschwerden, und die Mandeln sind dem entsprechend nicht geschwollen und kaum geröthet. Die allgemeinen Symptome sind hierbei niemals von besonderer Heftigkeit, und die Schleimankrisen immer unbedeutend.

ad 2) So leicht und sicher die erste Unvollkommenheit zu diagnosticiren ist, so schwer ist es die zweite, indem Verwechselung mit einfachen Anginen, welche die Kinder während einer Scharlachepidemie ja auch acquiriren können, kaum zu vermeiden sind. Bei der Scharlachangina gelten als charakteristische Momente: die weite Verbreitung der Röthe, die Himbeerszenge, die Seltenheit der Abscessbildung in den Mandeln und die Heftigkeit des Fiebers, welche Symptome möglicherweise aber sämtlich auch ohne Scharlach bei der einfachen Angina eines reizbaren Kindes sich zeigen können. Man kann mit Bestimmtheit die Scharlachangina nur dann diagnosticiren, wenn man dasselbe Individuum schon früher an einfacher Angina behandelt hat und nun eine beträchtliche Verschiedenheit in der Form und dem Fieber wahrnimmt.

Dass die Kinder nach Scharlach ohne Exanthem auch vollständig sich häuten sollen, wird mehrfach von Autoren angegeben; ich habe diese noch niemals beobachtet und halte es für räthlicher, bei wirklicher Desquamation einzeln, wenn auch nur wenige Stunden stehenden Hautausschlag anzunehmen.

Zwischen diesen beiden Formen liegt natürlich eine Reihe von Uebergängen. Es gibt ganze Epidemien, wo das Exanthem verhältnissmässig stark, die Angina schwach ist, und umgekehrt Epidemien, wo die Angina sehr heftige Beschwerden verursacht, während das Exanthem oft nur ganz kurze Zeit und nur an einzelnen Körperstellen sichtbar wird.

Bezüglich der Form des Exanthems haben wir vor allem 1) die *Scarlatina variegata*, 2) die *S. laevigata*. Bei der ersten entstehen zuerst thaler- bis handgrosse rothe Flecken, welche durch eine gewisse Partlie gesunder Haut von einander getrennt bleiben. Bei der zweiten wird die ganze Haut vom Gesicht bis zu den Füssen kreberoth, in welchem Falle immer die Desquamation am beträchtlichsten ist. Die erstere Form geht auf der Höhe des Exanthems wohl auch in die zweite über.

Wenn das Exsudat der Urtis massenhaft wird, so entstehen auf der Oberfläche eine Unzahl kleiner Knötchen, wodurch die Haut rau, wie eine Gänsehaut sich anfühlt.

Diese Knötchen entstehen durch Vergrößerung der Hautpapillen. Man nennt diese Art *Scarlatina papulosa*.

Bei noch grösserer Exsudation endlich sammelt sich das Exsudat zu Bläschen, die ganze Haut bedeckt sich mit unzähligen mohnsamengrossen Vesikeln, welche eine alkalisch reagirende, trübe Flüssigkeit enthalten, platzen und eine mehrfache Desquamation verursachen. *Scarlatina miliaris*, der Scharlachfriesel.

In einzelnen Epidemien stehen diese Bläschen so dicht, dass sie zu grösseren Blasen confluiren können, was man *Scarlatina vesiculosa, pustulosa, pemphigoides* genannt hat. Zur Miliarenbildung kommt es gewöhnlich nur bei ganz ausgesprochenen, schweren Fällen. —

2) Modificationen der Schleimhautbetheiligung.

Dass der Scharlach keine Hautkrankheit, sondern eine Allgemeinerkrankung ist, geht hauptsächlich aus den mannigfachen Affectionen der Schleimhäute hervor.

An der normalen Stelle, in der Mundhöhle, sind die Veränderungen von sehr verschiedener Intensität. Das Gaumensegel und die Mandeln sind entweder nur einfach geröthet, oder geröthet und beträchtlich geschwollen, oder sie bedecken sich in bösartigen Epidemien unter ungünstigen, inneren Verhältnissen mit grossen Membranen, es tritt die Angina diphtheritica auf. Die diphtheritischen Membranen finden sich am häufigsten auf den Mandeln und können durch Gurgeln theilweise abgelöst werden, worauf die Schleimhaut geröthet, erodirt zum Vorschein kommt und sich nach wenigen Stunden mit einer neuen Membran bedeckt. Der Geruch aus dem Munde ist hierbei sehr widerlich, das Schlingen ist erschwert und aus der Nase fliesst ein übelriechender Schleim, wenn sich die Diphtheritis nach aufwärts in den Choanen verbreitet hat. Die nächstgelegenen Sinusmaxillär- und Halsdrüsen sind dann immer geschwollen und gehen zuweilen in Eiterung über. Die Allgemeinerkrankung ist hierbei stets sehr intensiv und schneller Collapse tritt ein, wenn die Diphtheritis brandig wird. Dabei wird der Geruch aus dem Munde unerträglich aschhaft, es stellen sich grosse Schling- und Athembeschwerden, Diarrhöen, Delirien oder Coma und bald darauf der Tod ein.

Beständig ihrer Ausdehnung zeigt die Angina ebenfalls Veränderungen. Sie beschränkt sich in gutartigen Epidemien auf das Gaumensegel und die Mandeln, erstreckt sich aber, namentlich aber wenn die diphtheritische Form auftritt, auch auf die Eustachischen Röhren, die Nasenhöhle, die Highmoreshöhle, den Pharynx und den Larynx, wodurch je nach den ergriffenen Partien Schwerhörigkeit, Coryza, grosse Schlingbeschwerden oder krupöse Symptome auftreten können. Die Epidemien mit diphtheritischer oder gar gangränöser Angina gehören immer zu den bösartigsten.

3) Intensität der Allgemeinerkrankung.

Unsere Vorfahren nahmen 1) einen trochischen, 2) einen synochalen, 3) einen torpiden und 4) einen septischen Scharlach an. Wenn sich auch diese Trennung in verschiedene Formen nicht immer streng

durchführen Host, indem häufig bei einem und demselben Falle mehrere derselben nach einander beobachtet werden, so muss doch zugestanden werden, dass der Charakter der allgemeinen Reaction in den einzelnen Epidemien ein sehr verschiedener sein kann. Hiern kommt noch die Verschiedenheit je nach der Individualität. Im Allgemeinen kann angenommen werden, je kräftiger und gesunder ein Kind vor der Aufnahme des Scharlachgiftes war, um so synochaler, entzündlicher ist die Reaction seines Organismus, je schwächerer und dyskrasischer, um so septischer wird der Process verlaufen.

Unter erythematic Scharlach versteht man das Krankheitsbild, welches wir als normalen Scharlach oben gestellt haben. Die Vorläufer, der Ausbruch, die örtlichen und allgemeinen Veränderungen treten mit keiner gefährlichen Heftigkeit auf und der Verlauf ist deshalb immer ein günstiger. Es darf aus einem normalen Vorläuferstadium und Ausbruch jedoch noch nicht mit Bestimmtheit auf einen ebenso normalen Verlauf gerechnet werden, indem zu jeder Zeit der Charakter des Fiebers sich ändern kann.

Die synochale, entzündliche Form zeichnet sich durch rasches Auftreten der Krankheit, heftiges Fieber, stark entwickeltes Exanthem mit Frieselbildung, beträchtliche Angina und Gehirnerscheinungen, Schlaflosigkeit, Delirien, Kopfschmerz und Lichtschock aus.

In einzelnen Epidemien ist die typhöse oder nervöse Form die vorherrschende. Die Krankheit beginnt hierbei sogleich mit grosser Prostration, Schwindel, stillen Delirien, Ohnmächten und Coma. Der Puls ist zwar ausserordentlich beschleunigt, aber klein und leicht zu comprimirn. Die Angina hat Neigung zu Diphtheritis überzugehen. Das Exanthem bricht unvollkommen, nur an einzelnen Körperstellen aus, die Extremitäten sind oft kühler als warm. Die Zunge wird trocken, wie bei Typhösen, es stellen sich wohl profuse Diarrhöen ein und die Kranken sterben gewöhnlich sehr bald am zweiten bis vierten Tage der Erkrankung. Bei der Section findet man in der Regel keine den Tod genügend erklärende örtliche Ursache, so dass man die Einwirkung des Scharlachgiftes auf das Blut und das Nervensystem als solche annehmen muss. Genossen solche Kinder, so sind sie gefährlichen Nachkrankheiten ausgesetzt und reconvalesciren in allen Fällen nur sehr langsam.

Als höchsten Grad der typhösen Form kann man die septische gelten lassen, wo der Ausschlag gewöhnlich gar nicht zum Ausbruche kommt, da unter Bildung von Pusteln, unter profusen Blutungen der Nasenschleimhaut, des Darmes und der Nieren der Tod sich in kürzester Zeit einstellt. Die Diphtheritis der Mandibulä wird in diesen letalsten Fällen schon wenige Stunden nach ihrem ersten Auftreten beanfäng.

4) Anomale Localisationen.

Nicht immer beschränken sich die örtlichen Veränderungen auf die Haut und die Mundhöhle, sondern in einzelnen Epidemien erkranken neben diesen genannten Organen noch andere beträchtlich. So wird von Epidemien berichtet, in welchen viele Kinder auf der Höhe der Krankheit Pleuritis oder Pneumonie bekamen und daran zu Grunde gingen; in anderen starben sie plötzlich unter tetanischen Krämpfen

und man fand dann in der Leiche starkes Oedem, wohl auch öfterige Ablagerung in den Gelenkhäuten. Zuweilen theilte sich, namentlich bei beginnender Desquamation, die Darnschleimhaut in hohem Grade und es entstehen profuse Darmcatarrhe oder dysenterische Diarrhöen mit sehr schmerzhaftem Tenesmus. Die häufigste aber unter allen anomalen Localisationen ist die auf die Nieren, wodurch der acute brightische Hydrops entsteht. Derselbe ist pag. 403 schon ausführlich abgehandelt. Er kommt in einzelnen Epidemien sehr häufig, in andern fast gar nicht vor. In den letzten Münchener Epidemien gehörte er zu den größten Seltenheiten und stellte sich selbst da nicht ein, wo in der ärmsten Classe der Bevölkerung der Mangel aller Pflege und Aufsicht ihn sicher erwarten liess. In andern Epidemien werden die Hilft und noch mehr der Erkrankten trotz aller Pflege hydropisch, so dass man einer vorsichtigen Behandlung die Möglichkeit einer Prophylaxis zwar nicht abstreiten darf, jedoch bekennen muss, dass die Hauptveranlassung in dem Charakter der Epidemie zu suchen ist.

Wie die Angina bedeutend ist, da stellt sich auch sehr gewöhnlich Anschwellung der Lymphdrüsen des Halses, zuweilen auch Parotitis ein. Das Nähere hierüber findet sich pag. 102 im Abschnitte von der metastatischen Parotitis. Aus gleichem Grunde kann sich auch eine Coryza oder eine Otorrhöe entwickeln, indem die Schleimhauterkrankung, namentlich die diphtheritische Form sich in die Nasenhöhle fortpflanzen kann, oder durch die Mittheilung der Eustachischen Röhre Otitis interna verursacht, worauf dann das Tympanum perforirt und der Eiter nach aussen abfliesst.

Erfolich werden noch Metastasen in das Unterhautzellgewebe mit grossartiger Abscessbildung beobachtet und bei der torpiden und septischen Form kann rasch gangränöser Decubitus sich einstellen. —

Die Nachkrankheiten eines starken Scharlachs sind sehr mannigfaltig. Am häufigsten werden beobachtet: chronische seröse Ergüsse in der Pleura, dem Bauchfell oder einem Gelenke nach Morbus Brightii, Eblains, Chorea, Lähmungen, Taubheit, Aphasie, Blindheit nach heftigen Gehirnerscheinungen; bei cachectischen Kindern und unzureichender Pflege auch Noma.

Die Differentialdiagnose von Scharlach und Masern wird weiter unten bei den Masern gegeben werden. Weder die pathologische Anatomie noch die chemischen Untersuchungen des Blutes und der Excreta geben irgend eine Aufklärung über das Wesen des Scharlachgiftes. Man findet in der Leiche mit Ausnahme der Schwellung oder Diphtheritis der Mandeln gar keine constanten Veränderungen.

Aetiologie.

Der Scharlach entsteht durch Contagium. Dasselbe lässt am stärksten an den Hautfetzen, welche während der Desquamation von der Haut sich ablösen, weshalb auch zu dieser Zeit, nicht während der Blüthe des Exanthems, am häufigsten die Ansteckung erfolgt und eine Verschleppung möglich ist. Uebrigens ist der Zeitpunkt, mit welchem die Ansteckungsfähigkeit beginnt und wieder erlischt, noch nicht festgestellt. Es werden Fälle erzählt, wo Kinder schon im Vorläuferstadium angesteckt haben sollen, und wieder andere, wo nach längst beendeter Desquamation noch Infection stattgefunden hat.

Die Contagiosität ist nicht in allen Epidemien gleich ausgesprochen; in manchen ist sie so eminent, dass alle Kinder einer Familie erkranken, sobald bei einem der Scharlach ausgebrochen, in andern ist sie so gering, dass die Mehrzahl der Kinder trotz häufiger Berührung mit Kranken gesund bleibt. Die Inoculationen mit Scharlachblut oder Serum der Frieselbläschen wurden von Stoll, Harwood und Miquel mannigfach angestellt und hatten häufig den Erfolg, dass Scharlach entstand, welcher eben so heftig und selbst heftiger war, als der zur Impfung verwendete. Wenn man durch Impfung nur eine Ansteckung, aber keine Schwächung und engere Localisirung des Giftes erzielen kann, so entspricht sie natürlich ihrem Zwecke nicht. Man braucht hierzu gar nicht diese complicirtere Manipulation, sondern nur eine einfache Berührung mit Scharlachkranken. Am empfänglichsten sind die Kinder zwischen zwei bis zwölf Jahren. Kleine Kinder bekommen ihn nur selten, bei ganz heftigen Epidemien. Die Sterblichkeit wechselt zwischen 2—20 Procent. Dass ein Individuum zweimal den Scharlach bekommen könne, wird von einzelnen, zuverlässigen Autoren versichert. Es scheint sich dies jedoch so außerordentlich selten zu ereignen, dass man eher geneigt ist, einen Beobachtungsfehler, der bei den diagnostischen Schwierigkeiten mancher Fälle sehr verzeihlich ist, anzunehmen.

Behandlung.

Die Verschiedenheit der einzelnen Epidemien macht es unmöglich, eine auf alle Scharlachkrankungen passende Therapie anzugeben, und schwächt schon vornehmlich das Vertrauen auf die vielen als Specifica gerühmten Mittel im höchsten Grade.

Es ist überflüssig, die vielen prophylaktischen Mittel aufzuzählen, da keines sich in Wirklichkeit bewährt hat. Die einzige vernünftige Prophylaxe besteht in einer vollkommenen Absperrung der Kinder von allen Scharlachkranken und allen Personen, die mit solchen in Berührung kommen. Diese Absperrung muss jedenfalls fünf bis sechs Wochen für jeden Kranken dauern, wie weit aber und auf welchen Umwegen der Scharlach durch dritte Personen verschleppt werden kann, ist gar nicht zu ermitteln. In schweren Epidemien, in welchen ein grosser Theil der Erkrankten zu Grunde geht, ist es am sichersten, wenn die Kinder den Ort ganz verlassen, was, da die Epidemien oft lange dauern und in vielen Orten zugleich herrschen, mit grossen Opfern verbunden ist.

Die Behandlung des Scharlachs wird entweder mit specifischen Mitteln und Methoden versucht oder ist eine einfach expectativ symptomatische.

Zu den specifischen Mitteln gehören: das kohlensaure Ammoniak zu 4,0—8,0 auf 150 Lösung — das Chlorwasser 4,0 auf 200,0 Lösung — die Mineralsäuren — die Essigsäure 2,0—4,0 pro die.

Als specifische Methoden waren oder sind zum Theil noch in Gebrauch: Allgemeines Blutentziehungen — Brech- und Abführmittel — kalte Begiessungen, die methodischen Kaltwasserkuren haben zwar den von den älteren Aerzten gefürchteten Schaden nicht gebracht, in schweren Epidemien jedoch sich wirkungslos erwiesen — Fetteinreibungen, schon öfter gerühmt und wieder vergessen, von Schaeemann

sonderings zugleich mit einer kühlenden Behandlung dringend empfohlen. Schneemann lässt die Scharlachkranken vom ersten Tage an drei Wochen lang Morgens, Mittags und Abends, in der vierten Woche nur einmal täglich am ganzen Körper, den Kopf ausgenommen, mit Speck einreiben. Dabei soll die Zimmertemperatur höchstens 13° betragen, das Bett nur während der Eruption streng gehalten, so lang das Fieber dauert, kühlende Diät und innerlich kein Medicament verschrieben werden. Mit Recht legt Schneemann ein grosses Gewicht auf gründliche, oft wiederholte Ventilation, übertreibt jedoch seine Abkühlung, wenn er rüth, die Temperatur des Zimmers auf 10 bis 12° herabzubringen und jeden Tag die Fenster des Krankenzimmers drei Stunden lang zu öffnen. —

Es bedarf wohl kaum keiner besonderen Berichtigung, dass diese sog. Specifica und specifischen Methoden durchaus keine spezifische Wirkung haben, sondern in schweren Epidemien, alle mit einander an der Virulenz des Scharlachgiftes zu scheitern werden. In leichten Epidemien empfehlen sich die am meisten, wodurch die Kinder am wenigsten gequält und an Kräften geschwächt werden. Unter den Mitteln wird deshalb einer verdünnten Mineralsäure, unter den Methoden einer mässigen Fetteinreibung der Vorzug zu geben sein. —

Die expectativ symptomatische Behandlung beschränkt sich auf Abhaltung aller Schädlichkeiten, welche auf den Verlauf ungünstig einwirken könnten, und auf Minderung einzelner Beschwerden und besonders stürmischer Symptome.

Eine gehörige Ventilation des Krankenzimmers ist immer die wesentlichste Garantie eines günstigen Verlaufes. Dasselbe wird am vollständigsten bewerkstelligt, wenn man zwei neben einander liegende Zimmer zur Benützung hat, so dass der Patient die Hälfte des Tages in diesem, die Hälfte in jenem zubringen kann. Die Temperatur des Zimmers sei, während das Exanthem steht, 13° R., nach Erlöschen desselben, oder wenn es nicht gehörig zur Entwicklung kommt, oder etwas höher als niedriger. Die Kläder und Bettdecken des Kindes müssen so eingerichtet sein, dass es nicht immer transpirirt, aber doch nicht vollkommen sich abkühlen kann. Die Diät sei, so lange Fieber vorhanden, eine antifebrile, wo Verstopfung zugegen, eine leicht eröffnende, namentlich Compot, das die Kinder jeder Zeit gerne nehmen, und wo Neigung zur Harnthürste besteht, eine stopfende Schleimsuppe, schleimige Getränke. Ist das Fieber verschwunden, so verzögert eine so karge Ernährung die Recrudescenz; mit unken, leicht verdaulichen einfachen Nahrungsmitteln braucht man nicht so ängstlich zu sein.

Nachdem die Desquamation schon seit mehreren Tagen gehörig in Gang gekommen, kann ihre Vollendung durch einige mit grosser Vorsicht gegebene Bäder beschleunigt werden, worauf der Kranke allmählig wieder an die freie Luft gebracht werden darf. Um gegen alle denkbaren Vorwürfe sich sicher zu stellen, thut man gut, die Kinder im ganzen sechs Wochen lang nicht aus dem Zimmer zu lassen, was in den niederen Ständen und bei mangelhafter Aufsicht freilich nicht immer durchzuführen ist. Interne reicht man bei normalem Scharlach ein indifferentes leicht stürkliches, salinisches oder schleimiges Medicament, bei schlecht entwickeltem Exanthem täglich 2,0 kohlensaures Ammoniak in 150 CC. Vehikel.

Bei der symptomatischen Behandlung einzelner heftiger oder drohender Erscheinungen darf man nicht zu eilig noch zu energisch verfahren. Das starke Fieber vor der Eruption könnte zu Blutentziehungen, zu Colicen oder Brechweinstein verketten, wodurch man jedoch sicherer den Verlauf verzögern als das Fieber zum Schwinden bringen wird.

Eine längere Verzögerung des Ausbruchs sucht man durch Seitzüge und reizende Waschungen mit warmem Essig oder mit Laugen abzukürzen. Das bestehende Exanthem wird sehr zweckmäßig mit Speckeinreibungen behandelt, wodurch sowohl das lästige Hautjucken gemildert, als auch ein Schutz vor rascher Abkühlung gewährt wird.

Drohende Gehirnsymptome, Delirien, Schlafsucht oder Coma wurden am deutlichsten durch intensive kalte Begießungen des kurz geschorenen Kopfes, die stündlich wiederholt werden müssen, gebessert. Narcotica veranlassen zuweilen einen bedenklich raschen Collapsus und werden deshalb in den ersten Tagen besser gemieden. Bei den septischen, septischen Formen muss man bald zum Chinin, Campher, Wein, Moschus und Castoreum greifen und die Kräfte möglichst zu erhalten suchen.

Bei den bösartigen diptheritischen Anginen wäre eine energische örtliche Behandlung, Einblasen von ungeräucherten Schwefelblumen, stündliche Inhalationen von Kalkwasser oder verdünnter Milchsäure 2,5 auf 300, sehr ersprießlich. Die Prostration der Kinder und ihr Widerstreben tritt aber meist hinderlich in den Weg. Aus gleichem Grunde kommen nur selten Gargarismen in Anwendung und man muss sich darauf beschränken, den Kindern interne Mittel zu geben, welche als Antidiptheritica gelten. Die besten sind das kohlensaure Kali und das chloridre Kali, das letztere hat einen wirklich günstigen Einfluss auf die Reinigung der Schleimhaut, das letztere nimmt den unangenehmen Geruch. Man gibt beide Salze getrennt in wässrigen Lösungen, von jedem täglich bis zu 4,0.

Die Behandlung der Albuminurie wurde schon früher besprochen, ebenso die der Parotitis nach Scharlach. Darmcatarrhe müssen durch Opium, Mucilaginoso und Adstringentia möglichst rasch beseitigt werden. Lähmungen und Krämpfe nach Scharlach erfordern die gegen diese Uebel schon früher pag. 359 angegebene Behandlung; consecutive Gelenkentzündungen und seröse Ergüsse bessern sich auf warme schmerzstillende Umschläge und Resolventien.

2) Masern. Herbill.

Unter Masern versteht man einen acuten ansteckenden Hautausschlag, der in kleinen, runden, rothen Flecken besteht, mit catarrhalischen Erscheinungen verbunden ist und mit kleinartiger Abschuppung endet.

Da die einzelnen Masernepidemien, gerade so wie die Scharlachepidemien, bedeutende Variationen erkennen lassen, in ihrem Verlaufe, ihrer Gefährlichkeit und in ihren Nachkrankheiten sehr verschieden sind, so wird es am zweckmäßigsten sein, zuerst ein Bild des normalen Verlaufes zu geben und dann die Variationen der Reihe nach aufzuführen.

A. Normale Kochilli.

Es lassen sich mit ziemlicher Schärfe 1) ein Stadium der Vorboten, 2) Stadium des Ausbruches, 3) Stadium der Blüthe und 4) Stadium der Abschuppung unterscheiden.

1) Stadium der Vorboten. Stadium *invasionis*.

Bei kräftigen Kindern und leichten Epidemien sind die Vorboten nicht so mächtig, dass die Kinder sich niederlegen und das Bild einer ernsten Erkrankung bieten. Die gewöhnlichen Beschwerden sind: Schnupfen, fließende Nase und lästiges Niesen mit consecutiver Schwellung der Nasenschleimhaut, geröthete Conjunctiva, Thränen der Augen, leichte Bepharitis, Lichtscheu, Heiserkeit und trockner bellender Husten. Die allgemeinen Symptome reduciren sich auf Mattigkeit, Abgeschlagenheit, Appetitmangel, etwas erhöhte Hauttemperatur, Durst, abendliche Fieberexacerbation, die bei reizbaren Kindern sich Nichts bis zu Delirien steigern kann. Die Zunge ist belegt, der Geschmack schlägt, Druck auf den Magen empfindlich. Zuweilen lassen auf stärkeres Nasenbluten die Fiebersymptome nach.

Diese Zeichen steigern sich allmählich von Tag zu Tag und beginnen gewöhnlich erst einige Tage nach geschehener Ansteckung.

Nach Kerschenszteiner's genauen Untersuchungen verläuft in Familien mit mehreren Kindern, von denen eines an den Masern erkrankt ist, immer ein Zeitraum von 10–12 Tagen, bis weitere Erkrankungen eintreten. Parum, welcher auf den Faktoren unter ausserst günstigen Verhältnissen eine Epidemie beobachtete, nimmt ein Incubationsstadium von genau 14 Tagen an. Da man weiss, dass das Exanthem sobald es auf der Haut erschienen ist, auch ansteckt, so kann man mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die später erkrankten Kinder das Maserngift 10–14 Tage mit sich herumtrugen. Die oben geschilderten Vorboten stellen sich erst 3–5 Tage vor dem wirklichen Ausbruche des Exanthemes ein, und es ist demnach klar, dass das Maserngift die ersten 6–7 Tage nach seiner Infection durchaus wirkungslos bleibt.

2) Stadium des Ausbruches. Stadium *eruptionis*.

Das Exanthem bricht zuerst im Gesichte, auf den Wangen oder dem Nasenrücken aus und kriecht von da über den Hals zum Rumpfe an die oberen und zuletzt auch unteren Extremitäten. Bei vorher gesunden Kindern ist der Ausbruch in 24 Stunden vollendet, geht im allgemeinen jedoch langsamer von Statten als der des Scharlachs.

Das Exanthem beginnt mit Maserrothen, kleinen, runden Flecken von der Grösse einer Linse. Dieselben röthen sich mehr und mehr, fließen, wenn sie sehr dicht stehen, auch wohl zu unregelmässigen Figuren zusammen, lassen aber immer stellenweise normale Haut zwischen sich. Mit zunehmender Röthe erheben sie sich auch über das Niveau der Haut und werden auf der Höhe der Erhabenheiten etwas gelblich, zu Blasebildung kommt es jedoch niemals. Beim Ausbruche der letzten Pocken bestehen einige Stunden dieselben rothen erhabenen Hautstellen und lassen sich in keiner Weise örtlich von den Masern

unterscheiden. Die allgemeinen Symptome jedoch sind bei diesen beiden Exanthemen sehr verschieden, und die selben Blättern kommen in civilisirten Ländern wegen allgemeinen Impfwanges so gut wie gar nicht mehr bei Kindern vor.

Die rothen, erhabenen Stellen fühlen sich härter an als die normale Haut, und die darüber streichende Hand bekommt ein ganz eigenthümliches Gefühl von ungleicher Härte. Auf der Schleimhaut des Mundes sind wohl auch einzelne ungleich röhrene Stellen zu entdecken, das Exanthem ist übleigens hier bei weitem nicht so deutlich als bei Scharlach.

Die allgemeinen Symptome erreichen mit dem Ausbruch des Fiebers ihren höchsten Grad, die meisten Kinder deliriren, sind sehr unruhig und machen den Eindruck schwerer Erkrankung. Der Stuhl ist angehalten, Urin hochroth, reich an Harnsäure und Harnstoff.

3) Stadium der Blüthe. Stadium florescentiae.

Die Maseru stehen vier Tage lang auf der Haut. Das Fieber und die Schleimhautsymptome dauern gemässigt vor, die allgemeine Verstimmung jedoch stimmt sichlich ab. Der Ausschlag erbläst in derselben Reihenfolge, in der er crebescen ist, zuerst im Gesichte, dann am Rumpf und zuletzt an den unteren Extremitäten. Die grösste Schwellung und Spannung findet sich am zweiten Tage nach dem Ausbruch, am dritten Tage lässt dieselbe schon nach. Die Haut wird zuweilen gelblich, bevor sie zur normalen Färbung zurückkehrt und am vierten sieht man bloss mehr leichte Spuren des erblasenden Exanthemes. In gleichem Masse mündet sich die Conjunctivitis und der Nasencatarrh, während der Bronchialcatarrh gemäss der grossen destruetischen Ausdehnung der Schleimhautfläche noch lange Zeit und oft in höherem Grade als zu Anfang anhält. Die Expectoration wird hierbei sehr beträchtlich. Sobald das Exanthem am ganzen Körper erbläst ist, beginnt das

4) Stadium der Abschuppung. Stadium desquamationale.

Überall, wo das Exanthem aufgetreten ist, da stösst sich die Epidermis ab, allein nicht so, wie beim Scharlach, in grösseren Lappen, sondern immer nur in ganz kleinen Schuppen, die so wie ein weisser Staub auf der Haut liegen um am besten gesehen werden, wenn man dieselbe mit einem schwarzen Tuche reibt. Je stärker das Exanthem war, um so weisser und standiger wird das schwarze Tuch. Die Schleimhaut der Nase und der Augen ist nun vollkommen frei, die der Bronchien aber liefert auch bei ganz normalen Masern noch mehrere Wochen lang eine ziemliche Menge Secret, das durch Husten entfernt wird.

Das Allgemeinbefinden bessert sich ausserordentlich schnell, so dass es kaum möglich ist, die Kinder länger als 3—4 Tage nach Erblösung des Exanthemes im Bette zu halten. So lieten mit Ausnahme eines sehr wenig belästigten Hustens durchaus keine krankhaften Symptome mehr, der Schlaf ist gut, der Appetit vortreflich, Stuhl und Urin normal und die durch das Fieber heruntergekommenen Kräfte sind in

wenigen Tagen wieder ersetzt. Dasselbe wäre das Bild der normalen Masern, wie sie in einer mässigen Epidemie bei einem sonst gesunden Kinde verlaufen.

B. Varietäten und Nachkrankheiten.

Wir haben hier zu betrachten: 1) Abweichungen bezüglich des Exanthemes, 2) bezüglich der Schleimhaut, 3) bezüglich der Allgemeinerkrankung und 4) eine Reihe von häufigen, bösartigen Nachkrankheiten.

1) Modificationen des Exanthemes.

Das Exanthem stellt sich nicht immer in der oben geschilderten Ordnung ein. Bei reizbaren Kindern und übertrieben warmer Bedeckung bricht es schon am zweiten Tage nach Eintritt der Vorboten aus und hält sich auch nicht an die gewöhnliche Reihenfolge. Es kann statt im Gesichte an den unteren Extremitäten zuerst auftreten. An einzelnen Stellen können die kleinen rothen Flecke confluiren, so dass uns Schwierigkeit ist, das Exanthem von Scharlach zu unterscheiden. Diese grösseren rothen Stellen sind aber niemals über den ganzen Körper verbreitet und man findet immer noch hinreichend charakteristisches Masernexanthem. Auch zu Masern gesellt sich zuweilen ein Blutschnauschlag, der sog. Friesel, jedoch viel seltener als zu Scharlach, worauf dann die Abschuppung in grösseren Schuppen und reichlicher sich einstellt. In bösartigen Epidemien wird das Exanthem bläulich, es verschwindet nicht spurlos, sondern hinterlässt Echylosen und ist mit den bösartigsten Schleimhautrekrankungen complicirt.

Die Dauer der Blüthe kann verschieden lang sein. Zuweilen sieht es nur 2—3 Tage, es kann aber auch 5—6 Tage lang zu sehen sein, ja es wird sogar berichtet, dass es vollkommen verschwunden war und nach einigen Tagen mit neuem Fieber wiedergekehrt ist.

2) Bethheiligung der Schleimhäute.

Die Schleimhäute erkranken im Allgemeinen bei den Masern viel ausgedehnter und intensiver als im Scharlach und es droht von daher viel häufiger Gefahr als von der Infektion des Blutes durch das Maserngift.

Die gewöhnliche Conjunctivitis kann sich zu einer bösartigen Blemorrhoe mit starkem Oedem der Lider steigern.

Der Nasencatarrh kann einen so heftigen Reiz der Schleimhaut bedingen, dass fortwährendes Niesen, eine bedeutende Congestion und eitrige Erosion eintritt.

Die Entzündung des Gaumensegels und des Kehlkopfs verursachen zuweilen einen unaufhörlichen Hustenreiz, der zu wahren Paroxysmen nach Art des Keuchhustens, mit Erbrechen und Blutungen ansetzt.

In bösartigen Epidemien bleibt es nicht bei einfacher Congestion und bei Catarrh der Schleimhäute, sondern es entwickeln sich alsbald diphtherische Membranen auf denselben, wodurch Perforation der Cornea und Gangrän der Lider, eitrige riechende Coryza und Salivation,

bei Uebergreifen auf den Larynx aber der so häufige und gefährliche diphtheritische Krup entsteht.

Lobäre und lobuläre Pneumonie sind bei den Masern ausserordentlich häufig und namentlich erliegen denselben sehr viele kleine Kinder unter einem Jahre.

Der Darmkanal ist viel seltener bei der Erkrankung theilhaftig als die Respirationsorgane, doch kommen auch Diarrhöen, zuweilen sehr perniciöser Art, vor. Das unspezifische System erkrankt im Gegensatz zu Scharlach, wo Nephritis und Albuminurie zu den häufigsten Complicationen gehören, nur ganz ausnahmsweise. Bei Mädchen kommt zuweilen Diphtheritis der Vagina, die gewöhnlich mit Gangrän der Labier und Tod endigt, vor.

3) Charakter des Fiebers.

Man nimmt ebenso wie beim Scharlach 1) einen erythematösen, 2) einen synochalen, 3) einen torpiden und 4) einen septischen Charakter der Masern an, welcher sowohl in ganzen Epidemien, als auch bei einzelnen Constitutionen sich geltend machen kann. Es gilt hier alles, was beim Scharlach schon angegeben wurde.

Der gewöhnliche Charakter ist der erythematöse, wie er unter „A. Normale Morbillen“ geschildert werden ist. Kein Symptom gehört zu einer gefährlichen Höhe, das Exanthem kommt und verschwindet zu rechter Zeit, ist von mässiger Intensität, die Schleimhauterkrankungen, das Fieber und die Gehirnsymptome halten sich in den gehörigen Schranken, und es treten keine Nachkrankheiten auf.

Wenn die Gefässreaktion sehr bedeutend wird, so nimmt man den synochalen, entzündlichen Charakter an. Er kündigt sich meist schon durch ein stürmisches Vorlaufstadium an. Die entzündlichen Affektionen der Schleimhäute sind sehr heftig, die Haut wird brennend heiss und der ganze Körper ist alsbald mit dunkelrothen, prominenten Flecken übersät. Die Gehirnsymptome sind hierbei sehr bedrohlich, wilde Delirien wechseln mit tiefem, soporösem Schlaf ab. Das stark entwickelte Exanthem steht meist länger als vier Tage und ist am fünften und sechsten Tage noch deutlich zu erkennen. Die Abschuppung ist der vorübergehenden starken Hautentgeßung entsprechend ziemlich beträchtlich. Nachkrankheiten werden häufig beobachtet.

In bösartigen Epidemien und bei dyskrasischen, besonders scrophulösen Kindern ist der torpide Charakter des Fiebers der vorherrschende. Es zieht sich hierbei schon das Prodromalstadium unter bedenkliehen Symptomen in die Länge und von Anfang an fällt eine ausserordentlich schnelle Kräfteabnahme besonders auf. Die Kinder klagen über Schwindel und Gliederschmerzen, haben fortwährende Angst, Unruhe und Schlaflosigkeit. Der Puls ist sehr weicher, aber klein und leicht zu unterdrücken. Erbrechen, profuse Diarrhöen, krapulöse Hostenanfälle lassen schon vor Ausbruch des Exanthemes eine ungünstige Prognose stellen.

Das Exanthem selbst erscheint bei dieser Form nur selten zur rechten Zeit und gehörig entwickelt, es verschwindet bald wieder, zeigt sich nur an einzelnen Körperstellen und erreicht nicht die gewöhnliche, hochrothe Farbe.

Die Schleimhäute neigen sehr zur diphtheritischen Entzündung. Profuse Diarrhöen, maligne Bronchitis, Krup oder einfache Entkräftung ohne nachweisbare örtliche Veränderungen machen dem Leben nur zu oft ein Ende.

Die höchste Entwicklung dieses Charakters nun ist der septische oder putride. Das Exanthem tritt hier ebenfalls unregelmäßig auf und ist zugleich mit Eosynymen complicirt. Unter den Gehirnsymptomen sind Coma und Ohnmachten die vorwiegenden. Die diphtheritischen Schleimhäute neigen schnell zur Gangrän, die sich bei Mädchen bald auf die Vulva erstreckt. Profuse Nasen- und Darmblutungen können in kürzester Zeit einen hohen Grad von Anämie, einen scorbutischen Zustand herbeiführen.

Nicht immer muss dieser torpide oder putride Charakter von Anfang an zugegen sein. Es kommt auch vor, dass Masern, welche meist synochal aufraten, im Verlaufe von einigen Tagen ihren Charakter total zum torpiden umändern, weshalb auch diese Trennung a verschiedene Formen weniger einen streng wissenschaftlichen als vielmehr praktischen, therapeutischen Werth hat.

4) Nachkrankheiten.

Die häufigste und zugleich böartigste Nachkrankheit der Masern ist die Tuberculosis. Sie entwickelt sich zuweilen sehr rasch und intensiv als miliare Tuberculose, so dass die Kinder gar nicht mehr dem Bett zu verlassen, sondern unmittelbar nach dem Verschwinden des Exanthemes fest und fest fiebern, husten und abmagern. Gewöhnlich aber wird ein längeres Intervall zwischen dem Exanthem und dem Eintritt der tuberculösen Symptome beobachtet. Die Kinder stehen wieder auf, sind fieberfrei und bei gutem Appetit, und die überstandene Krankheit ist längst vergessen. Ein leichter Bronchialecatarrh jedoch ist zurückgeblieben und lässt sich durch die sorgsamste Pflege, gleichmäßige Temperatur und die verschiedenen Expectorantien nicht beseitigen. Ganz allmählig stellen sich abendlich Exacerbationen, dann allgemeines Unwohlsein, Traurigkeit und Abnahme der Kräfte ein, wobei der Husten immer stärker und häufiger wird. Die Abmagerung wird nun von Tag zu Tag deutlicher, die tuberculösen Erscheinungen lassen sich bald auch physikalisch nachweisen und nehmen in den meisten Fällen bis zum Tode zu. Nur ausnahmsweise können sie zum Stillstand und zur Rückbildung gebracht werden, worauf die Kinder noch Jahre lang eine Neigung zu Bronchitis behalten, und oft genug auch neue tuberculöse Insulte erfahren. Die ausführlichere Schilderung der hierher gehörigen Symptome findet sich bei der Lungentuberculose pag. 266.

Eine andere Nachkrankheit, auch meistens complicirt mit Tuberculosis, ist Otorrhoe, welche der adstringirenden Behandlung oft viele Monate widersteht. Sehr gewöhnlich auch sind Impetigo und Eczem im Gesicht, am behaarten Theile des Kopfes und namentlich hinter der Ohrmuschel. Chronische Augenentzündung, vorwiegend Blepharitis, bleibt bei scrophulösen Kindern Jahre lang zurück.

Die Diphtheritis verursacht zuweilen noch sehr spät eine chronische

Heiserkeit oder einen Krup, welcher im Allgemeinen eine etwas günstigere Prognose löset als der rein fibrinöse Krup.

Darnieaturrhe kommen ebenfalls vor, werden aber selten colligativ und lassen sich durch Diät und passende Adstringentien schnell beseitigen.

Bei schlecht gepflegten, dyskrasischen Kindern stellt sich zuweilen auch Noma ein.

Die übrigen als Nachkrankheiten aufgeführten Veränderungen, Hydrothorax, Ascites, Pericarditis, Meningitis etc. treten so selten ein, dass man in Zweifel geräth, ob man ihnen einen direkten Zusammenhang mit den Masern zugestehen soll.

Bei den Sectionen findet man lebuläre oder lobäre Pneumonie, Diphtheritis der Mundhöhle und ihre Folgen, Darmcatarrh, Gangrän der Vulva etc., aber weder im Blute noch in irgend einem Organe eine Veränderung, welche über das Wesen der Masern näheren Aufschluss geben könnte.

Diagnose.

Die Masern können mit exanthematischem Typhus, Erythem und Scharlach verwechselt werden. Der exanthematische Typhus, wie er namentlich in den russischen Ostseeprovinzen, Polen und Ostpreussen die herrschende Form ist, löset sich, was das Exanthem selbst betrifft, in vielen Fällen von den Masern nicht unterscheiden. Der Verlauf der typhösen Roseola aber und die Zeit ihres Eintretens sind viel variabler. Man sieht in ein und derselben Fleckfeberepidemie bei dem einen Kranken das Exanthem neun Tage, bei dem andern wieder nur zwei Tage lang bestehen und löset am dritten, bald am sechsten Tage aufzutreten. Im Gesicht findet sich die typhöse Roseola sehr selten, die morbillöse regelmäßig. Der eminent typische Verlauf, die charakteristischen Symptome der Catarrhe und des Fiebers sichern hinlänglich vor jeder Verwechslung.

Sehr viele Neugeborene und ältere Säuglinge bekommen ein fein punktirtes Erythem über den ganzen Körper, das der Form des Ausschlages nach sich durchaus nicht von den Masern unterscheidet. Dasselbe rührt höchst wahrscheinlich von mechanischen Ursachen her, indem die junge, zarte Lederhaut gegen den Reiz der atmosphärischen Luft der Bäder und Kleidungsstücke noch nicht gehörig abgestumpft ist und die Hautpapillen sich entzünden und vergrößern. Dieses Exanthem besteht meist mehrere Tage, verschwindet, kehrt zuweilen wieder, ist aber gewöhnlich nicht mit catarrhalischen Symptomen complicirt. Sind diese zufälliger Weise auch zugegen, so verläuft der ganze Process doch nicht so typisch und wird nicht von so heftigem Fieber eingeleitet, als die Masern. Ausserdem kommt das Erythem der Neugeborenen ohne alle Contagion vor, und für die Annahme desselben spricht auch namentlich, dass Neugeborene sehr wenig empfänglich für das Maserncontagium sind und gewöhnlich verschont bleiben, wenn auch wirklich grössere Kinder in demselben Haufe davon infectirt worden sind.

Die Unterscheidung zwischen Masern und Scharlach bietet zuweilen ziemlich Schwierigkeiten, zumal wenn beide Exantheme zu gleicher Zeit in einer Stadt vorkommen. Es wird deshalb nützlich sein, wenn

die Hauptsymptome und Unterscheidungsmerkmale beider Krankheiten mehrmals neben einander aufgezählt werden.

Differentialdiagnose.

Masern.

Das Vorläuferstadium dauert 3—4 Tage.

Als Prodromalsymptome sind die constantesten: Conjunctivitis, Lichtscheu, Nasen- und Bronchialcatarrh, Niesen, Schnupfen, Heiserkeit, Husten. Pulsfrequenz und Hauttemperatur nur mässig erhöht.

Das Exanthem besteht in kleinen, rothen, rundlichen Flecken, welche schwach über die Haut erhaben sind und nur an wenigen Stellen zu grösseren ungleich erhabenen Flecken confluiren. Es bricht zuerst im Gesichte aus.

Mit dem Ausbruch des Exanthemes schwinden die bedenklichen allgemeinen Symptome.

Das Masernexanthem steht im Allgemeinen etwas länger als das des Scharlachs. Es ist am vierten Tage ganz deutlich, am fünften und sechsten oft noch schwach zu sehen.

Abschuppung in feinem, weissen Pulver.

Nachkrankheiten: Tuberculosis, Bronchitis, Augenentzündungen, Eczem, Krup und Pneumonie.

Trotz dieser differentiellen Anhaltspunkte bleibt die Diagnose bei manchen Fällen zweifelhaft, weshalb denn auch die freilich nicht sagenden Namen: *Scarlatina morbillosa* und *Morbilli scarlatinosi* geschaffen worden sind.

Die Prognose wird, wie beim Scharlach meist zu schlecht, bei den Masern zu günstig gestellt, indem man die nur scheinbar genesenen Kranken alle für wirklich geheilt hält. Die Tuberculosis jedoch, welche sich nach den Morbellen sehr häufig und unaufhaltsam entwickelt, rafft noch viele derselben weg, so dass, wenn man die Beobachtungen lange genug fortsetzen kann, das Mortalitätsverhältniss kein gar so günstiges mehr ist.

Während der Blüthe des Exanthemes oder unmittelbar nach der Desquamation sterben allerdings nur sehr wenig Kinder, besonders wenn sie das erste Lebensjahr schon zurückgelegt haben, hingegen befällt die nachfolgende Tuberculosis innerhalb einiger Procente von Kindern aller Altersklassen.

Scharlach.

Schon am 2.—3. Tage Ausbruch des Exanthemes.

Die catarrhalischen Symptome fehlen hier fast gänzlich. Hingegen sind deutliche Schlundbeschwerden, beruhend auf Rötzung und Schwellung der Mandeln, zugegen. Das Fieber ist schon vor Ausbruch des Exanthemes sehr heftig.

Das Exanthem überzieht meist den ganzen Körper oder stellt mindestens grosse platte, unregelmässige Flecken dar. Es ist am stärksten an den von Kleidern bedeckten Hautstellen. Es beginnt am Halse und verbreitet gewöhnlich das Gesicht.

Fieber und Angina dauern ungeschwächt während der Blüthe fort.

Das Scharlachexanthem ist in der Regel am vierten Tage vollkommen verschwunden.

Abschuppung in grossen Lappen.

Nachkrankheiten: Nephritis, Hydrops, Parotitis, Otorrhoe.

Ätiologie.

Die Masern sind eminent ansteckend, so dass bei uns in den Städten wenigstens fast alle Menschen, welche noch nicht durchgemacht sind, davon ergriffen werden. Das Contagium ist sehr flüchtig, und es bedarf nur Ansteckung durchaus keiner directen Berührung mit Masernkranken. Die Uebertragbarkeit durch dritte Personen lässt sich zuweilen klar nachweisen.

Die Impfversuche mit dem Blute Masernkranker, deren Exanthem sich in der Blüthe befindet, sollen meistens anschlagen und am 7—10 Tage normale ziemlich gutartige Masern erzeugen. Da der Process hierdurch nicht localisirt wird und der Verlauf ungefähr derselbe ist, als wenn die Kinder zufällig angesteckt worden wären, so haben diese Inoculationen natürlich gar keinen praktischen Werth.

Das Maserncontagium verhält sich gegen andere Infectionen nicht exclusiv. So sah man namentlich schon Varicellen-, Blattern- und Intermitterakranke davon befallen werden. Wenn Krätze kranke Morbillen bekommen, so heilt die Krätze gewöhnlich spontan und auffallend schnell, was seinen Grund vielleicht darin hat, dass die Krätze milde durch das Contagium oder die materiellen Veränderungen der Cutis zu Grunde geht.

Auffallend ist schliesslich noch der Zusammenhang der Masern mit dem Keuchhusten. Man bemerkt, dass das eine Contagium gewöhnlich das andere ablöse, namentlich folgt der Keuchhusten oft auf die Masern, so dass man eine gewisse Verwandtschaft beider Prozesse annehmen darf.

Behandlung.

Wir haben keine prophylaktischen Medicamente gegen das Maserncontagium, alle bisher angegebenen haben nicht Stoch gehalten. Die Impfung ist, wie schon erwähnt worden, unpraktisch, indem man mit vieler Mühe dasselbe erreicht, was die Kinder gewöhnlich von selbst acquiriren, nämlich einen vollkommenen Masernprocess. Die Absperrung von Masernkranken und allen mit ihnen zusammenkommenden Personen ist das einzig sichere Mittel, eine Infection zu verhüten. Dasselbe gelingt aber während des Herrschens einer wirklichen Epidemie nur durch Ortswechsel sicher und ist hauptsächlich angezeigt bei ausgesprochen tuberculösen Kindern, bei welchen die Masern regelmässig eine rasche Zunahme der Dyskrasie verursachen.

Die einfachen regelmässig verlaufenden Masern erfordern lediglich eine expectative Behandlung. Eingreifende Mittel, wie Blutentziehungen, Tartarus stibius oder Laxantien, stören in vielen Fällen den regelmässigen Verlauf, ohne die gefährdenden Symptome, wegen deren sie in Anwendung kommen, zu beseitigen.

Der beste Schutz gegen einen unregelmässigen Verlauf und gegen Nachkrankheiten ist eine gleichmässige ziemlich hohe Zimmertemperatur, 15° R. = lange die Kranken im Bett sind, 16° R. wenn sie aufstehen sollen. So lange eine Spur von Exanthem zu sehen ist, darf das Bett nicht verlassen werden, und nach vollständigem Verschwinden desselben muss wenigstens noch 14 Tage, bei ungünstiger Jahreszeit noch länger, das Zimmer gelüftet werden.

Schwere Federbetten, in welche nach der alten Mode die Kinder bis an das Kinn sich stecken müssen, verursachen eine zu starke Transpiration, auf welche nur um so sicherer Erkältung eintritt. Rosshaar-matratzen und einfache wollene Decken sind dem Zwecke entsprechenden. Sehr wesentlich ist eine gründliche Ventilation des Krankenzimmers, die am besten gelingt, wenn der Kranke zwei nebeneinander liegende Zimmer benutzen kann.

Reinlich gewaschene Kinder empfinden es sehr unlieb, wenn ihnen mehrere Tage lang das Gesicht und die Hände nicht gewaschen werden, wie das noch von vielen älteren Aerzten verlangt wird. Allen Masernkranken, die ich bisher zu behandeln hatte, wurden täglich zweimal das Gesicht und die Hände mit lauwarmem Wasser gewaschen, ohne dass jemals von dieser Prozedur schlimme Folgen beobachtet worden wären. Es ist demnach die unnütze Quälerei der Entziehung des Waschwassers gänzlich zu verwerfen.

Die Diät muss streng antifebril sein, so lange noch Spuren von Fieber sich zeigen. Bei erwachendem Appetite die Kinder fasten zu lassen, ist grausam und verzögert nur die Convalescenz. An Mägen nicht verdaulichen Nahrungsmitteln, wie Milch, Suppe und trockenem Weizenbrot essen sich die Kinder niemals krank. Bei Neigung zu Diarrhöe reicht man stopfende, bei Obstruction leicht eröffnende Nahrungsmittel und Getränke.

Die Behandlung der unregelmässigen Masern, der Complicationen und Nachkrankheiten ist eine problematische, indem man fast von allen hier empfohlenen Mitteln keine recht entschiedene Wirkung beobachtet.

Die Masern mit deutlich exocalem, entzündlichem Charakter vertragen 1,0—3,0 Salpeter gut, bei ganz robusten, grösseren Kindern werden heftigste Kopfsymptome auch ganz passend durch einige Blutegel gemildert. Bei der torpiden, der nervösen Form sind Mineral-säuren, China und Wein indicirt. Heftiger Hustenreiz wird durch Narzotica, Belladonna, Bittermandelwasser oder Opium beruhigt. Schwere Gehirnsymptome erfordern kalte Begiessungen des kahlgeschorenen Kopfes. Zu rasch verschwindendes Exanthem oder eine Verzögerung des Ausbruches muss mit Hautreizen, am besten mit mehrfachen Seif-tigen behandelt werden. Auch Clystiere mit verdünntem Essig sind zu diesem Zwecke empfohlen worden.

Starke Diarrhöen müssen in allen Fällen durch Opium und Ad-stringentien beseitigt werden, schwache Diarrhöen üben bei sonst gut genährten Kindern einen günstigen Einfluss auf die Gehirnsymptome aus.

Die diphtheritischen Schleimhautaffectionen lassen sich auf innerliche Behandlung mit grösseren Gaben chloressauren Kalk's, mindestens 3,0—4,0 pro die. Dass die örtliche Behandlung mit Hollemböen ganz erfolglos ist, wurde schon bei der Diphtheritis im Allgemeinen pag. 85 ausführlicher besprochen. Gegen wirkliche Sepsis, profuse Schleimhaut-Blutungen, gangränöse Diphtheritis, Eczymosen der Cutis, muss man ein möglichst robordes Verfahren mit grossen Dosen alten Weines, China, Moschus und Naphten einleiten. Ausserlich hat man Waschungen mit Chlorwasser empfohlen. Ich kann jedoch nicht verkennen, dass auch diese Behandlungsmethode in wirklich septischen Fällen noch immer im Stiche gelassen hat.

Die nach Morbellen sich entwickelnde Tuberculosis Meist verhältnissmässig öfter wieder stille stehen, als die ganz spontan entstehende. Einen günstigen Einfluss auf diesen Verlauf haben grössere Dosen Chinin, wovon man einen Tag um den andern 0,15—0,30 auf einmal gibt. Ein Jahr lang fortgesetzter Gebrauch des Leberthrans kräftigt die Ernährung und bewahrt auch vielleicht den Organismus vor neuen tuberculösen Insulten. Landluft, Seebäder und eine vernünftige Abhärtung sind die besten Prophylactica gegen Fortschritte tuberculöser Erkrankungen.

3) Röttheln. Rubellae.

Aetiologie und Symptome.

Es gibt kaum eine Krankheit, über welche die Ansichten der Autoren so weit auseinandergehen als über die Röttheln. Die Einen halten sie für einen modificirten Scharlach, die Andern für Masern, wieder Andere für eine Mischform beider. Ueberdies wurden fieberloses Erythema, Urticaria, selbst Typhus- und Erysipelas exanthem als Rubella beschrieben, und die Verwirrung wurde endlich so heillos, dass die neueren Autoren kurzen Process machten, die ganze Krankheit langwierig und allenfalls dunkle Fälle irgend einer der obengenannten Anschlagsformen zuzählen.

Zu dieser letzteren Ansicht bekannte ich mich auch, bis ich im Frühjahr 1865 eines Beseren belehrt wurde. Zu jener Zeit kamen von Mitte März bis Mitte Mai 47 Personen, Kinder von $\frac{1}{2}$ —8 Jahren und drei Erwachsene in meine Behandlung, welche ohne deutliche Vorboten an einem acuten Exanthem litten, das sich in keiner Weise von Masern unterschied. Fünf weitere Fälle bekam mein Freund Lindwurm zur selben Zeit zu behandeln und einige Münchner Aerzte erriethen sich auf mein nachträgliches Befragen, zur gleichen Zeit eine eigenenthümliche Form einer fieberhaften Urticaria mit massenhaftigem Exanthem gesehen zu haben. Weder vor- noch nachher ist mir dieser Ausschlag wieder zu Gesicht gekommen, auch ging keine Masern- oder Scharlachepidemie kurz voraus, noch folgten solche nach. Derselbe Process wird von Köstlin in Stuttgart folgender Massen geschildert: Im Winter 1860/61 herrschte eine ausgedehnte Rötthelnepidemie in der Dauer von 5—6 Monaten durch ganz Stuttgart. Das Exanthem war nicht glatt, sondern leicht papulös mit einem Stich in's Gelbliche, liess nicht zusammen, sondern bildete kürzere oder längere, öfters gestreckte, selten gerade Streifen, meistens über die ganze Oberfläche des Körpers; nicht selten war das Exanthem von Hautjucken begleitet und verschwand in der Regel nach zwei bis drei Tagen, bisweilen noch schneller. Meist erschien und verlief dasselbe ohne jedwede catarrhalische Symptome, auch das Fieber fehlte oder war kaum ausgeprägt; dagegen zeigte das Exanthem grosse Ansteckungsfähigkeit, durchwachte ganze Familien, und einige Kinder wurden in derselben Epidemie zweimal befallen. Dasselbe Exanthem trat gleichzeitig an verschiedenen anderen Orten Württembergs auf. —

In neuester Zeit wurden 23 weitere Fälle von exquisiter Rubella in einer unter Thomas Leitung von O. Oesterreich verfassten Leipziger Dissertation, sowie auch jene fünf Fälle von Lindwurm und

eine eigene Beobachtung von dessen Assistenten Arnold im layr. Intelligenzblatt veröffentlicht. Endlich beschrieb Mettenheimer in Schwerin eine Rötthelpepidemie im Sommer 1869, welche der Schilderung nach genau zu den schon angeführten passt, und von dem Bericht-erstatler als Rubéolae bezeichnet wird.

Die von mir beobachteten Symptome lassen sich kurz fassen. Das Exanthem unterschied sich Anfangs in nichts von dem der Muehillen. Hautkorn- bis Linsen-grosse rötliche Flecke bedecken den ganzen Körper und verursachen meist beträchtliches Jucken. Diese Flecke stehen an manchen Stellen so dicht, dass sie schliesslich confluiren und unregelmässige Figuren bilden. Sie erheben sich auch etwas über das Niveau der übrigen normalen Haut und löten, wenn man sanft mit dem Finger darüber streicht, das Gefühl einer ungleichen Härte. Weit verschieden aber von dem Masern verhält sich dieses Exanthem bezüglich der Dauer. Es schwindet nämlich schon nach einem, längstens nach zwei Tagen vollkommen, und die darauf folgende Abschuppung ist sehr unbedeutend, kaum merklich. Das gleiche gilt von den catarrhalischen Symptomen. Wenn auch bei stark entwickeltem Exanthem im Gesicht die Lider schwellen und die Conjunctiva etwas injicirt ist, so fehlt doch zusehendes der Bronchialcatarrh, welcher hingegen bei Morbillen ein charakteristisches nie ausbleibendes Symptom ist. Ein Verlaufsstadium war in meinen Fällen kaum zu bemerken und die deutlichen Fiebererscheinungen am ersten Tage verschwinden mit dem abkühl. erfolgenden Erlöschen des Exanthems so vollständig, dass die Kinder am dritten Tage nicht mehr im Bett zu halten sind und ohne jegliche Nachkrankheit sogleich complet genesen.

Behandlung.

Mit einer rein expectativen Behandlung reicht man vollkommen aus. Innerlich verdünnte Säuren, äusserlich kalte Waschungen gegen das lästige Jucken war der ganze Heilapparat, der gegen dieses unschuldige aber acuten fieberhaften Exanthem in Anwendung kam.

4) Variola, die Blattern, Pocken.

Die achten Menschenblattern sind das ausgebildete aller neuen Exantheme, kommen aber jetzt durch den in fast allen civilisirten Ländern eingeführten Impfweg seltener vor und wurden von den heftigeren Formen, der Variolae, auch Variola modificata genannt, und von den Variellen mit der Zeit vielleicht ganz verdrängt werden.

Man versteht unter Variola einen fieberhaften, contagiosen, typisch verlaufenden Pustelausschlag, der sich in mehrere Perioden theilen lässt.

Symptome.

Wir unterscheiden drei deutliche Stadien: 1) Das Stadium der Incubation und der Vorläufer, 2) das des blühenden Exanthems und 3) das der Abkockung.

1) Stadium incubationis et prodromorum.

Die Zeit von der Aufnahme des Contagiums bis zum Ausbruch des Exanthems schwankt zwischen 8—14 Tagen. Die ersten Tage

Dieses Zeitraumes gehen gewöhnlich alle Symptome vorüber, nur in den letzten drei Tagen vor dem Ausbruche werden mehr und mehr pathologische Erscheinungen beobachtet. Indem ich den Verlauf der Blattern bei Erwachsenen als bekannt voraussetze, kann ich mich darauf beschränken, die Verläufe, welche bei kleinen Kindern unter einem Jahre vorkommen, zu skizziren. Da bei geimpften Kindern echte Variola nicht leicht vorkommt und bei uns gewöhnlich vor heftigstem ersten Lebensjahre geimpft wird, so bekommt man nur mehr bei kleinen Kindern diese Form zu sehen.

Man bemerkt an denselben, nachdem sie vorher einige Tage mit reinem oder auch modificirtem Blatterngütle inficirt worden sind, theils gastrische Symptome, Appetitlosigkeit, belegte Zunge, Erbrechen und Obstipation, theils Symptome von Aufregung des Gefäß- und Nervensystems, als heiße Haut, frequenten Puls, große Unruhe abwechselnd mit Schlafsucht, Aufschreien und Aufschrecken im Schlafe, Krämpfe mit den Zähnen, Convulsionen zwischen Ohnmachten und raschen Collapsen. Diese sämtlichen Symptome, welche durchaus nichts charakteristisches haben, — denn das bei Erwachsenen so bezeichnende, subjective Gefühl von Rücken- und Lendenschmerz kann bei Mangel der Sprache nicht geäußert werden — steigern sich am drei Tage hindurch mit abendlichen Exacerbationen, bis schließlich das Exanthem ausbricht.

2) Stadium eruptionis et florentissimae.

Die ersten Spuren des Anschlages sieht man im Gesichte, von wo aus sich derselbe auf den Rumpf und die oberen Extremitäten und zuletzt auf die unteren verbreitet. In 24—48 Stunden ist die Eruption vollendet.

Die Blatternapostel entsteht in der Weise, dass zuerst ein rather etwas erhabener Fleck auf der Haut sich bildet, der in keiner Weise von Masernexanthem zu unterscheiden ist. Im Centrum dieses rothen Fleckes entwickelt sich ein kleines hartes Knötchen und auf demselben ein noch kleineres Bläschen, welches sich aber rasch vergrößert, am zweiten Tage die Größe eines Stecknadelkopfes, am dritten die einer Linse annimmt und schließlich die ganze ursprünglich rothe Stelle in eine pralle Blase von der Größe einer halben Erbse und einer centralen Delle umwandelt.

Nicht alle ursprünglich rothen Flecken gehen diese Metamorphose ein, ein großer Theil derselben kommt nicht zur Bläschenbildung, sondern verschwindet nach einigen Tagen spurlos, was am häufigsten an den unteren Extremitäten vorkommt. An den Füßen ist die Eruption überhaupt immer am schwächsten.

Der Verlauf der Blattern ist, was Form und Dauer des Exanthems betrifft, bei Kindern genau derselbe wie bei Erwachsenen.

Wenn das Exanthem nicht gar zu ausgedehnt über den ganzen Körper aufgetreten ist, so lassen nach seinem Ausbruche die allgemeinen Symptome beäussend nach. Die große Unruhe und die Delirien verschwinden, der Puls wird weicher und langsamer, das Athmen regelmäßiger, der spezifische Varioligeruch aber ist nach dem Ausbruche deutlicher als vorher. Nur bei starker Eruption auf den Schleimhäuten der Augen, der Nase, des Mundes etc. wird keine Min-

berung der Aufregung bemerkt, indem die grossen, hierdurch veranlassten Schmerzen die Kinder nicht zur Ruhe kommen lassen.

Am 6. Tage nach der Eruption oder am 10. des Beginnes der Krankheit stellt sich auch bei den Kindern die *Febris secundaria*, das Eiterungsfieber, ein. Der Entzündungshef auf die Pocken vergrössert sich, das Gesicht schwillt bis zur Unkenntlichkeit an, die Haut wird wieder heiss und es beginnt ein so unerträgliches Hautjucken, dass die Patienten trotz aller Vorkehrungen die Pusteln, die sie mit den Nägeln erreichen können, aufkratzen. So kommt es endlich zum

3) Stadium. Stadium exsiccationis.

Dasselbe beginnt nicht am ganzen Körper zu gleicher Zeit, sondern die Pusteln platzen und vertrocknen in derselben Reihenfolge, in der sie entstanden sind, zuerst die im Gesichte, dann am Hals, an den Handgelenken, am Rumpfe und endlich an den unteren Extremitäten. Jede Pustel vertrocknet ziemlich genau am 9. Tage nach ihrer Entsehung, so dass also, die 2—3 Tage Prodromalstadium eingerechnet, am 11.—12. Tage der Krankheit sämtliche Pusteln die Abtrocknung begonnen haben. Zum spontanen Bersten oder zur einfachen Enttrocknung ohne Bersten kommt es bei Kindern fast niemals, indem sie nicht widerstehen können, das enorme Jucken durch Kratzen und Reiben zu mildern.

So bilden sich nun über den ganzen Körper, besonders aber im Gesichte, braune, dicke Krusten, welche, in Ruhe gelassen, nach drei bis fünf Tagen abfallen und eine mit Epidermis bedeckte Narbe zurücklassen, von den Kindern aber häufig vor der Zeit abgekratzt und durch neue dickere ersetzt werden. Die Plattenarben haben bei den Kindern dieselbe Beschaffenheit wie bei den Erwachsenen, nur ist die Cutis der Kinder noch bedeutend dünner, die Zerstörung deshalb leichter und es gleichen sich mit den Jahren auch Unebenheiten, die Anfangs sehr beträchtlich schienen, mehr und mehr an.

Die Pocken der Mundhöhle werden in diesem Zeitraume zu flachen Geschwüren und verursachen eine vermehrte Schleim- und Speichelsecretion. Mit der Abtrocknung schwindet die *Febris secundaria*, der Appetit stellt sich wieder ein und die Genesung schreitet rasch vorwärts. Zuweilen stossen sich die Nägel an den Fingern und Zehen ab.

Die Prognose ist bei Kindern unter einem Jahre ausserordentlich ungünstig, gegen 60 Procent erliegen.

Die Hauptgefahr für kleinere Kinder bringt 1) ein stürmisches Vorläuferstadium, wo tiefer Sopor oder Comabien den Leben bedrohen und 2) die *Febris secundaria*, welche einen typhösen, septischen Charakter annehmen kann.

Die quantitativen und qualitativen Verschiedenheiten sind bei Kindern dieselben als bei Erwachsenen. Auch hier haben wir *Variolae discretas, cohaerentes, corymbosae, und confluentes*, in qualitativer Beziehung *Variolae crystallinae, silliquosae, depresso, crustace, gangrenosae etc.*

Die häufigsten Complicationen sind: Laryngitis, Pleuritis, Meningitis, Intestinalcatarrh, beträchtliche Augenkrankungen, welche zu *Phthisis bulbi* führen können, Otorrhöen, Gangrän des Hodensackes.

Als die häufigsten Nothkrankheiten sind zu erwähnen: Furunkel, Zellgewebsabscesse, Pyämie, Gelenkentzündungen, Knochenabscessen und, was bei kleinen Kindern am auffallendsten ist, rasch sich entwickelnde Scrophulosis in allen ihren Formen und Localisationen. Die Sterblichkeit in Folge der Blattern ist bei Kindern unter einem Jahre eine sehr grosse, indem kaum 40 Procent genesen.

Aetiologie.

Die Blattern sind eminent ansteckend und zwar durch die Atmosphäre, durch Contact und durch Inoculation, am ansteckendsten während des Suppurations- und Abtrocknungsstadiums. Das wichtigste aber für die Praxis ist, dass nicht bloss echtes Blattern bei Ueingeimpften wieder echte Blattern erzeugen, sondern dass ausserdem auch die Berührung mit Varioloiden und selbst ganz leichten Variocellen bei einem ungeimpften Kinde die echten Monachtblattern verursachen kann.

Behandlung.

Man spricht bei vielen Krankheiten von einer Prophylaxis, bei keiner aber lässt sich dieselbe mit solcher Bestimmtheit angeben und durch eine einfache unschädliche Prozedur ausführen als bei Variola. Es ist dies die Impfung mit der Kuhpockenlymphe, die

Vaccination.

Bei unseren Hausthieren kommen Pustelanschläge vor und besonders kennt man schon seit langer Zeit die Pocken am Euter der Kühe. Ob dieselben immer durch ein Contagium oder auch spontan entstehen, ist noch nicht genügend entschieden, ihr Verlauf ist jedoch genau beobachtet. Canstatt berichtet darüber folgendermassen:

Einige Tage vor dem Ausbruche des Exanthemes fressen die Kühe weniger, geben wenig Milch und haben am Euter eine erhöhte Temperatur. Es zeigen sich hierauf besonders an der Aussentfläche der Euterwarzen kleine, rötliche Knötchen, die sich in gefüllte Pusteln verwandeln und am 4.—7. Tage in voller Reife stehen. Die Pusteln sind perlfarbig, Anfangs mit heller, später eitriger Lymphe gefüllt und von einem rothen Hofe umgeben. Die Berührung des Euters verursacht den Thieren deutliche Schmerzen. Am 12.—14. Tage vertrocknen die Pusteln.

Dass die Knechte und Mägde, welche solche Thiere zu pflegen haben, angesteckt werden können, wusste man schon vor mehr als hundert Jahren, nach war schon öfter aufgefallen, dass diese Leute von den echten Blattern verschont blieben. Eine genaue Prüfung und experimentelle Constatairung dieser Thatsache wurde aber erst von Jenner geliefert, welcher am 14. Mai 1796 zum ersten Male ein achtjähriges Kind mit Stoff von den Händen eines Melkers impfte. Nach regelmässigem Verlauf der Kuhpocke wurde bei diesem Kinde am folgenden 1. Juli die Gegenprobe gemacht, indem man ihm echtes Blatterngift einimpfte. Das Kind blieb unversehrt. Dieser Versuch wurde am oft wiederholt und im Jahre 1799 errichtete man in London schon die erste öffentliche Impfstalt. Von nun an verbreitete sich diese heilsame Massregel bald über die ganze civilisirte Erde, und es

geht jetzt fast kein Land mehr, wo die Vaccination im ersten Lebensjahre nicht gesetzlich vorgeschrieben wäre.

Die Vaccination wird am besten in folgender Weise vorgenommen: Man verschafft sich vor allem ein vollkommen normales, gut entwickeltes, an keinerlei Ausschlag leidendes Kind, das acht Tage vorher geimpft worden ist und mehrere legitime Impfpusteln an jedem Arme zeigt. Man sticht nun mit schräg gehaltener Impfzindel eine Pustel mehrmals so sticht an, dass nur reine, nicht mit Blut gemischte Lymphe austritt, was in grösseren Tropfen erst nach 1—2 Minuten geschieht, indem die Vaccinepusteln bekanntlich nicht einfach blutig, sondern gefächert sind. Die wohl abgetrocknete Impfzindel wird alsdann in diese Lymphe getaucht, so dass sie auf der Vor- und Rückseite damit benetzt ist. Man fasst hierauf den Oberarm des zu impfenden Kindes so unter der Achsel, dass man sich die äussere Fläche desselben gehörig spannt und sticht nun im oberen Drittheil 4—6 Mal die Nadel wieder ein. Die Stiche dürfen nicht sogleich bluten und am sichersten gelingt die Impfung, wenn man nach denselben nur einen kleinen rothen Tropfen bemerken kann. Die Stiche müssen wenigstens 1 Ctm. von einander entfernt sein, weil sonst die sich entwickelnden Pusteln confluiren.

Man impft am besten in den Sommermonaten, weil man im Winter eine langsamere Entwicklung der Pusteln beobachtet. Das beste Alter ist zwischen drei und zwölf Monaten. Bei herrschenden Blatternepidemien ist es jedoch rathsam, schon wenige Tage nach der Geburt die Impfung vorzunehmen. Die zu impfenden Kinder müssen vollkommen gesund und nicht gerade in einer Zahnperiode (vide pag. 11) begriffen sein.

Eine besondere Behandlung der Geimpften ist nicht nöthig. Sie können vor wie nach gehadet werden, und um Reibung zu vermeiden, thut man gut, vom 4.—10. Tage den Arm mit einer feinen Leinwandbinde einzwickeln, wodurch das Erythem der Umgebung am sichersten auf einem mässigen Grade erhalten bleibt.

Die Uebertragung der Deskrezen durch Vaccination von einem Kinde auf das andere ist nur bezüglich der Syphilis erwiesen. Scrophulis und Rachitis können nicht mitgeimpft werden; da im Publikum jedoch häufig nicht die gehörige Einsicht hierin herrscht, so nimmt man, um alle späteren Vorwürfe abzuschneiden, am besten nur ganz wohlgebildete Kinder ohne allen Anschlag zur Animpfung.

Die Vorsicht gebietet, immer Impfstoff vorräthig zu haben, damit bei Ausbruch einer Blatternepidemie derselbe nicht erst gesucht und verschrieben werden muss. Er wird ohne alle Mühe und Schwierigkeit auf folgende Weise gesammelt: Man sticht eine oder einige gut entwickelte, acht Tage alte Impfpusteln eines gesunden Kindes mehrfach an, wartet ein paar Minuten, bis die angetretenen Tropfen gehörig gross geworden sind und hält nun ein gewöhnliches gläsernes Capillarrohrchen mit seiner Mündung in schräger Richtung an den Tropfen. Das Capillarrohrchen muss deshalb schräg, flach aufgesetzt werden, damit bei allenfallsigen Bewegungen des Kindes keine Verletzungen stattfinden. Ich erinnere noch einmal ein Kind in Behandlung bekommen zu haben, bei dem während des Anlegens des Glasröhrchens durch ungeschickte Hand dasselbe zerbrach, die Glassplinter in die Pustel eindrangen und ein hässliches Erysipel des ganzen Armes ver-

anzusetzen. Nach den Gesetzen der Capillarität füllt sich das Röhrchen alsbald mit Lymphe, welche man bis zur Länge von 2 Centimeter eindringen lässt. Man zieht nun das Röhrchen zurück, klopft mit der linken Hand ein Paar Mal auf den Rücken der rechten, wodurch bei senkrecht gehaltenem Röhrchen dessen Inhalt noch etwas weiter nach innen dringt und schneidet mit einer Schere die Enden so ab, dass auf jeder Seite das Glas $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Zoll über die Lymphe hinausragt. Die beiden Enden werden nun mit einem Tropfen Siegelack verschlossen und es kann der Impfstoff auf diese Weise Jahre lang in flüssiger Form aufbewahrt werden. In niedriger Kellertemperatur von 8—10° R. behält er seine Wirksamkeit bedeutend länger, als wenn man ihn in unseren Wohnräumen bei circa 15° R. aufbewahrt.

Soll mit einem so conservirten Stoffe eine Impfung vorgenommen werden, so schneidet man mit der Schere die beiden Siegelackknöpfe wieder ab, steckt das Capillarröhrchen in ein etwas weiteres, ebenfalls gläsernes Röhrchen hinein, hält beide Röhrchen mit Daumen und Zeigefinger luftdicht zusammen und lässt von dem Impfstoff direct auf die Nadel. Die Impfung wird hierauf, wie jede geschulichte von Arm zu Arm, vorgenommen.

Die Entwicklung der Vaccinopustel geht in folgender Weise vor sich: Die kleinen Stiche lassen sich als rothe Tupfen noch einige Stunden lang bemerken. Hat gar keine Eruption stattgefunden, so verschwindet hierauf jede Spur des Einstiches, ist anderes jedoch der Fall gewesen, so bleiben braune Punkte sichtbar. Am dritten Tage nach der Impfung richtet sich die Impfstelle stärker und es erhebt sich ein kleines, rundes, körnliches Knötchen, auf dessen Spitze sich bis zum fünften Tage ein perlfarbiges Bläschen entwickelt. Dieses Bläschen wächst nun täglich mehr in die Breite, bekommt eine deutliche Delle, wie die Variolopustel, und ist am achten Tage als bläulichroth durchscheinende Pustel mit rothem Hofe in vollster Blüthe.

Die Pusteln haben einen fächerigen Bau, ihr Inhalt fängt am neunten Tage an trüb zu werden, der rothe Hof vergrössert sich unter zunehmender Härte mehr und mehr, die Achsdrüsen werden empfindlich und es stellen sich allgemeine Symptome ein. Die Kinder werden sehr unruhig, schlafen die Nacht nicht, haben heisse Haut, grossen Durst und sind zu acuten Krankheiten, namentlich Pneumonien und Darmcatarrhen sehr geneigt. Nach zwei bis drei Tagen verschwinden diese Allgemeinerscheinungen wieder. Am elften Tage erbleicht der harte rothe Hof mehr und mehr, die trübe Pustel verliert ihre Delle und spitzt sich etwas zu. Bei gehöriger Schonung platzt sie nicht, sondern trocknet zu einer braunen Kruste ein, welche in zwei bis drei Wochen abfällt und eine weisse, vertiefte, etwas anhebnende Narbe zurücklässt. Wenn sie aufgekratzt wird, so lässt sie einige Stunden und vertrocknet dann ebenfalls zu einer grösseren, unregelmässig contourirten Kruste.

Nicht immer ist der Verlauf der Vaccine so regelmässig und einfach, wie er eben geschildert worden. Das secundäre Fieber wird zuweilen so intensiv, dass Gefährde für das Leben einzutreten scheint. Die Kinder bekommen heftige Convulsionen, collabiren, werden ganz bleich oder überreichen anhaltend zuerst weiss, dann gelben Magen-schleim. Von einem tödtlichen Ausgang, der lediglich durch das

secundäre Fieber bedingt sein sollte, hört man jedoch niemals, und wenn Kinder mit Vaccin pusteln sterben, so findet man bei sorgfältiger Section gewöhnlich noch eine anderweitige Todesursache.

Bei Kindern mit feiner, reicher Haut erkranken andere Hautstellen, es tritt eine Nesselausschlag oder ein varicellenähnlicher Bläschenausschlag am ganzen Körper ein. Scrofulöse Kinder bekommen einen ausgedehnten Pustelausschlag, an welchem namentlich die geimpften Oberarme sich betheiligen, wo dann die Impfpusteln gar nicht heilen, sondern zu scrofulösen Geschwüren sich umwandeln.

Die schlimmste Complication ist eine erysipelatöse Entzündung der Oberarme, welche bei roher Behandlung besonders dyskrasischer Individuen am 9.—12. Tage sich entwickeln kann. Das Erysipel breitet sich über den ganzen Arm, selbst noch über einen Theil des Rumpfes aus, das Fieber ist dabei sehr heftig, die Genesung geht nur langsam von Statten und die Pusteln ulceriren.

Als Anomalien des örtlichen Verlaufes sind eine zu rasche und eine verzögerte Pustelbildung zu erwähnen. Bei schlechtem Impfstoffe, der aus einer mangelhaft entwickelten Pustel stammt, bilden sich schon nach 2—3 Tagen kleine Bläschen, welche, wenig gedellt, kaum die Grösse einer Linse erreichen und nach 6—8 Tagen schon wieder vertrocknen. Eine seltene, der vorigen entgegen gesetzte Anomalie ist, dass die Eruption bedeutend retardirt und die Incubationszeit 8—10 Tage dauert. Bei Vaccination ist mir dasselbe noch niemals begegnet, nur ein einziges Mal bei Revaccination eines 14jährigen Knaben, bei welchem, nachdem die Revaccination längst als erfolglos betrachtet worden war, am sechsten Tage nach der Impfung eine normale Vaccinopustel auftrat und den gewöhnlichen Verlauf nahm.

Als wirkliche Nachkrankheit einer mit allen Cauteilen vorgenommenen Impfung ist nur der plötzliche Ausbruch scrofulöser Affectionen zu erwähnen, wovon die Kinder tuberculöser Eltern oft mit auffällender Schädlichkeit und Vehemenz befallen werden.

Die Frage, auf wie lange Zeit die Vaccination gegen Variola schützt, wurde schon vielfach controvertirt und die hieüber geführten Untersuchungen haben endlich zur allgemeinen Einführung der Revaccination zur Zeit der Pubertät geführt. Mag man nun annehmen, die Vaccination schütze auf Zeilebens oder nur auf 10 oder 20 Jahre, so viel steht jedenfalls fest, dass Kinder, welche ordentliche Vaccinopusteln gehabt haben, vor echter Variola vollkommen geschützt sind. Die Vaccination ist somit als ein grosses Gewinn für die ganze Menschheit zu erachten, weshalb das englische Parlament auch einen Act der Dankbarkeit anstaltete und ihrem Erfinder Jenner eine Nationalpension von 30,000 Pfl. votirte.

Brechen in einer Familie, in welcher sich ein noch nicht geimpftes Kind befindet, die echten oder modificirten Blattern aus, so hat man bei demselben die Impfung so schnell als möglich vorzunehmen, um den Verlauf des gewöhnlich doch ausbrechenden Exanthemes zu mildern. Es verlaufen dann die Vaccine und die Blatternpusteln ungestört neben einander. Man hat jedoch beobachtet, dass, wenn die Vaccine dem allgemeinen Exanthem zuvorkommt, das letztere einen weniger gefährlichen Charakter annimmt.

So viel von der Vaccination. Die Behandlung der einmal aus-

getrockneten Blättern ist ebenso expectativ symptomatisch einzusetzen, als die des Scharlachs und der Masern. Man sorge für gute Ventilation, für eine gleichmässige Temperatur von 14° R. und enthalte sich aller schwächenden Behandlung, namentlich der Blutentziehungen, des Calomels und der Abführmittel überhaupt. Ist Darmcatarrh zugegen, was bei Kindern unter einem Jahre sehr gewöhnlich ist, so kann man denselben in mässigen Grade fortbestehen lassen, weil die Gehirnsymptome dadurch sichtlich gemildert werden, sobald er aber profus zu werden droht, muss er durch kleine Dosen Opium, alle 3–4 Stunden ein Tropfen Tinktur, zum Stillstand gebracht werden.

Mit dem Ausbruche der Pocken stellt sich die Indication ein, die Entwicklung der Pusteln im Gesichte und hiermit die so traurig entstehende Narbenbildung zu verhüten. Die zu diesem Zwecke bisher angegebenen Mittel lassen viel zu wünschen übrig und es entstehen in vielen Fällen trotz aller Behandlung bedeutende Narben. Das sicherste Mittel ist eine frühzeitige Aetzung, die man nach Brotonneau am besten in der Weise ausführt, dass eine goldene, spitze Nadel in eine concentrirte Hollensteinlösung getaucht und hiermit jede junge Pustel möglichst früh angestochen wird.

Am besten am zweiten Tage nach dem Ausbruche, so tritt ein Stillstand in der Entwicklung der Pustel ein, nach einigen Tagen wird die Oberhaut durch eine dünne Kruste emporgehoben und nach Abfall dieser bleibt keine entstellende Narbe zurück.

Diese Aetzung ist jedoch ziemlich schmerzhaft und erfordert bei confluirendem Erythem eine längere Zeit, weshalb man sich darauf beschränkt, die Augen, die Augenlider, den Nasenrücken und die Nasenflügel auf diese Weise zu behandeln, während man die übrigen Theile des Gesichtes, die Stirne, die Wangen und das Kinn mit Quecksilberpflaster bedeckt. Das Quecksilberpflaster muss jeden zweiten Tag gewechselt und sogleich da weggelassen werden, wo sich dennoch vollkommene Pusteln entwickelt haben. Ein Theil der Pusteln geht durch diese Behandlung sicher absterblich zu Grunde, ein anderer kommt nicht zu gehöriger, ausgedehnter Entwicklung und nur sehr wenige hinterlassen bleibende, entstellende Narben.

Ausserdem wurden Waschungen mit Sulfidmagnesium, mit Chlorwasser und Bepinselungen mit Jodtinctur empfohlen. Das allgemeine Verfahren beschränkt sich nach der Eruption auf antiphlogistische Diät, Offenhalten des Stuhles und bei grosser Unruhe auf kleine Dosen Opium.

In der Periode der Eiterung und Abtrocknung wird es dringend nöthig, das Kratzen und vorzeitige Abreissen der Krusten möglichst zu verhüten, zu welchem Zwecke man den Kindern am besten leinene Fingerringe anzieht. Gegen das heftige Hautjucken hat sich Bestreuen der Haut mit Stärkmehl oder Bestreichen mit einem Liniment aus Kalkwasser und Olivenöl als heilsam erwiesen. Die gleichmässige Zimmertemperatur dürfen die Kinder erst verlassen, wenn alle Krusten abgefallen sind und die jungen Narben anfangen weiss zu werden.

Wenn das Fieber den typhösen, septischen Charakter angenommen hat, so müssen die Nervina und roborigenden Mittel in Anwendung kommen, wie solche schon bei der Therapie des Scharlachs ausführlicher besprochen worden sind.

5) Die modificirten Blattern, Variolois, und die Schafblattern. Varicellae.

Schon lange Zeit vor Entdeckung der Vaccination war Aezten und Laien eine leichte Kinderkrankheit, die Variellen oder Schafpocken, bekannt. Von dieser niedrigsten Entwicklungsstufe der Blattern aber bis hinauf zur entwickeltesten Form der confluirenden Variola gibt es eine grosse Reihe von Uebergängen, welche man alle unter dem Namen Variolois, oder modificirte Blattern, Mittelblattern, zusammengefasst hat. Sie als eigene für sich bestehende Exantheme ohne direkten Zusammenhang mit den ächten Pocken anzusehen, geht deshalb nicht wohl an, weil es schon oft vorgekommen ist, dass Nichtgeimpfte von leichten Variocellenkranken die schwersten Formen der Variola bekamen, und umgekehrt, Geimpfte durch Berührung mit ächten Blatterakranken zur Variocellen acquirirten.

Zur leichteren Vermeidung bleibt es jedoch rathsam, die alten Bezeichnungen beizubehalten, und es sollen deshalb auch die beiden allerdings nicht scharf geschiedenen Krankheitsformen Variolois und Varicellae separat geschildert werden.

Symptome der Varioloiden.

Bei der Variolois können ganz dieselben Stadien beobachtet werden wie bei Variola, nur sind sie alle kürzer und weniger scharf markirt. Die Gesamtdauer der Variola vom Beginn der Vorläufer bis zur Vertrocknung der Pusteln nimmt einen Zeitraum von 16 bis 18 Tagen in Anspruch, die der Variolois nur von 7—11 Tagen.

Die Vorläufer sind die nämlichen wie bei Variola, sie dauern aber gewöhnlich keine vollen drei Tage, sondern nur 24—36 Stunden und sind im Allgemeinen weniger intensiv. Der spezifische Pockengeruch fehlt, hingegen stellt sich, was bei Variola gewöhnlich nicht der Fall ist, fast regelmässig ein dunkelrothes, grossfleckiges Hauterythem ein, das man mit dem Namen „Rash“ bezeichnet. Dieses Erythem ist nicht als Anfang des Pustelausschlages zu betrachten, indem die später sich entwickelnden Pusteln eben so gut auf vorher von Rash verschonten als davon befallenen Stellen auftreten können.

Das Exanthem bricht rascher und weniger regelmässig aus. Die Eruption beginnt nicht im Gesichte allein und steigt auch nicht gradatim den Rumpf hinab bis zu den unteren Extremitäten, sondern stellt sich ziemlich gleichzeitig am ganzen Körper ein. Während bei Variola an ein und derselben Körperstelle alle Blattern auf gleicher Entwicklungsstufe stehen und keine Nachschübe beobachtet werden, findet man bei Variolois sehr gewöhnlich Knötchen, Bläschen und grosse Pusteln neben einander, und die Zahl der Pusteln vermehrt sich mehrere Tage lang noch fort. Bei Variolois kommen allerdings einzelne Pusteln vor, welche sich bezüglich ihrer Grösse und Structur in keiner Weise von ächten Blattern unterscheiden, die Mehrzahl derselben aber bringt es nicht zur gereiften Pustel, sondern vertrocknet als hartkorrigrosses, hyalines Bläschen zu einem entsprechend dünnen Schorfe.

Die allgemeinen Symptome, welche schon von vornherein undeutlicher waren, verschwinden mit dem Ausbruche des Exanthemes entweder gänzlich oder reduciren sich wenigstens auf ein Minimum.

Ein wirkliches secundäres Fieber kommt hier nicht vor und die Kranken befinden sich meist auch so wohl, dass sie kaum im Bette zu erhalten sind. Auch die entwickeltsten Pusteln beginnen spätestens am 5.—6. Tage zu vertrocknen, und zuweilen bemerkt man mitten unter den vertrocknenden noch einige Nachzügler, welche sich zu Bläschen erheben, gewöhnlich aber abortiv wieder zu Grunde gehen. Die Eiterung der Pusteln wird nicht so mächtig, dass die Umgebung sich erysipelatös rothet und dass die Mehrzahl der Pusteln zum Aufplatzen käme. Der gewöhnliche Fall ist, dass sie rasch eintrocknen, dass die Krusten nach einigen Tagen abfallen und leicht geröthete, kaum vertiefte Narben hinterlassen. Die Pusteln auf der Schleimhaut der Mundhöhle und des Pharynx heilen ebenfalls in kürzerer Zeit als bei Variola.

Die Nachkrankheiten sind hier selten und bei vorher gesunden Kindern wenig gefährlich. Zuweilen entwickelt sich eine hartnäckige Furunkulosis oder ein stark nässender Impetigo mit Schwellung der benachbarten Lymphdrüsen. Bei scrofulösen Kindern machen die dyskrasischen Affectionen meistens beträchtliche Fortschritte.

Die Prognose ist hier viel günstiger als bei Variola, indem von Kindern unter einem Jahre nur 8—10 Procent, von älteren Kindern kaum 5—6 Procent erliegen.

Die Gefahr beruht besonders auf Betheiligung des Larynx, wodurch Krupssymptome und plötzliches Glottisödem entstehen, ferner auf rasch tödtenden Convulsionen, auf Complication mit Pneumonie oder Meningitis und endlich auf dem ausnahmsweise sich entwickelnden septischen Charakter des Fiebers.

Therapie der Varioloiden.

Die Vaccination gewährt keinen Schutz gegen Varioloiden, sondern sie modificirt das Contagium der echten Blattern so weit, dass dessen Uebertragung auf ein geimpftes Kind zur mehr im höchsten Falle Varioloiden zu erzeugen im Stande ist. Da man jedoch schon vielfach erfahren hat, dass die Varioloiden bei geimpften Kindern milder verläuft als bei nichtgeimpften, so ist auch in dieser Beziehung die Vaccination als ein wohlthätiges Prophylacticum zu betrachten.

Die Behandlung der einmal ausgesprochenen Krankheit ist eine rein expectative symptomatische. Es gilt hier alles, was bei der Therapie der Variola schon gesagt worden. Die Aetzung der Pusteln im Gesichte ist in diesem Falle nicht nöthig, indem die Pusteln weniger tief in die Cutis eindringen und nur leichte Narben zurücklassen. Eine Bedeckung der grösseren Partien des Gesichtes mit Quecksilberpflaster genügt in der Regel zur Verhütung entstehender Narben.

Zu Anfang der Krankheit gibt man am besten verdünnte Mineralwässer, wenn Diarrhöe zugegen, Mucilaginosi. Bei Larynkrup leisten intensive Aetzung des Pharynx und der Epiglottis mit einer concentrirten Jollanneseinlösung (20—300 Wasser) die besten Dienste.

Im Stadium der Abtrocknung kann man bei kleineren Kindern durch Feinsthandselne von Leinwand das übermässige Kratzen zu verhindern suchen, grössere Kinder werden durch diese Prozedur natürlich sehr indignirt und beunruhigt. Man begnügt sich hier, die Nägel an Händen und Füssen möglichst kurz schneiden zu lassen.

Die Reconvalescent macht gewöhnlich rasche Fortschritte und es bedarf deshalb nur selten einer speciellen roborenden Nachbehandlung.

Symptome der Varicellen.

Die Varicellen, auch falsche, Schlaf-, Wasser- oder Steinpocken genannt, sind das ungefährlichste, geringfügigste unter allen acuten Exanthemen, so dass die Mehrzahl der Fälle, namentlich wenn eine ausgebreitete Epidemie herrscht, gar nicht in ärztliche Behandlung kommt.

Von Vorläufern wird bei grösseren, sonst gesunden Kindern so gut wie nichts bemerkt. Zuweilen gehen einen, höchstens zwei Tage lang gastrische Symptome, Erbrechen, Appetitmangel, Magenschmerz, ein leichtes Fieber oder Urinbeschwerden dem Ausbruche der Exanthemes voraus.

Ohne besondere Steigerung dieser Vorläufersymptome bricht nun das Exanthem scheinungslos an verschiedenen Körpertheilen zugleich aus. Kleine rothe Flecken erheben sich rasch, in 6—12 Stunden zu linsen- bis erbsengrossen Blasen, welche man einzeln für sich betrachtet von kleinen, durch Verhinderung entstehenden Bläschen nicht unterscheiden kann. Sie sind meist rund oder etwas oval, und wenig gefächert, so dass sie bei einfachem Anstechen meist ihren ganzen Inhalt entleeren. Eine Delle ist gar nicht oder nur sehr leicht vorhanden. Die meisten dieser Bläschen finden sich auf dem Rücken und der Brust, weniger an den Extremitäten und die wenigsten im Gesicht, nur auf der Stirne kommt immer die eine oder andere Pustel zum Vorschein.

Gewöhnlich bleibt es nicht bei einer Eruption, sondern es stellen sich die folgenden Tage Nachschübe ein, so dass frische und ganz vertrocknete Varicellenblasen nebeneinander vorkommen können. Wenn auch die meisten Bläschen nicht über die Grösse einer kleinen Linse hinauskommen, so findet man doch bei allen Varicellenkranken eine oder einige Pusteln am Rücken oder auf der Stirne, welche schwach gefüllt entschieden an die echte Variolapustel erinnern.

Der Verlauf der meisten Bläschen ist ein sehr rascher. Ihr Inhalt trübt sich schon nach 2—3 Tagen und vertrocknet am vierten zu einer flachen, blätterigen Kruste, welche nach einigen Tagen abfällt und keine Narbe, sondern bloss einen rothen Flecken zurücklässt. Der schmale rothe Hof, welcher sich zur Zeit des Trübwerdens der Bläschen gebildet hatte, verschwindet wieder, sobald die Krusten vertrocknet sind.

Der rothe Fleck, welcher noch einige Wochen lang den vorwiegenden Sitz der Krusten erkennen lässt, ist nach dieser Zeit nicht mehr zu finden.

Wenn einzelne sehr heftige Nachschübe den Verlauf nicht besonders in die Länge ziehen, so ist die ganze Krankheit bis auf die rothen Spuren der Pustelchen nach 8—10 Tagen vollständig beendet. Nachkrankheiten werden hier nicht beobachtet, nur bei scrofulösen Kindern entwickeln sich zuweilen direkt aus den Bläschen chronische, ständige Ausschläge und widerstehen dann lange einer austrocknenden Behandlung. Der constante Ausgang der Varicellen ist rasche und vollständige Genesung.

Als Variationen dieser gewöhnlichen Schlafpocken werden in der

Literatur angeführt: die *Varicellae lenticulares*, wo gar kein Bläschen die Größe einer Linse überschreitet und keines gesabelt ist, und die *Varicellae conformes* oder *acuminatae*, die sog. Horn- oder Spitzpocken, wo sich zuerst harte Knötchen auf der Haut erheben, auf welchen dann am folgenden Tage kleine, spitze Bläschen entstehen. Das Bläschen trocknet schnell wieder ab, und seine härtliche Basis schrumpft unter mehrmaliger Desquamation ein.

Rescapituliren wir die wesentlichen Unterschiede zwischen Variolen und Varicellen, so ergibt sich, dass die Varicellen im Gegensatz zu ersteren kurze oder gar keine Vorläufer haben, dass das Exanthem ganz schmerzlos mit vielen Nachschüben ausbricht, das Gesicht fast gänzlich verschont, nach 2—3 Tagen schon wieder abtrocknet und keine Narben hinterlässt. Lebensgefahr oder irgend ein bleibender Nachtheil ist bei Varicellen niemals zu fürchten. Vaccination und überstandene echte Variola gewähren keinen Schutz gegen Varicellen.

Behandlung der Varicellen.

Wenn bei Variolis schon ein expectatives Verfahren für ausreichend erklärt werden, so gilt dass noch viel mehr für Varicellen. Wenn die Kinder, wie gewöhnlich, fieberlos sind, so ist es eine schwere Aufgabe, sie im Bett zu halten. Die Bettwärme ist übrigens bei diesem Exanthem auch gar nicht dringend indicirt, und selbst mit grober Vernachlässigung einer gleichmäßigen Temperatur bekommt man keine unheil Folgen zu sehen.

Sind febrilhafte Prodromalsymptome vorhanden, so gibt man leichte Abführmittel, Tamarinden oder Mittelmilch. Die Pusteln lässt man mit etwas Oel oder Cocosfett bestreichen, reducirt die Kinder einige Tage auf Mande, vegetabilische Diät und hält sie in gleicher Zimmertemperatur. Nach Abfall der Krusten wird durch 3—4 lauwarme Bäder die gestörte Thätigkeit der Haut passend wieder angeregt.

6) Erythema neonatorum.

Abgesehen von der physiologischen, rothen Hautfärbung, mit welcher alle normalen Kinder zur Welt kommen, und die erst nach einigen Tagen zuerst gelbroth und endlich hell rosenroth wird, kommt bei Neugeborenen noch sehr häufig ein *Erythema papulosum* vor.

Symptome.

Dasselbe ist gewöhnlich auf der Brust und dem Rücken am stärksten entwickelt und besteht aus kleinen dunkelrothen Knötchen, welche auf einem ebenfalls rothen Grunde stehen. Die Cutis ist hierbei nur wenig infiltrirt, Hautjucken scheint zugegen zu sein, indem alle Kinder, so lange das Exanthem sichtbar ist, weniger ruhig sind. Auf Fingerdruck schwindet die Röthe schnell, um nach aufgehobenem Finger zugleich in erhöhtem Maasse wiederzukehren. Nach einigen Tagen erblasst das Erythema und die dunkelsten Stellen schuppen sich leicht ab.

Es ist im Verlaufe durchaus nichts Typisches zu bemerken und der ganze Process kann bald in zwei, bald erst in 14 Tagen vollendet sein. Auch kann ein und dasselbe Kind öfter als einmal davon befallen werden. Allgemeine Symptome werden hidurch fast gar nicht veran-

last, die Kinder haben kein Fieber, keine Selbstentzündung, und behalten ihren Appetit, wodurch sich diese Erythema schon hinlänglich von Scharlach und Masern unterscheidet. Das Exanthem selbst hat allerdings oft die grösste Aehnlichkeit besonders mit Scharlach, und man muss in der That die begleitenden Symptome zu Hilfe nehmen, um etwaigenfalls neue Exantheme sicher ausschliessen zu können. Uebrigens sind Neugeborene für die letzteren sehr wenig empfänglich.

Aetiologie.

Die Ursachen dieses Erythems sind höchst wahrscheinlich äussere, wofür das Befallenwerden in den ersten Lebenstagen und die öftere Wiederkehr bei einem Individuum spricht. Die zarte Haut der Neugeborenen verträgt eben nicht immer gleich von Anfang an den Reiz der Kleider und Bäder gut und gelangt dann zu jenen hohen Graden von Hyperämie, welche das Erythema papulosum darstellen.

Behandlung.

Da das Erythem in kurzer Zeit spontan verläuft, so kann demselben allen Nachtheil ein rein expectatives Verfahren eingeblasen werden. So lange es besteht, muss alle Reibung der Haut gänzlich vermieden werden, und namentlich nach dem Bade, das keinen Tag ausgesetzt werden darf, sollen die Kinder einfach in trockne Tücher eingeschlagen, aber nicht gerieben werden. Leichte Fetteinreibungen mit Ol. Cacao oder irgend einem anderen reinen Fette scheinen die Kinder etwas zu beruhigen. Die Heuscheln und Windeln müssen während dieses Zeitraumes möglichst fein und weich sein.

7) Erysipelas. Rothlauf.

Bei grösseren Kindern von 6—15 Jahren kommen Erysipela vor, welche sich in nichts von der Rose der Erwachsenen unterscheiden, und deshalb hier auch nicht weiter berücksichtigt werden sollen. Das Erysipel der Neugeborenen und Säuglinge aber löst, namentlich symptomatisch und prognostisch, so bedeutende Verschiedenheiten dar, dass eine besondere Abhandlung desselben nöthig erscheint. —

Es zeichnet sich diese Art von Erysipel durch seine grosse und constante Neigung zum Wandern aus, indem es sich nicht auf einen kleineren oder grösseren Theil des Körpers beschränkt, sondern über die ganze Hautoberfläche fortkriecht. Immer die zunächst liegenden Theile werden ergriffen, während die vorher erkrankten Parthien allmählig erlassen, und es tritt kein Stillstand der Krankheit ein, bis nicht die ganze Körperoberfläche heimgesucht worden ist. Selbst nicht einmal damit beruhigt sich dieser perniciöse Process, sondern beginnt in seltenen Fällen an einer beliebigen entfernten Stelle von neuem, um noch einmal eine grössere oder geringere Fläche zu durchwandern.

Die localen Symptome sind nicht verschieden von denen der gewöhnlichen Rose: Röthung, Schwellung, Wärme und Schmerz bei Druck. An ein und derselben Stelle bleibt das Exanthem in seiner Blüthe 1—3 Tage lang und erlischt auffallend rasch, sobald es neue Parthien ergriffen hat.

Der ganze Process dauert im seltensten Falle der Genesung 4 bis 5 Wochen. Neugeborene erliegen regelmäßig nach einigen Tagen, Kinder, welche schon mehrere Monate alt sind, genesen auch nur ausnahmsweise.

Aetiologie.

Bei Neugeborenen geht das Erysipel fast regelmäßig vom Nabel aus und wird besonders häufig während der Puerperalfieber-epidemien beobachtet, wo es niemals zu einer normalen Vernarbung des Nabels kommt. Bei älteren Kindern können alle möglichen Hautverletzungen dazu Veranlassung geben. Am häufigsten erfolgt das Erysipel auf Vaccine- und Impetigopusteln, kann aber auch von einem einfachen Wundsein, Intertrigo, einer Hautfalte ausgehen. Bei der grossen Häufigkeit dieser Hautveränderungen einerseits und der Seltenheit der Rose andererseits muss jedoch immer noch eine bestimmte Disposition liegen, ohne welche alle diese Momente ungefährlich bleiben, angenommen werden.

Behandlung.

Alle Versuche, das Erysipel zu localisiren, sein Weiterkriechen zu verhindern, sind bisher erfolglos geblieben. Selbst das Ferrum candens wurde versucht, es konnte jedoch auch durch diese höchst eingreifende Behandlung kein Stillstand erreicht werden.

Die interne Behandlung muss jedenfalls eine roborative sein. Die Engländer wollen Erfolge gesehen haben von der Tinct. ferri muristici oxydat. stündl. zwei Tropfen. Die wenigen Kinder, die ich bisher von Erysipel genesen sah, bekamen von mir täglich 0,10 bis 0,20 Chinin einige Tage hindurch und mehrere Wochen lang stündlich ein Kaffessüßel Bordeaux. Oerlich wurde nur Ol. Coccos angewendet.

8) Intertrigo. Frattsein.

Unter Intertrigo versteht man ein Windwerden, einen Epidermisverlust zwischen den Hautfalten, entstanden durch Reibung zweigeebter, einander gegenüber liegender Hautflächen. Er kommt am häufigsten vor zwischen den Hinterbacken, in der Schenkelbeuge, unter den Achseln und am Halse. Fette Kinder können bei übrigens vollkommener Gesundheit und sorgfältigster Pflege in allen Hautfalten fratt werden, bei mageren geschieht dies nur, wenn diarrhöische Stühle und mit Urin durchsaute Windeln längere Zeit mit der Haut in Berührung bleiben.

Der erste Grad des Intertrigo ist Rötung und Feuchtwerden der betreffenden Hautfalte. Die Epidermis erweicht dann ausserordentlich schnell und lässt sich als ein weisser Schleim wegwischen, worauf die Cutis dunkelroth und schmerzhaft gegen Berührung zu Tage liegt. Die nun sich einstellende Sekretion ist ziemlich betrüßlich und kann bis zu leichter Krustenbildung sich steigern. Bei einiger Reinlichkeit und passender Behandlung ersetzt sich die verloren gegangene Epidermis bald wieder, sind jedoch die Kinder dyskrasisch oder atrophisch und dauert die ursprüngliche Veranlassung, die Diarrhöe, fort, so schreitet

die Erosionen den geschwürigen Charakter an, können sich mit diphtheritischen Membranen besetzen und in den schlimmsten Fällen sogar gangränös werden.

Der gewöhnliche Interitus der fetten Kinder weicht einem geeigneten Verfahren in 2–3 Tagen, der der ströplischen Kinder heißt fast niemals, so lange Diarrhöe besteht.

Behandlung.

Als Prophylacticum streut man bei fetten Kindern ganz passend in die Hautfalten den Bärlappsaamen, Semen Lycopodii, welcher die Berührung und Reibung verhindert und bei seiner schwach hygroscopischen Eigenschaft lange trocken bleibt. Gewöhnlich aber wird er von den Laien auch als Heilmittel bei schon verlorengegangener Epidermis benutzt und ist hier keineswegs am Platze. Das gelieferte Exsudat verbindet sich mit dem Semen Lycopodii zu harten grossen Krusten und vermehrt die Hautentzündung beträchtlich. Wo dieses ungeeignete Verfahren stattgefunden hat, muss man die Krusten mit etwas Oel erweichen und sanft entfernen. Die vorhandenen Excretionen bestreicht man am besten mit Blei- oder Zinksalbe, welche man in der Arzeneipraxis durch einfaches Talg ersetzen kann. Tägliche, nicht zu warme Bäder, sind das beste Präservativ gegen das Frattwerden.

9) Furunculosis.

Kinder verschiedenen Alters leiden sehr häufig an vereinzelter Furunkels oder Bütschwären, welche, dem rascheren Stoffumsatz im Allgemeinen entsprechend, in kurzer Zeit ihren Pfropf abstossen und verhältnissmässig schnell zur Heilung kommen. Anders verhält sich die Sache bei kleinen Kindern überreizter Eltern.

Hier stellen sich zuweilen am Hinterhaupte und am ganzen Kopfe überhaupt eine grosse Menge von Furunkeln ein, welche einer nach dem andern aufgehen und so mehrere Wochen lang dem Kinde ausserordentlich grosse Schmerzen bereiten. Das Exsudat ist gewöhnlich kein fester Pfropf, wie er bei den vereinzelter Furunkeln vorkommt, sondern ein dickflüssiger, gelber oder blutgemischter Eiter, nach dessen Entleerung sich fache mit den Haaren verklebende Krusten bilden.

Dabei schwellen die Drüsen des Nackens und Halses consensuell an, sind sehr schmerzhaft gegen Berührung und gehen auch wohl in Eiterung über.

Die Zahl dieser Furunkel kann so beständig werden, dass endlich das ganze Hinterhaupt mit confluirenden Krusten bedeckt ist, unter welchen immer wieder neue zum Vorschein kommen, die alten Krusten emporheben und nach Entleerung ihres Eiters die letzteren verliken lassen. So zieht sich dieser ausserst schmerzhaft Process viele Wochen hin, die kleinen Kinder schlafen fast gar nicht, die grösseren am besten, wenn so die Wärterin auf den Arm nimmt, wo sie dann ihr Gesicht auf deren Schaltern legt. Endlich trocknen die Krusten ein und es folgen keine neuen Nachschübe mehr. Die Krusten werden locker und können nun leicht sammt den Haaren, insofern selbe nicht schon vorher ausgefallen sind, abgeschnitten werden. Die Spuren der Furunkeln geben sich noch lange Zeit als blasse glänzende Narben zu erkennen.

Die consensuelle Anschwellung der Cervicaldrüsen verschwindet hierauf ebenfalls. Die Ernährung und Entwicklung der Kinder bildet durch die anhaltende Schlaflosigkeit in hohem Grade, geht aber, wenn die Verdauungsorgane nicht catarrhalisch afficirt sind, nach gehelter Furunkulose wieder rasch von Statten.

Bei vollkommen gesunden Kindern wird dieses Uebel fast niemals beobachtet, sondern gewöhnlich ist es der Vorbote einer grossen Reihe von scrofölosen Erkrankungen.

Behandlung.

Abkürzen lässt sich dieser Process nicht. Das einzige, was der Therapeut thun kann, ist, dass er die anhaltende Unruhe und Schlaflosigkeit zu beheben sucht, wodurch dem Kinde und dessen Angehörigen ein grosser Dienst geschieht. Es gelingt dies sehr leicht durch 1–2 Tropfen Opiumtinktur, wodurch bei einem jeden, auch dem unruhigsten Kinde einige Stunden lang ein erquickender Schlaf eintritt. Nachtheilige Folgen sieht man von einem mässigen Gebrauch der Opiumtinktur niemals.

Örtlich behandelt man die Krusten am besten mit Fett. Man bestreicht sie mehrmals des Tages mit Oel oder irgend einer milden Salbe, worauf sie erweichen und bröcklich werden. Es werden hierdurch die schmerzhaften Zerrungen an den mit den Krusten verklebten Haaren vermieden. Eine vorsichtige Eröffnung der Furunkel bringt keine Erleichterung. Man muss sich darauf beschränken, die gelb durchscheinenden Eiterpunkte mit einer Nadel anzustechen, wodurch die schmerzhaftige Spannung um einige Stunden abgekürzt werden kann. Zur Verhütung fernerer Krustenbildung müssen an den erkrankten Hautstellen die Haare so kurz als möglich geschnitten werden.

10) Pemphigus benignus (contagiosus).

Unter Pemphigus (*δ πληγὴ*, die Wasserrübe) im Allgemeinen versteht man die spontane Entwicklung von gelben Blasen auf der Haut, welche sich in keiner Weise von kleinen Verbrennungs- oder Cantharidenblasen unterscheiden. Bei syphilitischen Neugeborenen kommt eine sehr besartige Form vor, welche im Abschnitte von der Syphilis besprochen werden wird. Ausserdem besteht aber, wenn auch selten, auch ein gutartiger Pemphigus, welcher nicht dyskrasischen Ursprungs, zuweilen sogar in geringem Grade contagiosus auftritt. Es befallt dieses mit Vorliebe Säuglinge, ältere Kinder werden weniger ergriffen und am seltensten erkranken Erwachsene. Beispiele von deutlicher Contagiosität erwähnen Langhaus, Scharlau, Steffen, Hervieux, Olshausen, Klemm und andere. Mir selbst war es bisher nur in einem Falle möglich, Ansteckung zu constatiren. Ein Kind bekam in der zweiten Lebenswoche multiple Blasen und Bläschen, von denen einige den Varicellen vollkommen glichen, andere aber die Grösse einer Erbse oder Bohne erreichten. Einige Tage darauf erkrankte die Mutter und die Kinderfrau in derselben Weise, doch war bei den Erwachsenen das Exanthem den Windpocken noch ähnlicher als bei dem Kinde. Eine später am Kinde vorgenommene Vaccination ergab normale Proben, so dass man die Möglichkeit einer Verwechslung mit

Varicellen vollkommen ausschliessen kann. Die Menge der Blasen ist sehr verschieden, bald sind es nur einige wenige, bald viele Dutzende. Die Eruption tritt keineswegs so streng typisch ein, wie wir dies bei den acuten Infectiouskrankheiten beobachten, sondern es kommen mehrere Tage hindurch Nachschübe vor. Wie schon gesagt, sind die meisten Blasen von Varicellen nicht zu unterscheiden, dazwischen aber kommen immer einige von Erbsen- und Haselnussgrösse vor. Die grossen sind scheinbar rund, sondern oval und ihre Längsaxe steht senkrecht zur Körperlänge. Sie entstehen in der Weise, dass sich zuerst die Haut umschrieben röthet, und in den folgenden 24 Stunden dann zur Blase answandelt. Die letzteren platzen meist oder trocknen nach Art der Cantharidenblasen einfach ein, in allen Fällen aber bekommen sie eine dünne Borke mit schwach rothem Hofe und nach 6–12 Tagen fallen diese Borke ab. Narben bleiben nicht nach, nur wenn ausnahmsweise diphtheritischer Beschlag der Wundfläche sich dazu gesellt, zeigt ein weisses glattes Narbengewebe den Sitz der ehemaligen Blasen dauernd an. Das Exanthem bricht mit Vorliebe im Gesicht und am Rumpfe aus und verschont die Extremitäten oft gänzlich. Die allgemeinen Erscheinungen, bestehend in 1–3 tägigen Unwohlsein, abendlichem Fieber, Unruhe und Schlaflosigkeit, sind nur beim Ausbruche und auch da nicht in allen Fällen zu beobachten. Die Harnsecretion ist hierbei in keiner Weise gestört.

Behandlung.

Der gutartige Pemphigus verläuft, wie ja schon der Name sagt, günstig und bedarf keiner besonderen Behandlung. Die von Epidermis entbliesenen Stellen und die Borke werden durch einfache Fettsalbenreihung oder Salbenverband vor äusseren Schädlichkeiten geschützt. In 2–3 Wochen tritt Genesung ein. Complicirt sich hingegen der Process mit Diphtherie, so ist die gegen jenen Process schon angegebene interne Behandlung einzuschlagen. Die diphtheritische Haut verbindet man am zweckmässigsten mit einer einprocentigen Carbolsäurelösung.

II) Scabies. Die Krätze.

Da bei Abfassung dieses Kapitels Kenntniss der Hautkrankheiten im Allgemeinen vorausgesetzt wird, so kann ich die zoologische Beschreibung der Krätzmilbe füglich unterlassen und sogleich auf die durch sie verursachten Veränderungen auf der Haut kleiner Kinder übergehen. Die beste Beschreibung und Abbildung der Milbe findet sich in Simon's und Hebra's Hautkrankheiten und Küchenmeister's Parasiten.

Symptome.

Die Krätzmilben dringen in die zarte Epidermis der Säuglinge mit besonderer Vorliebe und auffallend rasch ein, und einige Tage nach erfolgter Ansteckung beginnt schon allenthalben das consecutive Exanthem zu erscheinen. Dasselbe ist bei kleinen Kindern je nach ihrem Alter verschieden. Ganz kleine, erst ein paar Wochen alte Kinder bekommen es in geringerem Grade, weil sie noch zu ungeschickt

sind, sich intensiv zu kratzen, während Kinder im Alter von mehreren Monaten fast am ganzen Körper damit bedeckt werden.

Das Exanthem ist meist am entwickeltesten an den Händen, an den Fusssohlen, am Gesäss und auf der Bauchhaut und bietet zuerst folgende Form. Es entstehen an verschiedenen Stellen des Körpers stark juckende rothfarbige Papeln; auf deren Spitze sich kleine wasserhelle Bläschen entwickeln. Bleiben diese Bläschen unversehrt, so trübt sich nach einigen Tagen ihr Inhalt, wird eiterig und es entstehen so mit grössere oder kleinere Pusteln, die spontan platzen und eine gelbe eitrige Kruste hinterlassen. Werden die Bläschen jedoch, wie es gewöhnlich der Fall ist, vorzeitig aufgekratzt, so bluten die wundgekratzten Stellen etwas und es bilden sich kleine rüthlich schwarze Krusten.

Je stärker die Kinder kratzen, um so ausgebreiteter wird das Exanthem. Durch Confluiren einzelner Pusteln entstehen besonders oft an den unteren Extremitäten und dem Gesäss grössere Geschwüre, welche lange der Heilung widerstehen. Hat die Krätze eine längere Zeit fortbestanden, so nimmt die ganze Haut, auch jene Partien, welche frei von Papeln sind, eine schäbige, trockene Beschaffenheit an.

Das Allgemeinbefinden krätzkranker kleine Kinder leidet in Folge des unstilllichen Juckens und der schlaflosen Nächte beträchtlich, und die Kinder magern, wenn die Krätze nicht gehörig behandelt wird, was leider noch häufig der Fall ist, sichtlich ab.

Was das Alter betrifft, so sind lediglich die Neugeborenen davon verschont, weil eben die Milbe einige Tage Zeit braucht, bis sie sich in die Epidermis einbohrt und dann das consensuelle Exanthem veranlasst. Erst wenn dieses entstanden, wird man die Gegenwart der Gänge gewahr; denn vorher hat man meist keine Veranlassung, die Haut mit so grosser Aufmerksamkeit zu untersuchen. Sind die Kinder einmal einige Wochen alt, so werden sie für die Krätze sehr empfänglich und acquiriren sie regelmässig, wenn eines oder das andere ihrer Geschwister sie in das Haus gebracht.

Die Krätze ist an kleinen Kindern schwerer zu diagnosticiren als bei Erwachsenen, weil die Milben nicht bei diesen eine Vorliebe für die Hände haben, sondern ihre Gänge am ganzen Körper und zwar sehr vereinzelt graben, so dass man bei einem Kinde oft lange suchen muss, bis man einen charakteristischen Gang aufweissen kann. Das Auffinden der Gänge wird ferner noch dadurch erschwert, dass dieselben weiss bleiben und nur wenig von der übrigen Haut abstecken, während die an den Händen Erwachsener in Folge der verschiedenen Beschäftigungen bald schwärzlich schmutzig werden und durch einfache Waschungen sich nicht mehr weiss waschen lassen. Der Schmutz, der unter die Epidermis gelangt ist, wird natürlich durch das Wasser kaum beseitigt. Am häufigsten findet man die Gänge bei kleinen Kindern auf der Haut der Sohlen, des Bauches und des Gesässes, sie kommen jedoch auch im Gesichte vor, was man bei Erwachsenen niemals beobachtet. Das consensuelle Exanthem ist bei ersteren immer viel ausgebreiteter und dichter als bei letzteren.

Ältere Kinder mit feiner Haut haben zuweilen excessiv grossenitige Pusteln, welche die Grösse einer halben Erbse erreichen und selbst noch übersteigen können. Es entzündet sich beim Anstecken ein

grosser Tropfen Eiter und gewöhnlich füllen sich diese Pusteln nach Entleerung dieses ersten Tropfens noch einigemal wieder. Sie hinterlassen meist dunkel pigmentirte, lange Zeit sichtbare Narben. Man hat diesen grosspusteligen Ausschlag auch die fette Krätze genannt.

Der Verlauf der Scabies ist bei Kindern immer ein sehr langwieriger, wenn nicht die geeignete Therapie eintritt, und kann sich auf Monate hinaus ausdehnen. Die Pusteln und Excoriationen werden dabei immer grösser und zahlreicher, die Unruhe immer zunehmender und die Abmagerung macht bedenkliche Fortschritte. Endlich, wenn fast die ganze Haut mit dicken Schuppen und Krusten bedeckt ist, scheint auch die spontane Heilung ohne direct antiscabiose Behandlung eintreten zu können.

Behandlung.

Die Behandlung scabioser Kinder unterscheidet sich wesentlich von der der Erwachsenen, und ist verschieden, je nachdem der essentielle Ausschlag bloss aus Papeln oder auch aus Pusteln oder Geschwüren besteht. Bei kleinen Kindern, welche noch wenig kratzen können, ist es gewöhnlich nur papulös, bei grösseren stellen sich zahlreiche, grosse Eiterpusteln ein.

Das souveränste Mittel, welches jetzt alle anderen vollständig verdrängt hat, ist der Balsam peruvianus 15,0. Man schmirt damit die Kinder des Abends reichlich ein und setzt sie am anderen Morgen in ein Seifenbad. Zur vollständigen Tödtung der Milben genügt schon eine einzige, gründliche Einreibung, um ganz sicher zu gehen, wiederholt man aber dieselbe 2—3 Abende nach einander. Der peruvianische Balsam hat den Vortheil vor allen anderen Krätzmitteln, dass er nicht im Geringsten reizt und somit die Heilung der secundären Krätzthemen nicht stört. Unangenehm ist nur, dass die hierdurch verunreinigte Wäsche sich schwer reinigen lässt und lange Zeit braune Flecke behält, weshalb es zweckmässig erscheint, die Kinder mit alter, weithäuser Wäsche einzuhüllen.

Bei Kindern unter fünf Jahren wende ich lediglich dieses Mittel an, bei grösseren kann, wenn wenig Pusteln vorhanden sind, auch die gewöhnliche Solutio Vlemingx, Schwefelcalciumlösung, in gleicher Weise wie der Perubalsam gebraucht werden. Mit den beiden oben genannten Medicamenten ist bei ordentlicher Handhabung eine jede Krätze in 3—4 Tagen heilbar.

Es versteht sich von selbst, dass man in Familien, wo mehrere Glieder an Scabies leiden, zu keinem günstigen Resultat kommt, wenn man nicht alle zu gleicher Zeit einer entsprechenden, möglichst eiergeichen Behandlung unterwirft. In den unteren Klassen der Bevölkerung, wo nicht Wäsche genug zum Wechsel vorhanden und die Beschaffung der Bäder zu kostspielig ist, sind die Chancen für eine baldige Genesung sehr ungünstig und werden erst besser, wenn die älteren Glieder der Familie in einem Spital eine gründliche Kur durchgemacht haben.

12) Der angeborene Naevus, das Muttermal.

Nachdem der Naevus vasculosus, das Gefässmal, die Telangiectase, schon bei den Krankheiten der Gefässe (pag. 305) abgehandelt worden,

bleiben nur noch die angeborenen Pigmentmaler, die Warzen und die angeborenen Fettgeschwülste zur Besprechung übrig.

Unter Pigmentmal, Fleckennal, *Spilus*, versteht man rundliche oder mannigfache Figuren darstellende Hautflecken von verschiedener Farbe. Sie sind gelb, braun, schwarz oder grau, und schwanken zwischen der Grösse einer Erbse und einer flachen Hand, ja bedecken in manchen Fällen sogar einen grösseren Körpertheil, den ganzen Rücken, eine ganze Extremität. Die Farbenveränderung rührt her von dem im Malpighischen Netz abgelagerten Pigmente. Zuweilen ist die Haut an diesen Stellen etwas gewölbt und höckerig, so dass das Mal über die gesunde Haut prominirt, und ziemlich häufig ist sie mit dichten Haaren besetzt, wodurch sie Aehnlichkeit mit dem braunen Pelze eines Thieres bekommt. Nicht immer ist die Pigmentirung an allen Stellen des Naevus gleich vertheilt, bald ist die Peripherie, bald das Centrum heller. Es vergrössern sich diese Pigmentmaler niemals anders als im Verhältnisse des allgemeinen Körperwachsthum und zuweilen wird sogar ein vorzeitiger Stillstand im Wachsthum beobachtet.

Unter Warzenmal versteht man höhere Prominenzen der Haut, welche durch Verlängerung der Papillen und Bindegewebsbildung entstanden und gewöhnlich auch braun pigmentirt sind. Von diesen angeborenen unterscheiden sich wesentlich die so häufig später entstehenden Warzen älterer Kinder. Diese letzteren bestehen aus einer Anzahl senkrecht stehender Zapfen der verlängerten Hautpapillen, welche von einer harten Epidermislage bedeckt sind. Sie sind nicht pigmentirt, entwickeln sich an den verschiedensten Stellen der Hände und des Gesichtes und verschwinden nach einigen Monaten alle spontan wieder, weshalb sie auch für die sog. Sympathieuren, für Deminuit und Betrug, ein beliebter Gegenstand der Heilversuche geworden sind. Die zuerst geschilderten angeborenen Warzenmaler verschwinden niemals spontan.

Unter Naevus lipomatodes, Fettgeschwulst, versteht man rundliche oder cylindrische, mit normaler Haut bedeckte Fettschwülste, welche meist gestielt sind, zuweilen aber auch mit breiter Basis aufsitzen. Sie gehören streng genommen nicht zu den Hautkrankheiten, weil die Cutis hierbei vollkommen unversehrt ist, sondern beruhen auf einer abnormen Fortwucherung des Unterhautfettes. Dieselben wachsen gewöhnlich im Verhältnisse zum Körperwachsthum, in einzelnen Fällen aber auch schneller.

Therapie.

Bezüglich der totalen oder partiellen Exstirpation dieser verschiedenen Mäler und der dabei zu berücksichtigenden Cauteleu je nach ihrem Sitze verweisen wir auf die Lehrbücher der Chirurgie. Bei kleineren Naevi können die chirurgischen Eingriffe häufig vermieden werden, indem man die Vaccination in und auf denselben vornimmt. Die Einstiche der Impfnadel müssen in diesem Falle so dicht neben einander gemacht werden, dass die daraus entstehenden Pusteln confluireu.

Es erhebt sich hierauf am 7.—8. Tage der ganze Naevus zu einer hohen, schmerzhaften Pustel, welche längere Zeit eibst und häufig ulcirt, schliesslich aber meist eine rosarethe oder weisse Narbe zurücklässt. Wenn bei grossen Mälern auch nicht alles Pigment durch dieses

Verfahren zerstört werden kann, so werden jedenfalls grössere pigmentlose Inseln in denselben erzeugt, welche spätere Operationen sehr erleichtern können.

Bei Kindern, welche schon gesopft sind, kann man durch fortgesetzte Lokalbehandlung mit Tartar. stibiat. oder Sublimat tiefe Pustelgeschwüre erzeugen, nach deren Heilung auch häufig weisse Narben zurückbleiben. Jedenfalls werden bei behaarten Mälern die Haarwurzeln hiedurch zerstört, was das Erschreckende derselben bedeutend mindert.

Bei den einfachen, nicht angeborenen Warzen grösserer Kinder, welche gewöhnlich in rascher Folge an verschiedenen Stellen emporwachsen, sind alle chirurgischen Eingriffe, Schneiden, Abbinden und Cauterisiren unnöthig, indem sie eben so spontan wieder verschwinden, wie sie gekommen sind. Der innerliche Gebrauch kleiner Dosen kohlensauren Alkalien oder der kohlensauren Magnesia soll das Abfallen der Warzen beschleunigen.

13) Verbrennung. Combustio.

Bei der Unerfahrenheit und Ungeschicklichkeit der Kinder kommen Brandwunden sehr oft vor und sind sogar sprichwörtlich geworden. Ein gebranntes Kind fürchtet das Feuer. Am häufigsten brennen sich die Kinder an vorderen Extremitäten und an Gesichte, am gewöhnlichsten an heissen Gefässen oder mit heissen Flüssigkeiten, Milch, Wasser oder Suppe. Es sind aus diesem Grunde die höheren Verbrennungsgrade, völlige Zerstörung und Schorfbildung selten, und es kommt nur selten weiter als zur Blasenbildung.

Die Eiterung ist jedoch auch nach diesem geringeren Grade von Verbrennung sehr stark und langwierig und die Narben haben grosse Neigung sich zu contrahiren. Bei ausgedehnter Verbreitung stellt sich schon am zweiten Tage eine enorme Reaktion, heftiges Fieber, bei reizbaren Kindern von Convulsionen begleitet, ein. Gewöhnlich sind die allgemeinen Symptome nicht sehr heftig und schwinden bei geeigneter Lagerung und Behandlung des verbrannten Theiles in wenigen Tagen.

Behandlung.

Die örtliche Behandlung richtet sich nach dem Grade der Verbrennung. Die Schmerzen des einfachen Erythemas werden am schnellsten durch Fetteinreiben mit darauf folgender Wattebedeckung beseitigt. Kälte ist nur bei kleinen Erythemen rathlich und wird bei ausgedehnten Verbrennungen von den erfahrensten Chirurgen, Walther, Nussbaum u. a. m., für gefährlich gehalten.

Grosse Blasen muss man durch feine Einstiche entleeren, darf aber ja die Epidermis hierauf nicht entfernen, indem sie schneller als alle Pflaster die Krusten- und Narbenbildung vermittelt. Bestreichungen mit concentrirter Hollensteinlösung 1:8 leisten in diesem Falle die besten Dienste. Bei ausgedehnt blossliegender Cutis sind sie sehr schmerzhaft. Bei Eiterung verbindet man Anfangs mit Cerat, später mit Blei oder Zinksalbe. Von Epidermis entlöste Flächen, z. B.

zwischen den Fingern und Zehen dürfen sich nie berühren, sondern müssen durch Ceratbappen und Heftpflaster sorgfältig getrennt werden.

Die bei ausgebreiteten Verbrennungen zuweilen sich einstellende Diarrhoe wird am besten durch Opium gestillt. Die Behandlung der allgemeinen Symptome ist eine antiplogistische, antifebrile. Gegen anhaltende Unruhe und Schläfrigkeit ist wieder das Opium als conservatives Mittel zu empfehlen.

Bei tieferen Verbrennungen der Hände und Arme stellen sich mit der Vernarbung beträchtliche Verkürzungen der Sehnen ein, was man durch geeignete Streckverbände zu verhindern suchen muss.

4) Erfrierung. *Congelatio*

So lange die Kinder noch nicht laufen können, kommen Erfrierungen der Extremitäten nicht leicht vor. Werden sie in so zartem Alter längere Zeit der Kälte ausgesetzt, so entsteht allgemeine Cyanose und die Kinder schlafen sehr schnell ein, um nicht mehr zu erwachen. Es mag dieses verheerliche Verfahren wohl öfters ausgeführt werden, als es zu Ohren der Behörde kommt; denn der Nachweis an der Leiche ist kaum möglich.

Bei grösseren Kindern, welche schon gerne mit Schnee spielen und kalte nasse Füsse nur wenig respectiren, sind Frostbeulen im Winter ausserordentlich häufig zu beobachten. Man unterscheidet auch hier, wie bei den Verbrennungen, drei Grade. 1. Grad: Röthung, leichte Schwellung, Jucken und Stechen, namentlich in der Wärme, *Pernio*, die Frostbeule. 2. Grad: Bläsige Blasen, welche zum Theil durch die Einwirkung der Kälte, zum Theil aber auch durch den Druck der Schuhe entstehen und deshalb vorzugsweise an den Zehen und Füssen vorkommen. 3. Grad: Gangrän der Haut oder ganzer Extremitäten. Die ersten beiden Grade sind es hauptsächlich, welche bei Kindern sich einstellen.

Behandlung.

Erfrierungen ersten Grades werden, wenn sie noch frisch sind, am besten mit Schnee einige Zeit gerieben. Bestehen dieselben schon länger, so ist deren rasche Beseitigung nicht möglich und das Uebel ist in der Regel zu unbedeutend, als dass die Kinder deshalb Wochen lang einer consequenten Cur unterworfen werden müssten. Mit Eintritt der warmen Jahreszeit vergehen die *Pernionen* meist spontan. Gegen das lästige Jucken haben sich Bepinselungen mit concentrirter Höllesteinlösung oder Jodtinctur als das wirksamste erwiesen. Als Volksmittel werden verschiedene Fette und Salben, gleiche Theile Talg und Branntwein etc., besonders auch der Tischerkeim, von dem man zweifeln frapante Wirkung sehen kann, empfohlen.

Die taubsehen, misfärbigen Geschwüre, welche im zweiten Grade aus den Bluthasen entstehen, widerstehen der Heilung geraume Zeit. Sie müssen öfter mit Höllestein cauterisirt und mit Digestivsalbe so lange fort verbunden werden, bis schöne rothe Granulationen im Niveau der gesunden Haut sich zeigen. Aber Druck muss natürlich fern gehalten werden. —

Dies waren im wesentlichen die Hautkrankheiten, welche in

der Form oder Behandlung von denen Erwachsener sich unterscheiden. Alle übrigen, z. B. Favus, Ichthyosis, Pityriasis, Lichen, Zoster, Urticaria, Pelliosis etc. verhalten sich bei Kindern ebenso wie bei Erwachsenen, weshalb sie hier keine weitere Berücksichtigung finden können. Von einzelnen entschiedenen dyskrasischen wird in den Abschnitten von der Syphilis und der Scrophulosis noch speziell gehandelt werden. —

Es lag ursprünglich im Plane dieses Werkes, auch den Krankheiten der Bewegungsorgane, der Knochen und Muskeln ein eigenes Capitel zu widmen. Bei genauer Prüfung ergab sich aber, dass der grösste Theil derselben rein chirurgisch-orthopädischer Hilfe bedarf, und dass die hierauf sich vorlegenden Specialisten schon eine grosse Literatur geschaffen haben. Wir mussten deshalb entweder sehr ausführlich werden oder uns begnügen, einen einfachen Auszug der neueren Chirurgien und zahlreichen orthopädischen Aufsätze zu liefern, und ziehen es daher vor, lieber gleich auf diese zu verweisen. Es gehören in dieses Capitel die Hemmungs- und Missbildungen an Händen und Füssen, der Klumpfüss, Plattfüss, Pferdefüss, die Verkrümmungen der Wirbelsäule, die traumatischen Luxationen und Fracturen.

Bei der Beschreibung der Dyskrasien wird die Veränderung des Knochen durch Rachitis und Scrophulosis gegeben werden.

5. Capitel.

* Allgemeine Erkrankungen der Saftmasse. Dyskrasien.

1) Rachitis. Englische Krankheit, Zweiwuchs, doppelte Glieder.

Unter Rachitis versteht man eine Entwicklungs-erkrankung des Sceletos, als deren Hauptsymptom eine Abnahme der Kalksalze in den Knochen zu betrachten ist. Die ersten genaueren Angaben datiren aus der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts und wurden von den englischen Aerzten Whistler, Boer und Glisson gemacht. Es gingen nämlich um diese Zeit aus den verschiedensten Gegenden Englands Berichte über eine neue Kinderkrankheit ein, zu deren genauerer Erforschung eine Commission, bestehend aus den genannten Aerzten, gewählt wurde.

Seit jener Zeit wurde die Einsicht in den rachitischen Process nur um wenig klarer, bis endlich vor 35 Jahren Elsässer die Rachitis des Schädels entdeckte. Die pathologische Anatomie wurde durch die Untersuchungen Külliker's, Virchow's und Hermann Meyer's bedeutend aufgeklärt und bereichert.

Pathologische Anatomie.

Zum richtigen Verständniss der rachitischen Veränderungen muss das physiologische Wachsthum der Knochen in Kürze recapitulirt werden.

Jeder Röhrenknochen wächst in die Länge und in die Dicke. In die Länge wächst er, indem sich zwischen dem Epiphyseknorpel und dem Ende des Knochens immer neue Schichten von Knocepzellen bilden, in welche sich dann Knochenerde ablagert. In die Dicke wächst er in der Weise, dass sich unmittelbar unter dem Periost aus dem Gewebe, womit die Beinhaut an die Knochenoberfläche gelöhnet ist, neue Schichten von Knochenmasse ansetzen. Da das Wachstum in die Dicke viel unbedeutender ist und langsamer von Statten geht als das in die Länge, so sind auch Störungen des physiologischen Wachstums an dem Knocependen viel auffallender und leichter ersichtlich.

Während der Knochen an seiner Aussen Seite sich nach allen Richtungen vergrößert, indem sich neue Gewebselemente ansetzen, nimmt in dessen Innerem auch der Raum der Markhöhle an Umfang zu. Wir haben also nach aussen fortwährend Knochenneubildung, nach innen Knochenresorption. Der Femur eines Kindes kann mit Leichtigkeit in die Markhöhle desselben Knochens eines Erwachsenen hineingelegt werden, so dass, bis das Kind ausgewachsen ist, der ursprüngliche Kinderknochen jedenfalls vollständig regeneriert wird.

Das physiologische Wachstum eines Knochens besteht also darin, dass

- 1) an seiner Oberfläche sich neue Gewebselemente ansetzen,
- 2) in denselben sich alsbald Verknöcherung einstellt und
- 3) im Centrum des Knochens Resorption stattfindet.

Das Wesen der Rhachitis besteht aber einfach darin, dass der erste und dritte Akt vollkommen normal, der zweite jedoch nur unvollständig oder gar nicht von Statten geht, wodurch verschiedene, sehr zufällige Veränderungen seiner Farbe, Form und Consistenz zum Vorschein kommen.

Was die Farbe betrifft, so zeichnen sich die rhachitischen Knochen besonders durch dunklere Rötze, welche am Schädeldecke sogar in's Blaurotze spielen kann, aus. Je röther der Knochen, um so länger und intensiver hat der rhachitische Process schon gedauert. Auch an ein- und demselben Skelete sind nicht alle Knochen gleichmässig gefärbt, sondern die einen sind dunkler, die anderen heller gefärbt, wovon allein schon hervorgeht, dass die Rhachitis kein einfacher, chemischer Process ist, sondern auf einem complicirteren, pathologisch vitalen Vorgange beruht.

Kein rhachitischer Knochen behält seine normale Form. Alle scharfen Knochenkanten stumpfen sich hierbei ab, die Röhrenknochen verkürzen sich in allen Fällen, resp. wachsen nicht weiter noch in die Länge, schwellen an den Epiphysen köllig an, was am besten an den Sternalenden der Rippen zu studiren ist und krümmen sich nach verschiedenen Richtungen. Es kommen an den Röhrenknochen einfache Krümmungen z. B. regelmäßig an den Rippen vor, sehr häufig aber ereignen sich besonders an den Extremitäten wirkliche Frakturen oder genauer gesagt Kriekungen. Wie wir bei der Untersuchung des Knochengewebes es noch ausführlicher schildern werden, enthalten nämlich bei vorgeschrittener Rhachitis die äusseren Knochenschichten so wenig Kalksalze, dass sie gar nicht mehr im Stande sind, vollständig zu brechen.

Die inneren, der Markhöhle zunächst gelegenen Parthien des

Knochen, welche schon vor Eintritt der Rachitis vorhanden waren, können allerdings brechen und brechen wegen ihrer Verdünnung in Folge der von innen fortschreitenden Resorption auch sehr häufig, die inneren weichen jedoch, welche nur knicken aber nicht sich trennen können, gestatten kein Auseinanderweichen der Bruchenden. Die nach Art eines Federkiesels oder einer Weidenrute geknickten Knochen der Extremitäten heilen dann immer in einem stumpfen Winkel, was durch das Uebergewicht der Flexoren sich erklärt. Die Spitze des Winkels am Vorderarm steht in diesem Falle nach aussen und vorne, die des Oberarms fast gerade nach aussen, die des Oberschenkels nach vorn und aussen, und die der Tibia, welche gewöhnlich nahe am Fussgelenke knickt, gerade nach vorne.

Durchsägt man nach vollendeter Heilung eine solche Infraction der Länge nach, so findet man an der convexen Fläche nur compacte, an der concaven eine breite Schichte spongioser Substanz. Die Markhöhle ist an der Stelle des Bruches durch dicke Knochenwucherungen, die sich später wohl wieder verdünnen, aber niemals mehr vollständig verschwinden, gänzlich verschlossen. Wir werden bei der Symptomatologie noch ausführlicher auf die Formveränderungen der einzelnen Skeitheile zurückkommen.

Sehr auffallend ist die Abnahme der Consistenz bei rachitischen Knochen. Man kann ohne besondere Anstrengung latente Einschnitte, bei sehr entwickelter Krankheit sogar vollständige Durchschnitte machen, ohne dass das Messer hiedurch Scharfen bekomme. Dies wären die grösseren pathologisch anatomischen Merkmale eines rachitischen Knochens.

Untersucht man nun ein so erkranktes Skelet genauer, so ergeben sich folgende, an allen Knochen mehr oder weniger erkennbare Veränderungen: Das Periost ist dicker als gewöhnlich, an vielen Stellen mäßig getrübt, von rosenrother Farbe. Versucht man dasselbe vom Knochen abzuschieben, so bleiben kleine, zuweilen selbst grössere, dunkelrothe Knochenfragmente daran hängen, und der Knochen ist immer dunkelroth und von besonders rauher Oberfläche. Man beobachtet dieses Verhalten des Periostes am deutlichsten an den Stirnbeinen bei Craniotabes. Das Schädeldach lässt sich in diesem Falle sehr leicht durchsägen oder gar mit dem Messer abschneiden, an den hinteren Parthien jedoch kann die Säge gar nicht in Anwendung kommen, indem die zur Dünne eines Kartenblattes geschwundenen Stellen nachgeben, der Säge ausweichen und bei fortgesetzten Sägesägen unregelmässig zerreißen. Aus der vorderen Hälfte des Durchschnittes, den Stirnbeinen, sickern kleine Tropfen eines blutigen Serums aus, der Durchschnitt der Schläfen- und Parietalknochen ist schon trockner und der des Hinterhauptes ist von einer hellrosa Farbe ohne eine Spur blutigen Serums. Die Stirnbeine sind immer etwas, oft um das Doppelte, verdickt, ebenso die Seitenwandbeine, vielmehr ihre vordere in die Kronennaht antossende Parthie, die hintere hingegen ist ebenso häufig verdünnt als normal, gegen die Lambdanaht aber und auf dem Durchschnitt des Occiput trifft man häufige, bewegliche Stellen von gelberöthlicher Farbe. Der übrige nicht ganz geschwundene Knochen ist unverhältnissmässig dünn, von heller Farbe und enthält gar keine spongiöse Substanz. Hält man das Schädeldach gegen das

Licht, so übersieht man mit einem Blicke die Ausdehnung und den Grad der Verdünnung, den die Rinzins des Schädels, die Craniotabes erreicht hat.

Betrachtet man das Schädelinnere von innen, so findet man lediglich am Hinterhaupte den Impressiones digitatae ähnliche Eindrücke, die jedesmal einem Gyru entsprechen und eine Verdünnung der Knochen-Substanz, einen Knochenschwund bedingen. Zuletzt berühren sich die dura mater und das Pericranium, wodurch im getrockneten Präparate die knöchernen Hüllen durch einfarbe, häutige Membranen durchbrochen erscheinen. Zuweilen sieht man in diesen, den getrockneten Fontanellen gleichenden Membranen noch einzelne weisse, undurchsichtige Punkte, die sich bei näherer Untersuchung als Reste der noch nicht ganz resorbirten Knöchernerde herausstellen. Elsässer hat in seiner bahnbrechenden Abhandlung „der weiche Hinterkopf“ eine Schädelskappe mit circa 30 Löchern abgebildet, was schon zu den exquisitesten Fällen gerechnet werden muss. Das Pericranium ist überall, wo es die Löcher überzieht, sowie in deren Umgebung undurchsichtig und verdichtet. Taf. VI. Fig. 4.

Der ganze Process des weichen Hinterkopfes lässt sich in zwei Acten zusammenfassen:

- 1) Die gewöhnliche, mangelhafte Phosphatlagerung in den äusseren Knochen-schichten des ganzen knöchernen Schädels und
- 2) Resorption der durch die Schwere des Gehirns gedrückten, erweichten Knochenparthien des Hinterkopfes.

An den Epiphysen der Röhrenknochen sind weitere charakteristische Merkmale zu beobachten. Auf einem Längsdurchschnitt durch den aufgetriebenen Gelenkkopf, z. B. des Oberschenkels, sieht man eine viel mächtigere Knorpelschicht als im Normalzustande Taf. VI. Fig. 1—3a und die Linie zwischen Knochen und Knorpel ist statt gerade sehr verschieden zackig und wellenförmig. Taf. VI. Fig. 1—3b. Die Spitzen der vom Knochen in den Knorpel sich erhebenden Wellen sind stark injicirt und markiren sich scharf von dem bläulichen Knorpel ab. Die mikroskopische und chemische Untersuchung der breiten, bläulichen Uebergangsschichte zwischen Knochen und Knorpel lehrt, dass wir es mit einem in der Verkalkung zurückgebliebenen Knochen zu thun haben, in welchem sich gar keine Knochenkörperchen und überhaupt nur geringe Spuren von Kalkablagerung finden.

An den Diaphysen der Röhrenknochen treten ebenfalls bedeutende Veränderungen auf. Das Periost ist beträchtlich verdickt und lässt sich nicht glatt vom Knochen abheben, sondern reisst immer einzelne an seiner Innenfläche haftende, poröse Knochenfragmente mit. Unmittelbar unter dem Periost finden sich breite, weissliche oder röthliche Schichten, an welchen man einen fein porösen, kieselartigen Bau erkennt.

Nach Virchow stehen die Balken dieser kieselartigen Masse als verkrochte Radien auf der Knochenfläche. Noch tiefer sieht man diese Radien durch eine erst weisse und dachere Linie von Rindenschicht, welche der Knochenoberfläche parallel ist, unterbrochen. Dann folgt eine neue Lage kieselartiger, röthlicher Masse mit stärkeren Radien, die wieder durch eine compactere Parallellage durchsetzt wird. So wiederholen sich diese Schichtungen verschied. oft, um werden,

je näher der Markhöhle, die Radien der spongösen Lage immer dicker und ihre Zwischenräume grösser und röther, während die Parallellagen compacter und fester werden.

Der rhachitische Röhrenknochen ist unmittelbar unter dem Periost am weichsten und porösesten und wird gegen das Centrum zu immer fester. Aus der Verdickung des Periostes und dem Weichbleiben der äusseren Schichten erklärt sich auch der sonderbare Vorgang der Infraktionen und die Unmöglichkeit, hierbei wirkliche Verschiebung der Bruchenden und Crepitation zu entdecken. Diese wären die wesentlichsten Angaben über die pathologische Anatomie der Knochenveränderung. Am ausführlichsten und gründlichsten werden dieselben von Virchow geschildert in dessen Archiv Bd. 5.

Die chemische Untersuchung rhachitischer Knochen hat stets eine bedeutende Verminderung des phosphorsäuren und kohlensäuren Kalkes ergeben, so dass die Knochenerde statt $\frac{2}{3}$ oft nur $\frac{1}{3}$ des getrockneten Knochens ausmacht. Im Harn hingegen findet man die Phosphate um das Drei- bis Fünffache vermehrt.

Man hat sich diese Zunahme der Phosphate im Harn und ihre Abnahme in den Knochen nicht zu denken, als ob in den Knochen schon deponirte Salze wieder gelöst und dann durch den Urin ausgeschieden würden. Die in den Knochen schon abgeschiedenen Salze bleiben in denselben, nur eine geringe Quantität mag in Folge der Resorption zunächst der Markhöhle wieder in den Kreislauf kommen — die neuen Vergrösserungen aber an Länge- und Dickendurchmesser erhalten keine Knochenerde mehr und die mit den Nahrungsmitteln eingeführten Kalksalze finden deshalb keine Verwendung im Organismus, sondern werden sogleich durch den Harn wieder ausgeschieden.

Warum die Ablagerung der Kalksalze in die Knochen mit einem Male total aufhört, ist noch in ein vollständiges Dunkel gehüllt, nur so viel ist gewiss, dass wir es mit keiner einfachen chemischen Wiederauflösung des schon fertigen Knochens durch eine Säure zu thun haben, indem sonst das Gewebe derselben an allen Stellen, an der Peripherie und im Centrum gleich arm an Knochenerde sein müsste, was durchaus nicht der Fall ist. Die der Markhöhle der Röhrenknochen näher liegenden Schichten sind viel compacter und salzreicher als die peripherischen.

Untersucht man das Sectat mehrjähriger Kinder, welche die Rhachitis überstanden haben, so findet man die Knochen noch mächtig gekrümmt, den Schädel gross, sein Dach verdickt und die einzelnen Knochen auffallend schwer an Gewicht. Alle die weiche, spongöse Knochenmasse, welche sich während der Rhachitis angesetzt hatte, ist zu dichter, compactem Knochengewebe geworden und es übersteigt diese nachträgliche Ossification an Härte noch die normale Knochenbeschaffenheit, weshalb man sie auch Sclerosis und in den exquisitesten Fällen sogar Eburnatis genannt hat.

In den übrigen Organen findet man keine constanten Veränderungen, nur die Lungen zeigen in allen Fällen von beträchtlicherer Thoraxrhachitis erworbene Atelectase und starken Bronchialcatarrh, wofür schon im Capitel der Lungenkrankheiten pag. 230 ausführlicher gesprochen wurde. Die Muskeln sind blass und welk und lassen an verschiedenen Stellen, namentlich auch am Herzen, beginnende Fett-

degeneration erkennen. Die Leber zeigt häufig einen beträchtlichen Reichthum an Fett.

Symptome.

Die Rachitis entwickelt sich meist ziemlich früh und zwar zuerst die des Kopfes, immer vor Schluss des ersten Lebensjahres, dann die der Rippen einige Wochen nach beginnender Schädelrachitis erkennbar, und zuletzt die der Extremitäten, des Beckens und der Wirbelsäule.

Man hat früher ein eigenes Vorläuferstadium angenommen und hiesu gestörte Verdauung, Säure der ersten Wege und überhaupt fehlerhafte Beschaffenheit der Excrete mit allgemeinem Unwohlsein gerechnet. Es muss hingegen erinnert werden, dass man vor Entdeckung des weichen Hinterkopfes durch Elsässer 1834 die Anfangszeit der Rachitis gar nicht gekannt hat, und dass nun die meisten Zeichen des Vorläuferstadiums weit in die Krankheit selbst hineinfallen.

Die Rachitis ist eine sichtbare und greifbare Krankheit, und es ist deshalb nöthig, die bei Lebzeiten sich ergebenden Veränderungen der einzelnen Körpertheile näher zu untersuchen.

A. Rachitis des Schädels.

Die Schädelrachitis mit ihrer eigenthümlichen Erscheinung des weichen Hinterkopfes ist eine Entdeckung Elsässer's. Vor Veröffentlichung der Elsässer'schen Arbeit hatte unbegreiflicher Weise kein Arzt eine Abtug von den so grossen und leicht zu unterscheidenden Veränderungen des Hinterhauptes. So sagt z. B. Neumann: Nie erweichen die Kopfknochen durch Rachitis, im Gegentheil, sie wachsen sogar oft auf Kosten anderer Körpertheile; Mioscher: Alle Knochen erweichen, nur der Kopf nicht, vielmehr entstehen an ihm anderweitige Veränderungen, sein Wachsthum nimmt nämlich über die Maassen zu; Schuitzer und Wolff: Die Kopfknochen erweichen nie, sie wachsen sogar, scheinbar auf Kosten des Wachsthums aller anderen Theile.

Ueber die allgemeinen Veränderungen am rachitischen Schädel ist Folgendes zu berichten:

Die grosse Fontanelle, welche sich bei einem normalen Kinde spätestens bis zum Schlusse des zweiten Jahres schliesst, bleibt hier 3—4 Jahre offen und kann sogar bis zu's sechsten knorpelige Textur behalten. Die Pfeilnaht, die wir sonst schon zu Ende des ersten Jahres geschlossen finden, ist oft im dritten Jahre noch nicht verwachsen. Die Kronennaht schliesst statt vier Monate zwei Jahre, und die Lambdanaht statt drei Monate 1 1/4 Jahr geöffnet. Ruffz hat genaue Messungen des Schädels angestellt; die Längen- und Querdurchmesser zeigten nur geringe Abweichungen vom Normalen, allein das eigenthümliche, eckige Hervorstehen der Stirn- und Scheitelbeinhöcker rührt dem Schädelgewölbe die gewöhnliche Kugelform und gibt ihm eine viereckige, unbeholfene Gestalt (*tête carrée*).

Längs der Kronennaht bildet sich auch Ablauf der Krankheit gewöhnlich eine Vertiefung, die dem Schädeldache, von oben betrachtet, die Form eines Flaschenkürbisses verleiht und von einer Hypertrophie der Stirnbeine herrührt. Es entstehen überhaupt durch die Rachitis mannigfache Gruben und Höcker, die der Cranioscopie ein weites Feld der Discussion eröffnen können.

Der weiche Hinterkopf kommt schon vom dritten Lebensmonat an vor und wird nur selten bei Kindern, welche das zweite Jahr überstanden haben, mehr aufgefunden. Constante Vorboten lassen sich nicht angeben. Es haben wohl viele Kinder einen Bronchial- oder Darmcatarrh vorher durchgemacht, andere aber erfreuen sich bis zum Eintritt der Craniotomie des besten Wohlbefindens, sind gut genährt, frisch und munter.

Die Krankheit beginnt mit profusen Kopfschweissen, die oft das ganze Kissen durchnässen, und zugleich macht sich eine gradatim zunehmende, nächtliche Unruhe bemerklich. Kinder, die sonst mehrere Stunden ununterbrochen im Schlafe lagen, wachen nun alle Viertelstunden mit Weinen, Reiben des Kopfes und Bohren in das Kissen auf. Eine Lageveränderung des Kopfes beruhigt sie schnell, doch immer nur auf kurze Zeit. Das beständige Reiben verursacht eine complete Kahlheit des ganzen Hinterhauptes.

Nach einiger Zeit nimmt auch bei Tage die Weinerlichkeit und Unzufriedenheit zu, und aufmerksame Kindmägde beobachten bald, dass das ganze Unbehagen sich nach den verschiedenen Stellungen des Kopfes richtet. Die Kinder schreien nämlich unter Reiben und Bohren mit dem Kopfe beständig, wenn man sie horizontal auf beide Arme stützt, um sie zu füttern oder einzuschlafen, werden hingegen schnell wieder ruhig, wenn man sie aufhebt und das Hinterhaupt von allem Drucke befreit. Sie lassen sich dann mit grossem Wohlbehagen füttern und ziehen es auch vor, das Gesicht auf die Schulter der Wärterin gestützt, mit freiem Hinterhaupte einzuschlafen. Die meisten Kinder werden in dieser Lage sogleich ruhig; etwas ältere drehen sich in ihrem Bettchen gerate auf den Bauch und bohren mit der Stirne in's Kissen.

Bei näherer Beachtigung des Schädels fällt der schwache Haarwuchs überhaupt und die Kahlheit des Hinterhauptes insbesondere sogleich auf. Das Hinterhaupt ist meist abgeflacht und die Tubera sind schärfer als gewöhnlich. Zum Behufe einer genaueren, manuellen Untersuchung nimmt man das Hinterhaupt auf beide Hände und beginnt am mit den Fingerspitzen zu tasten.

Ich untersuche die ganze Hinterhauptsgegend vom Lambdawinkel bis zu den Zitzenfortsätzen mit allmählicher Biegung der Fingerspitzen zweimal. Das erste Mal darf der Vorsicht halber nur ein ganz gelinder Druck mit flachem Finger ausgeübt werden, um, wenn grosse, sehr weiche Stellen sich vorfinden, keine zu grosse Gewalt auf das ungeschützte Gehirn auszuüben. Das zweite Mal beuge ich die Finger etwas mehr und drücke um doch auf alle einzelnen Stellen des ganzen Occiput und der Parietalknochen. Durch dieses Verfahren wird auch die kleinste linsengrosse Verdünnung und Eindrückbarkeit sicher und rasch entdeckt.

Die eindrückbaren Stellen finden sich am häufigsten, linsens- bis bohnergross, in der Nähe der Lambda- und des hinteren Theile der Pfeilnaht vor und unterbrechen zweifeln die Contur der Naht. Nur die Protuberantia externa oss. occipit. bleibt immer verschont. Die erkrankten Knochenparthien sind elastisch, lassen ihre ursprüngliche Convexität in eine ebenso grosse Concavität verwechseln und fühlen sich wie ein Kartenblatt auf hohler Unterlage oder wie ein aufgeblasenes,

getrocknete Schwelzablass an. Der Schmerz ist bei einer nicht zu vehementen Untersuchung von keiner Bedeutung.

Als häufigste Complication sind Krämpfe der verschiedensten Muskelpartien zu erwähnen. Am häufigsten und gefährlichsten ist der Spasmus glottidis, dessen tatsächlicher, jedoch keineswegs physiologisch erklärter Zusammenhang mit Craniotabes schon pag. 251 ausführlich erörtert wurde.

Außer am Schäfeldache macht die Rachitis sich hauptsächlich noch an den Kieferknochen bemerkbar. Die Zähne bleiben im Wachsen zurück, so dass die Kinder zwölf und sechzehn Monate alt werden, bis die ersten Schneidezähne durchbrechen. Nachdem dieselben endlich zum Vorschein gekommen, werden sie abhald wieder schwarz und zerbröckeln wegen Mangel an Schmelz. Fehlt der Schmelz vollständig, so verschwindet auch der Zahn bis zum Niveau des Zahnfleisches, zuweilen fehlt er nur an der Spitze und es begrenzt sich um die Schwärze da, wo der Schmelz anfängt. Die physiologischen fünf Zahnperioden (pag. 11) haben die rachitischen Kinder niemals gehörig eín. Am Schlusse einer jeden Zahnperiode ist die Zahl der Zähne bekanntlich eine gerade. Wenn demnach ein Kind länger als acht Wochen auf einer ungeraden Zahl von Milchkämen stehen bleibt, so kann man mit Bestimmtheit eine Unterbrechung der begrenzten Zahnperiode annehmen, und diesen Befund bei Abwesenheit anderer Ursachen, chronischer Darmcatarrhe, fieberhafter Krankheiten etc., auf Rachitis beziehen. Zur Zeit der zweiten Dentition ist die Rachitis längst abgeklungen, weshalb an den bleibenden Zähnen dergleichen Erscheinungen nicht beobachtet werden.

Das stöbereise Fehlen des Zahnschmelzes bei älteren Kindern soll nach Angabe mehrerer Autoren vom Gebrauche der Quackmilchpräparate, namentlich des Calomel, herrühren. Sollte sich in Wirklichkeit statistisch nachweisen lassen, dass die Mehrzahl dieser Kinder Calomel bekommen haben, so müsste in Zukunft die Indication desselben in engerer Grenzen gezogen werden.

B. Rachitis der Rippen.

Schon Glisson und seine Zeitgenossen erkannten in der Hühnerbrust richtig den rachitischen Process, und die späteren Autoren beschäftigten sich viel mit ihrer Entstehungsweise, so dass wir viel ausführlichere Angaben über die Thoraxrachitis als über Craniotabes haben.

Sie stellt sich gewöhnlich etwas später als der weiche Hinterkopf ein und es erkranken an ihr noch viele Kinder, die letzterem glücklich entgangen sind und schon aufrecht getragen werden. Deutlich greifbare Veränderungen beobachtet man selten bei Kindern unter sechs Monaten, während man die Craniotabes oft schon im dritten Lebensmonat nachweisen kann. Wenn einzelne Compendien lehren, die Hühnerbrust entstünde vom ersten bis vierten Jahre, so ist das so zu verstehen, dass man auch noch vierjährige Kinder mit diesem Uebel an Gesicht bekommt. Nach vollendeter erster Dentition tritt aber bei einem bisher intacten Kinde keine Rachitis mehr auf.

Das erste Symptom der Rachitis der Rippen ist ein deutlicher Schmerz bei Berührung oder Druck auf die Thoraxwandung. Die Wärtfrauen klagen häufig: „Das Kind schreit jedesmal, wenn wir es

nach noch so sanft aufheben.² Man gibt gewöhnlich von ärztlicher Seite auf solche Angaben nicht viel, weil die meisten derselben auf Vorurtheilen und unrichtigen Anschauungen beruhen. Die Häufigkeit dieser Klagen fiel mir jedoch schon vor langer Zeit auf und ich überzeugte mich selbst zu wiederholten Malen, dass viele Kinder zwischen dem fünften und zehnten Lebensmonate plötzlich schmerzliche Schreie ausstossen, wenn man sie mit heissen Händen unter die Achsel greift und sanft aufhebt. Sobald man sie hinlegt, beruhigen sie sich schnell wieder. Man braucht sie übrigens gar nicht aufzuheben, ein leichter Fingerdruck in die Achselhöhle oder die Seitenfläche des Thorax überlässt genügt zur Erzeugung des Schmerzes. Hebt man ein solches Kind, mit einer Hand den Hals, mit der andern das Becken stützend, sanft auf, so bleibt es ruhig, als ob es auf dem Kissen liege, und gestattet einen schmerzlosen Wechsel seiner Unterlage.

Zu dieser Zeit ist am Sternalende der Rippen, auf der Grenze zwischen Rippenknorpel und Knochen, noch gar keine oder nur eine unbedeutende Anschwellung zu fühlen. Erst nach einigen Wochen treten die Sternalenden der Rippen kuglig abgerundet hervor und sind dem Finger, später auch dem Auge deutlich erkennbar. So entstehen zu beiden Seiten des Thorax am Ende der Rückenknorpel zwei regelmässige Reihen von Knöpfen, der sog. rachitische Rosenkranz. Die ausserlich schon deutlich fühlbaren Knöpfe ragen an der Innenfläche der Rippen als noch viel grössere, eckige Knoten in den Brustraum hinein.

Haben diese Anschwellungen einmal längere Zeit bestanden, so erfolgt in allen Theilen eine Missbildung des Thorax. Das ebenfalls weich werdende Sternum entfernt sich mehr und mehr von der Wirbelsäule und wölbt sich nach aussen, der Schwertfortsatz wird sehr beweglich, steht nach aussen und begrenzt eine tiefe Grube im *Scrobulo cordis*. Bei den höchsten Graden der Hühnerbrust gehen die Rippenknorpel unmittelbar hinter dem Brustbein gerade nach hinten, so dass sie verlängert die Querfortsätze der Wirbelsäule treffen würden, und die Rippen bilden an ihrem vorderen Ende statt einer Convexität eine Concavität.

Der Durchmesser des Thorax wird kleiner von einer Seite zur andern und grösser von vorne nach hinten, wie aus einem schematischen Durchschnitt Taf. V. Fig. 2 erhellt. Der Querschnitt des Thorax nimmt die Gestalt einer Birne, deren Stiel in das Sternum gerichtet wird, an. Der rachitische Rosenkranz findet sich hauptsächlich von der zweiten bis achten Rippe, die falschen Rippen werden rechts durch die Leber, links durch den Magen und die Milz mächtig herausgedrückt. Der Bauch ist in Folge des constanten Meteorismus und einer Verkürzung und Krümmung der Wirbelsäule zu einer grossen Kugel angeschwollen, auf welcher der Thorax gleich einer dreiseitigen abgestumpften Pyramide, eine Kante gerade nach vorne gerichtet, aufsteht. Die Wirbelsäule krümmt sich in sitzender Stellung am meisten und es tritt deshalb auch in dieser Position die Kugelform des Abdomens am auffälligsten hervor. Legt man diese Kinder auf den Bauch und hebt sie in dieser Lage mit zwei Händen auf, so verschwindet die Krümmung nach aussen vollständig und die Wirbelsäule nimmt wieder ihre normale Form an. Bei Vernachlässigung und mehrjährigem Be-

stehen der Blachitis mit endlich auch bestehende Bogens-, niemals Angularverkrümmung des Brustwirbel nach hinten und schwärts ein.

Die Entstehung der Hühnerbrust erklärt sich theils durch den Druck der ausseren Luft auf die weichen Rippen, theils durch den Zug des Diaphragmas, dem dieselben als Insertion dienen. Nach Verlust der gehörigen Festigkeit können die erkrankten Rippen den fortwährenden Zerrungen nach innen nicht mehr widerstehen.

Durch die Rhachitis des Thorax entsteht also: 1) eine Veränderung der Form der Rippen, und 2) was als das wichtigere zu betrachten ist, ein Stillstand im Längenwachsthum und somit unabweislich eine Verkleinerung des Brustraumes. Die Erkrankung der Lungen, die erworbenste Atelektase hat hierin ihren triftigen Grund, wie solches schon ausführlich pag. 253 erörtert worden ist.

Die Prognose richtet sich ausschliesslich nach der Erkrankung der Lungen. Wenn ein grosser Theil derselben atelectatisch, ungesund geworden, so genügt natürlich ein unbedeutender Catarrh im respirirenden, normalen Gewebe, die grösste Athemnoth, Erstickungszufälle und den Tod herbeizuführen. In der That ist auch in diesem Umstande die gewöhnlichste Todesursache rhachitischer Kinder, wie schon Romberg, Guersant und Andere bemerkt haben, zu suchen.

C. Rhachitis des Beckens und der Extremitäten.

Das Becken verkrümmt sich erst, wenn das rhachitische Kind gehen kann, und zwar entweder im Folge einer Scoliosis oder einer Ungleichheit des unteren Extremitäten nach Art der Beckenverstellung bei Coxarthrosen. Die wichtigsten Consequenzen dieser Veränderung für das weibliche Geschlecht finden in der Geburtschilfe eine genügende Erörterung. —

Die Rhachitis der Extremitäten wird zuerst an einer Anschwellung der Epiphysen des Radius und der Ulna am Handgelenke erkannt. Die Anfangszeit fällt etwas später als die der Rippen, in die letzten Monate des ersten Lebensjahres. Den Grad der rhachitischen Erkrankung erkennt man immer am deutlichsten am Handgelenk, weil hier die Epiphysen im Normalenstand fast gar nicht prominiren und bei ihrer oberflächlichen Lagerung leicht untersucht werden können.

In der Leiche findet man die unteren Extremitäten ebenso stark rhachitisch als die oberen, da aber hier auch bei gesunden Kindern am Knie- und Fingergelenk bedeutende Verdickungen vorkommen, so vermischt die Rhachitis keine so auffallende Formveränderung als am Handgelenke. Wenn es freilich einmal zu Krümmungen und Krünkungen gekommen, so erkennt man die Rhachitis der unteren Extremitäten schon am Gange, ohne die Kinder vorher entkleiden zu müssen. Die Knöpfe an den Enden der rhachitischen Röhrenknochen stellen eigentlich deren Längenwachsthum vor. Es setzt sich an den Epiphysen immer neuer Knorpel an, die Verknöcherung der neu angesetzten Masse kommt aber nicht zu Stande und so wird der weiche Knorpel durch den Zug der Muskeln und den Druck, welchen die Knochen auf einander ausüben, breit gedrückt. Die Kolbenform wird in der Folge immer ausgesprochen, indem sich nun wieder neuer Knorpel in der neu gegebenen Richtung ansetzt.

Aus diesem Aufhören des Längenwachsthums resultirt ein ver-

hältnismässiges Kleinbleiben aller Röhrenknochen. Dasselbe gilt sich am deutlichsten an den Rippen zu erkennen und hat eine Obsolescenz grösserer Lungenpartien, die erworbene Atelektase, zur Folge. Die Verkürzung der unteren Extremitäten ist nach Jahre lang nach überstandener Rachitis bemerkbar, und solche Kinder sind immer kleiner als ihre gesunden Altersgenossen.

Die einfachen Verkrümmungen gleichen sich im Laufe der Jahre wieder aus, die Hühnerbrust kann sich vollständig wieder ausbilden und die krummen Sägelbeine können wieder nahezu gerade werden. Die Infractioren aber hinterlassen eine lebenslängliche Formveränderung.

Was die Functionen der rachitischen Extremitäten betrifft, so weichen dieselben sehr zurück. Solche Kinder lernen erst im zweiten oder dritten Lebensjahre stehen und noch später laufen. Zuweilen kommt es vor, dass Kinder, welche schon allein stehen konnten, die Rachitis noch acquiriren. Ihre Beinchen sind dann nicht mehr im Stande, die Körperlast zu tragen, und solche Patienten nehmen dann erst nach vielen Monaten ihre Geh- und Stüchversuche wieder auf.

Die Rachitis ist neben der einzige Krankheit, welche die Kinder so langsam auf die Beine kommen lässt. Mögen die Kinder im ersten Lebensjahre auch noch so kränklich gewesen sein, sobald sie sich einmal erholt haben und nicht rachitisch geworden sind, was freilich sehr häufig sich ereignet, fangen sie dennoch spätestens mit achtzehn Monaten an zu stehen.

Die Entstehung der Infractioren konnte ich einmal genau beobachten. Ein vier Monate altes Kind bekam Convulsionen, ich untersuchte das Skelet genau und fand die Röhrenknochen gerade, jedoch einen rachitischen Rosenkranz und am Handgelenke angeschwollene Epiphysen. Nachdem sich die Convulsionen in der Nacht gesteigert hatten, waren am folgenden Tage ein Vorderarm und ein Unterschenkel, beide am unteren Dritttheil, in einen stumpfen Winkel geknickt, die Umgebung etwas geschwollen und äusserst schmerzhaft. Die Bruchenden crepürten natürlich nicht, waren jedoch in geringem Grad beweglich. Die Bezeichnung „Bruchenden“ passt streng genommen hier nicht, indem gar keine vollständige Continuitätstrennung, sondern nur eine Knickung zu Stande gekommen ist.

So viel von den Symptomen, welche durch die Veränderung der Knochen bedingt werden. Ausser diesen besonders charakteristischen Zeichen finden sich aber auch noch andere nicht minder constante in anderen Organen. Mit dem Erscheinen der Rachitis oder einige Zeit nachher treten regelmässig heftige Kopf-, dann allgemeine Schweißausbrüche, in Folge deren mehrfache Hautkrankheiten sich entwickeln. Es bilden sich wirkliche Sudamina, oder noch häufiger die sog. Sudamina rubra, ganz kleine, trübe Bläschen mit rothem Hofe, welche so dicht stehen, dass oft der ganze Rumpf und die Beugeschläge der Extremitäten geröthet und feinhöckerig erscheint. Später, wenn die Kinder anfangen abzunehmen, erblasst die Haut, bedeckt sich mit einem kleinartigen, squamösen Exanthem und die Schweißsecretion stirbt fast vollständig.

Die Bänderapparate, namentlich das Kapselband des Hüftgelenkes, sind ausserordentlich erschlafft, so dass die Kinder leicht ihre Füße im Gesicht bringen können, und mit besonderer Vorliebe die Zehen in den Mund nehmen.

Im Bereich der Respirationsorgane finden sich sehr häufig die Glottiskrämpfe, deren schon bei der Craniotabes gedacht wurde, und constant Bronchialcatarrhe, welche bei zunehmender Caradification einzelner Lungenpartien sich ebenfalls beträchtlich steigern.

Die Verdauung kann während der ganzen Krankheit sehr wohl intact bleiben: stellen sich aber Diarrhöen ein, so verschlimmert sich sowohl der Knochencrocess als das Allgemeinbefinden in bedenklicher Weise. Es ist eine merkwürdige Erscheinung, dass kleine, hochgradig rachitische Kinder mit verminderter Esulust dennoch den Lohrthran vertragen und während dessen Anwendung sogar eine bessere Verdauung bekommen.

Noch einige Worte über den Zusammenhang unserer Krankheit mit Tuberculose und Scrofulose. Man pflegte früher die Rachitis „die Scrofulose der Knochen“ zu nennen und betrachtete sie als eine der vielen Localisationen der scrofulösen Diacrasie. Erst Ruff bewies durch zwanzig Krankengeschichten und Sectionen rachitischer Kinder, dass die Mehrzahl derselben gar nicht scrofulös war, und seit jener Zeit lernte man mehr und mehr die Rachitis als eine selbständige Allgemeinerkrankung betrachten.

Sie ist nach meinen mannigfachen Beobachtungen an vielen Hunderten von Fällen eine ganz unabhängige Krankheit, die man in einem gewissen Alter und unter gewissen Bedingungen fast willkürlich an jedem Kinde, zu einem mehr, an anderen weniger hervorrufen kann. Scrofulöse Kinder acquiriren sie nicht öfter als gesunde, und wenn in München nur selten in einem Individuum Rachitis und Scrofulosis vereint vorkommen, so ist das ein Beweis, dass die Mehrzahl der Kinder dieses Alters nicht scrofulös ist.

Aetiologie.

Ueber die Ursachen der Rachitis existiren auffallend wenig sichere Daten. Bei einer grösseren Zahl von Kranken ist die Erblichkeit nicht zu verkennen. Ich kenne mehrere Familien, deren Kinder bei aller möglichen Sorgfalt und rationellen Prophylaxis stets in einem gewissen Alter rachitisch werden und Jahre lang es bleiben. Vater und Mutter zeigen gewöhnlich die eigenthümliche rachitische Schädelform mit den stark prominirenden Stirn- und Seitenbeinhöckern. Elsäasser und Andere führten ebenfalls viele sichere Beispiele hierfür an. Von Seite des Vaters ist mir schon öfters Syphilis, die jedoch längst abgelaufen war, gestanden worden. Vielleicht kann auf diese Weise die Rachitis mancher Kinder aus der besitzenden Classe erklärt werden.

In anderen Fällen sieht man dieselbe auf acute Krankheiten, Masern, Pneumonie, Diarrhöe etc. schnell und mit Bestimmtheit sich entwickeln.

Von unseren Ursachen lässt sich nur eine einzige mit Bestimmtheit behaupten, nämlich der Mangel an frischer Luft, der von allen Beobachtern einstimmig als häufigstes Causalmoment angeführt wird. Hieraus erklärt sich auch, warum die Rachitis am häufigsten und exquisitesten im Frühling, am seltensten im Herbst beobachtet wird.

Der lange Aufenthalt im geschlossenen, meist schlecht ventilirten Zimmer zur Winterzeit hat sie veranlasst, der Aufenthalt unter freiem

Humel während des Sommers sie wieder geheilt. Aus gleichem Grunde kommt die Rachitis in nördlichen Climates fast gar nicht vor. Es muss jedoch bemerkt werden, dass auch diese Ausnahmen keine allgemeine Geltung haben. In meinem jetzigen Wohnorte Dorpat kommt Rachitis auffallend selten vor und zeigt sich nur in den mildesten Formen, während sie in München, das sehr Breitengrade nördlicher liegt, zu den häufigsten Vorkommnissen zählt.

Prognose.

Die Rachitis als einfache Knochenveränderung ist niemals gefährlich und kommt in vielen Fällen nach Beendigung der ersten Dentition zum Stillstand und schliesslich zur Heilung. Ihre Complicationen aber sind höchst pernicieös und durch sie wird ein grosser Theil der rachitischen Kinder hinweggerafft.

Schon gleich im Beginne der Rachitis bei kaum bemerkbarem, weichem Hinterkopfe stellt sich häufig der Spasmus glottidis ein und stiftet die Mehrzahl der davon befallenen Kinder. Bei zunehmender Thoraxrachitis ist die Verödung einzelner Lungenlappen unvermeidlich, indem die Lungen sich vergrössern, der Brustkorb aber sich nicht erweitert, sondern durch das Hinwegrücken des rachitischen Rosenkranzes vielmehr kleiner wird. Wenn diese Verödung oder Carnification oder erworbene Atelektase grösseren Umfang gewinnt, so entsteht beträchtliche Athemnoth, und eine leichte, catarrhalische Erkrankung des respirirenden, gesunden Gewebes führt fast regelmässig zum Tode.

Die Krümmungen und Verdickungen der Röhrenknochen endlich können bleibende Deformitäten, Verkürzung einer oder der anderen Extremität, Beckenverengerung und Verschiebung und beträchtliche Funktionsstörungen verursachen.

Behandlung.

Vor der Einführung des Leberthranes in die Therapie war eine Unzahl von Mitteln in Gebrauch. Man empfahl vornehmlich Cort. Aurant., Rad. Gentian. rubr., Herb. Absinth., Rassa lig. Quassiac, Calam. aromat., China, Colombo und Eisenpräparate. Ausserlich wurden Bäder, Waschungen und Umschuerungen mit allen möglichen aromatischen Kräutern und deren Präparaten angewendet. Später kam, hauptsächlich von Peller und Wendt angeregt, die Färberröthe in Gebrauch, deren rother Farbstoff bekanntlich in den Knochen theilweise abgelagert wird. Eine directe Einwirkung auf den Knochen ist somit nicht abzuleugnen, allein die Veränderung der Farbe bringt keine Zunahme des Kalkes mit sich.

Meissner glaubte bemerkt zu haben, dass die Vaccinatio die Fortschritte der Rachitis aufhalte, was Ruff jedoch entschieden und zwar mit Recht verneinte. De la Fontaine meinte dasselbe von der Krätze!

Andere kamen auf den Gedanken, es fehle wirklich an Material zur Knochenbildung und versuchten die Einführung desselben durch den Darmkanal. In dieser Richtung machte Wuxor mit Phosphorsäure Versuche, die ganz erfolglos blieben, und in neuerer Zeit machte Bencke den phosphorsauren Kalk als Antirachiticum geltend. Die Berichte über die jetzt allenthalben damit angestellten Experimente

lauten keineswegs günstig, und man ist jetzt ziemlich allgemein davon zurückgekommen.

Im Jahre 1824 endlich wurde von Schütze, Schenk und Tourtual in Deutschland auf den Leberthran aufmerksam gemacht, während die Franzosen ihn erst 5 Jahre später durch Bréguissan, dem ein Laie aus Holland darüber berichtete, kennen lernten. Seit dieser Zeit haben sich die günstigen Berichte über das Öl, jeete, Asell, in einer Weise gehäuft, dass alle bisher angeführten Mittel dadurch verdrängt worden sind.

Ueber den eigentlich wirksamen Stoff im Leberthran ist schon viel gestritten worden, die Einen glauben, er wirke einfach als Respirationsmittel durch seinen Fettgehalt, Andere suchen seine Wirksamkeit in den Spuren von Jod und Brom, Andere endlich in seinen Fettsäuren und den Beimischungen fäulender Leberbestandtheile, welche in jedem Leberthran sich finden.

Da die Versuche mit reinem Fette, sowie auch die mit kleinen Dosen Jod oder Brom nicht den gewünschten Erfolg hatten, so scheint verändernd die letzte Ansicht die stichhaltigste zu bleiben.

Man gibt den braunen Leberthran am besten pur, in steigender Dosis, zuerst nur einige Tropfen, dann kaffeeleffel-, später esslöffelweise, 1—2 Mal im Tage. Die meisten Kinder gewöhnen sich in wenigen Tagen so gut daran, dass sie ihn als Leckerbissen betrachten und mehrere Esslöffel voll auf einmal anstricken, wenn sie über das Leberthranfläschchen kommen können. Der Genuss des Thranes allein heilt die Rhachitis sogar bei sonst ungünstigen Verhältnissen. Durch möglichste Verbesserung der Wohnung und Nahrung wird die Cur jedenfalls beschleunigt und gesichert. Es ist hierbei Folgendes zu bemerken.

Frische, reine Luft ist vor Allem notwendig. Kinder in feuchten, dämpften Wohnungen, welche im Winter viele Wochen lang nicht gelüftet werden, acquiriren die Rhachitis am schnellsten und stärksten, und auf diese Individuen hat auch der Leberthran nur eine langsame, nicht constante Wirkung.

Als zweites Adjvans ist eine sorgsame Hautpflege anzuführen. Die Kinder müssen täglich ein Bad mit aromatischen Kräutern bekommen und die gekrümmten Glieder werden ausserdem täglich mit Braintwein gewaschen.

Auch kleine Kinder mit Craniotabes vertragen meistens den Leberthran gut, die Ursache derselben wird am besten durch kalte Waschungen des Kopfes, welche alle 2—3 Stunden repetirt werden, beseitigt. Das von Elsässer angegebene Kopfkissen, in dem ein birnförmiges Loch mit nach unten gerichteter Spitze sich befindet, gewährt manchen Vortheil. Wegen der starken Transpiration sollen rheumatische Kinder niemals auf Federn, sondern immer auf Rosshaaren, Stroh oder Segras liegen.

Kinder, welche noch an der Brust sind, sollen möglichst lange fortgestillt, nebenbei aber mit Brei gefüttert werden. Die Kuhmilch ist für Kinder bis zu drei Jahren das beste, durch nichts zu ersetzende Nahrungsmittel und muss so reichlich wie zur immer möglich gegeben werden.

Eine orthopädische Behandlung lässt sich während der Krankheit

nicht durchführen, erst nach Ablauf derselben können passende Maschinen und Verbands, wie sie jetzt von den Specialisten in grösster Mannigfaltigkeit gefertigt werden, in Anwendung kommen.

Grössere rhabditierte Diffornitäten können zwischen noch bei Erwachsenen durch richtig berechnete Auslegung von Knochenköllen und Anlegung eines passenden Verbandes beseitigt werden.

2) Tuberculosis und Scrofulosis.

Ueber den Unterschied zwischen Tuberculosis und Scrofulosis wurde schon viel debattirt. Die Einen betrachten diese beiden Zustände als vollkommen identisch, die Andern finden wieder, dass gar keine Ähnlichkeit zwischen ihnen besteht.

Es kommt nur darauf an, von welchem Standpunkte aus man den Vergleich anstellt. Vom pathologisch-anatomischen Standpunkte aus kann mit Bestimmtheit behauptet werden, dass die Coxarthrose und die scrofulösen Gelenkentzündungen, der Wandlora, die Spodilytis, die Erkrankungen der Conjunctiva und Cornea, die Ovarien und die scrofulösen Hautkrankheiten gewöhnlich auf keiner Tuberculosis der ergriffenen Theile beruhen. Der Kliniker aber sieht viele hundert, ja tausendmal, dass die eben genannten Erkrankungen 1) keineswegs locale sind, sondern theils alternirend, theils an verschiedenen Stellen zugleich auftretend vorkommen, 2) dass solche Kinder immer von tuberculösen Eltern stammen und 3) dass sie nach Ablauf der scrofulösen Affectionen, welche gewöhnlich gegen die Zeit der Pubertät hin verschwinden, mehr oder weniger deutlich tuberculös werden.

Der Kliniker also kann nicht anders, er muss einen innigen Zusammenhang zwischen den beiden Dyskrasien annehmen. Der pathologische Anatom aber, der mehr mit den fertigen Krankheitsproducten als deren Entstehung sich abgibt, kann sehr wohl die entstandenen Veränderungen gesondert betrachten. Doch weist auch die pathologische Anatomie in sehr vielen Fällen den inneren Zusammenhang nach. Man findet nämlich fast bei allen Kinderleichen, welche scrofulöse Veränderungen, Knochen- oder Lymphdrüsenkrankung zeigen, auch irgendwo im Inneren, gewöhnlich in den Bronchialdrüsen, einen oder einige grosse gelbe käsige Tuberkel, welche als die Wurzel, als der Herd der mehrfachen, peripherischen, scrofulösen Erkrankungen anzusehen sind.

Nach dieser Constatirung des Zusammenhanges können wir nun übergehen zur Betrachtung A) der Tuberculosis und B) der Scrofulosis.

A) Tuberculosa Dyskrasia.

Da der ganzen Anlage dieses Lehrbuches entsprechend die Krankheiten nach den einzelnen Organen und nicht nach dem Wesen der pathologischen Veränderungen zusammengefasst worden sind, so ist auch der Tuberculosis schon mehrfach gedacht worden. Wir können deshalb, um Wiederholungen zu vermeiden, auf frühere Abschnitte verweisen. Die Tuberculosis der Lungen findet sich pag. 263, die der Bronchialdrüsen pag. 264, die des Gehirnes pag. 305, die der Gehörorgane pag. 394, die der Meibomdrüsen pag. 204, die der Nieren

pag. 404, die tuberculöse Peritonitis pag. 199 abgehandelt. Es erläutert uns mehr die Beschreibung der allgemeinen Symptome der Tuberculosis und ihrer Artologie. Die Behandlung kann schließlich mit der der Scrophulosis zusammengefasst werden. Die allgemeinen Anschauungen des Tuberkels aber, seine Entstehung und Rückbildung, werden in Ziemsen's Handbuch der spec. Pathologie Band V von Ruhn und Rindfleisch so klar und durchsichtig abgehandelt, dass wir auf dieselben lediglich zu verweisen brauchen.

Allgemeine Symptome der Tuberculosis.

Wenn die Tuberculosis einzelne Organe besonders intensiv befallt, so treten natürlich die Functionstörungen derselben deutlicher hervor und verdrängen die der Dyskrasie eigenthümlichen Symptome, wie dies besonders häufig bei Tuberculose der Lungen, des Gehirnes und des Peritoneums beobachtet wird. Sehr gewöhnlich aber, wenn dieses Prävaliren eines einzelnen erkrankten Organes weniger ausgeprägt ist, treten folgende, ziemlich constante, allgemeine Symptome auf.

Die Gesichtsfarbe ist im Allgemeinen blass, fahl und anämisch, die Wangen zeigen häufig eine einseitige circumscripte Röthe, welche nach wenigen Stunden wieder schwindet. Wenn grosse Circulationsstörungen in den Lungen oder sehr voluminöse Bronchialdrüsen ausgegen sind, so kann auch Cyanose entstehen, worauf gewöhnlich bald das Ende erfolgt. Der Gesichtsausdruck tuberculöser Kinder ist meist verhältnissmässig traurig, die trägen Bewegungen der Augenlider und des Bulbus, dessen Sclera entschieden bläulich wird, verleihen ihm etwas überschwängliches.

Das Fieber, bestehend in Erhöhung der Hauttemperatur und beschleunigten Pulse, ist ein constantes Symptom bei allgemeiner Tuberculose. Man muss unterscheiden zwischen der gewöhnlichen, oft exacerbirten Gefässerregung der chronisch Tuberculösen und zwischen dem heftigen Fieber, das im letzten Stadium sich einstellt und bis zum Tode währt. Alle tuberculösen Kinder haben oft, namentlich gegen Abend, heisse trockne Stirne und Hände, verstopften Darm und eine allgemeine Erhöhung der Hauttemperatur, nach einigen Stunden aber verschwinden diese Symptome sämmtlich und kehren oft Wochen lang nicht wieder. Bei diesen vorübergehenden Gefässerregungen leidet die Ernährung der Kinder nicht wesentlich und sie können auch vollständig sistiren, wenn keine neuen tuberculösen Inanthe eintreten.

Ganz anders verhält sich das heftige Fieber. Der Puls, anfangs hart, später klein und leicht zu unterdrücken, beschleunigt sich hierbei bis zu 150 und mehr Schlägen, jedes Abend tritt eine Exacerbation ein, niemals aber mehr ein vollständig fieberloser Zustand. Dieses Fieber kann Monate und selbst Jahre lang dauern, ist im letzteren Falle natürlich weniger intensiv, führt eine Abmagerung bis zum Skelet herbei und verlässt die Kinder nicht mehr bis zum Tode. Dem Gefühle nach steigt die Hauttemperatur gegen das Ende zu nicht mehr im normalen Verhältnisse zur Pulsbeschleunigung, sondern wirkt vielmehr zu den Prominenzien unter die normale. Das Thermometer zeigt aber hohe Temperaturen bis zum letalen Ausgange.

Am Anfang der Tuberculose, oder wenn das kranke Kind noch

nicht lange genug beobachtet wird, kann diese Fieber leicht zu Verwechslungen Veranlassung geben. Die abendlichen Exacerbationen können eine Intermission simuliren, welche Täuschung durch den mangelhaften Erfolg grösserer Gaben Chinin leicht aufgeklärt wird. Zweifeln schwankt die Diagnose mehrere Wochen lang zwischen acuter Tuberculosis und Typhus, was bei Kindern um so leichter möglich ist, als der Kindertyphus bei weitem weniger ausgesprochene Symptome hat, wie der der Erwachsenen. Sind die tuberculösen Lungensymptome etwas vorherrschender, so ist man auch häufig im Zweifel, ob nicht eine abnorm verlaufende Pneumonie das anhaltende Fieber unterhalten könnte.

Die Ernährung leidet bei allen tuberculösen Kindern beträchtlich und es tritt eine erschreckende Abmagerung ein, welche jedoch diagnostisch von geringerer Bedeutung ist, da alle fieberhaften, länger dauernden Kinderkrankheiten dieselbe ebenfalls veranlassen. Nur die acute Tuberculosis kleiner Kinder unter einem Jahre macht hiervon eine Ausnahme. Es behalten nämlich die Kinder, namentlich wenn sie an der Mutterbrust sind, ihre Fettpolster fast bis zum Tode, die anhaltend hohe Temperatur und der fortwährende Husten, mit welchem viel weisslicher Schaum aus dem Munde befördert wird, lassen schon bei Lebzeiten die Diagnose aller Wahrscheinlichkeit nach auf Tuberculosis acuta stellen, und die Section bestätigt in den meisten Fällen diese Wahrscheinlichkeitsdiagnose.

Bildet sich bei grösseren tuberculösen Kindern Saor der Mundhöhle, so kann man fast mit Gewissheit ein labiliges lethales Ende prognosticiren. Die Zunge bietet wenig charakteristisches. Der Appetit ist selbst bei Febris hectica oft noch sehr gut, man bemerkt übrigens nicht, dass diese Kinder weniger abgemagerten und länger leben als andere, welche an anhaltender Dyspepsie leiden. Diarrhöen sind häufig, beruhen jedoch nur selten auf tuberculösem Darmgeschwür, sondern meist auf einfachen Catarrhen der Darmschleimhaut.

Die Haut bleibt in der chronischen Tuberculosis niemals normal, sie verliert ihre ursprüngliche Glätte und wird in Folge der Abnahme des Unterhautfettes weich und ruckelich. Häufig stellt sich am Rumpf und Hals eine kleienartige Abschuppung ein, welche auf einige Zeit verschwindet, bald aber wiederkehrt und sich zuweilen mit Pityriasis versicolor complicirt. Die stark desquamirenden, rauen Hautstellen schütten wenig, die übrigen dafür um so beständiger. Aus Kopfe namentlich dringt der Schweiß in grossen Tropfen hervor, so dass die Haare und das Kopfkissen häufig ganz nass werden. Sudamina werden demgemäss vielfach beobachtet.

Allgemeine Hautwassersucht kommt bei einfacher Tuberculosis nicht vor, nur um die Knöchel herum und auf dem Fussrücken finden sich im letzten Stadium leichte Oedeme. Bei kleinen Kindern sind diese Oedeme sichere diagnostische Anhaltspunkte, indem sie der Tuberculosis fast ausschliesslich zukommen und die physikalische Untersuchung der Brusthöhle gewöhnlich keine genügende Aufklärung gibt. Zuweilen entsteht ein partielles Oedem des Gesichts und der oberen Extremitäten, was auf locale Circulationsstörungen zurückzuführen ist. Man hat beobachtet, dass stark vergrösserte Brachialdrüsen einen Druck auf die V. Cava descendens ausüben und somit Stauung in deren Gefässgebiet verursachen können.

Die chronische Tuberculose behält entweder ihren Charakter bis zum Tode bei und die Kinder sterben an den Folgen des Fiebers, der Abmagerung und der Erschöpfung, oder es wird das lethale Ende noch durch acute Hilartuberculose und Hydrocephalus acutus beschleunigt.

Die Prognose darf auch bei ziemlich vorgeschrittener Tuberculose nicht unbedingt lethal gestellt werden, indem es Fälle gibt, in welchen trotz aller schlechter Zeichen noch einmal Stillstand und nach Jahreslangen Stillstand endlich wieder vollkommenes Ernähren und Fortentwicklung eintritt.

Aetiologie.

Keine Krankheit ist so bestimmt erblich als die Tuberculose, und diese Erblichkeit lässt sich in vielen Fällen so evident nachweisen, dass ich fast vermute, sie ist die einzige und allein wahre Ursache der Dyskrasie. Die Kinder bringen keine vollendeten Tuberkel mit auf die Welt, und man findet sie bei Sectionen Neugeborener meines Wissens niemals. Aber schon in den ersten Lebenswochen kann die Tuberculose sich vollkommen entwickeln, so dass man bei einem Kinde, das nur 2—3 Monate gelebt hat, miliäre, zuweilen auch sogar grosse gelbe Tuberkel finden kann.

Die Grade der Intensität sind sehr verschieden je nach der Art der elterlichen Constitution. Ist nur der eine Theil der Eltern tuberculös, der andere aber aus einer vollkommen gesunden Familie, so brauchen durchaus nicht alle Kinder dieser Ehe tuberculös, nicht einmal scrofulös zu werden. Es geht mit der Erblichkeit der Tuberculose wie mit der äusseren Körperbeschaffenheit. Wenn der Vater schwarze Haare und braune Iris, die Mutter blonde Haare und blass Iris hat, so bekommen die Kinder gewöhnlich kein Gemisch dieser Farbenunterschiede, sondern meist schlägt ein Theil derselben ganz dem Vater, ein anderer ganz der Mutter nach. Ist nun der Vater tuberculös, die Mutter aber gesund oder umgekehrt, so kann es sehr wohl sein, dass ein Theil der Kinder ganz gesund, ein anderer ganz tuberculös wird. Häufig bemerkt man jedoch einerseits eine Abschwächung der Dyskrasie, welche in milderer mehr scrofulösen Formen sich äussert und andererseits bei den scheinbar gesunden Kindern leichte scrofulöse Affectionen und eine Neigung zu Bronchial-Catarrhen, chronischer Bopharitis und phlyctänöser Conjunctivitis.

Durch Kreuzung zwischen Starktuberculösen, Schwachtuberculösen und Gesunden entsteht nun eine Menge von Abstufungen, und bei der unendlichen Vererbung, welche die Dyskrasie jetzt erfahren hat, wird es nur wenige Familien geben, welche von aller Neigung zur Tuberculose, von allen dieselbe anstehenden scrofulösen Symptomen gänzlich frei geblieben wären. Die Hauptschwierigkeit, welche man zu überwinden hat, wenn man die Entstehung der Tuberculose nur durch Erblichkeit zu erklären strebt, ist die, dass eben leichtere Grade von Tuberculose, einzelne beschränkte, vielleicht schon verkalkte Tuberkel nicht zu diagnostizieren sind. Man findet ja oft genug bei Sectionen der kräftigsten, wohlgenährtesten Individuen, welche an einer beliebigen acuten Krankheit gestorben sind, in einer Lungenpitze oder den Bronchialdrüsen die Reste eines früheren tuberculösen Processes,

von dem Niemand etwas geahnt hatte. Es kann deshalb auch niemals bestimmt behauptet werden, dass keine hereditäre Anlage zugegen, und dass in einem gegebenen Falle die Tuberculose lediglich durch andere, äussere Ursachen bedingt sein müsse.

Zu den äusseren Veranlassungen der Tuberculose rechnet man allgemein: schlechte Luft, Aufenthalt in engen, nicht ventilirten, staugen Zimmern, feuchte Wohnung und schlechte Kost, worunter man samentlich den ausschliesslichen Genuss von Schwarzbrot und Kartoffeln und die Entbehrung der Fleischkost versteht. Wenn man aber aus einer grossen Armenpraxis, wie sie mir seit mehreren Jahren geworden, seine Erfahrungen bezüglich dieser äusseren Veranlassungen resümiert, so stellt sich deutlich heraus, dass eben namentlich oft lediglich keine nachweisbare Tuberculose erzeugt wird, und andererseits, dass bei vollständigem Mangel dieser äusseren Ursachen dieselbe sehr häufig gefunden wird.

Am frappantesten gestalten sich die Verhältnisse, wenn Kinder von verschiedenen Eltern in einer Familie zusammen aufwachsen, was man in München sehr häufig findet, indem die illegitimen Kinder nicht bei ihrer Mutter bleiben dürfen, sondern in die Kost gegeben werden müssen. Hat nun die Familie, welche das Kostkind aufgenommen hat, ebenfalls Kinder, so leben alle Kinder mit einander unter ganz denselben Bedingungen. Sie schlafen im denselben Zimmer, sie essen aus derselben Schüssel, sie bekommen, resp. vernähmen die Hauptpflege in gleichem Masse, und dennoch wird viele Dutzend Mal beobachtet, dass das Kostkind vollkommen gesund bleibt, während die eigenen Kinder das ganze Jahr hindurch an scroföden Affectionen in Behandlung stehen, oder dass der umgekehrte Fall eintritt. Wenn sich nun diese Thatsachen so oft repetiren, dass jeder beschäftigte Arzt ganze Reihen davon aufzählen kann, so wird der Glaube an die äusseren Ursachen, schlechte Kost, Wohnung und Hauptpflege mehr als schwankend gemacht, und die Tuberculose müsste bei der grossen Masse von Proletariat, welches in den Städten beisammen wohnt, noch viel häufiger vorkommen, als dies in der That der Fall ist. Es müssten ganze Häuser und selbst Strassen, in welche diese armen Leute eingepfercht sind, tuberculös sein, eine Beobachtung, die meines Wissens noch in keiner Stadt gemacht worden ist.

Für Kinder, welche den Keim der Tuberculose in sich tragen, mögen diese äusseren Ursachen von grosser Bedeutung sein und die Art sowie die Anzahl der einzelnen Inalte vergrössern und verschlimmern. Wo aber der erstere nicht vorhanden, da entwickelt sich die Kinder wohl langsamer, bleiben bloss, mager und klein, zeigen jedoch keine Tuberculose, nicht einmal Scrofeln.

Betrachten wir die Sache von der Kehrsite. Bei den Kindern der wohlhabenden Bevölkerung fehlen die äusseren Ursachen und es müssten also am so viel weniger wohlhabende Kinder tuberculös sein, als arme Kinder dies durch ihre schlechten Verhältnisse geworden sind. Nun sind aber, soweit der allgemeine Ueberblick reicht (im Procenten lassen sich diese Verhältnisse nicht berechnen), die Kinder wohlhabender Leute durchaus nicht seltener tuberculös als die der Armen, vielmehr scheint die Krankheit besonders häufig und verheerend in dem erstere Stande vorzukommen. Aus dieser Anschauung resultirt

ebenfalls, dass auf die Kost, Wohnung und Hauptpflege bei Weitem weniger Gewicht zu legen ist als auf die hereditäre Anlage.

Wenn die äusseren Ursachen bezüglich der Erzeugung von Tuberculosis in ganz gesunden Individuen von nur geringer Bedeutung sind, so muss doch zugestanden werden, dass sie ein mächtiges Agens werden, wo hereditäre Anlage vorhanden. Viel wichtiger jedoch in dieser Beziehung sind vorausgegangene andere Krankheiten, namentlich Masern, Syphilis, Keuchhusten und Typhus. Nach diesen acuten Processen entwickelt sich bei Kindern, welche früher dem Anscheine nach ganz gesund waren, plötzlich Tuberculose. Am häufigsten stellt sie sich nach Masern ein, wo sie eine so gefährliche Folge ist, dass die Annahme gerechtfertigt erscheint, es erkrankte gar kein mit hereditärer Anlage behaftetes Kind an Masern, ohne darauf nicht wirklich tuberculös oder wenigstens scrofulös zu werden. Diese nach Masern eintretende Tuberculose zeichnet sich vor der spontan entstehenden auch dadurch aus, dass bei ihr ein Stillstand und endlich sogar entschiedene Besserung viel häufiger zu beobachten ist, als bei letzterer.

II. Scrofulöse Dyskrasie.

Man versteht unter Scrofulosis eine Reihe entzündlicher Processen auf der Haut und den Schleimhäuten, an den Sinnesorganen des Gesichts und des Gehörs, in den Lymphdrüsen, an den Knochen und Gelenken, welche pathologisch anatomisch gar keinen Zusammenhang haben, in ihrem Verlaufe jedoch von einfachen traumatischen Entzündungen dieser Theile sich wesentlich unterscheiden und selten ganz vereinzelt, sondern meist an mehreren Körperstellen zugleich oder nach einander verkommen.

Die Untersuchung der erkrankten Theile ohne Berücksichtigung des gesammten Organismus ergibt häufig schon solche Eigenthümlichkeiten, dass man mit Bestimmtheit zum entzündlichen Process das Beiwort „scrofulös“zusetzen kann. Es gilt dies namentlich für einzelne Erkrankungen der Augen, für die verschwärenden Lymphdrüsen und die Knochen- und Gelenkkrankheiten, während die meisten Hautauschläge, die Schleimhautentzündungen und der Ohrenfluss erst durch die Hartnäckigkeit ihres Verlaufes und die gleichzeitige Complication mit deutlichen scrofulösen Affectionen anderer Organe als dyskrasisch erkannt werden können.

Die Gegner der scrofulösen Diathese, welche ihr Auge gegen den so nahe liegenden und täglich zu beobachtenden innigen Zusammenhang der eben genannten Affectionen hartnäckig verschlossen, berufen sich namentlich darauf, dass die Dyskrasie im Blute nicht nachgewiesen sei. Unbegreiflicher Weise vergessen sie hierbei, dass man überhaupt noch in gar keiner Dyskrasie, weder in der Syphilis, noch im Krebs, noch in der Tuberculose etwas Specifisches im Blute hat finden können: dass aber hier Allgemeinerkrankungen vorliegen, hat doch noch jeder denkende Arzt zugestanden.

Von klinischen Standpunkte ist an folgenden Sätzen festzuhalten:

- 1) Es gilt gewisse, chronische Entzündungen, welche einen innigen ätiologischen Zusammenhang haben.
- 2) Die daran erkrankenden Kinder stammen, zum grössten Theil zweifellos, von tuberculösen Eltern und

- 3) Diese Kinder werden sehr häufig nach Eintritt der Pubertät, wenn die scrofulösen Erscheinungen zurückgetreten, selbst wieder tuberculös.

Es erscheint demnach die Scrofulosis als der Anfang, vielleicht auch als eine Abschwächung der Tuberculosis. Nach meinen Beobachtungen, die leider wegen des schwierigen Nachweises der elterlichen Tuberculosis niemals zu präcisen Zahlen führen können, kommt sie hauptsächlich in Familien vor, wo ein Theil der Eltern gesund, der andere aber tuberculös ist. Wo Vater und Mutter tuberculös sind, gehen die Kinder meistens in den ersten Lebensjahren an wahrer Tuberculosis zu Grunde und überspringen diese milderen Übergänge.

Was die allgemeinen Symptome, den sogen. scrofulösen Habitus, betrifft, so sind die meisten hiefür angegebenen Zeichen nur die einfachen Folgen der örtlichen Prozesse und beruhen nicht auf gewissen erblichen Constitutionenormalien. Es ist dies auch der Grund, warum die Schilderungen des sogen. scrofulösen Habitus nicht zu ein Bild zusammengefasst werden, sondern in zwei Formen, der cretischen und der torpiden, gegeben werden müssen.

Bei genauerer Prüfung reduciren sich diese beiden Formen auf höchst vage Angaben. So sollen die cretisch scrofulösen Kinder einen gracilen Körperbau, schwache Muskulatur, scharfes Fassungsvermögen, zarte Gesichtsbildung, schöne Augen, bläuliche Sklera und erweiterte Papillen haben. Der torpide Scrofulahabitus hingegen soll zu erkennen sein an grossen Gesichtszügen, grossem Kopfe, breiten Kinnbacken, aufgeschwollener Nase und Oberlippe, gerötheten Augen, geschwellenen Lymphdrüsen und grossem Bauche.

Es sind ungeschickter Weise in diesen Schilderungen allgemeine constitutionelle Veränderungen mit örtlichen Krankheitsprocessen zusammengeworfen worden. Die allgemeinen Charaktere sind höchst unbestimmt und überdies vollkommen unrichtig, die örtlichen, geschwellene Nase und Oberlippe, geröthete Augenlider, Drüsenhypertrophieen und meteoristisch aufgetriebener Unterleib sind allerdings Theilerscheinungen der Scrofulosis, allein sie sind nicht so constant, dass sie den Habitus bedingen können und ihr Fehlen oder Wiedervereschwinden beweist noch lange nicht, dass die Kinder nicht mehr scrofulös sind.

Die Kinder können ihren scrofulösen Habitus, ihre Adenitis sublingua, ihre geschwellene Nase und Oberlippe, welche eben nur local durch chronischen Catarrh der Nasenschleimhaut und dessen stützendes Secret bedingt sind, sehr wohl vollkommen wieder verlieren und nach einigen Monaten dieselben oder andere scrofulöse Affectionen wieder acquiriren. Es wird also, je nachdem diese localen Entzündungen gerade zugegen oder verschwunden sind, der Habitus vorhanden sein oder nicht.

Was nun die örtlichen Prozesse anlangt, so sind sie sämmtlich durch langwierigen Verlauf, häufige Recidive und hartnäckigen Widerstand gegen alle Localbehandlung mit Cauterisationen, Umschlägen und Salben aller Art, ausgezeichnet. Sie böten grossentheils so charakteristische Symptome, dass sie eine gesonderte Betrachtung verdienen.

a) Hals.

Am häufigsten finden sich hier die näselnden Anschläge, Eozem, Impetigo und Ecthyma.

Die Furunculosis, welche ebenfalls nur Kinder tuberculöser Eltern befallt, wurde schon pag. 465 eingehend besprochen.

Unter Eczema versteht man eine Hautentzündung, bei welcher ein flüssiges Exsudat unter die Epidermis ausströmt und in Form von kleinen, dicht aneinander stehenden Bläschen eine grössere Fläche der Haut einnimmt. Je nachdem der Grund und die zunächst gelegenen Hautpartien schwach oder stark gereizt und geschwollen sind, unterscheidet man Eczema simplex und rubrum. Wenn die Bläschen grösser werden und von Eiter strotzen, bezeichnet man diese Abart als Eczema impetiginoides. Es sind hier natürlich keine besonderen Formen anzunehmen, sondern es können sehr wohl an einem Individuum zu gleicher Zeit oder wenigstens nacheinander alle drei Formen beobachtet werden.

Symptome.

In allen Fällen bilden sich durch Platzen und Eintrocknen der Bläschen und Pusteln gelbe Krusten, welche durch nachdringendes flüssiges Exsudat immer wieder aufgehoben werden, worauf dann der frühere Eintrocknungsprocess in derselben Weise von Neuem beginnt. Am behaarten Theile des Kopfes werden die Krusten wegen des Anklebens an die Haare beträchtlich dicker als an unbehaarten Körperstellen. Zuweilen wird die Secretion so bedeutend, dass aus einzelnen Rissen und Spaltungen der vorhandenen Krusten grosse Portionen eines trüben Serums austreten und sogar abfliessen können. Dieses Exsudat erstarrt auch ferner gelegene, bisher ganz gesunde Hautstellen und es kann dasselbst ebenfalls ein nässender Ausschlag entstehen.

Das Eczem hat weder mit dem Follikel noch dem Drüsensysteme speciellen Zusammenhang, sondern ist eine reine Cutisentzündung; am häufigsten kommt es bei scrophelösen Kindern am Kopfe und im Gesichte vor (Kopfgriind, Tinea capitis, Porrigo) erscheint übrigens gar keine Hautstelle gänzlich. Es kommt gewöhnlich in 4—8 Wochen spontan zur Heilung und tritt nur höchst selten länger als ein halbes Jahr an ein- und derselben Stelle fort.

Wenn es einige Tage bestanden hat, so schwellen regelmäßig die nächst gelegenen Lymphdrüsen an, besonders die des Halses, indem, wie schon bemerkt, das Eczem am häufigsten am Kopfe sich etablirt. Diese Drüsenschwellungen haben das Eigenthümliche, dass sie fast niemals in Eiterung übergehen, sondern nach Heilung des Ausschlages sich wieder gänzlich verkleinern oder auch schwach infiltrirt noch längere Zeit fortbestehen können.

Das Eczem heilt ohne Substanzverlust, nur bleibt an den nicht behaarten Stellen eine dunklere Pigmentirung der Haut zurück, welche nach einigen Monaten jedoch nicht schwindet. Recidive kommen sehr häufig vor.

Behandlung

Es soll hier nur von der örtlichen Behandlung die Rede sein, indem die allgemeine am Schluss des ganzen Abschnittes folgen wird. Nach meiner tausendfachen Beobachtung genügt die einfache Reinlichkeit und, für die behaarten Stellen, die Entfernung der Haare vollkommen zur Heilung. Selbst diese letztere Prozedur ist nicht dringend

unthwendig, sondern beschleunigt nur das Abtrocknen und ist eine grosse Wohlthat für die Kinder, welche durch die mit den Haaren dick verklebten Krusten im höchsten Grade belästigt werden.

Einige Mütter entschlossen sich aber höchst ungern dazu, ihren Töchtern die Haare abzuschneiden. Die Kinder wurden durch das Waschen und Auskämmen der verkrusteten Krusten allerdings viel gequält, allein es ist nicht zu verkennen, dass auch bei dieser irrationellen, zuweilen sogar grausamen Behandlung endlich ein Zeitpunkt eintritt, wo keine neue Exsudation mehr erfolgt und nach Abfall der gänzlich vertrockneten Krusten eine normale Haut zum Vorschein kommt.

Die Entfernung der Krusten wird am besten vorgenommen, wenn man sie erst mit Oel trinkt, worauf sie weich werden und schmerzlos weggenommen werden können. Es lässt sich nicht verhindern, dass die Kinder kratzen, des hiëdurch entstehenden beträchtlichen Hautreiz aber kann man mildern, wenn man ihnen die Fingernägel zweimal die Woche so kurz als möglich schnodet. —

Unter Impetigo versteht man ein Eczem mit besonders grossen Bläschen, eine Hautentzündung, bei welcher sich auf geröthetem Grunde grössere Pusteln erheben, die zu dicken, gelben oder braunen Krusten vertrocknen. Die Exsudation dauert unter den Krusten fort, hebt sie empor, und es liegt für einige Stunden das geröthete Corium zu Tage, das jedoch schnell wieder mit neuen Krusten sich bedeckt. Der Verlauf, die übrigen Symptome und die örtliche Behandlung unterscheidet sich in nichts von Eczema.

Unter Ecthyma und Rupia versteht man vereinzelt grosse Pusteln, welche nur vorübergehend braune Krusten verursachen und gewöhnlich in torpide Geschwüre übergehen. Der Entzündungshof ist meistens unbedeutend, wird aber, wenn die Cachexie sehr ausgeprägt ist, livid-bläulich-roth. Die nach dem Abfallen der Krusten entstehenden Geschwüre liefern fast gar kein Secret, sind meistens trocken, heilen aber nichtsdestoweniger nur sehr langsam und bestehen häufig bis zum Tode fort. Es kommt dieser Auschlag nur bei mageren, atrophischen Kindern vor.

Behandlung.

Man muss versuchen, durch reizende Salben, Ung. digestivum oder Salinas, oder durch leichte Bestreichungen mit Höllenstein mehr Reaction in die torpiden Geschwüre zu bringen. Die örtliche Behandlung bleibt aber in der Regel erfolglos, wenn nicht eine constitutionelle Besserung erzielt werden kann. Die hier angezeigten Mittel sollen am Schlusse angeführt werden.

Ausser diesen Bläschen und Pustelausschlägen ist namentlich noch der Scrofulosis eigen die fressende Flechte, der Lupus.

Symptome.

Der Lupus kommt bei Kindern in allen vier Formen vor, welche die Dermatologie lehrt. Wir haben 1) *L. exfoliatus*, 2) *L. tuberosus*, 3) *L. exulcerans* und 4) *L. serpigineus* oder *ambulans*.

Der Lupus exfoliatus besteht in klumpen und grösseren Hauthypertrophien von glänzender, abgeschliffener Oberfläche, welche fortwährend sich abschuppen und häufiges Hautjucken verursachen. Die

Farbe dieser Hypertrophien schwankt zwischen der roseurothen bis zur Mau-rothen. Die Härte ist charakteristischer als die Hervorragung über das Niveau der gesunden Hautpartien.

Der *Lupus tuberosus* unterscheidet sich von der ersteren Form nur durch stärkere Prominenz der Knospen, welche durch Aggregation so grossen, Maxilloiden Tumoren anschwellen können und sowohl sehr hart, zuweilen aber auch schwach fluctuirend sich anfühlen. Die Abschuppung und die Farbe verhält sich wie bei dem ersteren.

Der *Lupus exulcerans*, auch *phagedaemicus* genannt, entsteht selten primär als solcher, sondern entwickelt sich aus einer der beiden oben beschriebenen Formen. Er charakterisirt sich durch ein hartes Ulcuscrustat, welches rasch schnitt und tiefe, unebene Geschwüre zurücklässt. Diese Geschwüre sondern keinen dickflüssigen Eiter, sondern eine bräunliche Jauche ab und heilen ausserordentlich langsam, sie greifen besonders in die Tiefe und verschonen nicht einmal die Knochen. Die Krusten, welche von Zeit zu Zeit durch eine momentane Abnahme der Secretion sich bilden, werden gewöhnlich bald wieder abgestossen.

Der *Lupus serpiginosus* endlich zeichnet sich aus durch Bildung tiefer Geschwüre, welche durch immer neue Exsudation in die Geschwürsränder grösser und grösser werden, während die erst ergriffenen Stellen sich contrahiren, abflachen und zur Heilung anschicken. Die Narben bleiben stets vertieft, weiss, strahlig, und die Substanzverluste, namentlich wenn der *Lupus* an der Nase oder den Augenlidern gesessen hatte, sind sehr entstellend.

Diese sämtlichen vier Formen finden sich niemals bei gesunden Kindern, sondern nur bei dyscrasischen, und zwar hauptsächlich bei angrosprochenscrofulösen, seltener bei syphilitischen. Ihr Sitz ist vorzugsweise im Gesicht, am häufigsten an der Nase, dann an den Wangen und den Lippen, viel seltener finden sie sich am Rumpfe und den Extremitäten.

Der Verlauf ist ein sehr chronischer und die Heilung lässt meist Jahre lang auf sich warten, die Substanzverluste sind immer beträchtlich und die Narben das ganze Leben durch zu erkennen.

Behandlung.

Die tertielle Behandlung des *Lupus*, namentlich fressender Form, ist von grösster Wichtigkeit. Es ist dringend nothwendig, dem Fortschreiten des Uebels durch systematische Cauterisation ein Ziel zu setzen. Der Höllensteinstift ist für diese Fälle nicht eingreifend genug, man muss zur Arsenik- oder Chlorzinkpasta greifen. Das Dupuytren'sche Arsenikpulver (98 oder 99 Theile Calomel und zwei oder ein Theil weisser Arsenik) ist besonders geeignet zu oberflächlichen Aetzungen, nicht zu nahe am Munde und der Nasenhöhle. Es wird in Pulverform $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Linie dick auf die gereinigte Geschwürsfläche gestreut und mit einer Schichte von Gummipulver bedeckt, wodurch bei Feuchtwerden der Paste eine feste Verklebung entsteht. Nach 8—10 Tagen fällt die Paste ab, muss aber meistens einige Male repetirt werden.

Weniger gefährlich wegen möglicher Vergiftung und dennoch sehr zuverlässig wirkt die Chlorzinkpasta. Man mischt ein Theil Chlorzink mit 2—3 Theilen Stärkmehl und bringt um mit einigen Tropfen

Wasser die Paste auf das gereinigte Geschwür. Das Chlorzink sitzt ebenso tief als die Dicke der aufgelegten Schichte ist. Nach Abfällen des Schorfes müssen die Aetzungen so lange erneuert werden, bis schöne granulirte Flächen erzielt worden sind. Thiersch behandelt den Lupus sehr glücklich mit einer Lösung von essigsaurer Theorbe, welche er mit Charpie als Verbandmittel so verdünnt benützt, dass nur geringe Schmerzen dadurch entstehen dürfen. In neuester Zeit ist durch die Einführung des scharfen Löffels eine grosse Umwälzung in der örtlichen Behandlung des Lupus hervorgerufen worden und es scheinen durch denselben in der That alle die genannten Aetzmittel entbehrlich zu werden.

Ohne interne Behandlung mit Leberthran, welche Jahre lang fortgesetzt werden muss, kann auch durch die stärksten Aetzungen kaum ein verüberrückendes Zuhelen bewirkt werden. Es bedarf keiner besondern Erinnerung, dass die Anfrangung des Chlorzinks ohne Chloroformanestheie kaum durchführbar ist.

b) Schleimhäute und Sinnesorgane.

Wir ügen hier die Veränderungen der Sinnesorgane gleich an die der Schleimhäute überhaupt an, weil bei den scrofulösen Erkrankungen der Organe des Gesichtes und Gehöres sich regelmäßig und hauptsächlich deren Schleimhaut theilnimmt.

Die Schleimhaut des Mundes und des Ernährungsschlauches zeigt keine charakteristische scrofulöse Erkrankung. Die bei scrofulösen Kindern so häufigen und langwierigen Bronchialcatarrhe sind viel wahrscheinlicher durch wirkliche Lungentuberculose als durch Scrofulose bedingt. Im respiratorischen Systeme kommen ebenfalls keine besonderen Veränderungen vor, in der Vagina aber findet sich bei scrofulösen Kindern oft eine langwierige Leucorrhoe, deren genauere Schilderung schon pag. 426 gegeben wurde.

Deutlich scrofulöse Localisationen etablieren sich nur auf der Schleimhaut der Nase, des Auges und des Ohres.

Nase.

Sehr häufig kommt in den Nasenlöchern an der Übergangsstelle der Schleimhaut zur Cutis ein nässender Ausschlag, Eczem oder Impetigo, vor, in Folge dessen die ganze Schleimhaut stark veredelt und ein *Abundant Secret* in grosser Menge liefert. Die Nasenlöcher werden durch immer dickere Krusten endlich ausgefüllt, die ganze Nasenpitze schwillt an, und das über die Oberlippe herunterfließende scharfe Secret verursacht eine chronische Rötzung und Infiltration dieser Hautpartie. Die Anschwellungen der Nase und Oberlippe kommen so häufig vor, dass man aus ihr den scrofulösen Habitus zu entziffern pflegt.

Wenn allerdings nicht gegruet werden kann, dass so beschaffene Kinder stets scrofulös sind und noch weitere scrofulöse Erkrankungen aufweisen, so geht hieraus noch keineswegs hervor, dass Kinder, welche keine geschwollene Nase und Oberlippe haben, nicht auch scrofulös sind. So häufig ist diese Affection in keinem Falle, dass man sie mit dem dyskrasischen Habitus identifiziren könnte.

Die Heilung lässt viele Monate, selbst Jahre auf sich warten, und nach endlichem Verschwinden des Ausschlages bleibt noch lange

Zeit die Infiltration der Cutis zurück. Mit Lupus, Polypenbildung und eitriger Coryza, Ozaena, haben diese einfachen Eczeme nichts gemein und gehen auch nicht in solche Zustände über.

Die serofulöse Ozaena, Stinknase, besteht in einem eitrig blätigen Ausflusse aus einem oder beiden Nasenlöchern und unterscheidet sich von der oben geschilderten Schleimhautkrankung durch den sie fehlenden penetranten Geruch des abfließenden Eiters. Sie ist ebenfalls sehr langweilig, sistirt zwischen einige Wochen und kühlt hierauf mit früherer Heftigkeit wieder. Es liegt ihr meistens eine Perionitis eines Theils der Nasenhöhlenwandung zu Grunde, auch wird zwischen das Abgehen kleiner Knochentückchen beobachtet. Es erklärt sich hieraus häufiglich der intensive Geruch des Eiters und der chronische Verlauf.

Behandlung.

Wenn die Kinder schon etwas grösser und vernünftiger sind, können Injectionen mit kaltem Wasser oder mit schwachen Adstringentien vortreffliche Dienste. Die Weber'sche Nasendouche ist hier allen andern Injectionen vorzuziehen. Bei kleinen Kindern, welche sich gegen diese Prozedur gewaltig sträuben, muss man sich damit begnügen, eine schwache Salbe aus rothem Präcipitat (0,2—4,0 Fett) mittelst eines dünnen Bourdais's einzuführen. Die allgemeine Behandlung hilft auch hier wieder die Hauptsache.

Auge.

An den Lidern verschwären häufig die Meibom'schen Drüsen. Es bilden sich mehrere Hordeola, welche theils in Eiterung, theils in Infiltration übergehen. Die nächstgelegenen Theile des Augenlides sind hierbei geschwollen und excoriiren schnell in Folge der Anfröng des verhärteten Secretes. Diese Erkrankung dauert ebenfalls viele Monate und endet häufig mit theilweisem oder gänzlichem Verlust der Liden.

Am häufigsten jedoch befallt sich die Dyskrasie auf der Conjunctiva bulbi.

Bei der Conjunctivitis serofulosa entstehen auf der Sclero-calcühaut fast regelmässig Phlyctänen, flache, weissgelbe Erhebungen, von der Grösse eines Stecknadelkopfes bis zu der einer Linse, welche von dick aufgelaufenen, blutrothen Gefässen umgeben sind. Die Hauptmasse der Gefässe geht gewöhnlich in Form eines strangartigen Bündels von einem Augenwinkel gegen die Phlyctäne zu. Da diese Phlyctänen nur bei serofulösen Kranken vorkommen, so scheinen sie mir höchst wahrscheinlich miliäre Tubercelkörnerchen der Conjunctiva zu sein. Ich hatte noch nie Gelegenheit, solche Phlyctänen am lebenden Kinde auszuschneiden und mikroskopisch zu untersuchen, auf welche Weise allein diese Frage zum Austrag kommen könnte.

Nach einigen Tagen platzen die Phlyctänen und collabiren, die zuführenden Gefässe verkleinern sich und verschwinden bald darauf gänzlich. Wenn der Process vollständig abgelaufen, ist durchaus kein bleibender Nachtheil für das Auge, noch ein sichtbarer Rückstand mehr zu bemerken. Anders gestalten sich die Verhältnisse, wenn die Cornea ergriffen wird.

Die Keratitis serofulosa stellt sich dar entweder als einfache Weiterentwicklung der Gefässe der Scleroticalbindehaut auf die Cornea, so dass an einzelnen Stellen oder an der ganzen Peripherie der Hornhaut radiale Gefässchen in ihren Rand hineingehen, oder es bilden sich an irgend einer Stelle der Cornea grössere oder kleinere Geschwüre.

Diese Hornhautgeschwüre entstehen ebenfalls aus Pusteln, welche den Phlyctänen der Sclera entsprechen, dieselben platzen aber hier allgemein schnell und man sieht in kurzer Zeit nach Beginn des Leidens keine Pustel auf der Cornea, sondern einen Substanzverlust, eine kleine, weiche Grube, in deren Umgebung die Cornea rauchig oder mülbig getrübt ist. Die so entstandenen Geschwüre, deren sich oft mehrere zugleich vorfinden, bedürfen um längere Zeit bis zur vollständigen Verheilung. Die Stelle, wo sie sitzen, sieht zuweilen aus wie abgeschliffen — Facettenbildung, — die rauchige Trübung des Geschwürgrundes aber und seiner Umgebung verliert sich erst nach vielen Jahren oder bleibt Zeit Lebens sichtbar — *Macula cornea*. —

Bei stark dyskrasischen Individuen können die Geschwüre tiefer und immer tiefer greifen und endlich perforiren. Wenn das Geschwür central gesessen, so dass nach Abfluss des Wassers der vorderen Augenkammer die Perforation nicht durch die Iris verlagert werden kann, tritt gewöhnlich Phthisis bulbi ein. War das Geschwür aber mehr peripherisch, so fällt die Iris vor, bedeckt sich mit Exsudat und die Kinder kommen mit einer verengten Pupille davon, wodurch das Sehvermögen nur wenig behindert wird. Es bleibt hier an der Verwachstungsstelle der Iris mit der Cornea ein weisser Fleck mit einem schwarzen, centralen Punkte übrig, von welchem aus sich nachträglich ein Staphylom entwickeln kann.

Die Perforation serofulöser Hornhautgeschwüre ereignet sich übrigens selten, es perforirt kaum eins von hundert und unter den perforirten Geschwüren tritt der günstige Ausgang der Irisverlagerung noch verhältnissmässig oft ein.

Sehr charakteristisch für die serofulöse Augenentzündung ist der *Blepharospasmus*, der Krampf der Lider. Derselbe ist bedingt durch eine grosse Lichtscheu, welche nur in den allerwenigsten Fällen fehlt. Die Kinder schliessen das leidende Auge den ganzen Tag nicht, sie suchen am Tage dunkle Ecken und Kammern auf, halten die Hände vor das Gesicht und verhindern so gut als möglich das Einfallen des Lichtstrahlen. Wenn auch zugestanden werden muss, dass willfährige, freundliche Kinder sich auf vieles Zureden oft entschliessen, das Auge zum Behuf einer ärztlichen Besichtigung momentan zu öffnen oder sich wenigstens gerwillig öffnen zu lassen, so verursacht doch in anderen Fällen das einfallende Licht eine so heftige Reizung, dass mit dem besten Willen des Kindes eine Eröffnung des Auges unmöglich ist. Man kann wohl ein solches Kind fixiren lassen und mit grosser Gewalt beider Hände die Lider aus einander reissen, es entsteht aber hierdurch immer eine kleine Blutung am äusseren Augenwinkel und eine beträchtliche Schwellung der Lider.

Therapeutisch bringt dieses gewaltsame Aufreissen keinen Nutzen, indem die Behandlung dieselbe bleibt, ob Geschwüre vorhanden sind oder nicht, wohl aber deutlichen Schaden durch die beträchtliche Schwellung und unvermeidliche Quetschung der Lider. Wichtiger kann

dieses Verfahren für die Prognose sein; denn man kann den tiefbetrübten Eltern mit Bestimmtheit eine vollkommen günstige Prognose stellen, wenn gar kein oder nur ein peripherisches Hornhautgeschwür entdeckt wird.

Die Lichtscheu steht nicht immer im geraden Verhältnisse zur materiellen Veränderung der Cornea, die erstere ist oft im höchsten Grade vorhanden und die letztere nichts destoweniger latent. Die Thränensecretion ist bei der Lichtscheu immer profus und die vielen Thränen verursachen gemeinschaftlich mit den mechanischen Reibungen und dem fortwährenden Zuhalten des Auges bald einen nussenden Bläschenauschlag der ganzen Gesichtshälfte.

Die scrofulösen Augenentzündungen recidiviren ausserordentlich häufig, ja man kann beinahe sagen, regelmässig. Es dauert mindestens ein halbes Jahr, oft aber viele Jahre, bis die armen Kinder endlich darn kommen, sich ihres Lebens wieder gehörig freisetzen zu können. Die heftigen, anhaltenden Schmerzen, von welchen diese Affectionen begleitet werden, bedingen gewöhnlich auch etwas Fieber und Appetitmangel, worauf eine seltliche Abmagerung des ganzen Körpers sich einstellt.

Eigenthümlich ist die Veränderung der Cilien bei chronischen scrofulösen Entzündungen. Sie entwickeln sich zuerst zu einer besonderen Länge und Dicke, verlieren aber dabei ihre einfach geschwungene Bogenform und werden wellenförmig, fast geknickt. Später fallen diese entarteten Wimpern sämmtlich aus und werden für die ganze Lebenszeit durch kleine, spärlich stehende ersetzt.

An den scrofulösen Ophthalmien sieht man am allerdeutlichsten das Alterniren der verschiedenen localen Ausdrücke der Dyskrasie. Trotz aller örtlichen und allgemeinen Behandlung können sich die Hornhautgeschwüre viele Monate hindurch mehren und verschlimmern, da tritt plötzlich ein Eczem am Kopfe, eine Otorrhoe, eine Bronchitis oder eine scrofulöse Knochenkrankung ein und die hartnäckigste Augenentzündung ist in wenigen Tagen vollkommen verschwunden. Lichtscheu, profuse Thränensecretion und Gefässinjection sind wie weggelassen, es restirt nichts als die Trübung der Hornhaut, welche mit Ausnahm des vorüberdauerten Sehvermögens nicht weiter belästigt.

Behandlung.

Trotz aller rationalen und irrationalen, schmerzhaften und schmerzlosen, alten und neuen Mittel, welche die Ophthalmologen in grosser Menge angerufen haben, besteht noch keine Behandlungsweise, welche deutlich abkürzend und mildernd auf den Verlauf dieses widerwärtigen Uebels einwirkt.

Man verbiete das Zukleben des Auges mit einem grossen Tuche und gestatte nur das Vorhängen mit einem gewöhnlichen Augensäckchen. Alle Salben und Einträufelungen in das Auge mit adstringirenden Augenwässern sind, so lange Röthung und Schmerz besteht, schädlich und vermehren die Reizung. Es passt in diesem catarrhalischen Stadium nichts besser als lauwarmes, destillirtes Wasser, womit stündlich das Auge leicht geduscht oder übergossen werden kann. Durch Kalte und kaltes Wasser wird in den meisten Fällen Schmerz und Rötze vermehrt.

Das Bestreben der Kinder, dem Lichte sich gänzlich zu entziehen, darf nicht unterstützt werden. Sie sollen mit einem einfachen Augenlappen, *Unbraculum*, versehen in einem nicht verdunkelten Zimmer sich aufhalten. Einigen Nutzen sieht man von der täglich einmal zu wiederholenden Einträufelung einer concentrirten Atropinlösung (0,00—8,0 Wasser) und von dem innerlichen Gebrauch des *Belladonna-extractes*, wovon in 24 Stunden 0,03 gegeben werden kann. Die Untertauchungen des Kopfes in kaltes Wasser haben eine entschieden günstige, jedoch nur einige Stunden währende Wirkung auf den *Blepharospasmus*. Die Manipulation kann nur unter heftigem Sträuben der Kinder und deren Eltern vorgenommen werden, und der gewöhnliche Erfolg ist, dass sie sich zur zweiten Untertauchung nicht mehr finden. Ich bin deshalb schon seit Jahren von dieser etwas brutalen Behandlung abgestanden und kann von keiner Verwölkchung meiner jetzigen Resultate berichten.

Wenn die Kinder nicht ausgesprochen tuberculos sind, was in der Regel nicht der Fall ist, so vertragen sie Einreibungen mit grauer Salbe sehr gut, und man bemerkt bei dieser Behandlung einen ziemlich günstigen, wenn auch nicht immer schnellen Verlauf. Die graue Salbe wird auf die Stirne eingegeben, täglich 1,0—2,0, worauf ein leinwandnes Band über die Stirne gebunden werden muss, weil die Kinder sie sonst überall hinschmieren, und die Augenentzündung sich verschlimmert, wenn graue Salbe auf die *Conjunctiva* kommt.

Gegen grosse Schmerzen, Schlaflosigkeit und allgemeine Aufregung ist *Morphium* ein zuverlässiges Mittel. Ich lasse stets 0,4 in 90,0 Wasser lösen und gebe von dieser Lösung nach Bedarf kaffeekehlweise. Ueble Nebenwirkungen kann man von so kleinen Dosen *Morphium* nicht wahrnehmen, wohl aber von den ebenfalls schmerzstillenden Blutzegen, welche früher oft in Gebrauch gezogen wurden und durch consecutive Anämie viel Schaden anrichteten.

Bei hartnäckigem Verlaufe und Abwesenheit alles Hautausschläges sieht man zuweilen durch Erzeugung von Brechweinsteinpusteln eine rasche, auffallende Besserung des Augenleidens eintreten. Die *Autenrieth'sche* Salbe ist jedoch zur Erreichung dieses Zweckes ein ganz ungeeignetes Präparat. Die Kinder jucken sich an den eingeschnürten Hautstellen und reiben sich dann mit ihren vernarbten Fingern die Augen, wodurch sie ihre Ophthalmie sichtlich verschlimmern. Ich bediene mich seit Jahren einer Mischung aus 1 Thl. *Tartar. stibiatus* und 3 Thln. *Emplastr. citrin.*, welche in der Grösse eines Thalers messerrückendick auf lange Heftpflasterstreifen gestrichen und am Nacken befestigt wird. Nach vier Tagen wird dieser Verband abgenommen, während eine Menge grosser und kleiner Pusteln zum Vorschein kommt. Wenn diese Pusteln sich nach einigen Tagen zur Heilung anstücken, so kann man sie durch *Ung. Salinae* noch lange offen erhalten.

Gegen die *Blepharitis* und *Adenitis meibomiana* bedient man sich austrocknender oder schwach reizender Salben. Es ist hier namentlich der weisse *Præcipitat* (0,1—0,3 auf 4,0 Fett) und das *Ung. Zinci* zu empfehlen.

Wie schon erwähnt, haben alle diese örtlichen Mittel keine entscheidende, deutliche Wirkung und die Hauptsache bleibt immer eine Jahre lang fortgesetzte, umsichtige, allgemeine Behandlung.

Ohr.

Die Scrophelosis liefert das Hauptcontingent für Ohrkrankheiten; namentlich die chronischen Otitiden, die Ausgänge der Otitis externa und interna, dann die Knochenkrankungen des Gehörganges und des Felsenbeins kommen fast nur bei Kindern tuberculöser Eltern vor und sind combinirt oder alterniren mit anderen Localisationen der Dyskrasie. Die hierher gehörigen Zustände sind pag. 387—396 bereits ausführlich geschildert.

c) Lymphdrüsen und Unterhautzellgewebe.

Bei scrophelösen Kindern kommen ausserordentlich häufig Drüsenanschwellungen vor, welche meistens durch benachbarte Haut oder Schleimhautkrankungen veranlaßt sind. Weitens am häufigsten schwellen die Lymphdrüsen des Halses, seltener die in der Achsel- und Inguinalgegend an.

Man unterscheidet in der pathologischen Anatomie die einfache Hypertrophie und die Tuberculosis der Lymphdrüsen. In Praxis läßt sich dieser Unterschied nicht aufrecht erhalten. Man kann oft genug sehen, dass ein Kind in Folge eines Eczemes am Kopfe Drüsenanschwellungen am Halse bekommt, und dass diese Drüsen, welche ursprünglich einfach hypertrophisch waren, nach länger geheiltem Eczeme dennoch in Eiterung übergehen und tuberculösiren. Die Trennung der scrophelösen Drüsen von den tuberculösen ist kaum möglich, indem der Uebergang der ersteren Form in die letztere allmählig geschieht und nicht durch präcise Symptome sich äussert.

Pathologische Anatomie.

Zahlreiche Exstirpationen vergrößerter Drüsen und mannigfache Leichenuntersuchungen haben ergeben, dass an demselben Individuum einfache Hypertrophien und tuberculöse Infiltrationen der Lymphdrüsen vorkommen können.

Bei den einfachen Hypertrophien ist die Veränderung der Structur nur unbedeutend. Je länger sie bestanden, um so fester, dichter wird die Substanz. Die Oberfläche ist meist sehr gefäßreich, auf dem Durchschnitte kann man durch Druck einen trüben Saft entleeren, welcher unter dem Mikroskop die bekannten Drüsen Elemente, viele Kerne, wenig Zellen und einzelne Bindegewebestränge erkennen lässt. Zwischen findet man auch kleinere und grössere Hohlräume mit klarem Inhalt im Drüsenparenchym zerstreut vor.

Die tuberculösen Drüsen sind immer zugleich auch vergrößert und zeigen auf dem Durchschnitte entweder kleine, hyaline, graue Miliartuberkel oder es ist schon zur Bildung grosser gelber Tuberkel und Tuberkelaggregats gekommen. Im höchsten Grade des Uebels ist fast das ganze Drüsenparenchym verschwunden und durch Tuberkelmassen verdrängt worden. Erweichung ist der gewöhnliche Ausgang der Drüsentuberculose, Verkalkung scheint bei Kindern selten einzutreten. Bei fortschreitender Erweichung entzündet sich das Parenchym und nächstgelegene Zellgewebe, es kommt zum Abscesse und zu den bekannten, so langsam heilenden, fistulösen und unterminirten Geschwüren.

Symptome.

Der häufigste Sitz der Drüsenentzündung ist am Hals, und fast niemals erkrankt eine einzelne Drüse, sondern in der Regel föhlt man grössere Convolute zu beiden Seiten des Halses, unter dem Kinn, hinter und unter dem Ohre. Wenn die Drüsen ganz langsam und ohne Schmerzen sich vergrössert haben, so bleiben sie gewöhnlich ziemlich beweglich, im entgegengesetzten Falle und namentlich, wenn sie in Eiterung übergehen, werden sie prall und unbeweglich. Es tritt sodann in allen Fällen ein lebhafter, auf Druck zunehmender Schmerz ein, die Hautdecke wird immer röthler und dünner, bricht endlich auf und es entleert sich dann ein dickiger, dünnflüssiger Eiter, mit welchem ausweilen grössere Tuberkelkörner ausgeschieden werden. Gewöhnlich brechen mehrere Drüsen an verschiedenen Stellen zugleich oder nacheinander auf, und die Eiterung ist stets ausserordentlich langwierig. Es entstehen ganz eigenthümliche Geschwüre mit callösen, gewulsteten Rändern und speckigen Grunde, aus welchen einzelne Drüsen höckerig hervorragen.

Endlich nach vielen Monaten erweichen die callösen Ränder, die Geschwüre reinigen sich und heilen freilich nur unter Bildung entstehender Narben zu. Merkwürdig ist, dass das Allgemeinbefinden hierbei gewöhnlich gar nicht leidet, sondern die Kinder blühend aussehen und gedeihen, vorausgesetzt, dass die Tuberculosis auf die Drüsen isolirt bleibt und nicht gleichzeitig die Lungen ergreift. Der Verlauf ist, die entstehenden Narben abgerechnet, in der Mehrzahl der Fälle ein günstiger, und es stellen sich, wenn einmal alle Geschwüre vollkommen geheilt sind, gewöhnlich keine neuen Anschwellungen und Vereiterungen mehr ein.

Was die Complicationen betrifft, so gesellt sich nach Lebert's bekannten Untersuchungen bei $\frac{2}{3}$ aller Kranken scrofulöse Ophthalmie dazu oder geht voraus, $\frac{2}{3}$ der Fälle compliciren sich mit Knochenkrankheiten, $\frac{1}{4}$ mit Hautkrankheiten, ebenfalls $\frac{1}{4}$ mit Gelenkkrankheiten und $\frac{1}{4}$ mit oberflächlichen Geschwüren und Abscessen. Nach den Angaben desselben Autors ist die Drüsen-tuberculosis zwischen dem 1.—5. Lebensjahre sehr selten ($\frac{1}{12}$ seiner Fälle), häufiger zwischen dem 5.—10. Jahre ($\frac{1}{3}$), am häufigsten zwischen dem 10.—15. Jahre (fast $\frac{1}{2}$ seiner sämtlichen Fälle). Vom 15.—20. Jahre ist die Frequenz auch noch bedeutend, $\frac{2}{3}$. Von da an wird die Krankheit immer seltener; denn die Tuberculosis ergreift auch dieser Zeit viel häufiger die Lungen als die Lymphdrüsen.

Die Lymphdrüsentuberculosis ist an und für sich ungefährlich, die Tuberculosis der Lungen stellt aber nach Eintritt der Pubertät sehr gewöhnlich sich ein und es muss deshalb prognostisch immer die Gefahr auch angedeutet werden.

Behandlung.

Bei der einfachen und der entzündlichen Drüsenhypertrophie muss vor allem das causale Moment berücksichtigt werden. So lange die sie verursachende scrofulöse Haut- oder Schleimhauterkrankung noch besteht, verkleinern sich die Drüsen niemals. Erst wenn dieselbe geheilt ist, und die Drüsen-geschwülste noch nicht geschwunden sind, kann man versuchen, sie durch Reizung mit Jodtinctur, 2—3 Mal

wöchentlich, zu beseitigen. Einfache Drüsenanschwellungen schwinden auf solchen längeren Gebrauch der Jodtinctur, tuberculöse entzünden sich aber dadurch schneller und kommen rascher zum Ausbruch. Es darf jedoch dieser letztere Process nicht als ein ungünstiges Ereigniss betrachtet werden, indem die tuberculösen Massen auf diese Weise wirklich aus dem Körper eliminirt werden und nicht weiter resorbirt werden können.

Die tuberculöse Erweichung geht zuweilen erstaunlich langsam von Statten, bleibt aber fast niemals aus, indem Verkalkung im kindlichen Alter so gut wie gar nicht vorkommt. Alle Reizmittel der Haut scheinen sie zu befördern, und es ist deshalb rationell, solche anzuwenden. Es gehören hierher alle die Haut röthmachenden Salben und Pflaster, deren in der Volksmedizin eine grosse Menge cursirt.

Die einmal aufgetretenen Geschwüre werden nach den allgemein gültigen Grundsätzen der Chirurgie behandelt. Wenn die Heilung gar zu lange auf sich warten lässt, kann durch rothe Präcipitatsalbe ein merklicher Fortschritt erzielt werden. Gegen einfache Indurationen ist Jod das souveräne Mittel. Nur muss man mit dessen innerlichem Gebrauch sehr vorsichtig sein, indem die immer zu vernünftiger Lungentuberculose hierauf zuweilen schädliche Fortschritte macht. Am geeignetsten ist der längere Gebrauch Jod- und Bromhaltiger Mineralwässer, unter welchen die Heilbrunnens Quelle obenan steht. Oertlich kann man durch fortgesetzte Bepinschungen mit Jodtinctur hypertrophische Drüsen bald verkleinern, jedoch nur selten ganz zum Schwunde bringen.

Von Exstirpation der Drüse kann erst die Rede sein, wenn die entzündlichen Erscheinungen längst geschwunden und nur einzelne Drüsen hypertrophisch geblieben sind. Im entgegengesetzten Falle hat man zu gewärtigen, dass die Operationswunde, statt zu heilen, den Charakter eines scrofulösen Drüsengeschwürs mit dem bekannten callösen Rändern annimmt.

4) Knochen.

Entzündung der Beinhaut. (Periostitis scrofulosa.)

Die Entzündung der Beinhaut ist nicht selten Ausdruck der Scrofulose oder Theilnahme an anderweitig scrofulösen Leiden, und tritt entweder als acute Entzündung auf oder hat einen chronischen, schleichenden, mitunter sehr heftig verlaufenden Verlauf. Umwandlung einer ursprünglich chronischen Periostitis in eine acute hat man in manchen Fällen zu beobachten Gelegenheit.

Die Erkrankung erstreckt sich bald in mehr oder weniger grosser Ausdehnung über einen Theil des Knochens, bald befällt dieselbe die Beinhaut eines Knochens in ihrem ganzen Umfange. Der Sitz sind vorzugsweise die langen Röhrenknochen der Extremitäten (Tibia, Femur, Humerus) und compacte Knochen, selten werden spongiöse Knochen ergriffen.

Der anatomische Charakter der acuten Periostitis, welche in ziemlich gleicher Häufigkeit wie die chronische vorkommt, ist ausgezeichnet durch lebhafte Injection der Knochenhaut, meist in Form einer gleichmässigen Röthung, durch Schwellung, Auflockerung und

schwammiges Aussehen; späterhin ist das Periost mit einer schaumigen zähhässigen Exsudationsflüssigkeit durchsetzt und leicht abzulösen. Bei der schleichend auftretenden Periostitis ist die Hyperämie geringer, mehr in Form einer streifigen oder fleckigen Röthe, die Hautoberfläche stellt eine speckige, graurolliche oder grauweißliche Masse dar, die sich weniger leicht vom Knochen und den benachbarten Weichtheilen abtrennen lässt. Letztere wie das veränderte Periost selbst enthalten bei längerer Dauer häufig Knochenplättchen oder kleine Knochenlamellen von neugebildeter Knochensubstanz, da Neubildung dieser stets bei Periostitis von einiger Dauer eintreten pflegt.

Die weiteren Veränderungen, welche das entzündliche Periost bei Scrophulose eingeht, sind folgende:

Vollständige Zortheilung und Rückkehr zur normalen Textur ist ausserst selten; etwas häufiger, doch im Ganzen ebenfalls selten, kommt bleibende Verdickung und Volumszunahme mit Organisation der Entzündungsprodukte zu stattem Gewebe vor, überwiegend häufig ist der Ausgang in Eiterung oder Jauchung. Es bildet sich bei letzteren Vorgängen in dem entzündlichen Periost, sowie zwischen Periost und Knochen Eiter, es entstehen in den benachbarten Weichtheilen nicht selten Abscessen, die sich mit dem Eiterherde aus Knochen vereinigen und so eine grössere Höhle bilden können. Ist Ausbruch nach Aussen erfolgt und war die Periostitis auf einen kleineren Umfang beschränkt, so kann wohl Heilung und Vernarbung erfolgen, doch sind dies seltene Vorkommnisse, in der Regel ist das Periost auf eine grössere Strecke vom Knochen weggehoben und ausgetrennt, letzterer ausserhalb der zu seiner Existenz nothwendigen Ernährungsverhältnisse gebracht worden, so dass die nächste Folge Necrose des Knochens ist. In anderen Fällen nimmt unter dem fortwährenden Einflusse der Scrophulose die Eiterung den Charakter der Jauchung an, welche auch auf den unterliegenden Knochen sich erstrecken und in demselben den gleichen Process — Caries — hervorrufen kann. (S. Caries und Necrose.)

Schwerer als die scrophulöse Knochenentzündung hat die scrophulöse Knochenhautentzündung die Bedeutung der Tuberculose, indem als Entzündungsproduct tuberculöse Massen zum Vorschein kommen. Die Symptome der scrophulösen Knochenhautentzündung sind im Allgemeinen die der Periostitis überhaupt und verschoben je nach dem acuten und chronischen Verlaufe. Im Anfange besteht meist ein örtlicher nicht genau umschriebener Schmerz, welcher sich längs des Knochens ausbreitet und eigenthümlich dumpfer Natur ist, bei Druck sich verstärkt. Bald wird der im Beginne nur zeitweise vorhandene Schmerz anhaltender, stärker, besonders bei schlechten Witterungsverhältnissen, häufig auch zur Nachtzeit. Das kranke Glied schwillt je nach dem Charakter der Entzündung schneller oder langsamer an, die Haut wird prall gespannt, kann sich mehr in Falten erheben werden; die Anschwellung ist in den ersten Stadien hart und derb, tritt Eiterung ein, so entsteht an einer oder mehreren Stellen Weichheit, deutliche Fluctuation, und der Ausbruch erfolgt, nachdem die Cutis blaurothlich gefärbt wurde, die Epidermis sich erheben hatte. Aus den entstehenden Oeffnungen, die sich oft rasch vergrössern, wuchern schwammige Granulationen, welche oft bei Berührung bluten. Der aus ihnen zum

Vorschein kommende Eiter richtet sich in seiner Beschaffenheit nach der in der Tiefe verlaufenden Processus. (Caries oder Necrose.)

Das Allgemeinbefinden nimmt bei chronischem Verlaufe, wenn dasselbe nicht durch gleichzeitige, außerwärtige, scrofulöse Affectionen gestört ist, manchmal wenig Abtheil; bei acutem hingegen sowie bei Eiterbildung ist dasselbe in Form von Fieberbewegungen wohl immer ergriffen, welche bei ausgebreiteter reichlicher Eiterung bei der ohnehin häufig vorhandenen Schwäche des Individuums zum hektischen Fieber sich ausbilden können. Dasselbe endet mit Aufreißung des Kranken.

Die Diagnose wird nach der angegebenen Symptomatologie keinen besonderen Schwierigkeiten unterliegen.

Die Prognose ist wegen der so häufig nachfolgenden Necrose oder Caries ungünstig zu nennen, ebenso kann die Periostitis, die nach diese Processus sich deutlich ausbilden, durch die reichliche Eiterung dem Leben des Kranken gefährlich werden.

Therapie.

Die Behandlung hat sich im Anfange auf zertheilende Mittel zu erstrecken, obwohl diese nur in wenigen Fällen zu dem gewünschten Ziele führen werden; nichtdiesem sind bei größter Ruhe des betroffenen Gliedes schmerzstillende Medicamente (innerlich gegeben, und örtlich applicirt) in Gebrauch zu ziehen; Cataplasmen heben die Schmerzen in der Regel am schnellsten und dauerndsten, besonders bei beginnender Eiterbildung. Kann diese constant werden, so ist mit Einschnittes nicht zu zögern, da durch den meist rasch zunehmenden massenhaften Eiter das Periost immer weiter losgewirft und der Knochen in größeren Strecken seiner Ernährung beraubt wird.

Entzündung des Knochenmarkes. (Osteomyelitis, Endostitis.)

Die Entzündung des Knochenmarkes — in dem Markkanale — der Röhrenknochen kommt bei scrofulösen Individuen vor, und zwar in bedeutender Häufigkeit. Der pathologisch-anatomische Befund dieser Erkrankung ist: Hyperämie mit dunkelrother Färbung des Markes, neben welcher sich auch hin und da kleine Blutextravasate finden, und folgende Eiterbildung, anfänglich in kleinen verstreuten Herden, die sich mehr und mehr ausbreiten, während die Hyperämie nachläßt. Das Mark erhält eine schmutzig braun-gelbe Färbung, wird zerflüssend, die Knochenwände erscheinen entweder mäßig mit Granulationen und Jauche durchsetzt, in fortgeschrittener Receptien ergriffen, werden carös, oder bei rascher Zunahme der Eiterung des Markes werden dieselben ihres Blutzuflusses beraubt und fallen der Necrose anheim (Caries und Necrosis centralis). Die Erkrankung kann nach und nach den Knochen in seiner ganzen Dicke befallen, das Periost in Mitleidenschaft ziehen und die übrigen Processus hervorrufen, welche bei der Entzündung des Knochengewebes und ihren Ausgängen näher betrachtet wurden. Auch hinsichtlich der Symptomatologie und der Therapie kann auf diese Erkrankung verwiesen werden.

Eine bei Scrofulösen häufiger in die Erscheinung tretende Entzündung des Knochenmarkes ist diejenige, bei welcher das Mark in dem Markkanale und dem Knochenmaschen vom Röhrenknochen, besonders der kleinen Knochen der Hand und des Fußes, sich entzündet zeigt:

dabei ist stets Entzündung des Periostes vorhanden. Der Process, welcher in seinen späteren Stadien als Osteoporosis, Osteopongiosis, *Spina ventosa* bekannt ist, verhält sich in seinen ersten Perioden in der Weise, dass man sämtliche Markhöhlen und die Markböhle mit dunkelrothem, Blut- und fettreichem, selbst manchmal eiterig verflüssendem Marke gefüllt findet, während das Periost hyperämisch, geschwollen sich erweist. Im weiteren Verlaufe findet im Inneren des Knochens durch entzündlichen Vorgang eiterige Schmelzung und Resorption von Knochensubstanz statt, wodurch die Markräume eine abnorm grosse Weite erlangen, während sich ausser vom gleichfalls entzündeten Perioste her unregelmässige dünne Knochenlamellen bilden, die ebenfalls zum Theil wiederum durch den von Innen her fortschreitenden Resorptionsprocess zerstört werden. Auf diese Art kann der Knochen in bedeutendem Masse vergrössert sein, während seine Substanz doch abgenommen hat, indem das Innere aus ganz grobmächtigem, grossen Räumen oder unregelmässigen Zellen besteht, gleichsam als wäre der ganze Knochen stark aufgeblasen worden (daher die Benennung: *Spina ventosa*, Windflora). Eine Trennung in Markhöhle und umschliches Gewebe ist im entwickelten Zustande nicht mehr möglich.

Die Erkrankung kommt bei scrofulösen Kindern häufig an den Händen und Füssen, und zwar an den Mittelhand- und Mittelfussknochen oder den Phalangen vor, welche oft eine unförmliche Ausdehnung erhalten und grosse keltige oder rundliche Geschwülste darstellen. (Ähnlichkeit mit Enchondromen in den Fingern, mit welchen der in Rede stehende Process auch darin übereinstimmt, dass bei ihm in der Regel die Gelenke frei bleiben.) Ausbruch erfolgt nicht immer, ziemlich häufig fehlt derselbe, während im Falle eines Aufbruchs zwar zahlreiche Fistelöffnungen bestehen können, dieselben jedoch meist klein sind.

Therapie.

Durch den Gebrauch der passenden gegen die Grund-Krankheit gerichteten Mittel, sowie durch Bäder der leidenden Glieder (entweder in lauem oder mit Alkalien versetztem Wasser) und einen länger fortgesetzten Compressivverband erfolgt nicht selten Heilung mit nur geringer Deformität. Die chirurgischen Eingriffe sind auf das Ausziehen allenfalls vorhandener, loser Knochen splitter zu beschränken.

Entzündung des Knochengewebes. (*Ostitis scrofulosa*.)

Die Entzündung des Knochengewebes kommt bei scrofulösen Kindern häufig vor und hat ihren Sitz hauptsächlich in spongiösem Knochengewebe (den unregelmässigen und kurzen Knochen der Extremitäten, in den Epiphysen langer Knochen, den Wirbeln etc.), doch kommt dieselbe auch in glatten, compacten und Rohrknochen vor, wie überhaupt kein Knochen des Skeletes ausgenommen ist.

Unter mehr oder weniger deutlicher Hyperämie, die sich bis zum Austritte von Blut steigern kann, bildet sich an irgend einer Stelle des Knochengewebes ein Entzündungsherd, der rasch in Ausbreitung gewinnt, oder es sind deren mehrere entstanden, welche sich vereinigen. Die Knochenräume strömen von einer fettig-gallertigen Flüssigkeit, die

bald durch Granulationen ersetzt wird, die grossen Reichthum an Zellengebilden zeigen: die Maschen des Knochengewebes werden grösser, indem knöcherne Substanz durch die Wucherung der Granulationen zur Resorption gebracht wird (Osteoporose). Der Knochen selbst erscheint an den entzündeten Stellen voluminöser, obgleich seine Masse nicht zugenommen hat, im Gegenstheile weniger geworden ist. Besonders auffallend gibt sich dieses Verhältniss, wenn die Entzündung nahe der Oberfläche des Knochens ihren Sitz hat, kund. Häufig bemerkt man, wenn die Entzündung auch in der Tiefe des Knochens ist und denselben nicht bis zur Oberfläche einnimmt, dass die benachbarten Weichtheile bereits Abscessbildung erkennen lassen.

Eine bei Scrophulose häufig vorkommende, besonders die spongiosen Knochen und Epiphysen befallende Form der Entzündung ist die tuberculöse. Es bilden sich unter Hyperämie entweder ein oder mehrere Herde von runderlicher Form oder eine gleichförmige Infiltration der Knochenmassen mit einem halb durchscheinenden, graugelblichen, gallertigen Exsudate. Sind einzelne Herde vorhanden, so sind dieselben los und da mit einer Art Balg umgeben, welcher jenes Exsudat gleichsam einkapselt, bei den weiteren Veränderungen desselben jedoch schwindet. Es tritt bald Erweichung ein, die Herde bekommen eine gelbliche Färbung, in einer dickflüssigen, breiähnlichen Masse finden sich bröcklige knöcherne Theile und bei rascher Vergrösserung nicht selten kleine Knochenfragmente. Durch diesen Vorgang entstehen Höhlen im Knochen, welche durch Zusammenstossen mehrerer oft rasch eine bedeutende Grösse einnehmen können, so dass der Knochen morsch wird und gleichsam in sich zusammenbricht. Heilung kann in den ersten Stadien durch Resorption des flüssigen Inhaltes der Herde und Verkalkung oder Verkalkung des Restes derselben entstehen, während sich in der Nähe desselben Verdichtung des Knochengewebes bildet, wodurch Abkapselung manchmal zu Stande kommt; häufiger ist aber Durchbruch und Entlassung des tuberculösen Eiters mit Fortdauer des Processes als tuberculöse Caries, die dann ihre verschloßenen Metamorphosen durchmacht (s. Caries).

Die tuberculöse Infiltration befällt entweder einen ganzen Knochen (z. B. Wirbel) oder einen Theil desselben: oder es finden sich in dem von graugelblichem Entzündungsprodukte durchsetzten Knochen gelbliche Streifen und Flecken, die sich rasch vergrössern, zusammenfliessen und aus eitriger mit bröcklichen Körnchen untermischter Flüssigkeit entstehen, die bald den Charakter der eitrigen jauchigen, saueren annimmt. Unter ihrem Einflusse geht das Knochengewebe in grösseren und kleineren Partikeln zu Grunde und findet sich zuweilen in dem zum Vorschein kommenden, jauchigen Fluidum. Geht der Process weiter, so kann er auch auf das Peristost übergreifen, Zerstörung, Verjauchung und Absterben desselben bedingen. In anderen, selteneren Fällen begrenzt sich die Krankheit nach Abtödtung der infiltrirten Partien, und es tritt Heilung ein durch Anfüllung der Lücken mit Granulationen, ausgehend von einer benachbarten noch gesunden Knochenpartie oder vom Peristost und dessen Nachbarschaft. Das Ausgange der Entzündung der Knochensubstanz, nachdem dieselbe längere oder kürzere Zeit als solche bestanden hat, sind:

1) Zertheilung. Vollkommene Zertheilung ist bei Scrophulose

nur äusserst selten und nur bei Entzündungen weniger umfangreicher Knochenparthien beobachtet werden. —

2) Eiterung mit nachfolgender Heilung ohne Uebergang in Caries. Der Uebergang in Eiterung findet ziemlich häufig statt, seltener ist jedoch die Heilung, nachdem Aufbruch und Entleerung stattgefunden hat, meistens erfolgt dann unter dem Einflusse der krankhaften Diathese Verjauchung und langwierige Caries. Die Knochenräume sind bei diesem Ausgange ausgedehnt, vergrössert und voll von Eiter, es bilden sich durch Zugrundegehen des mässigen Knochengewebes kleinere und grössere Höhlen; ein Process, welches es wohl führen kann, dass sich an Knochen nur eine Höhle befindet, welche von einer gewöhnlich immer dünner werdenden Knochenschale und dem Perioste begleitet ist — Knochenabcess. — Hat sich der Eiter einen Weg bis zu den Weichtheilen gebahnt, so kann er dieselben entweder, besonders wenn in diesen bereits auch Abscessbildung nach vorhergegangener Entzündung stattgefunden hat, in gerader, dem Sitze der Erkrankung entsprechender Richtung durchbrechen oder er wandert eine Strecke zwischen denselben fort und erscheint in mehr oder weniger grosser Entfernung von der Ursprungsstelle. Der Eiter ist gelb oder gelblich weiss, ohne üblen Geruch, meist etwas dünn, ohne stehende Eigenschaften. Derselbe soll eine grössere Menge phosphorsäuren Kalks ($\frac{1}{100}$ — $\frac{1}{50}$) enthalten, als der in Weichtheilen gebildete Eiter ($\frac{1}{100}$). Nach Entleerung desselben hört, nachdem der Ausfluss noch längere oder kürzere Zeit angehalten hat, die Eiterung in günstigen Fällen auf, die Oeffnungen schliessen sich, die Höhle füllt sich mit Granulationen, in welchen mit der Zeit Knochenneubildungen auftreten.

3) Caries.

4) Necrose.

Beide Entzündungsausgänge bieten so beträchtliche Eigenthümlichkeiten, dass sie gesondert betrachtet werden müssen. Die Symptome der Knochen-Entzündung sind verschieden, je nach dem Sitze und der Ausbreitung derselben und je nachdem die Weichtheile in den Entzündungsprocess gezogen sind. Die Schmerzen fallen nie, Be-weilen sind sie fix, in anderen Fällen anstrahlend.

Die Anschwellung des leidenden Theiles ist ebenfalls verschieden, und es ist in der Regel schwierig zu entscheiden, wie viel der Anschwellung den Weichtheilen, wie viel der Anschwellung dem Knochen und seinem Perioste zukommt. Die Haut ist meist sehr empfindlich, geröthet, besonders wenn Abscess durchzubrechen drohen: solche Abscess entstehen nicht selten, ohne mit dem Leiden des Knochens in Berührung zu stehen, in den Weichtheilen, brechen auf, vernarben wieder und lassen unregelmässige, vertiefte Stellen zurück.

Das Allgemeinbefinden kann bei chronischer Knochenentzündung nur wenig gestört sein und erst bei beginnender Eiterung durch Fiebererscheinungen etc. Theil nehmen, bei acut auftretender Otitis fallen immerwährendes Fieber, Abmagerung, Kraftlosigkeit, Störung des Schlafes, Appetitmangel und Durcheinander selten.

Behandlung.

Bei langsamem Verlaufe und bei mässiger Schmerzhaftigkeit kann man zum Zwecke der Rückbildung Jodkalium, Mercurialpflaster (wenn

das Allgemeinleiden letzteres Mittel erlaubt) oder Vojakow's, Haarschelle als Ableitungsmittel anzuwenden, bei welchem Vorgange müssen, da die Schmerzen in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle sehr heftig sind und dabei zu einer Zerstörung etc. nicht zu denken ist, schon absolute Ruhe des Gliedes schmerzstillende Mittel gebraucht werden: Cataplasmen, eine grössere oder wiederholte Anzahl von Blutegeln; bei heftiger Exacerbation Eis, kalte Irrigationen, Mittel, welche besser vertragen werden als diese noch der gewöhnlichen Anstalt der Fall ist.

Sind die Knochenabszesse nach Aussen aufgebrochen, so erfordert die Behandlung, dass dem Eiter gehöriger Ausfluss gegeben werde: Ausspitzen der Fistelgänge und der Höhle etc.

Caries, Ulceratio ossis.

Verschwärung des Knochens.

Caries entwickelt sich bei scrophulösen Individuen am häufigsten aus einer primären Knochenentzündung eines oder mehrerer Knochen, und zwar überwiegend häufig in spangrünen Knochen, seltener ist sie in Folge von Periostitis durch Uebergreifen der Verschwärung der Beinhaut auf den Knochen bedingt. Die Caries breitet sich demnach vom Centrum gegen die Peripherie von innen nach aussen (*Caries centralis, C. profunda*) oder von aussen nach innen, von der Peripherie gegen das Centrum aus, *Caries peripherica, C. superficialis*. Bald ist dieselbe *circumscript* und stellt so das eigentliche Knochengeschwür dar, bald *diffus*, bald nur auf einzelne Theile des Knochens, bald auf den ganzen Umfang desselben sich erstreckend, *Caries partialis* und *totalis*.

Die Caries entwickelt sich nach den erwähnten Entzündungserscheinungen dadurch, dass die Granulationen eine röthlich-braune Flüssigkeit absondern, welche im Verein mit den zerfallenden Fetzen und den nur spärlich vorhandenen Eiterkörperchen die Jauchedarstellen, mit welcher sich die Maschenräume füllen; dann kommt allmählig Schwund der Knochenbalken zum Vorschein, wodurch der so erkrankte Knochen weich, zusammendrückbar wird, bis derselbe durch die Schicht für Schicht fortschreitende Zerstörung vollständig verschwindet.

Häufig geht aber die Knochensubstanz nicht allein durch allmähigen Schwund und Zerfall zu Grunde, sondern auch durch Necrose, indem noch an und für sich normale Knochenstücke, welche den cariösen Stellen zunächst liegen oder bereits ulcerirende Partien unserer Ernährung gebrucht werden, absterben und kleinere oder grössere Sequester bilden (*Caries necrotica*).

Die Verschwärung des Knochens breitet sich auch auf die umgebenden Theile, welche in der Regel schon durch die vorhergehende Entzündung in Mittheilenschaft gezogen wurden, aus: das Periost erfährt Zerstörung durch Verjauchung der Weichtheile, besonders das Zellgewebe wird da, wo das Periost zerstört ist, von Verschwärung ergriffen, es bilden sich in ihm grössere und kleinere Eiterherde, Fistelgänge und endlich erfolgt nach Perforation der entzündlichen Haut Durchbruch nach Aussen, worauf die cariose Jauche abfliesst. Häufig findet

man in den Weichtheilen, besonders in der Nähe des Perioste, Osteo-
phytenbildungen.

Das Secret ist meist dünnflüssig, von indem, widrigem Geruche
(inhaltem Fleische ähnlich) mit Knochenpartikelchen oder bei tuber-
culöser Caries mit kleinen Krümchen und Flocken (sowie ebenfalls mit
Knochenstückchen) vermischt. Um die Fistelöffnung wuthern weiche,
schwammige Granulationen, welche den Eingang in dieselbe häufig
verlegen und bei der Berührung sehr leicht bluten. Die Fistelgänge
laufen in der Regel in gerader oder schiefer Richtung gegen den er-
krankten Knochen, doch manchmal auch erst nach mehreren Biegungen,
selbst Knickungen, indem die Jaulche nicht direct, sondern erst auf
Umwegen zur Körperoberfläche gelangt. Je nach dem Verlaufe der
Fistelgänge kommt man leichter oder schwieriger mit der Sonde zur
erkrankten Knochenstelle und fñhlt diese rauh, uneben, wie wurm-
stichig und leicht eindrückbar. (Die Sonde fñhrt sich häufig durch
die Schwefelverbindungen der Jaulche schwarz, ebenso die mit der
letzteren in Berührung kommenden Bieplaster etc.)

Das Allgemeinzustehen leidet bei Caries wenig, im Falle kleinere
vom Körperstamme entfernte Knochen ergriffen sind. In anderen
Fällen, z. B. Wirbelcaries etc., ist dasselbe in höherem Grade alterirt
(s. Spondylarthritis). Heilung ist in der grössten Mehrzahl der
Beobachtungen nicht möglich, wenn nicht die zu Grunde liegende
Dyscrasie getilgt ist, und auch dann schreitet oftmals die Caries noch
weiter bis zur Zerstörung des befallenen Knochens fort, auch wohl
noch auf benachbarte übergreifend. — Soll Heilung zu Stande kommen,
so muss die Jaulchebildung und der Schwund der Knochensubstanz
stillen, die Granulationen werden dann fester, consistenter, faserreicher;
von ihnen, wie von den benachbarten Gehilden, vorzüglich dem ver-
dickten Perioste, beginnt dann Verknöcherung, durch welche der Sch-
merzverlust ausgeglichen wird.

Die Diagnose ergibt sich, ebenso wie die Prognose, grösstentheils
aus dem Erwähnten. Kann man auch mit der Sonde den cariesen
Knochen wegen complicirten Verlaufes der Fistelgänge nicht erreichen
und die Diagnose ganz sicher feststellen, so wird die Beschaffenheit
des Eiters, das Aussehen der Oeffnungen der Fistelgänge, die ganze
Entstehungsweise im Einklang mit der Localität der Natur der Knochen-
theile — spongiöse Knochen — und dem Allgemeinzustehen genügenden
Aufschluss geben.

Behandlung der Caries.

Der Verband geschieht am besten durch feuchte Compressen oder
feuchte Charpieballen und Bäuschchen, welche häufig erneuert werden,
während das betreffende kranke Glied so gelagert wird, dass der
Ausfluss am leichtesten vor sich geht. Bei Blutungen aus den schwam-
migen Granulationen können diese mit Holsteinen betupft und mit
lächlen Abstrugentien verbunden werden. Oertliche Bäder sind em-
pfehlenswerth und sollen, wo immer die Oertlichkeit ihre Anwendung
gestattet (Hand, Fuss etc.), gebraucht werden. Man verordnet am
häufigsten ausser den Warmwasserbädern der Reinlichkeit wegen alka-
lesche und schweflige Bäder, denen man bei grösserer Schmerzhaftig-
keit narcotische Auflösungen mischen kann.

Allgemeine Böden sind ebenfalls von Nutzen, doch darf kein zu grosser Schwächegrad vorherrschend und mit dem Bilde nicht etwa Gefahr verbunden sein (z. B. bei Wirbelsaries). Abscesse, die unmittelbar mit der Beinhaut oder dem Knochen in Verbindung stehen und deutliche Fluctuationen zeigen, sind zu eröffnen, Congestions-Abscesse so wenig und so spät als möglich anzugreifen.

Hinsichtlich operativer Eingriffe kann bei Caries die Resection kleinerer und grösserer Knochenparthien, die Amputation oder Exarticulation in Betracht kommen. Doch richten sich die Indicationen hier so genau nach dem einzelnen Falle bezüglich seines localen Leidens und seines Allgemeinbefindens gegenüber dem Nutzen, den ein operatives Verfahren gewähren kann, dass keine allgemeinen Anhaltspunkte aufgestellt werden können.

Brand, Absterben einer Knochenparthie.

Necrosis.

Die Necrose des Knochen kann bei der Scrophulose zu Stande kommen durch Entzündung des Periostes, der Knochensubstanz oder des Markes, wobei der Knochen, durch Lösung der Periostes oder der Markhaut, durch Unwegsamkeit seiner Gefässe in Folge von Verstopfung oder Druck massenhafter Exsudate ausser seine gewöhnlichen Ernährungsverhältnisse gebracht, absterben muss. Auf diese Weise können alle Ursachen und Veranlassungen zur Caries auch Necrose hervorrufen.

Die Necrose befällt gewöhnlich nur einen Theil des Knochen, und zwar entweder die äussere Knochenhülle als Necrosis externa (N. superficialis), oder die innere Lamelle einer Markhöhle oder eines Stückes schwammiger Knochensubstanz in der Tiefe als Necrosis interna (N. centralis); sie kann auch den Knochen in seiner ganzen Dicke, selbst in seiner vollkommenen Totalität betreffen (Necrosis totalis).

Die Necrose kommt zwar bei der Scrophulose an allen Knochen vor, jedoch sind gewisse Knochen überwiegend häufig ergriffen, besonders die Diaphysen langer Röhrenknochen (Tibia, Femur, Humerus, Ulna, Radius), nächstdem die platten Schädelknochen. Im Verein mit Caries kommt sie in den spongösen Knochen vor, ausserdem werden diese seltener von Necrose ergriffen. Der Vorgang der Necrose gestaltet sich nach dem Sitze eingemessen verschieden.

a) Bei centraler Necrose (Necr. interna) findet sich das ausser Ernährung gebrachte, abgewanderte Knochenstück — der Sequester — in einem von Granulationen angekleideten Raume — Sequestraltasche, Todtenlade, — die Wände dieses Raumes bestehen aus altem Knochen und aus neuem, der sowohl in der Markhöhle als auch der Oberfläche des Knochen durch die hier entstehenden Entzündungsprocesses gebildet wurde und nach und nach in den compacten Zustand übergeht; der Knochen erscheint dadurch dick, plumper. Von der Sequestertasche entstehen Oefnungen in verschiedener Anzahl, welche mit Granulationen ausgekleidet sind und, im Hohlwege sich fortsetzend, nach Aussen münden — Cloaken.

Die Oefnungen am Knochen sind rund, oval, von verschiedener Grösse, aussen mit einem Granulationswalde umgeben; aus ihnen kommt,

so lange der Sequester seinen Sitz in der Kapsel hat, Eiter zum Vorscheine, und wenn sie auch vorübergehend zuheilen, brechen sie doch in der Regel bald wieder auf.

Wird der Sequester entfernt, so füllt sich das Cavum durch Granulationen und selbst durch compacte Knochenmasse — vorausgesetzt, dass der Allgemeinzustand nicht sehr herabgekommen ist, — und die Fistelgänge schliessen sich meist mit Hinterlassung narbiger Einziehungen.

b) Bei *superficialer Necrosis* — in Folge von *Periostitis* — ist der Sequester in der Regel in keine vollständige Kapsel eingeschlossen. Derselbe gibt die günstigsten Bedingungen zur Heilung, da er leichter ausgestossen oder entfernt werden kann, die Schinde, in der derselbe lag, wird mit Granulationen ausgefüllt und die Oeffnung schliesst sich zu einer auf dem Knochen aufsitzenden Narbe.

c) Bei *Necrosis totalis* kommt es ebenfalls selten zur Herstellung einer vollständigen Todtenlade durch die periphere Knochen-Neubildung an der Grenze des Sequesters, sondern dieselbe ist mangelhaft durch Lücken unterbrochen, die Weichtheile sind von Fistelgängen meist von beträchtlicher Grösse und Weite durchzogen. Ist der Knochen abgestorben, so wird die grosse Lücke durch fortgesetzte Granulationsbildung von der Sequestralfläche, dem Perioste und sonstigen Weichtheilen ausgefüllt, in welchen freilich bald langsam, bald schneller sich Knochensubstanz neu entwickelt.

d) Die *Necrose* ganzer Knochen kommt bei Scrophulose an der Hand und dem Fusse hiezuweilen vor und ist stets Folge einer intensiven *Periostitis* und *Ostitis*. Der aus dem ganzen Knochen bestehende Sequester zeigt daher meist Spuren der Entzündung, ist zuweilen sogar in hohem Grade carlös osteoporeotisch und lagert in einer weichen, mit Eiter und Jauche gefüllten Höhle. Nach Entfernung des Sequesters kann sich die Höhle mit Granulationen füllen, und aus dem verdickten Perioste und den Weichtheilen können neue Knochenzapfen sich bilden.

Ueber die Symptomatologie der *Necrose* gilt wesentlich das bei der Betrachtung der *Periostitis* und *Ostitis* Angegebene. Ist Ausbruch der Geschwulst erfolgt, oder ist dieselbe geöffnet worden, so gelangt man, wenn der Process bereits zur *Necrose* vorgeschritten ist, durch die Oeffnung auf den abgestorbenen Knochen. Derselbe bietet in den meisten Fällen bei der Berührung einen härlichen Ton, fühlt sich glatt und fest an, doch ist derselbe auch, z. B. bei der totalen *Necrose* spongiöser Knochen, rauh, anheben, hertelgig, einen dumpfen Ton beim Anstossen gebend. In solchen Fällen ist die Unterscheidung zwischen *Caries* und *Necrosis* sehr schwierig, zumal da das Secret der Sequesterkapsel auch ein jauchebähnliches sein kann.

Was die Prognose betrifft, so ist diese am günstigsten bei oberflächlicher *Necrose*, bedenklicher ist dieselbe, wenn der Sitz in der Tiefe und die Krankheit weit umgedehlet ist, insbesondere sich durch die ganze Dicke eines Knochens erstreckt. Die Heftigkeit und Ausdehnung der Entzündung, weiterhin der Eiterung, lassen bei scrophulösen Individuen die Gefahr des heftigen Fiebers nahe treten. Um so wichtiger ist, dass bei dergleichen Fällen in der Regel nur durch operative Eingriffe geholfen werden kann, die an und für sich nicht gefahrlos sind.

Die Behandlung soll außer der Bekämpfung der zu Grunde liegenden Dyscrasie vorzüglich darauf gerichtet sein, dass die Austossung oder künstliche Entfernung des Sequesters möglichst bald vor sich gehe. Bei oberflächlicher Necrose ist dieser Indication leicht Genüge zu leisten, man hat entweder den sich bildenden Abscess zu öffnen oder die bereits bestehende Oeffnung zu erweitern und den Sequester, vorausgesetzt, dass er vollständig gelöst ist, ausziehen; sollte dies nicht der Fall sein, so ist Abwarten unter einem geeigneten einfachen Verbands jedem eingreifenden Verfahren, Brechen, Aetzen, Ausschneiden vorzuziehen. Bei der eingekapselten Necrose (der centralen und häufig der totalen) hat man mechanische Hindernisse, welche die Austossung des Sequesters unmöglich machen oder wenigstens auf lange Zeit verzögern, durch mechanische Eingriffe zu beseitigen, da das längere Verweilen zu den ungünstigsten Zufällen Veranlassung geben kann. Die Mittel zur Befreiung des Sequesters aus der ihn umschliessenden Sequesterkapsel bestehen in einer hinlänglichen Eröffnung letzterer mittelst des Trepan, des Osteotoms, kleiner Stichsägen oder des Meissels und Herausnahme des toten Knochenstückes mit der Kourange etc. Die Anfüllung der Hölle mit Granulationen, die Verwundung u. s. w. wird unter einem einfachen Deckverband abgewartet und durch zweckmässige Behandlung des Allgemeinzustandes zu beschleunigen gesucht.

Entzündung der Wirbel bei Scrofulösen. Spondylitis.

Tuberculose, destructive Wirbelentzündung, Tuberculose der Wirbel, Spondylarthrocace¹⁾, Malum Pott, Kyphosis paralytica.

Dieses bei scrofulösen Kindern so häufig vorkommende Uebel entsteht entweder ohne alle nachweisbare äussere Ursache als Theil verbreitung der Scrofulose, wird aber auch in manchen Fällen durch traumatische Einflüsse: Stoss, Fall etc., bei scrofulösen Individuen hervorgerufen. Das Wesen der Krankheit ist Entzündung eines oder mehrerer Wirbelkörper mit dem Charakter der tuberculösen und der entschiedenen Neigung zur Jauchung und ulcerösen Zerstörung der Knochen. In der Regel tritt die Erkrankung in der Form der infiltrirten Tuberculose — nach dem oben beschriebenen Vorgange — auf, seltener als abgekapselter Tuberkelnöten, und zwar meistens in der Mitte oder nahe der Mitte des Wirbelkörpers. Seltene Fälle sind diejenigen, in welchen der Wirbelbogen, Quer- oder Schrägfortsätze das primär Ergriffene sind, noch seltener die Gelenkfortsätze. Die Zwischenwirbelscheiben erfahren zwar auch Zerstörung, allein erst secundär, wenn die Erkrankung auf dieselben überschreitet oder die Wirbelkörper zusammenknicken. Letzteres geschieht, nachdem der Körper des Wirbels ganz oder zum grössten Theile infiltrirt ist, wenn sich durch Schmelzung der Tuberkelmassen Cavitäten gebildet haben, so dass der Wirbel der Last der oberhalb liegenden Theile nicht mehr Widerstand leisten kann. Die Krümmung erfolgt zumeist nach rück-

¹⁾ Der Name Spondylarthrocace, der für diese Krankheit betrachtbar, ist nicht gut gewählt, da die Thätigkeit des Wirbelsinns erst nachher eintritt, und diese auch ganz bei Heilung können.

warts (Kyphosis, Pettscher Buckel), ist aber in der Regel mit einer mehr oder weniger bedeutenden Seitwärtskrümmung verbunden (Scoliosis, Kyphosis scoliotica), sie entsteht meist allmählig, seltener schnell (bei sehr rascher Erweichung, bei einem auf die kranke Stelle wirkenden Trauma etc.), und geht nothwendiger Weise mit Veränderungen im Rückenmarkskanal und seinem Inhalte einher: Hyperämie, Entzündung und Erweichung der Rückenmarkshäute und des Rückenmarks, Compression dieser Theile, ohne dass jedoch in allen Fällen lebhafte Erscheinungen zum Vorschein kommen, in manchen sind im Gegentheile dieselben sehr gering. Der Nervus sympathicus muss bei Krümmung der Wirbelsäule eine Zerrung erfahren, doch ist über die dadurch bedingten Symptome nichts sicheres bekannt.

Die erkrankten Wirbel erregen und unterhalten in der Nachbarschaft einen Entzündungsprocess, welchem bald reichliche Eiterung folgt. Es bilden sich Eiteransammlungen, die zuweilen als Senkungsabscesse an der vorderen Fläche der Wirbelsäule nach abwärts sich erstrecken und sich über die Schenkelfuge oder in das kleine Becken herablagern können. Auch nach rückwärts — an der Rückenfläche — kommen solche Abscesse, die oft sehr bedeutende Grösse erreichen können, zum Vorschein; seltener erfolgt ein Durchbruch in den Wirbelkanal. Die Abscesse enthalten dünnflüssigen Eiter oder Jauche, mit zersetzten oder verfallenen Tuberkelmassen gemischt, auch wohl kleine Knochenfragmentchen und Brandreste; der Inhalt hat meist einen sehr unangenehm üblen Geruch, färbt Sonden schwarz etc. (S. Caries.)

Mit der Zerstörung der Wirbel kann andererseits in den benachbarten Theilen Knochen-Neubildung verbunden sein, und man findet auch häufig die nächsten Wirbel oder die Zwischenräume zwischen den Bogen und Fortsätzen mit zackiger, unregelmässiger Knochenneubildung besetzt und ausgefüllt. Spontane Luxation von Wirbeln ist ausser bei den beiden obersten Halswirbeln sehr selten beobachtet worden.

Die ersten Zeichen der Krankheit beziehen sich auf die Wirbelsäule und bestehen in schmerzhaften Gefühlen, von dieser ausgehend. Kleiner Kinder sind unruhig, bieten Aeusserungen von Unbehaglichkeit, weinen bei Berührung des Rückens oder schneller Bewegung, grössere vermeiden diese sorgfältig und klagen über bald fixe, bald wandernde Schmerzen an der erkrankten Stelle oder deren Nachbarschaft.

Schon bei den ersten Angaben über Schmerzhaftigkeit ist eine genaue Untersuchung des Rückens und der Wirbelsäule nicht ausser Acht zu lassen; dieselbe muss durchtastet, percutirt werden, und der Kranke soll verschiedene Körperbewegungen machen, wodurch häufig der Sitz des Schmerzes genauer ermittelt werden kann. Nebst diesen örtlichen Symptomen fehlen allgemeine Erscheinungen bei einigermaßen vorgeschrittenem Uebel nie: es entstehen Appetitlosigkeit, Fieberbewegungen, Schlaflosigkeit, Abnahme der geistigen Fähigkeiten.

Im weiteren Verlaufe sieht man wichtige örtliche Veränderungen entstehen, nämlich: die Krümmung der Wirbelsäule nach hinten und zur Seite, mit welcher Hand in Hand eine Difformität des Thorax geht, indem die Rippen auf der Seite der Krümmungsconvexität weitere Abstände bilden, als auf der concaven Seite. Dabei zeigen sich in den weiteren Erscheinungen Modificationen je nach der Localität, welche die Erkrankung einnimmt.

1) Die Spondylitis thoracica beginnt in der geschilderten Weise, dabei klagen die Kinder über Schmerzen in den Beinen, über Krüppeln und über das Gefühl von Anwesenlaufen in den Waden und Schienbein, über Druck in der Herzgrube und dem Unterleibe, es gesellen sich nicht selten krampfartige Affectionen in den genannten Theilen hinzu, Verstopfung und Schwierigkeit der Harntentleerung. Bewegungen der Wirbelsäule werden sorgfältig vermieden, der Hals wird möglichst nach rückwärts gezogen und verkürzt, so dass der Kopf zwischen den Schultern zu stecken scheint, die Ellbogen werden an den Leib gehalten und die Hände auf die Schenkel gestützt. Hierauf kommen Senkungsabscesse, es stellen sich Lähmungserscheinungen ein, die allgemeinen Symptome nehmen die Bedeutung des heftigen Fiebers an, nicht selten von amyloider Nierendegeneration begleitet, und der Tod erfolgt nach längerer oder kürzerer Zeit. Doch kann der Kranke, wenn sich die Kräfte desselben nicht in zu hohem Grade erschöpft haben, in allen Stadien des lokalen Leidens mit dem Leben davon kommen, freilich mit einer unheilbaren Verkrümmung der Wirbelsäule und des Thorax, zuweilen auch mit Lähmungserscheinungen der unteren Extremitäten, des Mastdarms und der Blase, die in der Regel ebenfalls jeder Behandlung Trotz bieten.

2) Spondylitis cervicalis, Angina Hippocratica.

Je weiter die Erkrankung nach abwärts gegen die Brustwirbelsäule ihren Sitz hat, um so mehr hat das Krankheitsbild Aehnlichkeit mit dem oben erwähnten, nur kommen noch die Erscheinungen von Seite der oberen Extremität in Form von spastischen bis zu paralytischen Störungen in Betracht, je weiter nach aufwärts gegen das Hinterhaupt zu, um so mehr zeigen sich Symptome von Seiten der Schling-, Stimm- und Brustorgane. (Daher auch die alte Benennung Angina Hippocratica.) Bei dieser Form findet sich häufig Anschwellung der Nackengegend von bisweilen bedeutender Grösse, so dass dadurch selbst die Knochentafel der untersuchenden Hand verdeckt bleiben kann. Diese Schwellungen sind meist fest, prall, derb, und haben zu der Benennung „Tumor albus molleus“ (analog dem Tumor albus der Gelenke) Veranlassung gegeben. Am gefährlichsten ist der Sitz der Krankheit am ersten und zweiten Halswirbel, weil es an dieser Stelle leicht zur Compression der Medulla oblongata, und wegen der Wichtigkeit dieses Organes zum sofortigen tödlichen Ausgang kommen kann. Ursache ist die grosse Beweglichkeit der Gelenkverbindungen, sobald nur das Ligamentum transversum Atlantis zerstört oder bedeutend affigirt ist.

Die Bewegung des Kopfes ist schmerzhaft, dieselbe wird möglichst gemieden und der Nacken und Hals steif gehalten, oder bei Bewegungen der Kopf und der Nacken mit der Hand gestützt. Die Kopfschmerzen sind meist lebhaft und feldern den Kranken besonders bei Nacht vielfach, die Schlingbeschwerden nicht selten sehr beträchtlich, besonders wenn die Krankheit zur Bildung der Retro-Pharyngeal-Abcessse vorgeschritten ist, die den Kranken die Einführung von Speise und Trank sehr erschweren, da sie eine bedeutende Grösse erreichen können. Diese Form der Wirbelcaries tödtet bei einiger Intensität der Erkrankung entweder durch die oben erwähnte Luxation der oberen Halswirbel, oder durch Uebergreifen derselben auf die Hirnhäute und

das Gehen, oder unter colligativen Erscheinungen. Leichtere Grade können zur Heilung gelangen: in der Regel mit bleibender oder schwer zu verbessernder Difformität in der Haltung des Kopfes. (Eine Art des Caput obstip. leitet ihre Entstehung von dieser Krankheit ab.)

3) Spondylitis lumbalis und sacralis.

Der Sitz dieser Form, der bei scrofulösen Kindern am wenigsten häufig auftretenden, ist der untere Abschnitt der Lendenwirbelsäule, das Kreuzbein in seltenen Fällen auch eine benachbarte Partie des Darmbeines. Den eigentlichen Schmerzen gehen nicht selten unangenehme Empfindungen — in der Form der Ischias — in den Schenkeln voraus. Das Kind liegt mit angezogenen Schenkeln seitwärts im Bette, kann sich nur mühsam erheben, wobei es die Gesäß- oder Hüftgegend mit den Händen stützt. (Einge Achselhöhle mit Coxitis.) Eitersonkungen finden in das Becken statt und können sich durch Afterloch oder Mastdarm entleeren, selten kommen sie in der Leisten-gegend zum Vorschein. Lähmung der Sphincteren des Mastdarnes und der Harnblase ist bei dem tiefen Sitze selten, weil die diesen Organen vorstehenden Nerven bereits oberhalb des Krankheitssitzes sich befinden. Das Leben ist durch die Eiterung mit ihren Folgen bedroht, auch ist schon öfters letzhale Meningitis oder Myelitis beobachtet worden.

Behandlung.

Die Therapie sollte außer der Bekämpfung der Dyskrasie vorzüglich darauf gerichtet sein, die Ausbreitung der Erkrankung auf edle Gebilde, Hirn, Hirnhäute, Rückenmark, zu verhindern. Sorgsam muss jede mechanische Gewalt und jeder Insult auf die Wirbelsäule besonders — aus erwähnten Gründen —, wenn die Krankheit in dem obersten Abschnitte derselben sich befindet, vermieden werden. Daher ist, so lange der Krankheitsprocess noch nicht vollständig abgelaufen ist, ruhige horizontale Lage auf dem Rücken, oder wenn dies nicht möglich ist, in einer Seitenlage auf einer gut gepolsterten Matratze anzuordnen und der Patient allenfalls durch Vorrichtungen in derselben zu erhalten. Der entschlossen rationelle Vorschlag, durch eine anhaltende Bauchlage der zunehmenden Verkrümmung der Wirbelsäule mechanisch entgegen zu arbeiten, scheitert meistens an der Ungeduld der Kleinen. Um den Kindern den Genuss der frischen Luft nicht zu entziehen, sind dieselben, wo es nur immer ermöglicht werden kann, auf ihrem Lager in das Freie zu bringen.

Gegen die heftigen Schmerzen ist außer mit Narcoticis, innerlich oder örtlich in Form von Opium, Morphinum-Salbe angewendet, mit Ableitungen zu verfahren. Von Vortheil sind kleine Vesicantien, ein-greifender, jedoch ebenfalls gegen die Schmerzhaftigkeit nicht selten von Vortheil, ist das Haarsöl.

Sezuktionsabscesse sind, so lange sie nicht voluminös sind, möglichst lange nicht zu öffnen, da die Erkrankung nach deren Eröffnung meist raschere Fortschritte macht: haben dieselben einen grossen Umfang erreicht, gehen sie mit heftigen Schmerzen einher, steht Aufbruch nach Röhre und Entzündung der Haut in Bälde doch zu erwarten, so kann die Entseerung vorgenommen werden.

a) Gelenke.

Gelenkserkrankungen finden sich bei scrophulösen Individuen sehr häufig als Theilerscheinung der allgemeinen Erkrankung, ohne dass eine weitere äussere Ursache nachzuweisen wäre, und sind in der Regel mit anderweitigen Erscheinungen der Scrophulose verbunden. Anatomisch unterscheiden sich diese Entzündungen durch nichts Wesentliches von anderen, durch Traumen, rheumatische Einflüsse etc. entstandenen, bekommen jedoch eben durch das Allgemeineiden, welches ihnen zu Grunde liegt, hinsichtlich ihrer Erscheinungen einen eigenthümlichen Charakter. — Sie beginnen und verlaufen entweder acut oder chronisch, und nehmen entweder ihren Ursprung von den das Gelenk bildenden Knochenenden oder von der das Gelenk auskleidenden Membran der Synovialhaut — (manchmal von beiden zugleich) — und stellen auf diese Weise in ersterem Falle das klinische Bild der Arthrocace, in letzterem dasjenige der fungösen Entzündung (des Tumor albus) dar.

I. Arthrocace.

Die spongiosen Gelenkenden werden von Entzündungen befallen, welche nach der bei Ostitis etc. beschriebenen Weise ihren Ausgang in Suppuration und Caries nehmen. Es tritt Vereiterung, Verjauchung ein, die Knochenrinde wird in dem cariosen Process gezogen, perforirt, es entstehen in den umgebenden Weichtheilen Abscesse, während gegen die Gelenkhöhle hin nach Zerstörung der knorpeligen Theile der Eiter oder die Jauche sich Bahn macht und in derselben rasch suppurative Entzündung hervorruft. Nach Zerfall der knorpeligen Gelenküberzüge und Destruction der Synovialhaut und des Bandapparates ragen die cariosen Gelenkenden der Knochen in das erweiterte mit Jauche gefüllte Cavity, wobei nicht selten Abtossung einzelner Knochenpartikelchen stattfindet. Lageveränderung der Gelenkenden ist bei der Aufhebung des zusammenfügenden Apparates sehr leicht möglich.

Diese Art der Entzündung befallt vor Allem häufig das Hüftgelenk.

II. Fungus articulari.

In anderen Fällen findet sich vorzugsweise die Synovialmembran erkrankt. Dieselbe zeigt sich in den Anfangsstadien der Entzündung gelockert, infiltrirt, mit kleinen Hervorragungen — Granulationen — bedeckt, von flüchtigem oder warzigem Ansehen, späterhin wuchern die Granulationen zu zottigen, kolbigen, verästigten, in die Gelenkhöhle ragenden Excrescenzen, die Membran ist verdickt, infiltrirt, mit Eiter durchsetzt. Ebenso nimmt auch die Nachbarschaft des Gelenkes an der Entzündung Theil: das Zellgewebe, die Gelenkbänder etc. sind gallertartig oder speckig infiltrirt, mit spigigen Bindegewebswucherungen in Form schwammiger Massen durchzogen. In Folge von Abscessbildung werden die Weichtheile nicht selten von Fistelegängen durchbohrt, die sich häufig bis in die nächste Nähe des Gelenkes begiehn, um nach Durchdringung der Kapsel entweder von Aussen nach Innen oder in umgekehrter Weise in dasselbe zu münden. Das Unterhautzellgewebe ist meist sehr infiltrirt und im Zustande der Hypertrophie, die Haut gespannt und, so lange kein Ausbruch erfolgt ist (eine Er-

scheinung, welche öfters lange auf sich warten lässt), weißlich glänzend: daher die ältere Benennung *Tumor albus*. Die in der Nähe des Gelenkes befindlichen Muskeln werden meist weiß, atrophisch und erstarren fettig. Die Gelenkknorpel werden entweder von den fungösen Wucherungen überzogen und gehen in denselben unter oder sie zerfallen durch den abnormen Inhalt der Gelenkhöhle rasch und zerfallen zu einer pulprigen, fettigen Masse. Die Knochen nehmen im weiteren Verlaufe ebenfalls Antheil, und zwar werden dieselben in der Mehrzahl der Fälle cario, so dass im Endresultate diese Form der Entzündung mit der ersten die grösste Ähnlichkeit zeigen kann. Bei beiden hat man nicht selten Gelegenheit, in der Umgebung des Gelenkes, entweder an den knöchernen Parthien oder in den Weichtheilen, ungebildete Knochensubstanz in Gestalt von unregelmässigen Hervorragungen, Splitterchen etc. zu finden.

In selteneren Fällen geht die Entzündung gleichzeitig vom Knochen und der Synovialis aus: es kommt jedoch hierbei nicht sowohl zu massenhaften Wucherungen, von letzterer entspringend, sondern es wird meist rasch Eiter in die Gelenkhöhle producirt. Im Uebrigen ist das Verhalten der Weichtheile etc. das Gleiche.

Die fungöse Entzündung kommt hauptsächlich am Kniegelenke zur Beobachtung.

Symptome.

Die serofulöse Gelenkentzündung kann als eine acute, selbst sehr acute auftreten und als solche verlaufen oder späterhin in den chronischen Zustand übergehen; der Beginn kann jedoch auch chronisch sein, der fernere Charakter chronisch bleiben oder die Entzündung sich zur acuten steigern. Bei letzterer treten — wenn nicht etwa eben andererseits durch Serofulose bedingte fieberhafte Erscheinungen vorhanden sind — Frieschauer, abwechselnd mit Hitzegefühl, Appetitlosigkeit, grosse Unruhe auf, mit welchen Symptomen entweder zugleich oder in kurzer Zeit darauf Schmerzen im erkrankten Gelenke und in dessen Nachbarschaft nicht selten bis in ziemlich weite Entfernung sich kund geben. Dieselben sind anfangs meist intercurrent, dumpf, bei Bewegungen und Druck sich steigend, werden jedoch bald anhaltend intensiv und erfahren bei Bewegungsversuchen des ergriffenen Gelenkes häufig eine derartige Steigerung, dass die Kinder laut aufschreien. Deshalb hat auch das entzündete Gelenk sehr häufig eine gewisse Tendenz, eine bestimmte Lage anzunehmen, und zwar eine solche, welche die um das Gelenk herumliegenden Bänder und Muskeln in das grösstmögliche Gleichgewicht bringt und so wenig als möglich Spannung verursacht, weil die dadurch vermiedene Zerrung der Theile den Schmerz noch am ehesten erträglich macht. So z. B. wird der Schenkel bei Coxitis in Flexion, Adduction und mässige Rotation nach Innen, beim entzündeten Ellenbogengelenk der Vorderarm in die Mitte zwischen Pro- und Supination gebracht. Oertlich zeigt sich in der Regel lahm Anschwellung der Gelenkgegend, die entweder auf diese beschränkt ist oder sich in weiterer Ausdehnung verbreitet, eine runde, spindelförmige, unregelmässige Gestalt und Form hat, weich und teigig, oder hart, peall. fest, derb ist und erst späterhin Weichheit und Fluctuation erkennen lässt.

Die Haut ist bald geröthet, gespannt, mit kleineren und grösseren Gefässen (besonders Venenstämmen) durchzogen, in ihrer Temperatur erhöht, heiss, oder sie bietet keine Farbveränderung dar, lässt sich in mehr oder minder grosse Falten erheben, ist ohne vermehrtes Wärmegefühl. Kommt es zum Aufbruch der in der Tiefe und im Gelenk entstandenen Entzündungsproducte, so röthet sich die Haut, wird nicht selten bläulich gefärbt, die Epidermis hebt sich ab. Nach der natürlichen oder künstlichen Eröffnung lassen in der Regel die Schmerzen einige Zeit nach, so dass die Patienten ruhiger werden, dieselben beginnen jedoch in Bälde wieder, wenn auch nicht leicht mehr in dem bedeutenden Grade. In der weiteren Folge gestaltet sich das Krankheitsbild verschieden, je nachdem die Krankheit den acuten Verlauf durchläuft oder sich dem chronischen nähert. Im ersteren Falle erfolgt in der Regel der Tod einige Zeit nach dem Aufbruche unter den Erscheinungen eines pyämischen oder Consumptionsfiebers; beim zweiten Falle kann das Stochthum lange Zeit dauern und der Tod erst späterhin durch Erstickung oder bei einer neuen Exacerbation der Entzündung eintreten; oder es kann der Process sich zum Günstigen wenden und einen der zu erwähnenden anderweitigen Ausgänge nehmen.

Die chronische Form der Entzündung beginnt meist mit mässigem Fieber, der Schmerz ist in der Regel ebenfalls anfangs gering und wird nur durch ausgebreitete Bewegungen, durch stärkeren Druck auf das Gelenk gesteigert oder erfährt bei auskaltender Witterung eine Vermehrung. Auf diese Weise kann der Process einen längeren Zeitraum durchwachen, bis Aufbruch eintritt, wobei dann die Erscheinungen sich ändern, je nachdem eine ausgebreitete Entzündung auftritt oder die Krankheit auch jetzt noch ihren chronischen Charakter beibehält. Ist erstere Thatsache der Fall, so können auch dann noch alle Symptome einer acuten Gelenkentzündung mit rapidem Verlaufe zum Vorschein kommen. Nebst den erörterten ungünstigen Ausgängen kann die Gelenkentzündung, besonders wenn dieselbe auf die geeignete Weise allgemein und local behandelt wird, folgende Resultate darbieten:

1) Genesung ohne bedeutendere Störung der Function des Gelenkes. Dieser Ausgang setzt voraus, dass die Erkrankung keinen zu hohen Grad erreicht hat, dass die Gelenkkörper und Bänder keine ausgebreitete Zerstörung erfahren haben. Da jedoch diese günstigen Vorbedingungen nur in wenigen Fällen gegeben sind, so gehört dieser Ausgang auch zu den selteneren.

2) Heilung, jedoch mit Beeinträchtigung der Function des Gelenkes, indem der entzündliche Process bereits derartige Veränderungen gesetzt hat, dass eine vollkommene Wiederherstellung nicht mehr ermöglicht werden kann. Es kommt in derartigen Fällen, wenn die knorpeligen und knöchernen Theile verhältnissmässig weniger gelitten, die Kapsel, die Gelenkbänder und anliegenden Weichgebilde hingegen grössere Zerstörung erfahren haben und der Heilungsprocess mit Zusammenziehungen, Verwachsungen, Absinkungen einhergegangen ist, zur Steifigkeit mit gehinderter Bewegung (falsche Ankylose), oder wenn auch die knöchernen Theile und die Kapsel intensiver ergriffen werden und bei der Heilung durch Knochenneubildung gegenseitig verwachsen sind, zur wahren Ankylose. Letzteres Resultat hezwecken auch eine

Reihe von Operationsverfahren, während Heilung mit wenigstens einiger Beweglichkeit für gewisse Fälle vortheilhafter ist und ebenfalls durch operative Verfahren von den Chirurgen angestrebt wird. Die falsche Ankylose gibt nicht selten in der eben erwähnten Absicht Veranlassung zu operativen Eingriffen, während wiederum die wahre Ankylose, wenn sie mit bedeutenderen Difficultäten verbunden ist, Gegenstand manueller Behandlung wird.

3) Heilung jedoch mit Lageveränderung der das Gelenk zusammensetzenden Knochen, wenn im Laufe der Entzündung, nach Zerstörung der Halthänder und Befestigungsmittel, sowie nach Eröffnung der Gelenkkapsel, durch irgend einen, meist geringfügigen Anlass, Ausweichen eines oder mehrerer Knochen aus der natürlichen Lage erfolgt ist (*Luxatio spontanea*). Hat diese derartige Lagestörung länger bestanden, so wird sie selten ein erfolgreiches Object für chirurgische Eingriffe geben, nur tie und da wird bei abgelaufener Entzündung und bei nicht zu lange bestehender Lageveränderung ein solches Verfahren mit günstigem Resultate vorgenommen werden können.

Therapie.

Die Behandlung zerfällt in zwei Theile: 1) in eine allgemeine gegen die Grund-Krankheit und 2) in eine örtliche gegen die Local-Affection gerichtete.

In letzterer Beziehung ist eine vollkommen ruhige und passende Lage des kranken Theiles von grösster Wichtigkeit und erste Bedingung jeder Behandlung, die von Erfolg gekrönt sein soll. Es ist bereits darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Kranken inständig eine gewisse Lage des Gliedes aufsuchen und beibehalten, da jedoch diese Lage und Stellung des betreffenden Gelenkes im Laufe der Entzündung meist eine bleibende wird, dieselbe aber in manchen Fällen für die Function ungünstig erscheint, so muss möglichst darauf gesehen werden, dass die Lagerung eine solche ist, welche beim Ausgange in Ankylose die Gebrauchs-fähigkeit in nicht zu hohem Grade beeinträchtigt. Der Kranke gewöhnt sich in der Regel bald an die dem Gliede gegebene Richtung, wenn dieselbe auch von der durch ihn selbst aufgesuchten entgegengesetzt sich verhält.

So lange die Entzündung noch besteht, muss ununterbrochen Ruhe eingehalten werden, und erst nach Abfluss desselben darf unter Anwendung jeder Vorsicht und unter möglichster Schützung des Gliedes mit Bewegungen begonnen werden.

Gegen die Schmerzen sind Narcotica sowohl innerlich, als äusserlich in Form von Morphiumsalbe etc. anzuwenden, und haben dieselben einen bedeutenden Grad erreicht, so hat man sich nicht vor dem Gebrauch der Kalte, selbst der Application des Eises zu scheuen.

Als zertheilende, Resorption befördernde Mittel hat man vielerlei empfohlen: am meisten werden die Jodpräparate (Jodkalisalbe, Richter'sche Jodlösung zum Einpinseln: Jod. pur., Kali hydrojod. ana 4,0 Glycerin 8,0) angewendet; Quecksilberpräparate erfordern viel Vorsicht.

Jobert empfahl vorzuziehen das salpetersaure Silber als ein treffliches Mittel bei chronischen Gelenkentzündungen. Man beginnt mit

einer Salbe aus salpetersaurem Silber 4,0 auf 30,0 Fett und lässt davon zweimal täglich in der Menge von 2,0—4,0 einreiben, allmählig steigt man mit dem salpetersauren Silber bis zu 12,0 auf 30,0 Fett. Als Ableitungsmittel sind Haarseife, Fontanelles, Moxen, das Glühisen angewendet, besonders hat letzteres durch Rust grossen Ruf sich erworben. — Doch entspricht der Erfolg bei Weitem nicht immer den gehegten Erwartungen.

Gegen die Dyskrasie sowohl als gegen die örtliche Affection finden vielfach Bäder ihre Anwendung, dieselben sind jedoch nur unter der Voraussetzung zu gebrauchen, dass dem Kranken die Lageveränderung und die Bewegung nicht grösseren Schaden verursachen würde, als das Bad Nutzen stiften möchte. Vorzüglich sind es Jod- und Brombäder, welche sich eines gewissen Rufes erfreuen; ihrer Einfachheit und Wohlfeilheit wegen verdienen Bäder mit Kochsalz empfohlen zu werden. Hier schliesst sich die Prieznitz'sche Methode bei Gelenkheiden Scrofulösen an, welche zwar in ihrer ganzen Anordnung über den Körper wegen der geringen Menge von Kräften, die das Kind bei der erschöpfenden Cur zu veranlassen hat, zu verwerfen ist, jedoch local an dem kranken Gelenke volle Berücksichtigung verdient. Bei vorhandener Eiterung ist für guten Abfluss des Eiters, sowie für einfachen nicht reizenden Verband der Fistelöffnungen zu sorgen. Bei Abscessen, die sich in der Nachbarschaft des Gelenkes entwickeln, gegen die Haut vorzudringen, beschränkt mit der Eröffnung nicht geizig zu werden, hingegen sollen solche Eiteransammlungen, welche mit dem Gelenke zusammenhängen oder nach Durchbohrung der Gelenkkapsel bis unter die Haut gelangt sind, möglichst spät geöffnet werden, wenn die Kräfte des Kranken im Sinken sind, da der Process dann in der Regel rascher seinen lethalen Ende zugeht.

Tritt Vereiterung im Gelenke ein und ist bei der geeigneten localen und allgemeinen Behandlung nicht zu hoffen, dass sich Ankylose bildet, sondern verschlimmern sich die Zufälle und ist heftige Consumption zu befürchten, so kommen die chirurgischen Eingriffe als das letzte zur Lebensrettung mögliche Mittel in Frage, vorausgesetzt, dass der Zustand des Kranken — worüber natürlich jeder einzelne Fall Aufschluss geben muss — überhaupt noch ein operatives Verfahren zulässt. Bei denselben kann es sich um Entfernung der kranken Knochentheile — Resection — oder um Wegnahme des kranken Gliedes, Amputation oder Exarticulation, handeln (vgl. darüber die einzelnen Erkrankungen der Gelenke).

Bei vollkommen chronisch gewordenen Gelenkentzündungen eignen sich in manchen Fällen die Druckverbände um das betreffende Glied mit oder ohne gleichzeitige Anwendung von Resorption befördernden Mitteln, besonders Jodpräparaten. Die Compression kann durch Leinwand- oder Flanellbinden ausgeübt, oder in dieser Absicht ein Gyps- oder Klebsterverband um das Gelenk applicirt werden, wodurch dieses auch am besten in der gewünschten Lage erhalten wird. Fistelgänge und Geschwüre um das Gelenk geben keine Contraindication; der Verband ist dann mit Feinseiden, Oeffnungen zu versehen und öfters zu erneuern. Bieten Ankylosen, in so fern sie den Gebrauch des betreffenden Gliedes in bedeutenderem Grade behindern, Veranlassung zur Behandlung, so wird man je nach der Natur derselben einfachere

und gelindere, oder gewaltthamer und selbst operative Verfahren auszusuchen haben. Zu ersteren sind zu rechnen: Local- und allgemeine Bäder, Douche, Fomentationen, unterstützt durch passive Bewegungsversuche, Apparate und Maschinen, die successiv wirken; zu letzteren gehören die gewaltsamen Zerreißen und Extensionen, entweder mit Hilfe von Maschinen — oder in der Narcose nach dem Vorgange von Langenbeck. Als erleichternder Act kann die subcutane Durchschneidung von verdickten aponeurotischen, sehnigen Gebilden, Bändergewebsträngen etc. vorausgeschickt werden. Als operative Eingriffe werden bei knöcherner Ankylose die einfache Durchschneidung des Knochens oder die Amputation oder Resection von verschiedenen gestellten Stücken vorgenommen.

Die serofulöse Entzündung im Hüftgelenke.

(Coxitis serofulosa, Coxarthrosis, Coxalgia, Morbus Coxarum, Luxatio spontanea, Freiwilliges Hücken).

Diese Krankheit kommt unter den Gelenkentzündungen bei Weitem am häufigsten vor und befällt die serofulösen Kinder in den verschiedenen Lebensaltern, sehr oft zur Zeit der zweiten Dentitionsperiode. Dieselbe geht meist von den knöchernen Theilen des Gelenkes — am häufigsten vom Hüftbeinkopfe — aus, seltener von der Synovialmembran oder den umgebenden Weichtheilen und breitet, je nachdem der Verlauf einen acuten oder chronischen Charakter hat, Verschiedenheiten in ihren Stadien. Bei der acuten Entzündung entstehen schnell im Hüftgelenke und dessen Nachbarschaft heftige Schmerzen, welche sich vorzugsweise an der inneren Seite des Schenkels bis zum Knie ausbreiten und bei Berührung des Hüftgelenkes oder bei Bewegungsversuchen sich vermehren. Letztere werden sorgfältig gemieden, die Schenkel gegen den Unterleib angezogen und etwas nach Innen gewendet. Die Schmerzen nehmen meist bei Nacht zu und stören den Schlaf oft vollkommen, dabei sind in der Regel lebhaft Fieberbewegungen vorhanden, welche die Kräfte auffallend auch herabbringen. Das Stehen und Gehen ist dem Kinde höchst beschwerlich oder auch ganz unmöglich, es stützt dabei das ganze Gewicht des Körpers auf die gesunde Extremität, zieht die Hälfte der leidenden Seite in die Höhe und dreht umzufallen. Die Gegend des Hüftgelenkes, besonders die Hinterbacke erscheint mehr oder weniger angeschwollen, die Falte derselben meist tiefer stehend; beide Extremitäten sind entweder gleich lang oder die kranke Extremität scheint etwas verkürzt oder verlängert. Zertheilt sich die Entzündung nicht — der seltenere Fall —, so geht sie unter heftiger Verschlimmerung der allgemeinen und örtlichen Zufälle in Eiterung über; es kommen Abscesse in der Nähe des Hüftgelenkes oder in einiger Entfernung von demselben zum Vorschein, communiciren mit der im Gelenke gebildeten Eitersammlung, brechen nach Rührung der äusseren Haut auf und geben zu einer intensiven Eiterung und Jauchung Veranlassung. Bei rasch fortschreitender Zerstörung der knöchernen Theile, wodurch der Gelenkkopf kleiner, der Hohlraum grösser wird und also ein räumliches Mismatch zu Stand kommt, kann der Schenkelkopf sich leicht dislociren und so einer wirklichen Verwänderung seiner Längenverhältnisse gegenüber dem anderen Ver-

anlassung geben. Das Fieber nimmt bald nach dem Auftritte den Charakter des hektischen an, die Kräfte sinken, die Kinder magern bedeutend ab, die Muskeln der Hüfte und des Oberschenkels werden schlaff. Oft unterliegen nun die Kinder dem fortdauernden Consumptionsfieber, welches auch mit pyämischen Erscheinungen einhergehen kann, und sterben, indem der ganze Process nur sehr kurze Zeit gewährt haben kann — nur in seltenen Fällen mindert sich die Eiterung, es lösen sich Knochenstücke los und die Abscessöffnungen schliessen sich.

Beim chronischen Verlaufe der Hüftgelenkentzündung bemerkt man im Anfange ein oft nur ganz unbedeutendes Schleppen oder Nachschleifen der Extremität beim Gehen des Kindes, dabei stellt sich leichte Ermüdung mit Klagen über Schwäche und Steifheit im Beine ein, der Gang wird bei stärkeren Anstrengungen unsicher, wobei das Körpergewicht ebenfalls meist auf der gesunden Beckenseite und Extremität ruht. Der Schmerz ist nicht bedeutend und nicht anhaltend, ist meist vage im Schenkel herumziehend und gleicht dem rheumatischen: nicht selten ist derselbe am Morgen vorhanden, schwindet im Laufe des Tages und zeigt sich Abends unter leichten Fiebererscheinungen wieder. Am Hüftgelenke bemerkt man wenig Krankhaftes. Lässt man den Patienten die kranke Extremität in die Höhe heben, so bemerkt man hier und da schon eine geringe Rotationsbewegung des Schenkels nach Innen nebst leichter Adduction desselben. Diese Zufälle können bei schleichendem Verlaufe des Uebels Monate (selbst Jahre) lang dauern, wechseln wohl auch häufig in Besserung und Verschlimmerung.

Nach einem gewissen Zeitraume ändert sich, ohne dass oft eine bestimmte äussere Ursache nachzuweisen wäre, das Krankheitsbild und neigt sich mehr und mehr der acuten Form zu. Es stellen sich die bekannten Schmerzen im Knie ein, welche meist sehr heftig sind, ohne jedoch durch die Berührung und durch Druck vermehrt zu werden. Die Knieschmerzen hat man durch Reizung der äussersten Hautzweige des N. obturator. oder des Saphenus internus zu erklären gesucht. Der Gang wird stärker beeinträchtigt, es entsteht Hinken, der Fuss berührt nur mit der Spitze den Boden, während das Gewicht des Körpers auf dem ausgestreckten, gesunden Beine zu ruhen kommt. Beim Sitzen wird nur die Hinterbacke der gesunden Seite auf die Unterlage gebracht und will der Patient irgend einen Gegenstand vom Boden aufheben, so beugt derselbe nur das gesunde Knie, während die kranke Extremität steif gehalten wird.

Im weiteren Verlaufe treten Symptome ein, welche zu den verschiedensten Annahmen und Deutungen Veranlassung gegeben haben und deren bereits oben Erwähnung gethan wurde: nämlich eine Verlängerung oder Verkürzung des kranken Schenkels im Vergleich zum anderen, ohne dass eine Lagenabweichung der das Gelenk zusammensetzenden Knochen vor sich gegangen wäre. Man nahm früher hauptsächlich an, dass der Schenkelkopf durch das Exsudat aus der Pfanne heraus gedrückt würde, wodurch Verlängerung des Schenkels zum Vorschein käme oder dass derselbe durch stärkere Muskelcontraction in die Pfanne gepresst und dadurch die Verkürzung der Extremität hervorgerufen würde. Es hat sich jedoch mit aller Evidenz herausgestellt, dass die angenommene Verkürzung oder Verlängerung keine reelle, wirkliche, sondern nur eine scheinbare ist, bedingt durch das Herab-

sinken der Beckenhälfte der kranken Seite, oder durch das Verschieben des Beckens auf der leidenden Seite nach aufwärts mit nachfolgender Krümmung der Wirbelsäule. Um diese Verhältnisse genau zu erüiren und um nicht in sehr leicht mögliche Täuschungen zu verfallen, muss man genaue Messungen anstellen und zu diesem Zwecke beide Spinae anteriores superiores im Liegen des Kranken in eine gerade Linie bringen, auf welche eine vom Schwertfortsatz des Brustbeines direkt nach abwärts gezogene rechtwinklig aufrällt. Dann sucht man die beiden Extremitäten in ganz gleiche Lagerungsverhältnisse zu setzen, und misst dann mit einem aus festem Materiale gearbeiteten Maassstabe, von der Spina bis zum Condylus internus tibiae und Malleolus internus.

Die Krankheit kann auch auf diesem Stadium zum Stillstand und zur Heilung gelangen: es schwinden dann auch die Erscheinungen der Verlängerung oder Verkürzung, vorausgesetzt, dass in der Configuration des Beckens und der Wirbelsäule nicht sehr wesentliche Veränderungen vor sich gegangen sind, welche die gerade Stellung des Beckens nicht mehr gestatten.

Macht hingegen die Krankheit weitere Fortschritte, so tritt eine mehr oder weniger bedeutende Anschwellung in der Gesäß- und Hüftgelenkgegend ein, die Haut röthet sich, es zeigt sich Weichheit und Fluctuation, welchen Erscheinungen in der Regel bald Aufbruch folgt. Dieser findet jedoch nicht immer in der Nähe des Gelenkes statt, der Eiter kann sich vielmehr weit nach abwärts einen Weg bahnen und in der Kniegelenksregion oder noch weiter abwärts zum Vorschein kommen. Wird die Gelenkkapsel vom Eiter durchbrochen, so geschieht dies meist an der hinteren oder unteren Seite, woselbst einerseits jene die geringste Dichtigkeit zeigt, andererseits auch der stärkste Anzrang des Gelenkkopfes, besonders wenn man dem Kranken die Lagerung der Extremität selbst überlässt, stattfindet. Gar nicht so selten bemerkt man, dass der Eiter aus der Gelenkhöhle durch die Communicationstelle mit dem Schleimbeutel unter dem Muscul. Biceps in letzteren und von da aus in die Beckenhöhle dringt, wiewohl er auch durch Perforation des Darmbeines von der Glutifasciaskalatur aus in den Beckencavum gelangen kann. Die durch den Durchbruch der äusseren Haut gebildeten Fistelöffnungen sind meist von schwammigen, leicht blutenden, das Niveau der Haut überragenden Granulationen umgeben, nicht selten bilden sich auch entsprechend der Perforationsstelle ausgebreitete Geschwüre in der Haut und dem Unterhautzellgewebe.

Bei fortschreitender Zerstörung der Knochensubstanz an den das Gelenk zusammensetzenden Knochen entsteht Verkleinerung des Schenkelhalbes und Vergrößerung des Pfannenraumes, also ein räumliches Missverhältniss, welches die Grundbedingung zu der sog. *Luxatio spontanea* ist, die mit wirklicher Verlängerung oder Verkürzung des Schenkels im Vergleiche zu dem gesunden einhergeht. Die Ausweichung des Schenkelkopfes oder des Restes desselben selbst erfolgt bei vorgeschrittenem cariatem Process oft sehr leicht durch die Veränderung der Lage im Bette, durch Aufheben des Kranken, durch energische Contracturen der Streckmuskeln und kann verschiedene Richtungen einschlagen. Am häufigsten findet jedoch die Luxation nach oben und hinten auf die äussere Fläche des Darmbeines statt, weil der Kopf

durch die Länge des Schenkels meist gegen den hinteren Pfannenrand drückt und dessen cartilaginöse Zerstörung am schnellsten vollendet ist, auf welche Art der Gelenkkopf ein oft äusserst geringes Hinderniss zu überwinden hat. Wird die Stelle des Darmbeines, welches dem abnormen Schenkelkopf entspricht, auch in diesen Process gezogen, so kann Durchbruch der Darmbeinhäute und Eindringen des Kopfes in die Beckenhöhle vor sich gehen, obwohl diese Möglichkeit auch ohne Luxation durch Zerstörung des Bodens der Pfanne stattfinden kann.

Neben dieser gewöhnlichen Form der Ausweichung des Hüftgelenkkopfes sind auch solche in das Foramen ischiacicum oder obturatorium auf den horizontalen Schambeinast, obwohl seltener beobachtet worden. Abstossung des kranken Kopfes und Elimination desselben durch eine grössere Fistelöffnung hat die Erfahrung gezeigt; im günstigsten Falle kann durch diesen Vorgang die Heilung, freilich mit grösserer Differenz, eingeleitet und ermöglicht werden.

Erfolgt Stillstand des Uebels und Genesung von dem in Rede stehenden Leiden nach geschickter Luxation, so bleiben die Folgen derselben in der erwähnten Weise zurück und stören den Gebrauch der Extremität meist in hohem Grade. In glücklichen Fällen bildet sich in weiterer Zeit eine Art von Gelenkhöhle neben der alten, in welcher der Kopf einige Beweglichkeit hat, meist aber ist derselbe in seiner neuen Stelle durch Adhäsionen, Verwachsungen feststehend.

Häufiger ist jedoch die Ausweichung des Schenkelkopfes Vorstufe der letzten Stadien der Krankheit. Die Eiterung wird immer profuser, die Haut wird nicht selten in grösseren Partien necrotisch, die Extremität durch Gerinnungen in den Venen oder mechanischen Druck auf diese oedematos. Das Fieber nimmt mehr und mehr den hektischen Charakter an, es entstehen Frostschauer bis zu Schüttelfrösten und die Kinder sterben unter dem Bilde allgemeiner Consumption.

Bei der acuten Form der Hüftgelenkentzündung, sowie bei der ausgebildeten Krankheit unterliegt die Diagnose nicht der mindesten Schwärigkeit: bei dem chronischen Verlaufe hingegen kann sie in den Anfangsstadien entweder mit anderen Processen verwechselt oder ganz übersehen werden. Verwechslung mit rheumatischen Affectionen, mit Hüftweh sind im Anfange der Krankheit nicht unmöglich, doch wird eine genaue Beobachtung der geschilderten Symptome, das Fehlen von Erscheinungen, den genannten Processen eigenthümlich, bald die richtige Diagnose treffen lassen, wozu auch nicht das Allgemeicleiden schon aufmerksam machen müsste.

Therapie.

Bei der Coxitis ist vor Allem auf strengste Ruhe der untern Extremität und des Hüftgelenkes zu sehen und zwar soll dieselbe in gestrecktem Zustande bei fixirtem Becken gelagert sein. Zu diesem Zwecke bedient man sich mit Vortheil der Verbände, wie dieselben für Schenkelhals- oder Schenkelhalsfracturen angegeben wurden, am besten mit zwei Schlingen für die äusseren Seiten der beiden Extremitäten, welche bis gegen die Schenkel reichen, durch ein Fussbett vereinigt sind, während für das Becken ein Riemen oder Gurt am Apparate angebracht ist. So sehr sich die Kinder Anfangs gegen diesen Apparat wehren und sträuben, besonders wenn sie schon eine

Zeit lang die von ihnen selbst aufgesuchte gebogene adducte Lagerung des Schenkels inne gehalten hatten, so leicht gewöhnt und getragen sie denselben, besonders wenn man denselben anfangs nur einige Zeit lang anlegt und dann erst allmählig weiter steigt, bis er fast immer gebraucht wird.

Auch der Gyps- oder Kleisterrverbande bedient man sich mit Vortheil zur Ruhighaltung der Gelenkgegend und der Extremität: besonders mögen dieselben bei leichteren Fällen gebraucht werden, da sie der Verschiebung des Beckens, wie dieselbe in schweren fast immer eintritt, nicht genug Widerstand entgegenzusetzen.

Man hat in neuerer Zeit auch die Resection des Gelenkkopfes mit Vortheil ausgeführt. Durch die Zerstörung der Gelenkhäuter und der Kapsel wird die Operation bedeutend erleichtert, so dass man mit einem einfachen Längsschnitt meist ausreicht, durch welchen man dann in der Regel sogleich den Schenkelkopf erreicht und denselben mit einer gewöhnlichen oder der Kottensäge abschneidet. Andere Operationsmethoden gründen sich auf Anlegung eines drei-eckigen, halbmondförmigen Lappens, obwohl sich keine bestimmte Schnittführung wegen der bestehenden Fistelegänge angeben lässt, sondern jeder Fall seine eigenen Vorschriften gibt.

Ist die Heilung mit Ausweichung des Schenkelkopfes erfolgt, so hat die bedeutende Deformität und Behinderung des Gebrauchs des Schenkels zu Heilversuchen geführt. Man hat, wenn die Luxation nicht zu lange bestand, die Einrichtung unter den notwendigen Vorsichtsmaßregeln zu erreichen gesucht und dadurch in manchen Fällen wenigstens eine bessere Richtung des Schenkels erzielt, die sich unter längerer Anwendung von Maschinen noch vervollkommnete.

Die serotulöse Entzündung im Kniegelenke.

Gonarthrosis, Gonalgia, Tumor albus genu, weisse Kniegeschwulst.

Der Ausgangspunkt dieser Krankheit sind entweder die knöchernen Theile des Gelenkes und vorzugsweise die Gelenkknoten des Oberschenkels, seltener der Kopf des Schienbeines oder — und zwar häufiger — die Synovialkapsel mit oder ohne die Gelenkhäuter. Die Erscheinungen sind verschieden, je nachdem das Leiden acut oder chronisch auftritt. Im ersteren Falle kommen dieselben äußerst rapid und stürmisch sich zeigen und in kurzer Zeit mit Vereiterung des Gelenkes und selbst plötzlich euligen — im letzteren sind sie häufig anfangs fast unmerklich und steigern sich erst nach und nach.

Symptome.

Das Leiden beginnt mit dem Gefühle von Steifigkeit und etwas gehinderter Bewegungsfähigkeit im Gelenke, die Beugung fällt schwerer, während das Strecken meist weniger behindert ist. Frühzeitig erkennt man die Anschwellung des Gelenkes, die durch vergleichende Messungen leicht festzustellen ist und durch welche die Gruben zu beiden Seiten des Patellarlandes, sowie die Kniekehlen ausgefüllt, voller erscheinen. Die Temperatur des Gelenkes ist meist etwas erhöht. Mit dem Fortschreiten der Erkrankung stellt sich allmählig der Unterschenkel mehr und mehr in Beugung zum Oberschenkel, die Bewegungen sind schmerz-

hafter, namentlich jetzt auch die Beugung. Es entstehen Schmerzen auch ohne Bewegungsversuche: dieselben, anfangs dumpfer Natur, gewinnen nach und nach an Lebhaftigkeit und breiten sich bis zum Fusse aus, die Geschwulst wird grösser, fühlt sich meistens eigenthümlich elastisch an, ohne jedoch das Gefühl von Fluctuationen zu geben, die Haut behält ihre Farbe, ist meist gespannt und glänzend. Beginnt Eiterung in der Gelenkhöhle, Abscessbildung in dem Umfange des Gelenkes, so nimmt das Volumen desselben rasch zu, die Haut röthet sich und man bemerkt in dem Grade, als sich die Eiteransammlung der Haut nähert, deutliche Fluctuation, meist mit starker Vermehrung der Schmerzen, die dem kranken Kinde nicht selten jede Ruhe rauben. Ausbruch erfolgt entweder im Umfange des Gelenkes oder der Eiter senkt sich längs des Unterschenkels herab und kann in manchen Fällen erst in der Gegend des Kniegelenkes zum Vorschein kommen: übrigens ist Ausbruch an jeder Stelle des Unterschenkels, jedoch sehr selten an der vorderen Fläche beobachtet worden. Auch eine Strecke weit nach aufwärts am Oberschenkel ist der Eiter, begünstigt durch die Lage der Extremität, zum Vorschein gekommen. Schreitet der Process mit cariöser Zerstörung der Gelenkknochen und Ulceration der Kapsel und umgebenden Weichtheile fort, so kann ebenfalls Lageveränderung der das Gelenk zusammensetzenden Knochen erfolgen und zwar betrifft dieselbe meist den Unterschenkel, der eine ganze oder theilweise Abweichung aus seiner Lage darstellt.

Auf jeder Stufe der genannten Veränderungen im Krankheitsverlaufe kann der Process stille stehen und zur Heilung gelangen, wobei je nach der Grösse der anatomischen Störungen mehr oder weniger bedeutendere Beeinträchtigung der Bewegung und Configuration des Gelenkes zum Vorschein kommen wird. Meist erfolgt — wenn nicht die Behandlung diesen Ausgang verhütet hat — die Heilung mit Verwachsung der Gelenkenden: in günstigeren der Behandlung leichter zugängigen Fällen mit der Bildung von Bindegewebsadhäsionen, tendinösen Strängen etc. (bei Entzündungen von der Synovialhaut ausgehend und ohne bedeutendere Störung in den Knochensubstanzen); in ungünstigen und nur durch tiefere mechanische Eingriffe zu beseitigenden durch Zusammenheilen und Verwachsen der knöchernen Theile (nach Abtossung der Gelenkkapsel und cariöser Entzündung der Knochen). Falsche und wahre Ankylose des Kniegelenkes.

Nimmt die Krankheit, ohne Stillstand zu zeigen, ihren weiteren Verlauf und tritt sie in die letzten Stadien, so zeigt der Unterschenkel ödematöse Anschwellung, die Jauchung ist meist sehr profus, die allgemeinen Erscheinungen werden immer bedenklicherer Natur und der Tod tritt in der schon mehrmals erwähnten Weise ein.

Therapie.

Bei der Behandlung gelten die erörterten Grundsätze: hinsichtlich operativer Eingriffe wird wohl hauptsächlich die Amputation des Oberschenkels in Betracht kommen, da die Resection des Gelenkes schon wegen der grossen Knochenflächen, die in neue Eiterung versetzt werden müssen, und bei den geringen Aussichten zur Heilung kaum ausgeführt werden wird.

Die serofulöse Entzündung des Fussgelenkes.

Tumor albus articuli pedis. Podarthrose.

Der gewöhnliche Anfang dieser ziemlich häufig vorkommenden Erkrankung ist ein meist ganz allmählicher, dann nach und nach intensiver werdender fixer Schmerz, entweder an der Vorderseite des Fussgelenkes oder an einer der seitlichen Gegenden, seltener die ganze Gelenkparthie einnehmend. Die Bewegung ist anfangs wenig gehindert, bald aber wird sie in der Weise beeinträchtigt, dass der Fuss etwas nachschleift, an Sicherheit im Gehen verliert, wobei dann gewöhnlich jeder falsche Tritt, jedes Anstossen an einen festeren Gegenstand, selbst das Auftreten auf feste Körper (Steine) als Schmerz im Gelenk empfunden wird. Bald zeigt sich auch eine elastische, von normaler Haut überzogene Anschwellung am Fussgelenke, wodurch die Bänder unter den Knöcheln ausgefüllt und die ganze Gelenkgegend voluminöser gemacht wird. Der Schmerz ist anhaltender, dumpf oder reissend, sich über den Fuss ausbreitend.

Im weiteren Verlaufe wird die Haut geröthet, die Anschwellung weicher, es kommt an einer oder mehreren Stellen zu Fluctuation in Folge von Eitersammlung entweder direkt aus dem Fussgelenke oder durch einen in der Umgebung entstandenen Abscess, dem dann bald Communication mit der Gelenkhöhle folgt. Vor dem Aufbruche haben die Schmerzen ihre höchste Höhe erreicht: ist jener erfolgt, so lassen dieselben meist an Intensität nach. Durch die Fistelöffnungen, deren sich manchmal eine bedeutendere Anzahl um das Gelenk herum befindet, gelangt man mit der Sonde leicht in die geöffnete Gelenkhöhle oder auf cariose Knochenstücke, den Unterschenkel- oder Fusswurzelknochen zugehörig, während sich aus denselben meist sehr übel riechender, missfärbiger Eiter, der auch mit Bröckelchen und Stückchen von Tuberkelmasse und mit Knochenpartikeln durchsetzt sein kann, entleert. Die oft wirklich sehr zahlreichen Öffnungen verdanken ihren Ursprung Abscessen, die in den Weichtheilen um das Gelenk herum entstehen und meist bis zur erkrankten Gelenkhöhle sich fortsetzen.

Der Fuss bekommt im weiteren Verlaufe, wenn die Krankheit nicht stille steht, eine unformliche Gestalt, indem der vordere Theil meist atrophirt, die Gelenkgegend klumpig vergrössert erscheint, dabei ist derselbe nach Art des Pferdehufes durch die Achillesschne in die Höhe gezogen. In der Regel nimmt die Erkrankung einen langsamen Verlauf mit acuten und subacuten Störungen, heilt manchmal mit Diffinität und bleibender Beeinträchtigung der Bewegung, kann aber auch mit tiefen Störungen des Allgemeinbefindens durch Jauchung und Entkräftigung zum Tode führen.

Therapie.

Ausser um die Amputation des Unterschenkels, welche bei dieser Form in Betracht kommen kann, handelt es sich vorzugsweise nach um die Resection des cariosen Fussgelenkes, wenn die Krankheit nur die untersten Gelenktheile des Unterschenkels und den oberen Theil des Astragalus ergreifen hat.

Die scrofulöse Entzündung des Ellenbogengelenkes
Olecranonarthrose.

Das Ellenbogengelenk ist bei der Scrofulose nicht selten Sitz der Entzündung, und zwar geht dieselbe bald von der Synovialisbursa aus und ergreift die knöchernen Gelenkenden, bald hat sie ihren Sitz zuerst in der spongiosen Substanz des das Gelenk bildenden Knochen. Die Krankheit beginnt in der Regel mit einer leichten Erschwerung der Bewegungen im Gelenke und mit gelinden Schmerzen; beide Erscheinungen neigen an Intensität zu, während sich um das Gelenk herum eine Anschwellung bildet, die anfangs ziemlich derb und elastisch ist, nach und nach weicher wird und an einer oder mehreren Stellen aufleuchtet.

Der Vorderarm ist mehr oder weniger zum Oberarm gebeugt, dabei in einer Mittelstellung zwischen Pro- und Supination. Die ganze Extremität bietet nicht selten ein eigenthümliches Ansehen, indem der Vorderarm atrophisch ist, der Oberarm auch durch die Unthätigkeit seiner Musculatur abmagert, während die Gelenkgegend spindel- oder kugelförmig angeschwollen erscheint. Durch die Fistelöffnungen kann man sich durch Sondirungsuntersuchungen über die Zerstörung im Gelenke in der Regel genauer überzeugen, da dieselben meist keinen langen Gang bilden und direct gegen den Knochen führen.

Die allgemeinen Erscheinungen sind je nach dem chronischen und acuten Verlaufe in der mehrfach erwähnten Weise verschieden, heftiges oder pyämisches Fieber entwickelt sich aus dieser Art der scrofulösen Entzündungen seltener als aus den bisher beschriebenen, kommt jedoch ebenfalls vor. Gelingt die Krankheit zur Heilung, so erfolgt diese mit mehr oder weniger bedeutender Difformität und Ankylose; Abweichungen der einzelnen Knochen aus ihrer gegenseitigen Lage erfolgen auch bei grösserer Zerstörung nicht häufig; am häufigsten ist Luxation der Ulna nach Hinter oder Ausweichen des Radiusköpfchens nach Innen zu.

Therapie.

Ausser der Amputation des Oberarmes, die bei sehr heftigen das Leben bedrohenden Entzündungen des Ellenbogengelenkes in Frage kommen kann, ist die Resection der carlösen Knochen zu erwähnen, die nicht selten bei erschöpfender Eiterung zur Lebensrettung oder Abkürzung des krankhaften Processes im Gelenke vorgenommen wurde. In der Regel wird ein Längsschnitt parallel mit dem inneren Rand des Oberarmes und zwei Finger über ihm beginnend und nach Abwärts ziehend zur Entfernung der Knochen genügen; ist diess nicht der Fall, so wird eine complicirtere, sich meist nach der Gegenwart der Fistelöffnungen richtende Schnittführung nothwendig sein. Bei allen Operationsmethoden ist auf die Erhaltung des Nervus ulnaris gebührende Rücksicht zu nehmen.

Allgemeine Behandlung der Tuberculose und Scrofulose.

Bei dem grossen Gewichte, das nach meiner Ansicht auf die hereditäre Anlage zu legen ist, kann weniger von einer Vorhütung des

Ausbruches der Deskrasie als von der Erzielung eines möglichst milden, günstigen Verlaufes der verschiedenen Localisationen die Rede sein.

Sorgfältige Abhaltung aller Verdauungsstörungen und der Aufenthalt in gut ventilirten Räumen sind die zwei Hauptpunkte, auf welche der Arzt bei Kindern tuberculöser Eltern zu dringen hat.

Die Kinder müssen lange Zeit an der Brust einer gesunden Amme bleiben. Die Entwöhnung geschehe mit der grössten Vorsicht. Später sind hauptsächlich die blähenden Speisen zu meiden. Die Hauptnahrung sei in den ersten zehn Lebensjahren Milch und Milchspeisen, Fleischsuppe, weiches Fleisch, junge, zarte Gemüses, viel reines Obst. Kartoffeln sind nicht zu häufig, das Brod nur wohl ausgebacken zu gestatten. Als Getränke bezeichnen die Kinder nichts als frisches Wasser. Kleine Quantitäten Bier können keinen Schaden bringen, Wein und andere Spirituosen aber sind strenge zu meiden.

Zum Frühstück eignet sich der Eschülkaffee, sobald die Kinder ihn aber nicht mehr gerne schmecken, darf nicht zum wirklichen Bohnenkaffee übergegangen werden, sondern die Kinder trinken dann wieder die pure Milch.

So lange die sich constellenden scrophulösen Erscheinungen fieberlos sind, darf von dieser Ernährung keineswegs abgegangen werden, stellt sich Fieberbewegung ein, so verheisst sie der Instinkt, welcher bei Kindern noch viel deutlicher als bei Erwachsenen hervortritt, von selbst. —

Was die Wohnung solcher Kinder betrifft, so ist ein sonniges Schlaf- und Wohnzimmer, möglichst gross und ventilirbar, dringend indicirt. Die Kinder müssen im Sommer den ganzen Tag, im Winter wenigstens zwei Stunden täglich im Freien sein. Häufige, lauwarme und noch besser kalte Waschungen und Bäder schützen am besten vor Erkältungen und den so häufigen Bronchialcatarrhen. Seebäder, auch Solenbäder, sind für scrophulöse Kinder von besonderem Vortheile.

Im Sommer sollen sie auf dem Lande leben, im Winter in grossen geräumigen Zimmern. Der Aufenthalt in warmen Climates während der kalten Jahreszeit hat zwar den grossen Vortheil, dass die Kinder dort vielmehr im Freien sein können, da aber dieser Ortswechsel alle Jahre vorgenommen werden muss, wenn die Kinder nicht in den folgenden Wintern beträchtlichen Schaden schmecken sollen, so werden sie hiedurch von frühester Jugend an an ein unstätes Leben gewöhnt und betrachten sich selbst als ewige Patienten. Dass solche Treibhauspflanzen keiner frhen Zukunft entgegengehen, bedarf kaum einer weiteren Versicherung.

Unter den Arzneimitteln gebührt ohne Zweifel dem Leberthran die erste Stelle. Contraindicirt ist derselbe bei fieberhaften Zuständen, bei Appetitmangel und bei Diarrhöe, welche letztere Symptome er in der heissen Jahreszeit häufig selbst erzeugt. Ausserdem wird er von allen scrophulösen und auch ausgesprochen tuberculösen Kindern jahrelang mit grösstem Vortheile genommen.

Man gibt ihn am besten 1—2 Stunden nach dem Frühstück, zu $\frac{1}{2}$ —1 Esslöffel und lässt etwas Kaffee nachtrinken oder reicht ein kleines Stückchen Zucker. Bei den meisten Kindern ist es übrigens gar nicht notwendig, durch besondere wohlgeschmeckende Dinge eine Belohnung für den genossenen Leberthran einzutreten zu lassen, indem

er ihnen gewöhnlich gar nicht zuwider ist und sie selbst daran erinnern, wenn er einmal vergessen wird. Man thut gut, sogleich beim Beginn der Cur die Angehörigen aufmerksam zu machen, dass nur durch einen Jahre lang fortgesetzten Gebrauch eine Besserung erzielt werden könne und dass man viele Monate ihn fortgeben müsse, wenn auch Anfangs keine Veränderung oder gar eine Verschlimmerung eintreten sollte.

Bei gutgenährten, übrigens stark scrofulösen Kindern kann man dem Leberthran kleine Dosen Jodtinctur, 1—2 Tropfen auf 30,0 beifügen. Zur länger fortgesetzten, internen Jodbehandlung möchte ich jedoch niemals rathen. Jod- und bromhaltige Quellen, in erster Reihe die Heilbrunner, dann die Kreuzbacher, sind bei scrofulösen Kindern also Bronchitis von sehr wohlthätiger Wirkung, bei mageren Kindern mit verblühter Bronchitis jedoch entschieden contraindicirt.

Wird nun der Leberthran nicht vertragen oder kann er unmöglich genommen werden, so muss man ein Surrogat für ihn suchen. Als das zweckmässigste erscheint der Wallnussblätterthee, wovon man täglich 2—3 Tassen trinken lässt. Hopfenabund oder Calmusaufguss werden auch von manchen Kindern genommen, von vielen andern aber wegen zu grosser Bitterkeit refused. Bei vorherrschender Blässe der Lippen und der Schleimhäute müssen eisenhaltige Mineralwässer oder leichtverdauliche Eisenpräparate, z. B. die Tinet. martis pomat. in Anwendung kommen.

Jede schwächende Behandlung, mag sie nun in Blutentziehungen oder Brechmitteln, Abführmitteln, Antimonialem oder Mercurialien bestehen, bringt in allen Fällen eine Verschlimmerung der Dykrasie und ist desshalb gänzlich zu meiden.

Traurig stellen sich die Erfolge, welche die chirurgischen Eingriffe an scrofulösen Knochen erzielen. Gewöhnlich entstehen an den Knochenenden von Neuem dieselben Knochenkrankheiten, wegen deren die Operation vorgenommen worden, und trotz aller Pflüge und Schmerzen wird der Process nur wenig hierdurch abgeändert.

3) Hereditäre Syphilis.

Syphilitische Eltern erzeugen Kinder, welche entweder mit dem Zeichen der Seuche geboren werden oder wenigstens in den ersten Lebensmonaten solche zum Vorschein kommen lassen. Prognostisch ist es wichtig zu unterscheiden, ob die Kinder die entwickelte Syphilis mit auf die Welt bringen oder erst nach einiger Zeit daran erkranken.

Kinder, bei denen im Mutterleibe die Syphilis ausgebrochen, werden meist zu früh und todt geboren oder sterben, wenn sie lebend mit Pemphignebläschen zur Welt gekommen sind, sicher bald nach der Geburt. Jene Kinder aber, welche von syphilitischen Eltern stammen, scheinbar gesund geboren werden und erst nach Wochen oder Monaten die Zeichen erblicher Syphilis erkennen lassen, genesen unter geeigneter Behandlung sehr häufig und können sich ohne alle weiteren dykrasischen Erscheinungen vollkommen weiter entwickeln.

Bevor wir auf die ätiologischen Fragen genauer eingehen, erscheint es zweckmässig, zuerst sämtliche zur hereditären Syphilis gehörenden Veränderungen zu analysiren.

Symptome.

Die angestrebte Syphilis gibt sich zu erkennen: 1) auf der Haut, 2) auf den Schleimhäuten, 3) im substantiellen Zellgewebe, 4) in den Muskeln und Knochen und 5) in den drüsigen inneren Organen.

ad 1) Haut.

Die syphilitischen Hautausschläge (die Syphiliden) theilen sich 1) in maculöse und squamöse, 2) papulöse und 3) pustulöse und bullöse.

Zur erstesten Form gehört die

Roscola syphilitica. Man versteht hierunter lins- bis beizengrosse Flecken von bräunlich kupferiger Farbe. Sie beginnen über grosseren Strecken der Körperoberfläche zugleich als hellgelbe oder rötlichgelbe Flecken, anfänglich ohne Veränderung der darüber liegenden Epidermis und ohne Verhärtung noch Erhebung über die gesund gebliebenen Hautstellen. Mit der Zeit erheben sie sich jedoch etwas, bekommen eine kupferige Farbe und sehen aus wie abgeschliffen, oder bedecken sich in andern Fällen mit feinen weissen Schuppen. In Folge einer antisyphilitischen Behandlung verschwinden sie spurlos, gelöst jedoch nichts dagegen, so infiltriren sie sich mehr und mehr, die darüber liegende Epidermis wird entweder fältig oder vertracknet oder es folgt die Entz. an zu nässen und sich mit gelben Schorfen zu bedecken.

An Hautpartien, welche fortwährend mit Flies verunreinigt werden, also an den Nates, der Schenkelbeuge und den unteren Extremitäten, kommt es oft zu Excoriationen und endlich auch zu tiefen eithymatischen Geschwüren.

Die verschonte Haut behält auch niemals ihre normale Farbe und Glätte. Sie vertauscht die rosenrothe Färbung mit einer rauchig-grauen, was am auffallendsten am Gesicht und zwar auf der Stirne zu beobachten ist. In Folge der bei Syphilis niemals ausbleibenden Abmagerung wird die Haut an vielen Stellen fältig und runzlig. Die Handteller und Fusssohlen bleiben selten intact, es kommt hier bald zu einer beträchtlichen Desquamation und bei Kindern, welche oft einen schmutzigen Schnuller mit den Händen halten, zu tiefen Excoriationen der Handteller. Diese Vorliebe der Syphiliden für die letztgenannten Hautstellen ist diagnostisch von besonderer Wichtigkeit, indem die übrigen, nicht syphilitischen Ausschläge gerade diese Theile unversehrt lassen.

Die zweite Form, die papulöse, besteht fast niemals für sich allein, sondern ist entweder mit der ersten oder mit der dritten Form, der bullösen complicirt. Die syphilitischen Papeln (Lichen oder Strophulus syphiliticus) sind von bräunlicher Farbe, hart, ohne Rötze der Umgebung, stehen meistens zerstreut und finden sich ebenfalls am häufigsten in den Handtellern und Fusssohlen. Sie sind nicht charakteristisch genug, dass man auf sie allein ohne alle weiteren Symptome die Diagnose der Syphilis stellen könnte. Wird keine Behandlung eingeleitet, so bleiben sie lange unverändert, nehmen an Zahl mehr und mehr zu, werden an vielen Stellen verkratzet und stellen dann grossere oder kleinere unregelmässige Geschwüre dar. Wird aber eine passende Behandlung eingeleitet, so schwinden sie in kurzer Zeit vollständig, was sich aus der geringen anatomischen Veränderung hinfänglich erklärt.

3) Die dritte Form, die bullöse und pustulöse, ist die bläsigste und kommt nur bei hohen Graden der Dyskrasie vor. Sie wird repräsentirt durch den

Pemphigus syphiliticus.

Man versteht hierunter gelbe, gelbgrüne oder bräunliche Eiterblasen von der Grösse eines Haarkornes bis zu der einer Bohne. Ihr Inhalt ist trüb, eiterig, reagirt alkalisch, und ihre Umgebung ist nur in schmalen Umkreise geröthet. Sie stehen meist isolirt, coalesciren nur an wenigen Stellen und finden sich am sichersten wieder auf dem Handtellern und Fesselfüssen.

Nach einigen Tagen sinken diese Eiterblasen entweder ein und vertrocknen zu einer dünnen Kruste, oder sie platzen, der Inhalt fließt ab und die hochgeröthete Cutis wird nach Abstossung der Epidermis sichtbar. Die nachfolgende Wundsecretion ist äusserst gering, so dass es nicht einmal zur Krustenbildung kommt und die bedeckenden Kleidungsstücke nur wenig befeuchtet werden. Zu tieferen Ulcerationen kann es schon aus dem einfachen Grunde nicht kommen, weil die Kinder nicht lange genug am Leben bleiben, sondern rasch collabiren und ohne alle weiteren Erkrankungen lediglich unter den Zeichen der Lebensschwäche zu Grunde gehen.

Die Prognose kann bei diesem bullösen Exantheme mit grosser Bestimmtheit lethal gestellt werden. Kinder, welche die ausgebildeten Pusteln mit auf die Welt bringen, sterben schon einige Tage nach der Geburt wieder, entwickeln sich dieselben erst etwas später, zwischen dem 3.—8. Tage des Lebens, so können die Kinder ein Paar Wochen leben, sterben hierauf aber auch fast alle, vorausgesetzt, dass wir es mit einem *Pemphigus syphiliticus* und nicht mit einem *P. contagiosus*, benignus zu thun haben. Nach Zeissl's reicher Erfahrung ist die angeborne Syphilis, welche sich fast ausschliesslich als *Pemphigus* manifestirt, unbedingt tödtlich.

Eigenthümlich ist, dass in der überwiegenden Mehrzahl dieser Fälle die Syphilis vom Vater stammt, und dass die sorgfältigste Untersuchung der Mutter gewöhnlich zu keinem positiven Resultate führt, so dass schon öfter der Zusammenhang dieses Exanthemes mit der Syphilis bezweifelt worden ist. Die Zweifel entstanden hauptsächlich in Gehäusen, wo die betreffenden Väter natürlich nur selten zu ermitteln sind, während man in der Privatpraxis die früheren und jetzigen Gesundheitsverhältnisse des Vaters erforschen kann. Es stellt sich im letzteren Falle heraus, dass regelmässig der Vater an secundärer Syphilis leidet oder wenigstens gelitten hat. Man hat sogar schon öfter beobachtet, dass, nachdem der Vater einer vollständigen, anti-syphilitischen Cur sich unterworfen hat, die hierauf erzeugten Kinder normal und ohne alle Zeichen von Syphilis zur Welt kamen und auch in der Folge gesund blieben.

Ausser diesem charakteristischen *Pemphigus* kommen bei syphilitischen Kindern auch noch in späterer Zeit eiterhaltige Pusteln vor, welche jedoch auf hartem, rothem Grunde stehen und nach dem Platzen tiefe speckige Geschwüre zurücklassen (*Ecthymapusteln*).

Am charakteristischsten für die erst nach der Geburt ausbrechende Syphilis sind die Hautgeschwüre und Rhagaden, welche mit besonderer

Vorliebe die Mundwinkel, die Lippenränder, den Aft und die Genitalien befallen. Die Lippengeschwüre sind flach, haben einen gelben, wenig indurirten Grund und halten sich Anfangs genau an die rothe Linie, welche die Lippen umsäumt. Erst später verlassen sie diese ihre ursprüngliche Stelle und greifen über auf die nächstgelegenen Hautpartien, namentlich die Unterlippe und das Kinn, wo durch die Speisen und durch den Schmalz die Epithelmis ohnedem erweicht und erodirt ist.

Unter Rhagaden versteht man Einrisse der Lippen in der Richtung der natürlichen Hautfalten. Sie entstehen zuweilen in ganz gesunden Lippen, gewöhnlich aber sind vorher die oben geschilderten Geschwüre vorhanden, durch deren Krusten die Lippen spröde werden, und bei stärkerer Ausdehnung, wie sie durch jedes Geschrei bedingt wird, einreißen. Die kleinen Einrisse werden nun durch den Geschwürseiter verunreinigt und es kommt zu ziemlich tiefen gelben Einschnitten, welche bei jeder Zerrung von Nüssen klaffen und aus demselben Grunde auch außerordentlich langsam heilen.

Dieselben Rhagaden finden sich auch, jedoch viel seltener als am Mund, an den Nasenlöchern, am After und an der Vulva der Mädchen, und zuweilen auch an dem inneren Augenwinkel. Die der Lippen sind deshalb noch von besonderer Bedeutung, weil durch sie eine sichere directe Infection von einem syphilitischen Säugling auf eine gesunde Amme vermittelt wird.

Was schließlich die Hautsecretion betrifft, so kommen zuweilen bei syphilitischen Kindern übelriechende Schweißse am ganzen Körper, namentlich aber am Kopfe, vor. Dieselben verschwinden, sobald die Dyskrasie getilgt ist.

2) Schleimhäute

Die erste Erscheinung der hereditären, einige Wochen nach der Geburt entstehenden Syphilis ist eine Schwellung der Nasenschleimhaut. Die so erkrankten Kinder athmen immer mit offenem Munde und schnarchen während des Schlafes. An der Aussenseite der Nase ist keine Veränderung zu bemerken, die Schleimhaut der Nasenlöcher aber erscheint geröthet und geschwollen. Nachdem diese Schwellung einige Tage bestanden, stellt sich eine eitrige Secretion ein, *Coryza syphilitica*, der Eiter ist anfangs schleimig und wird später blutig, juckartig, worauf er auch die Oberlippe antztt. Die abdam weiterfressenden Geschwüre können endlich auch die Knochen ergreifen und Necrose und Exfoliation des Vomer, der Muscheln und des Siebbeines verursachen. Wenn anders die Kinder so intensive Syphilis überstehen, so sinkt zum mindesten hierauf die Nase ein und es blüht das Gesicht Zeilbens entstell.

Auf der Mundschleimhaut und auf der Zunge entstehen dieselben flachen Geschwüre wie an den Lippenrändern, sie gehen niemals mehr in die Tiefe und vernarben leicht, wenn eine entsprechende Behandlung eingeleitet worden ist.

Die Rhagaden und Geschwüre am Mastdarm, an der Vulva und dem Präputium wurden schon erzählt. Leucorrhoea und Ulceration der Vagina kommt ziemlich oft vor. Die Ovarial- und Oophoralmoleculen syphilitischer Kinder unterscheiden sich nur durch ihre grosse

Intensität von denen der nicht syphilitischen. Bei dieser Ophthalmo-blauertheile erweicht beiderseits die Cornea in kürzester Zeit und der Process endet höchst traurig mit Phthisis des Augapfels.

§ 8) Subcutanes Zellgewebe

Bei vielen syphilitischen Kindern entwickelt sich Gummata im Unterhautzellgewebe, welche keinen Zusammenhang mit den Lymphdrüsen haben. Mögen die erweichten Gummata mit der Lancette geöffnet werden oder spontan aufbrechen, in allen Fällen wird die Eröffnungstelle geschwürig und vernarbt erst nach längerer Zeit mit starker Pigmententwicklung. Sehr häufig beobachtet man Nagelverschwörungen, Onychia, zugleich an mehreren Fingern und Zehen. Auch diese Prozesse sind sehr langwierig, besonders wenn die Finger mit dem Schauler viel in Berührung kommen, der neue Nagel wird dann gewöhnlich löcherig, natürlich.

Die Lymphdrüsen in der Nähe syphilitischer Geschwüre schwellen wohl consensuell an, gehen aber selten in Eiterung über. Im Allgemeinen kann man sagen, dass der Lymphdrüsenapparat der Kinder durch Syphilis viel weniger afficirt wird, als durch Scrophulosis und Tuberculosis.

§ 9) Muskeln und Knochen

Bei intensiver, in den ersten Wochen nach der Geburt sich entwickelnder Syphilis kommen auch Paralyse der oberen, seltener der unteren Extremitäten vor. Diese Lähmungen erstrecken sich nicht immer über ganze Extremitäten, und sind auch nicht immer vollständige, indem meistens eine schwache Bewegungsfähigkeit einzelner Muskelgruppen zurückbleibt.

Die Knochen theilnehmen sich selten an der hereditären Syphilis. Man hat die angeborene Fragilitas ossium, bei der sämtliche Röhrenknochen auf die geringste Gewalt zerbröckeln, und welche natürlich nur bei todtegeborenen oder bald nach der Geburt sterbenden Kindern vorkommt, mit Syphilis der Eltern in Zusammenhang gebracht.

Es ist dieser Process übrigens ausserordentlich selten, und bei den bisher bekannten Fällen wurde der Nachweis der Syphilis durchaus nicht immer in genügender Weise geliefert.

Periostitis und Necrose einzelner Knochenpartien, bei secundärer Syphilis der Erwachsenen ein sehr gewöhnlicher Process, kommt bei hereditärer Syphilis der Neugeborenen nur selten vor.

§ 10) Drüsen und Organe

Die Abscessen in der Thymusdrüse, von denen schon pag. 257 die Rede war, werden mannigfach bezweifelt, indem die physiologischen Hohlräume, die sich bei Resorption dieser Drüse bilden, von Abscessen kaum zu unterscheiden sind.

Die Veränderungen der Leber wurden pag. 191 schon ausführlich beschrieben. In den Lungen, der Milz und den Nieren hat man ebenfalls gummöse Geschwülste specifischer Natur gefunden. Es konnten die damit befallenen Kinder meist schon mit heftigem Exanthem zur Welt und sterben regelmässig nach wenigen Tagen.

Verlauf und Ausgänge

Sobald die ersten Zeichen der hereditären Syphilis aufgetreten sind, was mit Ausnahme des angeborenen Pemphigus erst 1—6 Monate nach der Geburt zu geschehen pflegt, so magert das Kind ab, wird unruhiger und bekommt allmählich das charakteristische, rauhige Aussehen. Die künstlich ernährten Kinder erliegen gewöhnlich der Anämie oder einem damit verbundenen Darmstarr. Die Brustkinder genesen bei geeigneter Behandlung ziemlich regelmässig. Je später die Syphilis sich einstellt, um so günstiger ist die Prognose. Je früher, um so ungünstiger.

Aetiologie.

In der grossen Mehrzahl der Fälle stammt die hereditäre Syphilis vom Vater, nicht von der Mutter. Ist die Mutter secundär syphilitisch, so kommt die Schwangerschaft fast niemals zu ihrem normalen Ende, sondern es erfolgt Abortus oder mindestens Frühgebur. Es ereignet sich dies zwar auch bei secundärer Syphilis des Vaters, jedoch viel seltener, die Schwangerschaft verläuft hier gewöhnlich normal, das Kind aber kommt entweder mit Pemphigus syphiliticus schon zur Welt, oder lässt die oben geschilderten Zeichen der hereditären Syphilis in den ersten sechs Monaten des Lebens erkennen.

Wenn der Vater an secundärer Syphilis leidet, so kann die Mutter ganz intact bleiben und dennoch ein syphilitisches Kind gebären, ja es kann sich die Empfängniss und Geburt solcher Kinder sogar mehrmals repetiren, ohne dass die Mutter im geringsten infectirt würde. Diese oftmals constatirte Thatsache ist um so merkwürdiger, als das fötale Blut doch direct mit dem mütterlichen communicirt und der Fetus den specifischen Pemphigus schon im Mutterleibe acquirit.

Von der Mutter stammt die Syphilis nur, wenn sie vor oder während der Schwangerschaft primär infectirt und hierauf secundär wird. Wenn die Mutter erst in den letzten drei Monaten ihrer Schwangerschaft primär infectirt wird, so soll die Frucht unversehrt bleiben. Die Ansteckung eines gesunden Kindes durch primäre SchandlippenGeschwüre, mit denen es während des Geburtsaktes in Berührung kommen kann, erscheint sehr unwahrscheinlich. Die Kinder sind mit einem dicken *Vertex nasosus* bedeckt, und haben an keiner Körperstelle Epidermisverluste erfahren; sie müssen in diesem Falle vor dem Ausbruche der allgemeinen Syphilis zuerst auch ein primäres, syphilitisches Geschwür bekommen, was man kaum jemals beobachtet haben wird.

Eine weitere, höchst merkwürdige Thatsache ist, dass ein syphilitisches Kind, dessen Dykrasie bei ganz intacter Mutter lediglich vom Vater stammt, seine Mutter durch Sugen niemals ansteckt, während eine gesunde Amme, welcher man ein solches Kind an die Brust legt, in der Regel infectirt wird. Es resultirt hieraus der therapeutisch wichtige Grundsatz, dass man die syphilitischen Kinder sehr wohl durch ihre eigene Mutter, aber niemals durch eine Amme stillen lassen darf, indem die letztere nach geschehener Infection mit Recht gegen den Arzt klagend auftritt.

Der Weg, auf welchem ein syphilitischer Säugling eine gesunde Amme ansteckt, ist nicht immer deutlich nachweisbar. Am einfachsten gestaltet sich das Verhältniss, wenn die LippenGeschwüre des Kindes

mit einer wunden Stelle an der Brustwarze der Amme in Berührung kommen. Es wird zuweilen beobachtet, dass die Brust der Amme unverändert bleibt und sich alsbald Symptome allgemeiner Syphilis einstellen. Umgekehrt kommt es auch vor, dass eine syphilitische Amme auf ein gesundes Kind die Syphilis übertragen kann, ohne dass die Brustwarzen derselben erkrankt wären. Man braucht zur Erklärung dieser Fälle keineswegs seine Zuflucht zur Milch zu nehmen. Mir scheinen Berührungen mit der Mundhöhle oder mit den Fingern, welche die syphilitischen Partikeln kurz vorher berührt haben, viel näher zu liegen.

Es ist keineswegs notwendig, dass ein sekundär syphilitischer Vater immer syphilitische Kinder erzeugt. Eine erhebliche Anzahl solcher Kinder bleibt vollkommen frei von aller Dyskrasie. Am wenigsten empfänglich sind die Kinder eines Vaters, dessen Syphilis schon sehr inveterirt ist, die Haut und die Schleimhäute verlassen und sich als tertiäre Syphilis in den Knochen localisirt hat.

Behandlung.

Der Quecksilber wirkt bei der Syphilis der kleinen Kinder außerordentlich schnell und zuverlässig, und zwar am besten auf eudermatischem Wege. Ich gebe schon seit mehreren Jahren keine Quecksilberpräparate mehr innerlich — die beliebtesten sind hier das Calomel und der Mercurius solubilis Habermanni —, sondern lasse auf gesunde Hautstellen, welche sich innerhin noch in genügender Ausdehnung finden, täglich 0,5—1,0 graue Salbe tüchtig einreiben. Wenn die Salbe Abends eingegeben, kann man, ohne die Cur zu beeinträchtigen, am andern Abend ein Bad geben lassen, worauf sogleich von Neuem geschmiert werden muss.

Die gefährlichen Geschwüre behandelt man am besten mit Chamillen-theeläppchen, wo solche sich anbringen lassen, die Ekzemen und Lippengeschwüre bessern sich auf mehrmalige Bienensteinetriebe zuweilen. Die Bäder mit Sublimat, wovon 1,0—4,0 auf ein Bad genommen werden soll, sind kostspendend, für das Kind und dessen Wärterpersonal gefährlich und bei unsichtig geleiteter Schmierker vollkommen zu entbehren. Der interne Gebrauch des Jodes kann bei kleinen Kindern selten lange genug fortgesetzt werden, indem hierdurch häufig Verdauungsstörungen und ein rasch fortschreitender Marasmus entstehen.

Die Diät sei möglichst nahrhaft. Am sichersten gedeihen die Kinder, welche an der Brust ihrer eigenen Mutter genährt werden. Bei künstlich ernährten Kindern ist die Hauptaufgabe, durch sorgfältig bereitete Kost und schleimige Getränke Diarrhöe zu verhüten. Wenn dass geschieht, so sterben viele Kinder die Syphilis.

Sach-Register.

(Die Ziffern in runden Klammern beziehen sich auf die Seiten.)

A.

- Acanthia 391.
 Alter, Färbungsfehler desselben 357.
 Anas 27.
 — deren Milch 79.
 Anzina tessellata 399.
 Apnea infantum 228.
 Arterien, Krankheiten derselben 395.
 Arteritis aneurysmale 54.
 Arthritiden 323.
 Ascaris lumbricoidea 184.
 Asites 305.
 Asphyxia neonatorum 45.
 Asthma Milleri 307.
 — thymicum 728.
 Atelactasia pulmonum 10, 352.
 Atresia papillae venteris 381.
 — rectalis 416.
 Auge, Bildungsfehler desselben 363.
 Augenmuskelfalte, angeborene 392.
 Auscultation, Cardien 29.

B.

- Balanitis 417.
 Bandhöhl, Krankheiten derselben 159.
 Barosteatitis 407.
 Bällern 451.
 Bence-Jones'sches Löss 184.
 Bilgische Nimmerkrankheit 390.
 Bronchialdrüsen, Tuberculosa derselben 383.
 Bronchitis 238.
 Bronchitis, Entzündung derselben 64.
 Bulbus 116.

C.

- Caput succedaneum 51.
 Caries 399.
 Catarrhes vesicae 384.
 Catarrhus urinae vesicae 394.
 — urethralis acutus u. chronicus 398.

- Catarrhus vesicae 397.
 — — während der Des-
 cension 19.
 Catarrh der Mundschleimhaut 75.
 Catarrhus ventriculi 128.
 Cephalocephalus 36.
 Chloera asiatica 377.
 Chorea minor 388.
 — major 367.
 Cicca 420.
 Coloboma iridis 383.
 Colostrum 33.
 Comedia 471.
 Congestio 473.
 Conjunctivitis hyperaemica 67, 100.
 — serena 439.
 Constrictio während der Descentu 50.
 Coryza 396.
 Coxarthrosis 323.
 Cruris scrofulosa 323.
 Cruristipes 428.
 — bei Laryngismus stridulus 231.
 Cryptorchidismus 421.
 Cyclops 382.
 Cystitis 407.

D.

- Darmblutung der Neugeborenen 46.
 Darrhöhlenbeschwerden 94.
 Desquamation im Schenkel 421.
 Diarrhoea 123.
 Diarrhoea, Krankheiten derselben 73.
 Diphtheritis der Mundhöhle 81.
 — — Mündung in Folge der-
 selben 83.
 Diphtheritis — Myocarditis in Folge der-
 selben 83.
 Dysenteria 146.
 Dyskinesia 473.
 Dryopteris 114.
 Ductus arteriosus Botalli 2.
 — venosus Arterii 1.

Laryngitis 110.
 — croupöse 225.
 Larynx, Krankheiten desselben 110.
 Leber, Krankheiten desselben 190.
 — angeborene Anomalien 190.
 — Syphilis desselben 191.
 Leukorrhoe 428.
 Liebig'sche Suppe 39.
 Lithiasis 412.
 Luftröhren, im Selbstst. der Nage-
 forsten 42.
 Lungen, Krankheiten desselben 238.
 Lungenblutungen 259.
 Lungenbrand 261.
 Lungenempyem 254.
 Lungenentzündung 241.
 Lungeninfarkt, hämorrhagischer 260.
 Lungenkrebs 269.
 Lungenarteriosclerose 265.
 Lymph 495.
 Lymphoepithelium 505.
 Lymphknoten, Scropheln desselben 161.

M.

Magenverwundung 112.
 Malaria Foli 514.
 Mandarmpolypen 154.
 Mandarmpolyp 155.
 Marm 440.
 Mastitis mammaria 67.
 Mastitis 419.
 Mercuro, dessen Hekologie 4.
 Mediastinalarterien, Krebs desselben 269.
 Melanosis 91.
 Melanosis acutiformis 85.
 Melanosis vesicularis 245.
 — papillaris 341.
 Mikrotonia 36.
 Milch, deren Chemie 32.
 — Nachweis von Medicamenten in
 derselben 34.
 Milch, deren praktische Prüfung 35.
 — verdauende 41.
 Milchprobe, optische 35.
 Milz, bei Typhus 171.
 Milz, Krankheiten desselben 195.
 Mischgicht 163.
 Morbilli 416.
 Morbus Brightii 329.
 Mumps 102.
 Mucorrhoe 85.
 Nasenhöhle, Krankheiten desselben 73.
 Natrium 469.
 Myelitis spinalis 341.

N.

Nabel, Brand desselben 55.
 — Krankheiten desselben 51.
 Nabelarterien 2.
 Nabelblutung 56.
 Nabelbruch 57.

Nasenhöhle, Operation desselben 54.
 Nasengefäße, Entzündung desselben 54.
 Nasenknorpel, chronischer 55.
 Nasenkarzinom, periodisches 251.
 Nasen 469.
 — nasale 505.
 Nasenbluten 265.
 Nasenhöhle, Krankheiten desselben 264.
 Nasenhöhle, fremde Körper in derselben
 266.
 Nasenrinne 469.
 Nasenverletzung, Störungen desselben 248.
 Nestliches Kinderspiel 41.
 Netzen des Gehirns 227.
 Netze, Krankheiten desselben 298.
 — Bildungsfelder 298.
 — Stenose 494.
 — Symp 494.
 Netze 59.

O.

Oedipus 118.
 Oedema pyrenum 257.
 Oesophagus 111.
 Oen, fremde Körper in derselben 296.
 Oesophagitis 509.
 Otitis 419.
 Ophthalmoblastom 67.
 Otorrhoe 366.
 Otitis seroflida 347.
 Otitis externa 357.
 — interna 391.
 Otitis ventriculi 185.

P.

Palladium 51.
 Palsus 355.
 — gutta 254.
 Paraphimosis, asphyxica 415.
 — erythema 415.
 Parotitis 102.
 Paraphimosis benigna 446.
 — syphilitica 534.
 Penis, dessen Bildungsfelder 415.
 Pericardium des Thorax 17.
 Pericarditis, vermindert durch die
 Bauchpresse 18.
 Pericardium der Thorax 20.
 Pericarditis 256.
 Pericarditis seroflida 394.
 Pericarditis 194.
 Pericardium 270.
 Pilektis umbilicalis 54.
 Pleura, Krankheiten desselben 267.
 Pleuritis 267.
 Pneumonia hypostatica bei Typhus 169.
 — tuberculosa 244.
 — lobaria 244.
 Pocken 481.
 Poliarthrose 529.
 Polypen des Mandarins 154.

Polyplogia 116.
 Prädation auf 155.
 — Inzision 74.
 Pseudokrupp 225.
 Puls der Kinder 15.

15.

[illegible]

5.

Scabies 487.
 Scaphalus 490.
 Schallhüllen 458.
 Schmalz 420.
 Schmelz der Neugeborenen 46.
 Schmelztrübe, Kinnhöhlen derselben 235.
 Schreyen 298.
 Schmelz der Euter 298.
 Schmersen 91.
 Schenkel verrennen 61.
 Schenkel verstaar 557.
 Schenkel des Knechtens 113.
 Schenkel der Mordschnecke 87.
 Schenkel 487.
 Schenkel 218.
 Schen 91.
 Spasme glottis 227.
 Spina 145a 145.
 Spandylarthrosis 514.
 Spandylis 514.
 Sticksen 270.
 Stenose 85.
 Stenotitis calcarialis 78.
 Streptolus erythraeus 221.
 Struma 220.
 Syphilis hereditaria 532.
 — der Thrane 536.

2.

Talun (manggah) 247
Tania lala 184
— moficanehata 184
— soliza 185
Telangitane 395
Temperaturan-temper 16
Telukau nomatun 58

Thrombosen 567.
Thymusdrüse: *Thymusglandula* 2.
 — *Paludaglandula* 237.
Thyreoidea *thyroidea* 235.
Trichocephalus *dipus* 186.
Trisax *resantorum* 58.
Tuberculosa 457.
 — *der Lungen* 265.
 — *der Bronchialdrüsen* 265.
Tumore *albus* *geras* 627.
 — *artificialis* *pedis* 579.
Typhus *coronarius* 779.
Typhus *abdominalis* 199.

1

Uebers. v. Schlegel's *perforatus* 103.
 Ueberzeugung der Kinder. Allgemeine
 Regeln 19.
 Ueberblick 98.
 Ueberblick 105.

5.

Vaccinaceae 434.
Vaginallösung 438.
Variole 459.
Varicella 451.
Varzele 469.
Veilstand, der kleine 359
 der große 367.
Veitertanz 471.
Veitertanz der Mundstiele 76.
Verruc. canalicul. 1.
Verwürgung 124.
Vibrius 149.
Virens, Entfaltung derselben 417.

W.

Wahrheitssinn der Kinder 6.
Wasserbrunn 422.
Wasserkopf, hölzerner 366.
— silberner 334.
Wasserkreis 89.
Werkstoffes 196.
Weißfels: Gestalten, deren Bedeutung
Eifel 434.
— Diphthong desselben 428.
Wetterzeichen 75.
Wurmkrankheiten 181.

7.

24lins. dems. Darchleppel 10.
 Zellverschleimung 43.
 Zeige, allgemeine Untersuchung 23.
 Zeigerbleib 94.
 Zeiger, Adhäsion 77.
 — Ektodermzeiger derselben 74.
 — Vorfall 76.

Erklärung der Tafeln.

Tafel I.

- I. Placenta. II. Leber. III. Herz. IV. Nieren. V. Blase.
 1) Aortabogen mit den aus ihm abzweigenden Hauptstämmen.
 2) Hacia arteriarum Bifurk.
 3) Arteria pulmonalis.
 4) Ductus communis Arterii.
 5) Vena cava superior.
 6) Vena cava inferior.
 7) Vena pulmonalis.
 8) Vena umbilicalis.
 9) Arteria umbilicalis.

Tafel II.

- Fig. 1 u. 2. Schematische Zeichnungen des Schädelsknochens vor Durchschneiden der physiologischen Vergrößerung der grossen Fontanelle. (ide. 100: 8.
 Fig. 3. Normale Fossenschnitt nach Fische.
 Fig. 4. Normales Ektostoma nach Fische.
 Fig. 5, 6 u. 7. Schematische Durchschnitte der verschiedenen Arten von Cephalopoden. Fig. 5. Cephalopodentypus polytypicus, Fig. 6. Cephalopodentypus. Fig. 7. Cephalopodentypus.
 8) Befüllte Kopfart. 2) Galea apertissima. 3) Pericardium. 4) Schädelknochen. 5) Ductus major. 6) Knochenwall (nur bei Fig. 5 möglich).
 Fig. 8. Schematischer Durchschnitt eines Nabelstrumpfes. a) Der Strumpf. b) Die ihn umgebende Bastring.
 Fig. 9 a u. b. Schematische Darstellung des sog. Nabelstrumpfes. a) vor, b) nach dem Abfall des Nabelstrumpfes.

Tafel III.

- Fig. 1. Die Eindrücke der Zähne in die Zunge bei Scanzoni.
 Fig. 2. Scanzoni nach Kiehnwider.
 a) Fragment eines abgeworfenen Scanzoni. b) und c) Sporen. d) Thallusfäden mit Scheidewänden. e) Faser Ende eines Thallusfaden. f) ausgesprossene. g) Thallusfaden mit Endsporen.
 Fig. 3. A. Hämatoxylin eines Darmstückes. B. Schematischer Durchschnitt nach Förster. a) Das Hämatoxylin. b) und c) Das w. aufsteigende Darmrohr. d) und e) Die Urethralstellen. f) Das mit Hämatoxylin besetzte Mesenterium.
 Fig. 4. Längsdurchschnitt des Knochens und des Mastdarms. 1) Knochens. 2) Mastdarm. a) obere, b) mittlere und c) untere Partie des Mastdarms. 3) Pericardium. 4) Uterus. 5) Vagina. 6) Schamlippen. 7) Harnblase. 8) Perineum.

- Fig. 5, 6, 7, 8 u. 9. Schematische Durchschnitte von Injektionen des Mastdarms und von dessen abnormen Anordnungen: 1) Prostata, 2) Xanthoma, 3) Anorectalprosp., 4) Blase, 5) Vagina.
- Fig. 10. Schematische Zeichnung einer Ekloge der Blase, nach Förster.
- Fig. 11, 12, 13 und 14. Schematische Darstellung der Hydroselen.
- Fig. 11. Hydroselen canalis vaginalis testis apertis.
 - 12. Hydroselen canalis testis clausis.
 - 13. Hydroselen canalis vaginalis testis apertis.
 - 14. Hydroselen canalis vaginalis testis clausis.
 a) Ein Stück Harnblase von innen gesehen. b) Offener canalis vaginalis.
 c) Harn. d) Hydroptische Ausdehnung eines Stückes des Leistenkanals.

Tafel IV.

- Fig. 1—3. *Bothriophthalmus latiss.*
 Fig. 1. Kopf in natürlicher Grösse.
 Fig. 2. Vergrößerter Kopf mit längeren Haken.
 Fig. 3. Dasselbe Stück. Die Geschlechtsöffnung in der Mitte jedes Gliedes.
- Fig. 4—7. *Tremia setacea.*
 Fig. 4. Kopf in natürlicher Grösse.
 Fig. 5 u. 6. Vergrößerter Kopf von der Seite und von oben gesehen.
 Fig. 7. Die Geschlechtsöffnung auf der Seite.
- Fig. 8—9. *Arenia latifrons* des Spitzsterns.
 Fig. 8. Ein aufgeplatztes Weibchen in natürlicher Grösse mit vorgelassenem Eingeweiden. Der trichterförmige Schwanz ist der Spermienkanal. Die weissen Schlingen sind die Eierstöcke.
 Fig. 9. Der charakteristische Schwanzende des Männchens mit doppelter Bulbe vergrössert.
- Fig. 10—13. *Oxyuris vermicularis*, Pharyngostomat.
 Fig. 10 u. 11. Weibchen in natürlicher Grösse und vergrössert.
 Fig. 12 u. 13. Männchen vergrössert und in natürlicher Grösse.
- Fig. 14 u. 15. *Trichocephalus dispar*, Trematoderm. natürliche Grösse.
 Fig. 14. Weibchen, Fig. 15. Männchen.

Tafel V.

- Fig. 1 u. 2. Schematischer Durchschnitt eines normalen (1) und eines thurallischen thurallischen Thoms (2).
- 1) Stratum, 2) Bippusknorpel, 3) Bippusknorpel, 4) In den Durchschnitt fallende Rippen, 5) Interkostalraum, 6) Fünftes Rückenwirbel, 7) Herz, 8) Kollage, thurallische Aufreissung.

Tafel VI.

- Fig. 1. thurallisches Bippusende nach Virchow.
 Fig. 2. Dornen Durchschneiden.
 Fig. 3. Durchschnitt eines thurallischen Oberbacken.
 Fig. 4, 2, 3. a) Blaufrühe Schädel der grossartigen Knochenbildung, b) Becherförmige Anordnung der jungen Knochen, c) Zuckige Weibchen zwischen Kiefer und Knochen.
 Fig. 4. thurallischer Schädel. Grösstest nach Elmer. An den beiden Seiten ist die Knochenende geschwunden, über mehr und Pericranium knochen sich.





Fig 1.



Fig 2.



Fig 5.



Fig 6.



Fig 7.



Fig 8.




Fig 9.




Fig 4.



Fig 3.









Fig. 1.




Fig. 2.



Fig 1



Fig 2



Fig 4





Fig 3





0,002	$\frac{1}{30}$ gr.
0,003	$\frac{1}{20}$ gr.
0,006	$\frac{1}{10}$ gr.
0,007	$\frac{1}{4}$ gr.
0,01	$\frac{1}{6}$ gr.
0,015	$\frac{1}{4}$ gr.
0,02	$\frac{1}{3}$ gr.
0,03	$\frac{1}{2}$ gr.
0,06	gr. i
0,12	gr. ii
0,18	gr. iii
0,25	gr. iv
0,3	gr. v
0,36	gr. vi
0,5	gr. vii
0,6	gr. x
0,7	gr. xii
0,9	gr. xv
1,0	gr. xvi

[illegible]

Demco 293-5

RJ 44
875V

Accession no.

15233

Author

Vogel, A.

Lehrbuch der

Kinderkrankheiten.

Call no.

1876.

